Revalidatie van gedragsdeviaties bij cerebraal gestoorden : een medisch-psychologisch onderzoek naar mogelijkheden van gedragstherapie

Citation for published version (APA):

Schuerman, J. A. (1977). *Revalidatie van gedragsdeviaties bij cerebraal gestoorden : een medisch-psychologisch onderzoek naar mogelijkheden van gedragstherapie*. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Rijksuniversiteit Limburg. <https://doi.org/10.26481/dis.19770923js>

Document status and date:

Published: 01/01/1977

DOI:

[10.26481/dis.19770923js](https://doi.org/10.26481/dis.19770923js)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 26 Apr. 2023

REVALIDATIE VAN GEDRAGSDEVIATIES
BIJ
CEREBRAAL GESTOORDEN

(Rehabilitation of Behaviour Disorders
in Patients suffering from Cerebral Damage).

J. A. SCHUERMAN

with an English summary
mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache
avec un résumé en Français

**REVALIDATIE VAN GEDRAGSDEVIATIES
BIJ
CEREBRAAL GESTOORDEN**

(Rehabilitation of Behaviour Disorders
in Patients suffering from Cerebral Damage).

Een medisch-psychologisch onderzoek naar mogelijkheden van gedragstherapie.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN
DE RIJKSUNIVERSITEIT LIMBURG, OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS
DR. H. A. TIDDENS, HOOGLERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE,
VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE DER DEKANEN IN HET OPENBAAR TE
VERDEDIGEN OP VRIJDAG 23 SEPTEMBER 1977 DES NAMIDDAGS OM 4 UUR
PRÉCIES, IN DE AULA DER UNIVERSITEIT.

door

J. A. SCHUERMAN
geboren te Goes

PROMOTOR: PROF. DR. J. J. C. B. BREMER
CO-PROMOTOR: PROF. DR. P. E. BOEKE
REFERENTEN: DR. B. NIEUWENHUIJSE
DR. J. MOL

AAN REVALIDANT EN REVALIDATIE IN NEDERLAND

„The day may not be far off when behavioral disorders will be treated not in hospitals or mental hygiene clinics but in comprehensive „learning centers”, where clients will be considered not patients suffering from hidden psychic pathologies but responsible people who participate actively in developing their own potentialities”.

Albert Bandura

VOORWOORD

Bij de voltooiing van dit proefschrift maak ik graag van de gelegenheid gebruik een woord van erkentelijkheid te richten tot allen die aan het tot stand komen hebben bijgedragen.

In de eerste plaats moet hier genoemd worden dat deze studie alleen mogelijk is geweest dankzij de coöperatie van vele tientallen patiënten, die tijdens hun opname in het revalidatiecentrum aan diverse onderzoeken hebben deelgenomen. Mijn gedachten in deze heb ik proberen te verwoorden in de opdracht en het motto van deze dissertatie.

Hooggeleerde Bremer, het valt mij moeilijk mijn dank jegens U in woorden uit te drukken. Uw kritische bijsturing op het pad der revalidatiepsychologie was onmisbaar. Dat ik onder uw leiding de diverse denkbeelden heb mogen verwoorden beschouw ik als een voorrecht. De vele kontakten, die hierbij hebben plaats gevonden, waren voor mij steeds een stimulans tot verdergaan. De wijze waarop U tenslotte het manuscript hebt doorgewerkt heeft mijn bijzondere waardering.

Hooggeleerde Boeke, hoewel de geografische afstand, althans in Nederland bezien, nauwelijks groter had kunnen zijn, bestond bij mij de indruk dat er op enig ander gebied van distantie geen sprake was. Integendeel, bij voortduring was tijdens onze gesprekken bij mij de zekerheid aanwezig, dat U vanuit Uw ervaring volledig begrip had voor theoretische en praktische problemen, die in een klinische setting kunnen optreden.

Zeergeleerde Nieuwenhuys, de kennis die U mij op het gebied van het experimentele design en de cognitiepsychologie in korte tijd wist over te dragen alsmede Uw kanttekeningen en aanvullingen bij deze studie zijn van grote waarde geweest. Uw samenwerking in deze heeft naar mijn gevoel onze reeds jarenlang bestaande relatie eens te meer bestendigd.

Zeergeleerde Mol, het deed mij bijzonder veel genoegen dat U naast Uw deelname aans ons zeer recent aangevangen researchproject eveneens Uw kritische aandacht vanuit neuro-fysiologische visie op deze studie heeft willen richten.

Hooggeleerde Fordyce, dankzij Uw publikaties en later schriftelijke en persoonlijke kontakten heeft U aan mij de weg gewezen voor de toepassing van leertheorie in de revalidatie.

U, Hoogleraren, Lektoren en Leden van de wetenschappelijke staf van de Faculteit der Sociale Wetenschappen der Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, betuig ik gaarne mijn dank voor het onderwijs, dat ik door colleges, praktika en bewerken van doktoraal onderwerpen van U heb mogen ontvangen. Met name de benaderingswijze van Prof. Dr. J. Barendregt heeft mij later bij studie en werk bij voortduring geïnspireerd.

De directeur van de Lucasstichting voor Revalidatie te Hoensbroek, de heer C. W. de Ruijter en de dirigerend geneesheer van het Revalidatiecentrum „Hoensbroeck”, de revalidatie-arts H. J. te Riele ben ik bijzonder erkentelijk voor de bijstelling van allerlei ideeën en methodieken vanuit het standpunt van de medische revalidatie en vanuit organisatorische- en beleidsaspecten.

Aparte aandacht wil ik hierbij besteden aan alle leden van afdeling IV van het revalidatiecentrum te Hoensbroek.

De samenwerking met de heer P. Bakker, teamleider en revalidatie-arts van het eerste uur, zal mij steeds voor ogen staan als een open diskussierelatie. De vele gesprekken met hem hebben er in niet geringe mate toe bijgedragen, dat allerlei probleemstellingen en denkbeelden helder en scherper geëxpliciteerd konden worden.

De algemene gedachtengang, dat revalidatie voor een deel opnieuw leren zou kunnen inhouden, werd mede opgenomen door de heer C. Pons, in 1973 assistent-revalidatie-arts van afdeling IV, en drie jaren later voortgedragen door mevrouw P. Hoenderdaal. Beide artsen ben ik zeer erkentelijk voor hun spontane wijze van reageren en hun bereidheid tot uitproberen van een nog onvolledig werkmodel.

Nadrukkelijk wil ik stilstaan bij de activiteiten van de onderwijsdeskundige mevrouw Van Pelt en de onder haar ressorterende therapie-assistenten. De grote bereidheid tot het meedenken en meewerken inzake de op te zetten functie-restauratie moet met grote waardering genoemd worden. De vervaardiging van materiaal en het uitvoeren van de trainingen was een niet te onderschatten opgave, die door hen allen met groot enthousiasme en nauwkeurigheid werd gerealiseerd.

Een bijzonder woord van waardering zou ik willen uitspreken voor zuster Gadiot en het verplegendenteam, dat in staat was naast hun disciplinegebonden activiteiten toch ruimte te bieden voor werkzaamheden welke voortkwamen uit een totaal andere denkwereld.

Eenzelfde uitspraak geldt in niet mindere mate voor:

de logopedisten mevrouw C. Sipkema-Van Geel, pater B. van Wel en mejuffrouw M. Beekmans;

de fysiotherapeuten de heren J. Halfens en J. Kurvers;

de arbeidstherapeuten mejuffrouw W. Heystek, de heer K. van Rooden en mejuffrouw T. Lutgerink;

de maatschappelijk werkers, de heren J. Kupers, J. Vernooy en mejuffrouw M. Hennekens;

de bezigheidstherapeuten mejuffrouw M. Brekelmans en mevrouw Van Helden;

de sport en spel-therapeuten de heren H. Dobbelsstein en T. Grendel.

Zij allen waren bereid de hun aangeboden ideeën, instrumenten en modifikatietechnieken binnen eigen vakgebied uit te proberen en hun steun te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen.

De dames M. Ploum, C. Kleykers-Roukens en M. Eussen verdienen de hoogste lof voor werkzaamheden van zeer uiteenlopende aard. Zij waren niet slechts in staat daadwerkelijk mee te werken bij programma-uitvoering en de verzameling van diverse empirische gegevens, maar bovendien hebben zij het gepresteerd dit manuscript op een accurate wijze te typen, ondanks een toch reeds volbezette dagtaak.

Mijn collega's de heren F. Riga en J. Koekkoek en de stagiaires, de dames E. Hermens en K. Beers ben ik zeer erkentelijk voor hun samenwerking tijdens de realisering van deze studie en het geduld dat zij in verscheidene opzichten moesten opbrengen in verband met de overbezetting van andere leden van de afdeling psychologie.

Het contact met diverse medewerkers van de Medische Fakulteit te Maastricht heb ik altijd zeer op prijs gesteld. In het bijzonder denk ik hierbij aan de samenwerking met Drs. L. Strijbosch, die de statistische bewerking en komputerverwerking heeft geleid, en de regelmatige gesprekken met de leden van de capaciteitsgroep Medische Psychologie.

Hoewel mijn ouders helaas geen getuige konden zijn van de realisatie van deze studie, meen ik hier mijn grootste waardering uit te moeten spreken voor hun opvoeding die mij naast vele, hier niet te noemen levenswaarden, ook de waarde van een academische opleiding heeft doen ervaren.

In niet geringe mate gaat mijn dank uit naar mijn vrouw, die mij niet slechts op direkte, maar vooral op indirecte wijze heeft bijgestaan in de tot standkoming van deze dissertatie.

INHOUDSOPGAVE

1. Introductie: Naar een revalidatie-leermodel	11
1.1. Algemene inleiding	12
1.2. Voorgeschiedenis	13
1.2.1. Uitgangssituatie	13
1.2.2. De „probleemgroep”	14
1.2.3. Inventarisatie der problematiek van patiënten met contusio cerebri	15
1.2.4. Literatuurverkenning	16
1.2.5. Behoeftte aan „basisfilosofie”	17
1.2.6. Samenvatting	18
1.3. Revalidatie en leren	18
1.3.1. Inleiding	18
1.3.2. Pijlers van de revalidatie	20
1.3.3. Leerparadigmata in de revalidatie	23
1.3.4. Keuze van verklarings- en behandelingsmodel in de revalidatie	25
1.3.5. Het revalidatie-leerproces gezien vanuit het operante paradigma	26
1.3.5.1. Krisishantering	28
1.3.5.2. Assimilatie van handicap	29
1.3.5.3. Motivatie tot (her)leren	31
1.3.5.4. Beklijving van handicap-adekwaat gedrag	32
1.3.6. Samenvatting	33
2. Een voorlopige revalidatiestrategie	35
2.1. Contusio-problematiek gezien vanuit een neobehavioristisch referentiekader	36
2.1.1. Inleiding	36
2.1.2. Inventarisatiebronnen	36
2.1.3. Resultaten van de inventarisatie	39
2.1.4. Bespreking der resultaten van de inventarisatie	42
2.1.5. Samenvatting	46
2.2. Samenstelling van een voorlopige assessmentprocedure	47
2.2.1. Inleiding	47
2.2.2. De psychologische onderzoekprocedure (PO)	48
2.2.2.1. Samenstelling	48
2.2.2.2. Assessmentuitvoering	49
2.2.3. De gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC)	50
2.2.3.1. Samenstelling van de items	50
2.2.3.2. Assessment door gedragsobservatoren	51
2.2.3.3. Assessmentuitvoering	52
2.2.4. Samenvatting	54
2.3. Opzet van een voorlopige modifikatiestrategie	54
2.3.1. Inleiding	54
2.3.2. Situatie en probleemgedrag	55
2.3.2.1. Situaties waarin gedragsdeviaties gesignaleerd kunnen worden	55
2.3.2.2. Konstatering van gedragsdeviaties	58

2.3.2.3. Het probleemgedrag nader bezien	59
2.3.3. Gedragstherapeutische technieken t.b.v. de modifikatie van probleemgedrag	61
2.3.4. Samenvatting	64

3. Uitvoering en evaluatie van een experimentele revalida- tiestrategie	67
3.1. Uitvoering van modifikatie en assessment	68
3.1.1. Inleiding	68
3.1.2. Gedragsvorming bij zero-gedrag	68
3.1.3. Toename van gedrag	70
3.1.4. Behoud van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit	71
3.1.5. Reduktie van excessief gedrag	72
3.1.6. Samenvatting	74
3.2. Statistische bewerking der Gedragsobservatieschaal Contusio Cere- bri	74
3.2.1. Inleiding	74
3.2.2. Dataverzameling	75
3.2.3. Bewerking der gegevens	76
3.2.3.1. Zwakheden in schalkonstruktie	76
3.2.3.2. Inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid	78
3.2.4. Overwegingen inzake faktoranalyse	79
3.2.5. Bespreking der resultaten	80
3.2.6. Samenvatting	81
3.3. Evaluatie van modifikaties ter vorming, toename en reductie van gedrag	82
3.3.1. Inleiding	82
3.3.2. Datapresentatie	82
3.3.3. Gedragsvorming	83
3.3.4. Toename van gedrag	89
3.3.5. Gedragsreductie	97
3.3.6. Bespreking der resultaten	113
3.3.6.1. Rekenkundige bewerking der resultaten	114
3.3.6.2. Statistische bewerking der resultaten	115
3.3.7. Modifikatie van gedragsdeviaties bij patiënten, die buiten de kategorie contusio cerebri vallen	116
3.3.8. Samenvatting	118
3.4. Evaluatie van de modifikatieprocedure ter gedragsbehoud onder toenemende stimuluscomplexiteit	119
3.4.1. Inleiding	119
3.4.2. Assessment en modifikatie	119
3.4.3. Samenstelling en kondities van experimentele en kontro- legroep	125
3.4.4. Vergelijking van training versus geen trainingkondities	128
3.4.4.1. Formulering der hypothesen	128
3.4.4.2. Toetsing der hypothesen	130
3.4.5. Bespreking der resultaten	131
3.4.6. Samenvatting	132

4. Heroriëntatie	135
4.1. Assessment	136
4.1.1. Inleiding	136
4.1.2. Assessment van gedragstekorten in de premorbide situatie	138
4.1.3. Assessment van gedragstekorten in de klinische testsituatie	139
4.1.3.1. Probleemstelling	139
4.1.3.2. De neuropsychologische benadering van Mark	142
4.1.3.3. De cognitiepsychologische benadering van Guilford	146
4.1.3.4. Ontwikkelingspsychologische benaderingen	148
4.1.3.5. Overzicht	148
4.1.4. Assessment van gedragstekorten in klinische observatiesituatie	149
4.1.4.1. Probleemstelling	149
4.1.4.2. Samenstelling van enkele gedragsobservatieschalen	152
4.1.4.3. Aansluiting tussen test en gedragsobservatieschaal	156
4.1.5. Assessment van gedragstekorten in de nabehandelingssituatie	159
4.1.6. Assessment van gedragstekorten in de thuissituatie	160
4.1.7. Assessment van gedragsbelemmeringen	161
4.1.7.1. Probleemstelling	161
4.1.7.2. Gedragsaspecten ter observatie	162
4.1.8. Samenvatting	163
4.2. Modifikatie	164
4.2.1. Inleiding	164
4.2.2. Modifikatie van gedragstekorten uit de premorbide situatie	165
4.2.3. Modifikatie van gedragstekorten vanuit de klinische testsituatie	165
4.2.3.1. Probleemstelling	165
4.2.3.2. Het effect van funktietrainingen	166
4.2.3.3. Indeling naar theoretische uitgangspunten	167
4.2.3.4. Indeling naar praktische uitgangspunten	170
4.2.4. Modifikatie van gedragstekorten vanuit de klinische observatiesituatie	176
4.2.4.1. Probleemstelling	176
4.2.4.2. Gedragscorrectie naar methodiek	177
4.2.5. Modifikatie van gedragstekorten in de nabehandelingssituatie	181
4.2.6. Modifikatie van gedragstekorten in de thuissituatie	183
4.2.7. Modifikatie van gedragsbelemmeringen	186
4.2.7.1. Probleemstelling	186
4.2.7.2. Reductie van excessief gedrag in de diverse situaties	186
4.2.8. Samenvatting	192
5. Naar een revalidatie-leerproces	195
5.1. Overwegingen inzake assessment	196
5.1.1. Inleiding	196
5.1.2. Assessment van gedragstekorten in de klinische testsituatie	196
5.1.2.1. Algemene zienswijze	196
5.1.2.2. Ontwerp van een funktietaxonomie	197
5.1.2.3. Van ontwerp naar operationalisering	200
5.1.3. Assessment van gedragstekorten in de klinische observatiesituatie	202

5.1.4.	Assessment van gedragstekorten in andere criteriumsituaties	205
5.1.5.	Integratie van functies en vaardigheden ter assessment.	205
5.1.6.	Assessment van gedragsbelemmeringen	206
5.1.7.	Samenvatting	209
5.2.	Overwegingen inzake modifikatie	210
5.2.1.	Inleiding	210
5.2.2.	Modifikatie van gedragstekorten	210
5.2.3.	Modifikatie van gedragsbelemmeringen	212
5.2.3.1.	Terugblik	212
5.2.3.2.	Beslissingsprocedure	213
5.2.4.	Samenvatting	217
5.3.	„Conceptual framework”	217
5.3.1.	Inleiding	217
5.3.2.	Praktische realiseringmogelijkheden	218
5.3.2.1.	Poging tot konkretisering van leermodel	218
5.3.2.2.	Poging tot integratie van ziekte- en leermodel	220
5.3.3.	Research in de revalidatie	222
5.3.3.1.	Algemene overwegingen	222
5.3.3.2.	Nabeschouwing	224
5.3.4.	Samenvatting	225
6.	Algemene samenvattingen	227
6.1.	Summary	228
6.2.	Zusammenfassung	233
6.3.	Résumé	238
6.4.	Samenvatting	243
Referenties		249
Bijlagen		257
Bijlage 1	Gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC) – Aanwijzingen voor de beoordelaar – Items	258
Bijlage 2	Voorbewerkingstabellen inzake GOCC-scores. Verzameling 1 (dec. 1975) en verzameling 2 (dec. 1976)	263
Bijlage 3	Inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënt inzake GOCC. Verzameling 1 (dec. 1975) en verzameling 2 (dec. 1976)	266
Bijlage 4	Verzameltabel inzake gedragsvorming, gedragstoename en gedragsreductie	268
Bijlage 5	Toetsing van de procedures ter gedragsvorming, gedragstoename en gedragsreductie	270
Bijlage 6	Verzameltabel inzake behoud van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit	271
Bijlage 7	Toetsing van de procedure tot gedragsbehoud onder toenemende stimuluscomplexiteit	274
Curriculum Vitae		279

HOOFDSTUK 1

INTRODUKTIE

Naar een revalidatie-leermodel

1.1. Algemene inleiding

Een eerste doel van een revalidatieprogramma lijkt te zijn: het (opnieuw) doen optreden van een bepaald gedrag (met een bepaalde regelmaat, sterkte enz.) in een omgeving, waar dit verondersteld wordt op te moeten treden. Deze omgeving is in eerste instantie het revalidatiecentrum zelf. De ontwikkeling van nieuw gedrag veronderstelt een leerproces en dit kan slechts gerealiseerd worden indien de kondities voor dit leren in de persoon en/of omgeving aanwezig zijn. Het leren van nieuw gedrag zal niet of trager verlopen, indien en naarmate kondities in persoon en/of omgeving tegenwerken. Een van deze tegenwerkende factoren bestaat uit aktueel gedrag, dat incompatibel is met het aan te leren gedrag, als dat aktuele gedrag bovendien voor patiënt en/of omgeving een zodanig bekrachtigende waarde heeft dat het aan te leren gedrag absoluut geen kans heeft om op te treden. De kans hierop is des te groter naarmate het nieuwe gedrag minder bekrachtiging ondervindt, hetgeen zondermeer veelal het geval is. Als tweede doelstelling zou derhalve konstatering en eliminatie van deze blokkades in de nieuwe gedragsvorming kunnen worden gezien. Deze blokkades kunnen optreden in de persoon, in de revalidatie-omgeving, in het thuismilieu en eveneens in processen in het organisme zelf. De principes van gedragsvorming bij gedragstekorten en de opheffing van belemmeringen bij blokkades in het leerproces gelden in alle fasen van de revalidatie.

Wanneer een gehandicapte patiënt bijvoorbeeld een depressie in het revalidatiecentrum heeft verwerkt, maar thuis door allerlei omgevingsinvloeden weer in deze depressie terugvalt, dan is het revalidatieprogramma *mislukt*, tenzij er verdere activiteiten worden ondernomen. Een revalidatieprogramma lijkt beperkt te zijn in de mate, waarin het de niet-therapie-omgeving kan beïnvloeden, teneinde de waarschijnlijkheid van optreden van revalidatie-adekwaat gedrag te verhogen. Alle inspanning is weinig zinvol als de patiënt, thuisgekomen, terugvalt in revalidatie-inadekwaat gedrag. Om deze weinig zinvolle inspanning te voorkomen, dient speciale aandacht besteed te worden aan revalidatiebevestigende reacties in dit thuis- of werkmilieu. Daarmee is de derde revalidatiedoelstelling aangegeven: het ondersteunen van nieuw gevormd gedrag in het thuismilieu en de eliminatie van factoren, die gedragsbeklijving tegenwerken. Het nieuwe, adekwate gedrag moet immers met name op (kunnen) treden in de leefwereld van de ontslagen patiënt, anders kan men zich de inspanning beter besparen.

De vorming van nieuw gedrag, de eliminatie van gedragsbelemmeringen en de beklijving van nieuw gedrag in het thuismilieu vergen een behoorlijke inspanning, een afstemming en coördinatie van alle werkers in de revalidatie op patiënt en op elkaar. In vele gevallen zal dit er op neerkomen, dat de diverse therapeuten, maar ook het thuismilieu een nieuw gedrag t.a.v. de patiënt moeten gaan ontwikkelen. De noodzakelijke gedragsverandering bij deze revalidatiemedewerkers en personen uit het thuismilieu vereist een bijzondere aandacht. Het ontwikkelen van procedures die deze gedragsverandering mogelijk maken en verder ondersteunen wordt als vierde revalidatiedoelstelling gezien.

De drievoudige gedragsmodifikatie (bij patiënt, de medewerkers in de revalidatie en de personen in het thuismilieu) lijkt een uitermate gekompliceerd, maar desalniettemin noodzakelijk leerproces te zijn, waarbij alle onderdelen regelmatig moeten worden bijgesteld en doorlopende evaluatie behoeven. Als vijfde en laatste doelstelling wordt derhalve een continue empirische wetenschappelijke ondersteuning van alle gedragsmodifikatieprocedures aangevoerd.

Het opnieuw leren heeft dus niet slechts betrekking op de patiënt, maar eveneens op het personeel in het centrum en het thuismilieu. Het leerproces moet niet slechts

optreden in het revalidatiecentrum, maar moet ook daarbuiten worden gekontinueerd. Het leerproces behoeft een voortdurende bijsturing, evaluatie en verdere afstemming op gestelde doelen.

Uitgaande van een nadere precisering van deze leerprocessen bij diverse categorieën van personen en in diverse situaties kunnen de voorwaarden tot leren, de leermethoden, de doelstellingen, de vorm, de organisatie van het centrum en de externe contacten buiten het centrum worden gestructureerd.

Het is de doelstelling van deze studie om bovenstaande gedachtengang in theorie en praktijk te expliciteren en d.m.v. empirische toetsing te ondersteunen in de hoop en verwachting dat naast de medische en paramedische activiteiten ruim baan gemaakt kan worden voor „revalidatie als leerproces”.

1.2. Voorgeschiedenis

1.2.1. Uitgangssituatie

Het „klimaat” waarin deze studie kon ontstaan, is te kenschetsen met:

- 1e. De jeugd van het centrum. In 1970 werd het centrum, dat voorheen een verpleegtehuis was, als revalidatie-instituut geopend. Niet alleen de staf, maar in feite elk personeelslid was bezielde van de gedachte eigen ideeën en initiatieven te ontplooien om „hun” centrum en „de” revalidatie te helpen opbouwen. Hoewel aanvankelijk de stroom van ideeën en initiatieven leidde tot een veelheid aan richtingen, bleek deze zich geleidelijk aan te kanaliseren binnen duidelijker beddingen.
- 2e. Eigen gerichtheid. Dankzij wellicht een technische voorgeschiedenis ging onze interesse hoofdzakelijk uit naar die gebieden in de psychologie, welke zich enigszins konden beroepen op empirisch wetenschappelijke ondersteuning. De aanwezigheid van empirisch geverifieerde leerwetten richtte de keuze wat betreft therapeutische interventie op de gedragstherapie en stimuleerde tot het zoeken naar mogelijkheden juist deze gedragstherapie ook in de revalidatie toe te kunnen passen.
- 3e. De revalidatie zelf. Uitgangspunt van deze studie is de visie, dat een der pijlers van de revalidatie het „opnieuw leren” representeert en wel gezien vanuit leertheoretisch kader. De geleidelijke ontwikkeling van deze visie betekende dat niet slechts het medisch handelen, maar eveneens het handelen vanuit het zgn. leermodel zijn plaats ging vinden binnen het totaal der revalidatie-activiteiten. Hierdoor konden vanuit leerprincipes diverse gedragstherapeutische toepassingsmogelijkheden gerealiseerd worden ten behoeve van revalidanten.
- 4e. De probleemgroep. Zoals vaker in de loop der geschiedenis is gebleken, krijgt de gedragstherapie in een setting alleen een reële kans bij een moeilijke of vergeten groep patiënten (Ayllon 1968). Pas indien verscheidene therapieën op deze groep tevergeefs geprobeerd zijn, krijgt de gedragstherapeut – die alles op een minder humane wijze zou bekijken – een kans. „Probleempatiënten” zijn er in een grote verscheidenheid aanwezig in de revalidatie, maar in de groep der patiënten met contusio cerebri in het bijzonder.
- 5e. Last but not least wordt het team genoemd, dat gecoördineerd door de revalidatie-arts, de bereidheid, interesse en flexibiliteit heeft opgebracht een

nieuwe benaderingswijze in hun toch al overbelaste activiteiten te incorporeren. Hoewel in eerste instantie wat aarzelend en voorzichtig, werd de „draad” geleidelijk aan door verscheidene teamleden opgenomen en trachtte ieder op zijn beurt toepassingsmogelijkheden te vinden binnen het eigen werkterrein.

1.2.2. De „probleemgroep”

In de jaren 1970-1973 manifesteerde zich de groep van patiënten met contusio cerebri als een speciale probleemgroep binnen de revalidatie. In de aard van de aandoeningen die in het algemeen ter revalidatie werden aangeboden, voltrok zich geleidelijk een verandering. Enerzijds leek er een vermindering op te treden van het aantal patiënten met hemiparese, multiple sclerose e.d., terwijl er anderzijds een toename ontstond van het aantal aangeboden patiënten met dwarslesie en contusio cerebri.

Terwijl over de revalidatie van dwarslesiepatiënten reeds vele publikaties het licht zagen en er zelfs speciaal daarop gerichte tijdschriften bestonden, beperkte de literatuur over patiënten met hersenletsel zich, althans in Nederland, vrijwel tot puur medische zaken qua diagnostiek en behandeling. Overigens worden deze zaken ook op het medische vlak tot nu toe niet uitputtend behandeld. Een oorzaak hiervan is mede het feit dat het begrip „contusio” zeer wijd is en gepaard gaat met een eindeloze variatie van symptomen. „Het is onmogelijk een beschrijving te geven van de symptomen van de contusio cerebri” (Van 't Hooft, 1975 p. 52) en „er bestaat geen specifieke behandeling hiertegen. Het komt erop neer dat een spontane genezing moet worden afgewacht, enerzijds door een zo zorgvuldig mogelijke verpleging anderzijds door de prophylaxe en zo nodig de behandeling van complicaties” (Van 't Hooft, 1975 p. 66).

Voor een revalidatiecentrum betekende dit dat het patiënten kreeg aangeboden op basis van zeer onduidelijke behandelingsindicaties. Een prognose inzake algemene levenskansen was meestal nog wel te geven; wat betreft echter het herstel van de fysieke en nog meer van de psychische functies was dit uiterst moeilijk. Er bestond geen overzichtelijke diagnostische procedure ten aanzien van diverse functionele stoornissen.

Tijdens de revalidatiebehandeling moesten herhaaldelijk koerswijzigingen aangebracht worden op basis van onduidelijke informatie en op basis van een volledig gemis aan een te volgen strategie. Voorzover er spake was van enige behandeling was dit een zaak van trial and error, waarbij de error in de meerderheid was.

De hierboven gesignaleerde toestand noodzaakte tot bezinning op eigen handelen. Teneinde te trachten in de algehele situatie rondom de patiënten met contusio cerebri enige structuur te brengen werd op 20 augustus 1973 in het revalidatiecentrum een studie- en werkgroep geformeerd, samengesteld uit een arts, klinisch psycholoog, fysiotherapeut, logopedist, arbeidstherapeut en verpleegkundige. De doelstelling van deze werkgroep was tweeledig:

- 1e. Interne inventarisatie van de contusio-problematiek via de bestudering van 25 statussen van ontslagen patiënten met contusio cerebri. Iedere deelnemende discipline werd verzocht vanuit eigen gezichtspunt mogelijke criteria te signaleren inzake diagnostiek en therapie en te letten op lacunes in strategie en rapportering.
- 2e. Externe inventarisatie van de contusio-problematiek. Een aantal instituten en personen waarvan aangenomen kon worden dat deze zich met de behandeling van hersentraumata bezighielden, werden benaderd. Te weten: werkgroepen in

Nederland, ziekenhuisneurologen, huisartsen en maatschappelijk werkenden in de regio Zuid-Limburg.

Daarnaast werd een literatuurstudie ondernomen inzake de diagnostiek en behandeling van de patiënten met contusio cerebri.

1.2.3. Inventarisatie der problematiek van patiënten met contusio cerebri

- 1e. Bestudering van de statussen leverde de volgende bevindingen op (Bakker 1974):
 - a. Fysiotherapie: Uit teamverslagen is het verloop van de fysiotherapie-vorderingen niet te halen. Na enkele maanden verschuift het aksent van het verslag naar psychosociale problemen.
 - b. Arbeidstherapie: Van een algemeen vastgesteld programma is zelden sprake. Nazorg komt in de verslaggeving weinig aan de orde. De rol van de arbeidstherapie is gericht op motorisch gebied en niet op het terrein van observatie of algemene begeleiding.
 - c. Medisch: Inkonsistente berichtgeving in akute fase, duur coma wordt weinig vermeld. Inkonsistentie t.a.v. verslaggeving teambespreking en in ontslagbrieven door wisselende notulist. Therapie is somatisch gericht. Vage bloemlezingen over het gedrag, waarin woorden als „agressief” en „initiatiefloos” veel worden gebezigd. Over premorbide gedragsstructuur blijkt weinig bekend, evenals over de follow up. Zeer wisselende verblijfsduur die niet korreleert met de ernst van fysiek en/of psychisch letsel
 - d. Psychologie: Uit de teamverslagen komt een subjectief onbevredigd en bevredigd behandelde groep naar voren. De onbevredigd behandelde groep wordt als minder „gemotiveerd” en als meer „agressief” omschreven. De uitspraken gedaan tijdens de teambesprekingen waren zeer gevarieerd. Niet minder dan 120 adjektiva konden worden vastgesteld. Gebruikte diagnostische procedures zijn beperkt tot algemene intelligentie (WAIS), concentratie (Bourdon), geheugen (Benton) en perceptie (Frostig).
- 2e. Kontakten buiten het centrum:
 - a. Kontakten met werkgroepen in Nederland: Uit de schriftelijke en mondelinge kontakten tijdens de inventarisatieperiode, werd de indruk verkregen dat deze groepen op ongeveer gelijk niveau stonden met de eigen werkgroep „Hoensbroeck”.
 - b. Kontakten met ziekenhuizen en neurologen in de regio Zuid-Limburg leverden als resultaat op:
 - de motorische uitval bij de contusio werd als a-specifiek omschreven. Als grove indeling bleek het meest gangbaar, de indeling naar lokalisatie van de inwerking van het trauma in de zin van occipitaal, frontaal etc.
 - Zo men al van het contusio-syndroom kon spreken dan zou dit toch bepaald kunnen worden door het psychisch disfunctioneren.
 - uit het doornemen van 25 contusio-statussen in een ziekenhuis konden slechts onvolledige gegevens betrokken worden.Er was slechts in 20% van het aantal gevallen EEG of laboratorium-onderzoek verricht, terwijl juist deze onderzoeken volgens deskundigen voor diagnostiek en therapie wezenlijk zijn vanwege hun prognostische waarde met name op lange termijn, dus belangrijk voor de revalidatie.
 - frontale beschadiging zou - volgens deze statusverslagen - meer psychische stoornissen veroorzaken.
 - c. Kontakten met nazorg.

- een onslagprocedure met regeling van nazorg werd slechts in de helft van de gevallen gevolgd. Deze bestond uit: gesprekken met de familie om deze voor te bereiden op het ontslag van de patiënt, maatschappelijk werk verzoeken verdere begeleiding te verzorgen, ontslagbrief aan arts, het leggen van kontakten met GMD-GAB-SPD en overdracht aan dagverblijven verzorgen.
- vaak blijkt dat herintegratie in gezin en werk mislukt. De patiënt blijkt zo veranderd te zijn, dat de omgeving niet weet hoe zij hierop moeten inspelen. Maar al te vaak valt een totale ontwrichting van het gezin te signaleren.
- Het maatschappelijk werk lijkt niet geprepareerd te zijn voor de begeleiding van de ontslagen patiënt met contusio cerebri en zijn gezinsleden. In persoonlijke kontakten met maatschappelijk werk kwam af en toe naar voren dat men nogal moeite ondervond met het zich in de persoon van de gehandicapte (en zeker in die van de contusio) te verplaatsen. „Het leek alsof men te doen had met geheel andere mensen dan waarmee men gewend was te werken”.

1.2.4. Literatuurverkenning

Bij de opgave de meest relevante literatuurbronnen te vinden die vanuit een psychologisch referentiekader de problematiek benaderen, leverde een schriftelijk contact met de Temple University Philadelphia Pennsylvania een goed spoor. Onder auspiciën van de American Psychological Association werd aldaar in 1970 een literatuuronderzoek gepubliceerd (Glenn, Snelbecker en Mason 1970).

Dit onderzoek had tot doel via literatuurstudie te weten te komen in hoeverre diverse disciplines betrokken waren bij hersenbeschadigingen. Deze disciplines waren: klinische psychologie, pedagogiek, neurologie, pediatrie, huisartsengeneeskunde, psychiatrie, revalidatie- en schoolpsychologie. Per discipline werden ca. 7 recente boeken bestudeerd, waarbij gelet werd op een drietal criteria: mate van behoefte aan diagnostiek, geïnteresseerdheid in de revalidatie pogingen tot herscholing en herintegratie in de maatschappij bij de patiënt met hersenbeschadiging. De auteurs van het rapport kwamen tot de volgende konklusie: „dat van genoemde disciplines, in feite de revalidatie de meeste interesse toont in gestandaardiseerde psychologische diagnostiek in combinatie met gedragsobservatieschalen en rapporteringen uit het dagelijkse leven. De diagnoses variëren van „brain damage” tot gedetailleerde neurofysiologische stoornissen en psychofunctionele defektlokalisaties. Er is een diversiteit aan planning variërende van algemene tot zeer gedetailleerde leerprogramma's. Pogingen tot herscholing en herintegratie in het milieu zijn aanwezig”.

Het rapport signaleert verder de volgende problemen:

- 1e. De relatie hersenen-gedrag is zo complex dat het uiterst moeilijk is vast te stellen, welke functies er al dan niet zijn aangetast. Bezoekers van symposia e.d. gaan vaak teleurgesteld naar huis, aangezien het vakjargon zo specialistisch is dat de aanwezige disciplines elkaar niet begrijpen.
- 2e. In de meeste settings lijken diverse specialisten vanuit diverse disciplines en vanuit diverse uitgangspunten te werken. Glenn c.s. onderscheiden drie groepingen:
 - a. de groep die zich met name richt op de ontwikkeling van de gestandaardiseerde diagnostische strategieën t.b.v. de determinatie van de relatie hersenen-gedrag.
 - b. de neurofysiologische groepen.
 - c. de groep die betrokken is bij revalidatieplanning en uitvoering van trainings- en onderwijsprogramma's.

- 3e. Interdisciplinaire kommunikatietoornissen en het gemis aan een duidelijke basisfilosofie werden gezien als de oorzaken van het uitblijven van duidelijke behandelingsplannen ter behandeling van hersentraumata.

Gegeven Glenn's literatuurbevindingen zou het zoekveld van de relevante literatuur dus beperkt kunnen worden tot publikaties vanuit het gebied van de revalidatie zelf. Deze konklusie leidde tot de selectie van literatuur uit zgn. Rehabilitation Abstracts van 1973 t/m 1976, en tot informatiewerving bij een tiental universiteiten in de USA met een revalidatie-afdeling. Bovendien leek het noodzakelijk om te werken vanuit één algemeen geaksepteerd referentiekader, teneinde kommunikatietoornissen binnen het team te voorkomen.

1.2.5. Behoeftte aan „basisfilosofie”

Deze behoefte aan of eventueel de noodzaak van één referentiekader welke door Glenn c.s. werd gesignaleerd, dringt zich zowel in theorievorming alsook in de dagelijkse praktijk van de revalidatie steeds meer op.

- 1e. Over het algemeen blijken omschrijvingen van het begrip revalidatie alles omvattend te willen zijn en ondanks lange of puntige formulering, blijven ze toch te vaag.
- 2e. In 1975 ontstond het rapport „Model Centrum” (Van Rooyen 1976) waarin o.a. deze basisfilosofie onder de loep werd genomen. Het was een redelijk doorwrocht stuk, maar de kritieken die er op volgden, kwamen steeds weer terug op het onvermogen van de samenstellers één algemene gedachtengang te formuleren, en daaruit konklusies voor de werkzaamheden te trekken.
- 3e. In het revalidatiecentrum „Hoensbroek” ontstond naar aanleiding van dit rapport een studiegroep „Revalidatiefilosofie” waarvan tot op dit moment niet duidelijk is of de inspanning van deze groep een nuttig rendement zal hebben.
- 4e. Binnen een centrum varieert de denkwijze per afdelingsteam en binnen elk team weer per teamlid, maar al deze variaties worden zelden geëxpliciteerd.

Het gehele „bedrijf” loopt of lijkt soepel te verlopen, zolang ieder teamlid zelfstandig op eigen territorium mag functioneren. Komt men echter tot een poging om de eigen denk- en handelwijze te expliciteren, teneinde bijvoorbeeld een nieuw probleemgebied grondiger aan te pakken, dan blijkt dat ieder zijn eigen „geloof” hanteert. Dan pas komen de verschillende meningen, opvattingen en werkwijzen naar voren en dreigt men in het slop te geraken, waarvoor de studie der Temple University waarschuwt (Glenn 1970).

Een team van deskundigen dat een speciale patiëntengroep in diverse aspecten wil begeleiden, moet echter gesteund zijn in zijn wijze van handelen door een algemeen geaksepteerd referentiekader. Om echter deze basisvisie te doen ontstaan, lijkt het zinnvoller niet tot discussie over te gaan, maar een geheel andere weg in te slaan. Het denken over een revalidatiewijze en het effectueren van deze gedachtengang is – althans volgens leertheoretische principes – in beide opzichten „gedrag” resp. covert en overt gedrag. Om een gedragsverandering te bewerkstelligen werd en wordt vaak te veel waarde toegekend aan het gesprek als het medium bij uitstek. Intussen is uit evaluatieonderzoek van psychotherapie gebleken, dat dit stellig niet zo maar zondermeer kan worden aangenomen. Integendeel, er zijn aanwijzingen dat vele gedragsveranderingen eerder d.m.v. konditioneringsvormen worden bewerkstelligd en dat ook in de zgn. verbale therapie konditionerings-elementen aanwezig zijn (Kanfer en Philips 1970 p.371). Om gedragsverandering te realiseren dient men tenminste kennis te hebben van deze principes en deze ook systematisch en

doelbewust te hanteren. Dit geldt waarschijnlijk eveneens voor het bewerkstelligen van een gemeenschappelijke basisfilosofie. Deze principes komen elders in deze studie uitgebreid ter sprake. Het is hier niet de plaats om dus een „handreiking” te verrichten die ons naar deze zo gewenste (?) gemeenschappelijkheid van denken, zou kunnen voeren.

Hier zij slechts de problematiek rondom de basisfilosofie gesignaleerd.

1.2.6. Samenvatting

In het voorgaande werd een schets gegeven van de voorgeschiedenis en uitgangssituatie die ten grondslag lag aan deze studie.

1. In eerste instantie werd zowel bij directie als personeel een bereidheid en enthousiasme geconstateerd om in het centrum effectieve revalidatiemogelijkheden te realiseren. Er bestond echter geruime onzekerheid omtrent het gehele revalidatiegebeuren, hetgeen ondermeer tot uiting kwam in een sterke behoefte aan een basisfilosofie. Dit enthousiasme en deze onzekerheid resulteerden in een veelvoud aan ideeën, stromingen, visies, filosofieën en activiteiten.
2. Indien in zulk een situatie nog een nieuwe visie wordt gepresenteerd dan kan deze nieuweling, of een plaats krijgen naast andere visies, of volledig afgewezen worden of overgenomen worden. De eerste mogelijkheid lijkt het meest waarschijnlijk, de laatste daarentegen vrijwel uitgesloten, tenzij deze visie zich richt op een „probleemgroep” waar niemand goed raad mee weet. Wanneer er dan „per ongeluk” enkele successen geboekt worden, lijkt er althans een eerste bereidheid tot overname gevormd.
3. Deze bereidheid tot overname kwam verder tot uitdrukking in een bezinning op de problematiek rondom de patiënten met contusio cerebri. Er werd een werken studiegroep geformeerd, die enkele belangrijke informatie opleverde:
 - a. De therapie en de bewerking van gegevens, bleek een tamelijk inkonsistente aangelegenheid te zijn.
 - b. De behandeling was hoofdzakelijk somatisch gericht, terwijl men toch de indruk had dat, met name psychische factoren, de problematiek bepaalden.
 - c. Een literatuurstudie, die suggereerde dat men voor een eventuele oplossing, zich zou dienen te oriënteren op publikaties vanuit revalidatiecentra in het buitenland en met name vanuit de USA.
4. Mede dankzij deze bezinning op eigen werkwijze kwam een discussie rond een mogelijk nieuwe revalidatiegedachte op gang. Deze studie zal in de volgende bladzijden verslag geven van deze ontwikkeling in theoretisch en praktisch opzicht.

1.3. Revalidatie en Leren

1.3.1. Inleiding

De ontwikkeling van principes en procedures waarmee men tracht een proces te verklaren of te veranderen, wordt grotendeels verklaard door het model dat men ondersteunt. Indien men als voorbeeld neemt de poging om „inadekwaat” gedrag van de mens in interactie met de medemens te verklaren en te wijzigen, dan lijkt dit model aansluiting te moeten vinden bij de „persoonlijkheidstheorie” danwel de „mensvisie” die men aanhangt. De eerste opvattingen inzake psychopathologie zagen anomalieën van menselijk gedrag als beïnvloed door „boze geesten”. De behandeling die hierop volgde, was dan ook gericht op hun „uitdrijving”.

Hippocrates was een der eersten die het woord "bezeten" anders kodeerde. Hij verving het demonisch concept door het woord "ziekte" en de behandeling werd voltrokken d.m.v. dieet, hydrotherapie, aderlating en andere methoden.

Hoewel de psychologische methoden gaandeweg deze eerste pogingen tot wijzigingen van deviant gedrag vervingen, bleef de analogie met het „ziektemodel” lange tijd voortbestaan. Hierin bleven dus gedragsuitingen, die door de omgeving als deviant werden gekodeerd, gezien als uiting van een dieperliggende oorzaak. De codering van Hippocrates veranderde nauwelijks en werd „geestesziekte”.

Volgens Bandura (1970 p.2) blijft in onze tijd een kwasi-ziektemodel gehanteerd: „Het deviante gedrag blijft gezien als een symptoom waarbij, vanwege deze dieperliggende oorzaak, uitdrukkelijk gewaarschuwd wordt tegen symptoombehandeling. De oorzaak van deviantie wordt gezocht in een groot aantal factoren als „verdrongen impulsen”, „psychische complexen”, „latente tendenties”, „zelfdynamiek” en andere benamingen die doen denken aan duivels van vroegere tijden. Zo te zien is er weinig veranderd. Door het blijven hanteren van het ziektemodel, namelijk door uiterlijk waarneembare devianties toe te schrijven aan een innerlijk in het organisme schuilende oorzaak, werd – aldus vervolgt Bandura – alleen het woord „demon” vervangen door „psychische energie”. Ook de behandeling bleef gericht op de uitbanning van geesten d.w.z. niet op het probleem zelf, maar op de veronderstelde interne „agents” die uitgedreven moeten worden door „katharsis”, „afreageren”, „het verwerven van inzicht door een uitgebreid interpretatie-proces”. Direkte modifikatie van het zgn. symptoomgedrag wordt niet slechts als ineffektief, maar als buitengewoon gevaarlijk gezien, aangezien dit „werkelijk gerichte behandeling” in de weg zou staan en het symptoom toch, eventueel na tijdelijke afwezigheid, in een andere vorm en in ernstiger mate weer terug zou komen.

Preoccupatie met interne respons producerende krachten resulteerde in een verwaarlozing van externe variabelen. Een organisme dat volledig bepaald zou zijn van „binnenuit” moet ongevoelig zijn voor omgevingsstimuli en voor de gevolgen van zijn activiteiten. Een dergelijk organisme zal niet lang voortbestaan”, aldus Bandura (1970 p.3.). Gegeven het feit dat de mens in zijn totaliteit veel meer is dan wie dan ook ooit zal kunnen verwoorden, zal bij het verklaringsmodel van het menselijk functioneren, dat *hier* zal worden gehanteerd noodzakelijkerwijs een sterke reductie van de nimmer te benaderen werkelijkheid worden doorgevoerd. „Menselijk gedrag houdt in, een aantal met elkaar in relatie staande en elkaar controlerende systemen” aldus Bandura (1970 p.62) die het gedrag bepaald ziet door:

1e. externe stimulussituaties

2e. interne informatieverwerkende processen en coderingssystemen

3e. externe respons bekrachtigende feedbackprocedures

Aan deze visie van Bandura valt toe te voegen:

4e. het niveau waar het organisme door leerprocessen via een voortdurende interactie met zijn omgeving op weet te functioneren.

De relaties tussen deze controlerende systemen kunnen weergegeven worden als: $S \rightarrow O \rightarrow R \rightarrow K \rightarrow C$ (Kanfer F.H. en Philips J.S. 1970 p.54)

Het gedrag (R) van de mens wordt bepaald door de voorafgaande situatie of de stimulusconfiguratie (S) die inwerkt en verwerkt wordt door het organisme (O), de gevolgen of de konsekwenties op dit gedrag zelf (C) en van de aard der relatie tussen R en C, de kontingentie (K).

Er bestaan diverse verklaringsmodellen die alle een verschillend aksent plaatsen op de relatieve invloed van de S,O,C, en K-variabelen op het aanleren van het gedrag R. Deze verklaringsmodellen worden ook vaak weergegeven in de vorm van

paradigmata. Voor een nadere verklaring moet verwezen worden naar handboeken op dit gebied. Inzake leertheorie in het algemeen zij verwezen naar Deese J. and Hulse S. (1967) wat betreft gedragstherapie naar de Moor W. en Orlemans J.W. (1972). Voor definities inzake veel gebruikte en essentiële concepten in leertheorie en gedragstherapie kan ten overvloede worden geattendeerd op Linschoten J. (1964 p.396-399) of De Groot A.D. (1959) waar de definitie van „gedrag” aan de orde komt. De term „leren” wordt wellicht het duidelijkst omschreven door Hilgard E.R. (1956 p.3) of door Lundin R.W. (1967 p.265). Een zekere basiskennis inzake leertheorie wordt in het navolgende verondersteld.

Ongeacht het relatieve aksent op de kontrolerende systemen en onafhankelijk van het verkozen paradigma, bestaat er over het algemeen een consensus inzake de opvatting dat het merendeel van het menselijk gedrag geleerd is.

In deze paragraaf wordt vooral ingegaan op het leren bij de gedragsvorming in het revalidatie-gebeuren. Maar al te veel wordt voorbijgegaan aan deze rol van het leren in de revalidatie, waardoor een breed stuk van potentiële mogelijkheden in de revalidatie gewoon niet wordt gerealiseerd. Dit tekort is te bezien als een ingebouwde handicap in de revalidatie en is ongeveer te vergelijken met de blinde die de kreupel weer probeert te leren lopen. Uit de diversiteit van de leerparadigmata zal een paradigma gekozen moeten worden, dat de meeste perspectieven biedt voor de populatie van patiënten die ter revalidatie worden aangeboden. Binnen dit behandelingsmodel verdienen de hierin verdiskonterde leerprincipes de aandacht. Tenslotte moeten de behandelingsmogelijkheden vanuit dit gekozen behandelingsmodel in het kort worden aangegeven en verduidelijkt. Met andere woorden: Vanuit het meest effectief beoordeelde leerparadigma zal het revalidatieproces naar toepassingsmogelijkheden en werkwijzen worden geanalyseerd.

1.3.2. Pijlers van de revalidatie

De zogenaamde cliëntèle van de medische revalidatiecentra bestaat op de eerste plaats uit mensen die als konsekwentie van een lichamelijke handicap een functioneel nadeel hebben in het verrichten van allerlei taken en activiteiten waarmee ze in hun leefwereld worden geconfronteerd. In het onlangs verschenen rapport inzake het revalidatiecentrum (Van Rooyen 1976) wordt de revalidant gedefinieerd als de „tijdelijk of blijvend primair motorisch gehandicapte, die kampt met functie- en invoegingsstoornissen voortkomend uit zijn primaire handicap, en die de bereidheid heeft zich te revalideren”.

Het revalidatieproces wordt vervolgens gedefinieerd als: „een complex van onderling samenhangende en zoveel mogelijk op de individuele postrevalidatieverwachtingen afgestemde activiteiten, dat wordt vastgesteld vanuit een multifunctionele benadering van de revalidant door een team van in revalidatie gespecialiseerden en dat wordt uitgevoerd in een volledig samenspel tussen revalidant en het team met als uiteindelijk doel: de revalidant in staat stellen een optimale graad van zelfstandigheid en welzijn te bereiken om zoveel rollen in zijn leven te vervullen als in zijn omstandigheden mogelijk zijn en anderszijds zijn leven zo weinig mogelijk gekonditioneerd te doen zijn door het bestaande lichaamsgebrek”. Zo gedefinieerd zijn de activiteiten voor zowel revalidant als centrum in twee gescheiden terreinen op te splitsen, namelijk:

- 1e. Het beperken, verminderen, verlangzamen of elimineren van de fysieke handicap. Deze activiteiten lijken hoofdzakelijk besloten te liggen in het medisch takenpakket. De behandelingen van fysieke handicaps, per traditie een essentiële functie van de revalidatie, zijn te zien als het manipuleren van de

O-variabelen. Aangezien deze studie zich wat betreft de O-variabelen beperkt tot de behandeling van psychische functiestoornissen zal op de behandeling van de fysieke handicap in de revalidatie niet verder worden ingegaan, hoewel ook op dit gebied de leertheorieën toepasbaar zijn.

- 2e. Een complex van activiteiten gericht op post-revalidatieverwachtingen inzake zelfstandigheid en het (opnieuw) vervullen van talrijke rollen zodanig dat betrokkene weer opgenomen kan worden in de maatschappij met een optimaal niveau van functioneren binnen de handicap. Dit betekent een ontwikkelen van nieuw gedrag, tengevolge van de handicap en de veranderde levenssituatie.

Te Riele H. (1975-1) vergelijkt de revalidant met het kind „dat vanaf zijn geboorte een lange weg moet gaan om met behulp van velen geleidelijk aan een volwassen mens te worden. Zo staat eveneens de gehandicapte door het verlies van diverse functies voor een nieuwe situatie, een nieuw uitgangspunt van waaruit hij opnieuw moet leren leven. Het revalidatieproces is op deze wijze gezien een opnieuw leren, waarbij revalidant, hulpverleners, thuismilieu en de hele maatschappij betrokken dienen te worden. *Uitgaande van een nadere precisering van dit leerproces binnen de revalidatie kunnen de voorwaarden tot leren, de leermethoden, de doelstellingen, de vorm, de organisatie van het centrum en de externe kontakten buiten het centrum worden gestructureerd*”.

In een artikel „Revalidatie” wordt ook t.a.v. de huisarts dit revalidatie-leerproces opnieuw beklemtoond (Te Riele H. 1975-2).

Ook Bakker P. (1976) drukt zich op soortgelijke wijze uit:

„De bekende omschrijvingen van het begrip revalidatie geven ons weinig houvast. In een steeds weer zich opdringende wens om allesomvattend te zijn, blijven ze, lang of puntig geformuleerd, toch te vaag. Wij tenderen naar een haast oversimplistisch uitgangspunt: *Revalideren is een opnieuw leren*. Aan revalidatie gaat iets vooraf, een ziekte of een ongeval, dat de geleidelijke groei, het geleidelijk leren doorbreekt. De mens ondergaat een vaak sprongsgewijze, plotselinge verandering en zo ook zijn omgeving. Het bestaande interactiepatroon muteert. *Wanneer we het zo zouden durven benaderen, wordt revalidatie een leerproces; een leerproces te voltrekken aan de persoon én zijn omgeving, een opnieuw leren vanuit een ander, nieuw en nog onbekend startpunt*”.

Te Riele en Bakker zijn overigens de eerste revalidatie-artsen in Nederland die zich als zodanig weten op te stellen en hierdoor een uitgesproken positie innemen en uitdrukkelijk „kleur bekennen”.

Ze zijn hierbij in het goede gezelschap van Fordyce W.E. (1971 - 2) „there can be little doubt that the major change in Rehabilitation since the Princeton Conference of 1958 is the emergence of intervention strategies based on learning principles. In order to realize this different frame of reference in rehabilitation there are three tactical steps to be taken. 1st: Reconceptualizing rehabilitation from the perspective of a learning based conceptual model. 2nd: Carrying out a proper analysis of tactical situations in order to identify behavior to be modified. 3rd: Preparing the professional staff for application of these methods”.

In Nederland werd vanuit psychologisch gezichtspunt het belang van leren in de revalidatie beklemtoond door Schuurman (1974 p. 98) „Wanneer iemand in een revalidatiecentrum terecht komt, dan blijkt plotseling een soms lang vergeten activiteit enorm belangrijk te gaan worden: Hij moet weer gaan leren”.

Achtereenvolgens wordt de aandacht gevestigd op het leren van nieuw gedrag, het leren verwerken van een handicap, maar eveneens wordt stilgestaan bij het thuismilieu dat nieuw gedrag moet gaan ontwikkelen. Dat het revalidatie-leerproces niet eindigt wanneer de patiënt het centrum heeft verlaten, wordt eveneens

aangegeven door Trieschman (1974). „Rehabilitation does not end at the moment of discharge from the Rehabilitation Center, but rather begins when the person practizes the techniques he has learned in the center and applies them in copying with his own world.”

Volgens Fordyce (1971 -1) zijn er in het revalidatie-gebeuren minimaal 4 redenen te signaleren waarom dit leren in de revalidatie zo uitermate belangrijk is:

- 1e. Als iemand een fysieke handicap krijgt dan is er een onmiddellijke verandering in zijn gedragspotentieel of gedragsrepertoire. De handicap (b.v. een amputatie of een dwarslesie) verandert niet alleen wat de patiënt kan doen, maar ook wat hij móet doen. Hij kan echter pas nieuwe dingen doen als hij dat leert. Dit betekent: verwerven van de vaardigheid dan wel gedrag vormen dat op de juiste plaats, op de juiste tijd, en met een bepaalde frekwentie moet worden toegepast. Zowel de verwerving alsook de vergroting van de mogelijkheden tot optreden op de juiste plaats en tijd zijn gedragsveranderingsprocessen en derhalve als leerprocessen te beschouwen.
- 2e. Raakt iemand gehandicapt dan zijn sommige vroegere gedragingen niet meer goed en geschikt. Dat gedrag moet worden geëlimineerd of verminderd. In aanvulling daarop moet de patiënt nieuw gedrag leren dat wel bij de handicap past. De vaststelling van het gedrag dat geëlimineerd moet worden, alsook de poging tot eliminatie, gaan ervan uit, dat er iets afgeleerd moet worden om plaats te maken voor de konditie voor het aanleren van ander gedrag.
- 3e. Handicaps kunnen meestal niet volledig worden geëlimineerd, er resteert een residu, ze blijven bestaan of ze keren terug. Dit in tegenstelling tot de gemiddelde medische praktijk. Dit verschil heeft een groot aantal betekenissen voor de patiënt, familie, de staf of de verpleging die moet optrekken met de patiënt. Chronische ziekteprocessen zoals bij een handicap vereisen een permanente gedragsverandering voor patiënt én omgeving. Het gedrag dat „geïndiceerd” wordt vanwege de handicap is meestal van lage frekwentie waarde, sterkte of intensiteit voor de patiënt.
Tenslotte is de vooruitgang zeer langzaam in vergelijking met de ervaring van patiënt met vroegere akute ziektes. Dit alles bij elkaar is dus een wel zeer bijzonder proces, een weinig aantrekkelijk leerproces, maar wel stereotiep voor de revalidatie. Het vereist een bijzondere instelling, een kennis van het leerproces volgens welke een dergelijke gedragsverandering kan worden gerealiseerd.
- 4e. De handicap moet door patiënt en omgeving eveneens op „psychisch” niveau worden verwerkt en wel zodanig dat na verloop voor beide partijen een emotioneel stabiel evenwicht mogelijk wordt. Tot voor kort werden dat soort aanpassingsproblemen gezien vanuit het zgn. „ziektemodel”. D.w.z. het gedrag (bv. depressie, agressie, passiviteit, ontkenning e.d.) dat door anderen werd gezien als (nog) niet aangepast, werd geïnterpreteerd als onder controle staande van intra-psychische factoren binnen het organisme. Deze visie is zoals in 1.2.2. werd toegelicht voortgekomen uit het traditionele medische model, waarbij symptomen altijd werden geïnterpreteerd als veroorzaakt door onderliggende pathologische condities.

Het ziektemodel werd dus toegepast op aanpassingsstoornissen naar analogie van de toepassing op lichamelijke stoornissen. Ongelukkig genoeg werd vrij snel vergeten dat het slechts een analogie was en het werd op den duur gezien als de realiteit. De konsekwentie hiervan was dat bij een gekonstateerde „slechte” aanpassing de oorzaak gezocht werd in onjuist gerichte, ten onrechte aanwezige, met elkaar in konflikt zijnde onderliggende gevoelssystemen of

psychische energieën. De behandeling hiervan kon dan ook alleen maar plaatsvinden door verandering van onderliggende gevoelens d.m.v. een of andere vorm van gesprekstherapie hetgeen een vaak langdurige bemoeienis impliceerde, nog afgezien van de onbruikbaarheid van deze benadering bij handicaps zoals bepaalde cerebrale traumata. Er zijn echter alternatieve beschrijvende modellen mogelijk, die het medisch model als interventiestrategie gedeeltelijk terzijde schuiven en juist hierdoor tot nu toe ongekende mogelijkheden bieden, ook voor bovengenoemde patiëntengroep.

De depressie, agressie, e.d. zijn nl. ook nog eens gedrag van de patiënt en derhalve volgens de leertheorie *ook* modificeerbaar door *externe* kondities (S-, K- en C-variabelen).

Inplaats van de „psycho-dynamica” (O-variabele, voor zover wetenschappelijk aksepteerbaar,) moet toch minimaal plaats geboden worden aan de mogelijkheid dat het gekonstateerde onaangepaste gedrag te zien is als het resultaat van een verkeerde wijze van interactie tussen patiënt en omgeving. Deze moet worden veranderd, maar niet door een jarenlange behandeling, maar door er een andere wijze van interactie voor in de plaats te zetten.

M.a.w. het onaangepaste gedrag moet door verandering van omgevingskontingenties worden afgeleerd, zodat het mogelijk wordt door stimulerende kontingenties gedragsverandering hier voor in de plaats te brengen.

Resumerend kan dus gesteld worden dat het belang van het leren in het revalidatieproces niet genoeg kan worden benadrukt. Gemeend wordt dat men niet kan volstaan met het aankondigen, konkluderen of citeren: „dat de patiënt moet leren . . . enz.” en verder in afwachting verkeren. Om werkelijk leren te doen optreden moeten de werkers in het revalidatiecentrum ervan bewust worden, dat leren niet zomaar zonder meer zal optreden. Men dient zich daadwerkelijk af te vragen om welke vorm van leren het gaat bij een bepaalde patiënt, of er potenties aanwezig zijn voor deze leervorm en of de omgevingskondities wel optimaal zijn. Men zou zich moeten beraden of het, indien noodzakelijk, ook mogelijk is dat de omgevingskondities optimaal worden voor deze speciale patiënt. Tenslotte dient men welk leerproces dan ook inderdaad „op gang te brengen”.

Hoe een en ander te realiseren valt, zal hopelijk uit het verdere betoog duidelijk worden.

1.3.3. Leerparadigmata in de revalidatie

Reeds eerder werd vermeld dat het bij de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek op dit moment niet goed mogelijk is een keuze te doen voor een allesomvattend leerparadigma, dat al het op leren gebaseerde gedrag verklaart en een indicatie vormt voor één behandelingsstrategie. Bij een keuze kan men zich dan ook niet zozeer laten bepalen door deze theoretische stand van zaken, maar dient men zich eerder te laten leiden door praktische overwegingen, het „type” van patiënten dat ter revalidatie wordt aangeboden en eigen ervaringen tot nu toe. Bij deze overwegingen zullen achtereenvolgens de diverse leerparadigmata met het oog op hun toepasbaarheid, de specifieke mogelijkheden en de behoeften van de revalidatiepatiënt, worden gezien.

Het klassieke conditioneringsparadigma lijkt als verklarings- en behandelingsmodel met name toepasbaar te zijn op patiënten, welke als gevolg van een verkeerde konditionering een niet-reële angst ontwikkeld hebben voor situaties of objecten. De potentiële toepasbaarheid lijkt dus in de revalidatie bijzonder groot voor die

patiënten welke geen vermijdingsgedrag kunnen tonen, dankzij hun toestand van immobiliteit of hun onvermogen een bepaalde therapie te weigeren. In de revalidatie is tot nu toe relatief weinig toepassing van dit konditioneringsparadigma opgetreden. Een verklaring hiervoor zou kunnen bestaan uit de overweging dat de uitvoering van diverse therapieën op zichzelf een desensitiserende of bekrachtigende werking zou hebben, waarbij de patiënt a.h.w. „over de angst heen geholpen wordt”. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat de therapeut resp. het team niet „alert” is voor dit soort angsten en onvoldoende geïnformeerd is over de frekwentie van fobieën in het dagelijks leven en in de revalidatie.

Het twee-factoren-paradigma lijkt toepasbaar op patiënten die na een verkeerde konditionering een niet-reële angst van hun ongeval hebben overgehouden en eveneens in staat zijn daadwerkelijk gevolg te geven aan hun neiging tot vermijden. Als modifikatie zou een combinatie van desensitisatie en assertiviteitstraining overwogen kunnen worden, dus de combinatie van klassieke en operante technieken. In de jaren 72-76 werd deze gedragsmodifikatie in totaal tweemaal met succes toegepast. Als een verklaring van dit sporadisch gebruik kunnen soortgelijke overwegingen aangevoerd worden als boven vermeld. De toepasbaarheid lijkt in de revalidatie eveneens erg groot te zijn.

Het operante paradigma houdt rekening met de diskriminatieve stimulus, de konsekwenties en contingenties van het gedrag. Het zou zich minder richten op de vorming van nieuw gedrag op basis van reeds bestaande reflexen, maar wel uitdrukkelijk op de vorming en modifikatie van instrumenteel gedrag. Een belangrijk kenmerk van het paradigma is juist het aksent op de omgevingsvariabelen en de negatie of beter gezegd, het niet relevant achten van O-variabelen.

Het leent zich derhalve voor die personen, waarbij nieuw instrumenteel gedrag gevormd dient te worden of waarbij bestaand instrumenteel gedrag niet adequaat is en gemodificeerd zou moeten worden. De patiënten die voor een dergelijke benaderingswijze in aanmerking komen, zijn zij die door hun konstitutie meer gevoelig zijn voor externe bekrachtigende kondities dan voor interne reinforcement. Dit vereist echter wel dat de omgeving, i.c. het revalidatieteam bereid en in staat is zich voor langere duur uniform op te stellen achter een bepaalde behandeling. Indien aan deze voorwaarden voldaan kan worden, dan lijkt het operante paradigma een behandelingsmodel te presenteren dat toepasbaar is op met name probleemgroepen als cerebraal gestoorden, konversie- of pijnpatiënten, kinderen en geretardeerden.

Het imitatie-paradigma houdt rekening met diverse stimuluskondities als modelgedrag van therapeut, maar ook van patiënten en de konsekwenties van dit gedrag voor het model. Het sluit niet uit dat ook het gedrag van de observator, indien deze het model nabootst, bekrachtigd kan worden. In dit opzicht speelt ook het operante paradigma mee. Het is het eerste paradigma in deze reeks dat rekening wil houden met kenmerken en processen in de observator. Het lijkt in de revalidatie gebruikt te kunnen worden om angstreakties te modificeren en een grotere toepasbaarheid te hebben voor de vorming en modifikatie van instrumenteel gedrag, indien bijvoorbeeld verbale instructies ontoereikend zijn. Het imitatieparadigma lijkt met name bruikbaar voor de behandeling van patiënten, die hetzij door konstitutie, hetzij tijdelijk in hun intellektuele vermogens gehandicapt of onvoldoende ontwikkeld zijn zoals cerebrale traumata, kinderen, geretardeerden. Het zou als zodanig een aanvulling of combinatie kunnen vormen met het operante paradigma. Ook het model der „informatieverwerking” lijkt toepasbaar in de revalidatie. Deze toepasbaarheid blijft echter beperkt tot enkele speciale groepen van patiënten, nl. de cerebrale stoornissen en de andere neurologische aandoeningen.

Dit model houdt beloften in als *verklaringsmodel* voor de cerebraal gestoorde patiënt. Het is echter op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre dit informatieverwerkende systeem aanwijzingen geeft voor een *behandelingsstrategie* buiten of naast de modifikaties die reeds vervat zijn in het operante model.

De cognitieve paradigma's welke de cognitieve herstructurering van een waarnemingsveld beogen of een beroep doen op het vermogen tot self-control of self-reinforcement lijken in de revalidatie alleen toepasbaar bij die patiënten, welke meer bepaald worden door interne dan door externe reinforcement. Hoewel in de gedragstherapie de gedachte heerst dat principes van externe bekrachtiging overgenomen dienen te worden door principes van self-reinforcement, lijkt dit vooralsnog alleen mogelijk bij hen, die hiertoe over voldoende vermogens beschikken.

De theoretische basis voor de werking van deze konstrukties, alsmede van de therapeutische ondersteuning hiervoor, is overigens nog vrij zwak, maar dat wil niet zeggen dat verdere ontwikkeling hiervan – ook in de revalidatie – niet dient te worden beproefd. Voorwaarde hierbij is echter een gedegen empirisch onderzoek, ook in de revalidatie.

1.3.4. Keuze van verklarings- en behandelingsmodel in de revalidatie

Na voorafgaande, uiterst sumiere, uiteenzetting bestaat nu de opgave een keuze te doen inzake het verklarings- en behandelingsmodel binnen de revalidatie.

Aangezien de huidige stand van wetenschappelijke kennis wel een aantal paradigmata presenteert, maar geen uitspraak doet over één bepaalde approach, lijkt deze keuze bepaald te moeten worden door de praktische toepasbaarheid en de patiëntenpopulatie. Deze overwegingen inachtnemend zijn een drietal *behandelingsmodellen* te noemen.

- 1e. Het klassieke paradigma en het twee-factorenmodel lijken zich bij uitstek te lenen voor de behandeling van de patiënt met niet-reële angsten en onzekerheden in het gedrag tengevolge van een ongeval. De behandeling is hierbij uitsluitend individueel, d.w.z. één therapeut begeleidt de patiënt gedurende vrij lange tijd.
- 2e. Het cognitieve paradigma gericht op herstructurering en het bewerkstelligen van een toename van self-control is alleen toepasbaar op de patiënt die hiertoe de nodige vermogens bezit. Het zal de patiënt moeten zijn, die o.a. verbaal benaderbaar is, over de nodige „introspektieve” kwaliteiten beschikt, een redelijke tot goede intelligentie heeft en wellicht nog meer kwaliteiten bezit, die hem o.a. in staat stellen tot een relatief onafhankelijke individuele opstelling. De behandeling is hierbij eveneens therapeut-gebonden.
- 3e. Het operante paradigma op zich biedt mogelijkheden voor nieuwe gedragsvorming en gedragsmodifikatie bij een groot aantal patiënten in de revalidatie, waaraan niet persé de eisen van het cognitieve paradigma gesteld moeten worden. De behandeling is hierbij voornamelijk gericht op de hantering van de omgevingskontingenties, d.w.z. niet persé therapeut-gebonden. Aangezien revalidatie pretendeert een multidisciplinaire behandeling te zijn, lijkt dit paradigma bovendien een goede aansluiting te hebben bij de algemene revalidatiegedachte.

Van de genoemde drie behandelingsmodellen lijkt het operante paradigma vanuit pragmatisch gezichtspunt op dit moment de meest reële en grootste toepassingsmogelijkheden te bieden in de revalidatie.

$S^D \rightarrow R \rightarrow K \rightarrow C$

Het model der informatieverwerking, het imitatiemodel, alsook het verklaringsmodel inzake de aard der menselijke motivatie, leveren geen uitdrukkelijke bijdrage inzake een toe te passen *strategie*.

Wel verschaffen ze informatie omtrent de soort diskriminatieve stimulus de volgorde van presentatie van deze stimulus en wellicht omtrent de bekrachtigende kondities volgende op de respons.

Voorbeeld: Bij het imitatieparadigma bestaat de empirisch ondersteunde bevinding dat de ene mens sneller imiteert dan de ander en dat niet ieder model gelijkelijk voor ieder persoon leidt tot imitatieleren. Met beide (en andere) mogelijkheden van imitatieleren dient dus rekening gehouden te worden inzake de aan te bieden stimulusconfiguratie. Het operante paradigma zelf verandert hierdoor echter niet wat betreft zijn behandelingsstrategie.

Resumerend:

Op pragmatische gronden wordt gekozen voor het operante paradigma als behandelingsmodel.

Als verklaringsmodellen, d.w.z. informatie biedend voor de selectie der stimulus en reinforcement kondities kunnen het model der informatieverwerkende processen, het model van de sociale imitatie en de konditioneringsgeschiedenis van de persoon hun bijdrage leveren.

De behandelingsmodellen der klassieke deconditionering en van het cognitieve leren lijken op dit moment minder toepasbaar en zijn slechts geëigend voor speciale patiëntengroepen zoals hierboven werd aangegeven.

Het operante paradigma en zijn specifieke toepassingsmogelijkheden in de revalidatie verdienen thans de aandacht.

1.3.5. Het revalidatie-leerproces bezien vanuit het operante paradigma

In de traditionele literatuur op het gebied van de psychologische revalidatie (zie o.a. Wright B.1960) wordt het revalidatieproces omschreven als het doorlopen van een aantal fasen. Hierbij worden dan termen als: „ontkenning, marchandering, depressie, agressie, integratie, assimilatie” e.d. gebezigd. Dit zou een soort reeks zijn, die de revalidant moet doorlopen, wil hij tot volledige verwerking van de handicap geraken. Daarnaast wordt ook verwezen naar „persoonlijheidsstructuur” en „motivatie” als belangrijke determinanten die dit verwerkingsproces kunnen beïnvloeden.

Wanneer men het revalidatieproces vanuit leertheoretisch perspectief en met name vanuit het operante paradigma wil bezien, dan dienen deze termen, voorzover relevant, ook binnen deze context benaderd en verklaard te worden.

Bij deze behandeling van het revalidatieproces vanuit het operante paradigma moeten de volgende uitgangsvoorwaarden worden genoemd.

- A. Het (onaangepaste) gedrag als reactie op de handicap wordt uitdrukkelijk niet geïnterpreteerd vanuit een onderliggende psycho-pathologie of vanuit diepere lagen van de persoonlijkheid. Niet omdat deze niet zouden bestaan, maar omdat het operant paradigma daar waar het om opnieuw leren gaat, het aksent legt op de omgevingskontingenties.
- B. Het eerste punt houdt tevens in, dat afgezien wordt van de poging om een bepaalde wijze van reageren op de revalidatie en het verwerken van de handicap te interpreteren als voorkomende uit de persoonlijkheidsstructuur.

- C. Fysieke handicaps houden niet noodzakelijk gefixeerde gedragspatronen in. Er zijn slechts drie omstandigheden waaronder een systematische relatie is te veronderstellen tussen gedrag enerzijds en een speciale handicap anderzijds:
- Als de handicap optreedt ten gevolge van een bepaald gedrag (Voorbeeld: mensen die veel alcohol drinken krijgen vaak leverstoornissen, diabetici die weinig zorgvuldig zijn met hun dieet, krijgen visusstoornissen). De aard van het gedrag wordt dan veelal weinig nader gespecificeerd dan „alcoholmisbruik” en „onzorgvuldigheid”.
 - Als de handicap een direct causaal verband heeft tot het gedrag of de gedragsverandering. (bijvoorbeeld stoornissen in de linker hemisfeer en afasie).
 - Als de handicap een consistent effect heeft op het gedrag van anderen (bijvoorbeeld gelaatsmisvormingen, blindheid, opvallende bewegingen). Als de handicap een consistent effect heeft op het gedrag van anderen, dan zullen hun responsies het gedrag van de gehandicapte beïnvloeden. De causale relatie ligt tussen het gedrag van de persoon en het gedrag van de omgeving t.o.v. hem. Er is echter geen reden om een onderliggend mechanisme te postuleren, die het geobserveerde gedrag produceert.
- D. Ervan uitgaande, dat het niet nodig is zijn toevlucht te nemen tot persoonlijkheidskenmerken bij aanpassing aan de handicap wordt het mogelijk de directe weg te nemen naar observatie van gedragskonsekwentie-relaties: men richt zich dan op het gedrag, bij voorkeur objectief geobserveerd. Hierbij vraagt men zich af of dit gedrag onaangepast is bijvoorbeeld in die zin, dat het een revalidatieleerproces tegengaat of niet. Verder tracht men te weten te komen, waardoor dit eventueel onaangepaste gedrag wordt onderhouden en hoe men moet handelen om deze ondersteuning weg te nemen. Tegelijkertijd tracht men gedrag te ontdekken dat beter bij de handicap past en de ontwikkeling hiervan door aanleren te stimuleren met inschakeling van patiënt, therapie- en thuismilieu.
- E. Het onderzoeks- en behandelingsplan in de revalidatie ziet er dan als volgt uit:
- 1e. Beginobservatiefase: Is er probleemgedrag aanwezig? Zo ja, waaruit bestaat dit, waar of wanneer treedt dit op? Zijn er bekrachtigende elementen (reinforcement) voor dit ongewenst gedrag?
 - 2e. Overlegfase: Is er alternatief gedrag, dat bij voorkeur inkompatibel is met het probleemgedrag en dat revalidatie-ondersteunend is? Onderkenning van dit gedrag alsmede van de ondersteuning van dit gedrag.
 - 3e. Behandelingsfase: Door middel van het vestigen van goede relaties tussen patiënt en therapeut wordt de mogelijkheid van sociale bekrachtiging ingebouwd. Hierna wordt overgegaan tot extinktie van probleemgedrag door konsekwente onthouding van bekrachtigende kondities. Tegelijk wordt getracht bij optreden van het gewenste gedrag dit door bekrachtiging te ondersteunen. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van een trapsgewijze opbouw (suksessieve approximatie), of andere shapingsprocedures.
 - 4e. Afbouwfase: bij afname van probleemgedrag en ontstaan van gewenst gedrag, zal dit gewenste gedrag in eerste instantie onderhouden moeten worden door een kontinuu bekrachtigingsschema. Later zal echter voor de bekliving van dit gedrag overgegaan moeten worden op een variabel bekrachtigingsschema.
 - 5e. Procesevaluatie: door voortgaande observatie in behandelings- en afbouw-fase wordt nagegaan in hoeverre de gevolgde strategie effectvol is.

- 6e. Effektevaluatie: na afbouwfase dient de eindobservatie vergeleken te worden met de beginobservatie.
- 7e. Tijdens alle fasen dient therapie- en thuismilieu zoveel mogelijk samen te werken. Het thuismilieu dient expliciet in de behandeling betrokken te worden.

In het navolgende zal getracht worden het werkmodel nader te differentiëren, aan de hand van de diverse veronderstelde stadia, die de patiënt heeft door te maken. Te weten crisis, assimilatie van handicap, meewerken aan revalidatie, bestendiging van gedrag dat adequaat is bij de handicap.

1.3.5.1. Krisishantering

Met crisis wordt hier bedoeld het psychotrauma, dat ontstaat ten gevolge van het plotseling gehandicapt raken.

Direkt na de gebeurtenis waaruit een blijvende handicap ontstaat, kan het gedrag een functie zijn van:

- a. de gedeeltelijke of bijna volledige afwezigheid van stimulus-input m.a.w. sensorische deprivatie, wat kan leiden tot desorganisatie.
- b. De gehandicapte probeert zich de toekomst voor te stellen, wat kan leiden tot een geanticipeerde deprivatietoestand. Het idee dus, dat patiënt niet langer meer toegang heeft tot voor kort zinvolle, levensvullende aangelegenheden.
- c. Tegelijkertijd heeft patiënt en thuismilieu onvoldoende informatie over revalidatie. Er is dus afwezigheid van bevestiging of ontkenning inzake geanticipeerde deprivatie.
- d. Door het veelal langdurig in bed liggen is er onvoldoende mobiliteit zodat hierdoor weinig informatie valt te verwachten die de geanticipeerde deprivatie kan reduceren.
- e. Van belang is verder het premorbide gedrag in het algemeen, en het gedrag inzake krisishantering in het bijzonder.
- f. Momentane respons-repertoire. Wat kan patiënt op dit moment? Over welke leerfuncties beschikt hij?
- g. Suggestibiliteit. Over het algemeen zijn patiënten in crises zeer gevoelig voor o.a. imitatieleren.
- h. De betekenis die de handicap voor het therapie- en thuismilieu heeft.

Werkmodel bij krisishantering. (als voorbeeld).

Vermoedelijk zal onaangepast gedrag bij krisissituatie niet zozeer onderhouden worden door bepaalde ondersteuning van patiënt of omgeving. Er lijkt eerder een tekort aan gedrag of een ongericht gedrag te zullen bestaan. Wat ontbreekt is dan een nieuw soort gedrag of het richten, sturen, begeleiden van dit gedrag vanuit de omgeving. Alternatief gedrag: gerichte bezigheden, vragen proberen te stellen, actieve therapieën e.d.

Stimulans voor alternatief gedrag: aandacht door omgeving, vermindering van onzekerheden.

Verschaffing van identifikatie-objekten (verpleging, bepaalde patiënten) en het trachten te bewerkstelligen van goede relaties.

D.m.v. identifikatie met modellen, indien aanwezig, stimuleren van trapsgewijze verkenning van omgeving en mogelijkheden, gerichte bezigheden en ondersteunen-de gesprekken trachten een verandering te bewerkstelligen in krisisgedrag. Voortgaande observatie door team moet eventuele modifikatie vaststellen.

1.3.5.2. Assimilatie van handicap

Na verwerking van crisis staat de patiënt voor de opgave dat hij zijn handicap moet inpassen in zijn levenspatroon. Dit wordt de „assimilatiefase” genoemd (Fordyce 1971-1). Aan deze assimilatie zijn een aantal specifieke moeilijkheden te onderkennen. Factoren die deze assimilatie in de weg staan, zijn de volgende:

- A. aversief beleefde revalidatie
- B. het rouwproces
- C. premorbide gedrag

Ad A. *De revalidatie kan als aversief ervaren worden*, doordat de patiënt en omgeving de behandeling associeert met het toekomstig leven met handicap, dat door patiënt en/of omgeving anticiperend als negatief gewaardeerd wordt, de pijn door handicap en therapie en de geanticipeerde deprivatie.

Gebruikelijke reactiepatronen hierop zijn met name:

1. Vermijdingsgedrag (zich onttrekken aan behandeling)
2. En/of agressief gedrag

Beide reactiepatronen worden in principe niet vaak langdurig gekontinueerd, aangezien dit een onttrekking aan alle positieve, prettige zaken tijdens het verblijf in het revalidatiecentrum betekent. Er is helaas een uitzondering, waardoor vermijdings- en agressiefgedrag blijft voortduren, namelijk in het geval dat de omgeving (thuis- en therapiemilieu) dit gedrag door middel van extra aandacht ondersteunt. In geval van aversief ondervonden revalidatie kan getracht worden het vermijdings- of agressiefgedrag te reduceren door:

- 1e. De aversieve kwaliteiten van het revalidatieklimaat te verminderen door goede patiënt-therapeutrelaties.
- 2e. De positieve consequenties van vermijdingsgedrag te beperken door consequente onthouding van iedere bekrachtiging.
- 3e. De revalidatiedeelname te bevorderen door:
 - aangeven van therapiedoel en het markeren van de stadia op de weg naar dat doel.
 - bij vooruitgang, het verschaffen van stimulans en ondersteuning.
 - deelname van familie bij selectieve ondersteuning.

Werkmodel bij aversief ondervonden revalidatie (voorbeeld)

Observatie: Welk gedrag treedt op? Hoe wordt dit gedrag ondersteund? Door het thuismilieu, dankzij irreële fantasieën, of door het therapiemilieu d.m.v. aandacht?

Alternatief gedrag: deelname aan therapie, geen agressief gedrag. Ondersteuning: operante konditioneringsprincipes. Verschaffen van inzicht (eventueel). Faciliteiten verstrekken. Aangeven wat bereikt kan worden (fysiotherapie, arbeidstherapie). Doen deelnemen van familieleden en door bekrachtigingsschema's. Het bewerkstelligen van goede relaties (met fysiotherapie, arbeidstherapie, logopedie, maatschappelijk werk).

Algemene behandeling: tracht door geregelde ondersteuning bij medewerking en inzet van patiënt en consequente onthouding van ondersteuning bij tegenwerking het vereiste gedrag te realiseren. Voortgaande observatie ten behoeve van evaluatie van effect.

ad B. Vanuit leertheoretisch gezichtspunt wordt verdriet en depressie gezien als een tijdelijk tekort aan indrukken, gevoelsimpressies, die voor de patiënt het leven inhoud gaven.

Remedie hiertegen is te trachten het leven weer zinvol te maken en inhoud te geven. Bij de revalidatie moet de patiënt weer ontdekken, dat zijn toekomstig leven

ondanks allerlei deprivaties toch zinvol en prettig kan zijn. Dit kan hij alleen ervaren door opnieuw actief te worden en opnieuw te ervaren, dat er ook voor hem nog (self-)reinforcement bestaat.

Werkmodel bij het rouwproces. (als voorbeeld)

Observatie: toont de patiënt rouwgedrag en zo ja, welk?

Zijn er situaties te ontdekken, die de depressie ondersteunen, zowel in, het revalidatiecentrum als thuis?

Alternatief gedrag is: opgewekt gedrag, activiteit, belangstelling. Men is er *niet* op gericht om de depressie te behandelen, zodat patiënt weer actief kan worden, men helpt de patiënt om weer actief te worden, zodat hij de depressie het hoofd kan bieden. Wat waren of wat zijn voor deze patiënt bekrachtigers? Wat deed de patiënt vroeger, welke onderdelen hiervan kunnen nog gedaan worden? Wat zijn de imitatiemodellen en wat voor belangstellingen hadden deze? Bewerkstelligen van goede relaties. Verschaffen van modellen ter identifikatie of imitatie. Onderdelen van vroegere activiteiten binnen bereik van patiënt brengen.

Algemene behandeling bestaat uit: aangeven van mogelijkheden van het revalidatieproces met prestatie-units. Patiënt tot activiteit brengen. Eerst door middel van oude hobby's, die nog redelijk uitgevoerd kunnen worden, daarna kan geleidelijke overgang naar therapieën plaatsvinden (selektieve ondersteuning). Soms dient tevens gebruik gemaakt te worden van medicamenteuze therapie of psychiatrisch consult, maar dan wel samen met geleidelijke introductie van therapieverwante taken en ondersteuningskondities. Voortgaande observatie.

ad C. *Extinktie van premorbide gedrag* dat niet verenigbaar is met handicap. Bepaalde gedragingen welke bestonden vóór het ongeluk worden onverenigbaar met de handicap, zoals vaardigheden van het vroegere dagelijkse leven, beroepsactiviteiten, vrijetijdsbesteding e.d. Veel van dit gedrag kan niet meer worden gerealiseerd, *echter de patiënt kan hierover gaan dagdromen en fantaseren*. Dit fantaserend gedrag blijkt in eerste instantie zekere bevrediging voor patiënt te geven, maar dit is slechts voor korte tijd. Er ontstaat wel een probleem als de omgeving rond patiënt (therapie- en thuismilieu) het fantasiegedrag ondersteunt door irreële beweringen, die suggereren, dat de handicap slechts tijdelijk zou zijn.

Het revalidatieprogramma moet erop gericht zijn om het ongewenste of inadekwate premorbide gedrag te vervangen door alternatief d.i. bij de handicap horend gedrag via optimale ondersteuningskondities. Ook de *familie* moet geïnformeerd worden over datgene wat de patiënt nog zal kunnen doen aan het eind van het program. Maar aan informatie alleen hebben zij onvoldoende. Ook zij, net als iedereen, hebben behoefte aan positieve ondersteuning c.q. extinktie van hun gedrag ten opzichte van de patiënt.

Werkmodel bij extinktie premorbide gedrag (als voorbeeld)

Observatie: is er sprake van irreëel gedrag, dagdromen, gebrek aan zelfkritiek en zo ja, in welke vorm?

Wordt dit vanuit thuis- en therapiemilieu ondersteund?

Alternatief gedrag: aanleren van zelfkritiek, betrekkelijk nuchter denken over toekomst, zich verstaan met de realiteit.

Is er stimulans voor dit gedrag te vinden? Maatschappelijk werk kan bijdrage leveren door systematisch contact met de familie, naarmate de revalidatie vordert. Goede relaties vormen (verpleging, therapeuten), zodat adequaat gedrag wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag bijv. „kritiekloos argumenteren” wordt gene-

geerd. Doelgerichte begeleiding die erop gericht is het dagdroom-gedrag e.d. te reduceren en het kritiekvol spreken over toekomst te stimuleren. Dit alles door gebruik te maken van modellen, van relaties, van selectieve ondersteuning door omgeving en familie. Voortgaande observatie ter tussentijdse effectbepaling.

1.3.5.3. Motivatie tot (her)leren

Het grootste probleem en het meest gebruikte begrip bij de revalidatie is „motivatie”. De opvatting omtrent motivatie is bij het leermodel anders dan bij het ziektemodel. Bij het ziektemodel is motivatie niet een onderdeel van het gedrag, maar het is een *gevolgtrekking* ten aanzien van een innerlijke toestand van patiënt, ontleend aan observatie van het gedrag. De patiënt heet dan gemotiveerd, als men ziet dat hij meedoet aan datgene, wat voor hem op het programma is geplaatst. Hij is niet gemotiveerd als hij dat niet doet. Op deze manier gebruikt, voegt het begrip motivatie niets toe omtrent de patiënt noch aan een verder te volgen richting voor het programma. Voor nadere informatie omtrent het motivatieconcept wordt verwezen naar Cofer CN, Appley M (1967 p. 808-838)

Wanneer men het begrip motivatie vanuit het leermodel benadert krijgt men een enigszins andere formulering. Gedrag wordt bepaald – volgens de leertheorie – door de konsekwenties. Bij te weinig frekwent gedrag moet er wat gedaan worden aan de konsekwenties van dat gedrag. Bij verkeerd (gericht) gedrag moeten de konsekwenties van dit gedrag verminderd worden. Te weinig motivatie schijnt louter een kwestie te zijn van onvoldoende of van slecht gearrangeerde bekrachtiging (ondersteuning, goedkeuring, succesvolle prestaties, vermindering van pijn, hoop voor toekomst etc.).

Twee redenen waarom motivatieproblemen zo vaak optreden in revalidatie:

- 1e. Meedoen aan revalidatie kan initieel aversief zijn.
 - 2e. De bekrachtigers voor nieuw gedrag, dat aangepast is aan de handicap zijn zwak. Vaak ziet men dat – voordat er enige vaardigheid is verkregen met bijv. prothesen – bekrachtigers worden gezocht voor reeds vroeger beheerste substitutie-bewegingen. Er moeten dus eerst prothese-bewegingen ontstaan die competitief zijn met de vroegere bewegingen. Nu zijn deze prothese-bewegingen niet „natuurlijk” bekrachtigend, bovendien zijn ze van lage frekwentie, niet krachtig en voor de patiënt initieel van weinig waarde. Het is dus noodzakelijk – en dat is de essentie bij motivatie in de revalidatie – om goede therapeut-patiëntrelaties te bewerkstelligen, waardoor er bekrachtiging mogelijk wordt van handicap-adekwaat gedrag. De patiënt gaat dus de handelingen verrichten, omdat hij de therapeut niet wil teleurstellen en deze behoefte om een prettige relatie niet te doorbreken vormt de *overbrugging* naar later komende ondersteuning.
- Daarnaast moet aandacht besteed worden aan zgn. „langere termijn”-ondersteuning en/of -waarden, die het handicap-aangepaste gedrag blijvend doen voortbestaan.

Werkmodel (als voorbeeld)

In geval van aversief beleefde revalidatie kan het werkmodel onder 1.3.5.2. A gehanteerd worden.

Verder lijkt het *aksent bij gebrek aan motivatie gelegd te moeten worden op de goede relatie tussen patiënt en therapeut.*

De psychologische afdeling zou in principe behulpzaam kunnen zijn bij het trapsgewijze indelen van een aan te leren vaardigheid, het ontdekken van adekwate

bekrachtiging of het kiezen van de „juiste persoon” voor deze intermenselijke relatie. Observatie: is er hier inderdaad sprake van gebrek aan motivatie? Zijn er tegenwerkende factoren, gemis aan goede relaties of moet eerder het thuismilieu benaderd worden?

Het adequaat gedrag lijkt bekend: „gemotiveerd meedoen”.

Zijn er bepaalde personen waar patiënt een goede relatie mee heeft?

Intensivering en verbetering van deze contacten.

Trapsgewijze presentatie, waarbij aksent valt op zeer veel stimulans en goedkeuring door kontaktpersoon bij in eerste instantie geringe vooruitgang.

Voortgaande observatie waarbij er ook opgelet wordt of verandering van motivatie generaliseert naar andere dan strikt therapie-activiteiten.

1.3.5.4. Beklijving van handicap-adekwat gedrag

Als een programma zich alleen bezighoudt met het gedragsrepertoire van de patiënt en de familie negeert, dan zal de gedragsverandering die tot stand werd gebracht in de revalidatie, nadien niet lang blijven voortbestaan. De stappen, die genomen moeten worden om de familieleden te helpen hun gedrag te veranderen zijn hetzelfde als die voor de patiënt. De familie heeft daadwerkelijke hulp nodig om eigen gedrag en dat van de patiënt te modificeren, om te letten op de frekwentie van dit gedrag en om patronen van dit gedrag te veranderen door gebruik te maken van gerichte, toepasselijke stimulans of ondersteuning.

Werkmodel (als voorbeeld)

Het bewerkstelligen van de beklijving van handicap-adekwat gedrag lijkt in eerste instantie het terrein te zijn voor personen die hiertoe speciaal opgeleid zijn. Misschien zouden we de voorkeur geven aan maatschappelijk werkenden, mits deze zich zouden kunnen verenigen met de gedachte dat gedragsverandering ook door beïnvloeding van de omgevingscondities kan en soms moet plaatsvinden en niet alleen door overigens goed bedoelde inzichtverstrekkende gesprekken. Voorlopig geven we de voorkeur aan non-professionals, met middelbare opleiding, die een speciale training in gedragstherapie volgen.

Deze non-professionals dienen samen met de familie een aantal zaken te bespreken:

- a. de fasen binnen de assimilatie der handicap.
- b. de voorwaarden welke nodig zijn om het handicap-adekwate gedrag als een (mogelijk totaal) nieuw gedragspatroon te blijven ondersteunen.
- c. het beklemtonen dat ook *hun* gedrag in relatie met gehandicapte aanzienlijk gewijzigd is of moet worden en dat men *niet* moet trachten naar het vroegere patroon terug te keren.
- d. het bieden van steun aan de familieleden in hun aanpassing aan de veranderde omstandigheden.

De 7 genoemde fasen van het werkmodel zijn hierbij volledig of grotendeels ter verantwoordelijkheid van de non-professionals. In feite komt dit neer op *gezinstherapeutische* activiteiten vanuit leertheoretisch gezichtspunt.

Observatie: loopt voortgaande revalidatie goed of niet? Zijn er d.m.v. gesprekken, tegenwerkingen, misverstanden of i.d. te ontdekken? Is het mogelijk met het gezin een andere (betere) *gedragslijn* af te spreken?

Hoe kan deze gedragslijn bij patiënt en gezin wederzijds gesteund worden? Zijn er identifikatiemodellen binnen de familie of moeten er goede relaties ontstaan tussen non-professional en patiënt? Doorspreken, voorschrijven van gedragsregels, uit-

proberen van programma, gedragsverandering in concreto in relatie met de patiënt. Evaluatie.

1.3.7. Samenvatting

In de revalidatie en misschien zelfs wel in de gehele gezondheidszorg, behoeft het medisch model aanvulling van het leermodel. Aangezien er meer paradigma's bestaan, werden deze gezien vanuit hun mogelijke pragmatische betekenis voor de revalidatie. Drie leerparadigma's blijken een potentiële toepasbaarheid te hebben, uit welke drie het operante paradigma op dit moment de voorkeur verdient als behandelingsmodel. Drie verklaringsmodellen waarin O-variabelen betrokken zijn, worden medebepalend geacht voor de toepassing van het operante paradigma. De invloed van deze verklaringsmodellen wordt echter beperkt tot de selectie der diskriminatieve stimuli en de toe te passen bekrachtigende kondities.

Vanuit dit standpunt werd het revalidatieproces en enkele specifieke probleemgebieden nader gezien. De consequente doorvoering van deze principes is toepasbaar op een belangrijk grote patiëntengroep. De effectuering van het operante leermodel in de revalidatie vereist echter een heroriëntatie van het huidige revalidatiebeleid. Het onderzoek waarover hiernavolgend zal worden gerapporteerd impliceert een principiële haalbaarheid van een dergelijke heroriëntatie in een revalidatiecentrum.

HOOFDSTUK 2

EEN VOORLOPIGE REVALIDATIE-STRATEGIE

2.1. Contusieproblematiek gezien vanuit een neobehavioristisch referentiekader

2.1.1. Inleiding

In het eerste hoofdstuk werd het revalidatiegebeuren gezien vanuit een neobehavioristisch referentiekader. Opnieuw leren bleek een der pijlers van de revalidatie. Het operante model kwam mede vanuit pragmatisch standpunt en als aansluitend bij de algemene revalidatiegedachte, voorlopig als de meest relevante vorm van leren naar voren. Vanuit het revalidatieleermodel bleken diverse categorieën in de revalidatie, zoals de zgn. verwerkingsfasen, het motivatie-concept e.d. effectief te kunnen worden geanalyseerd.

In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de patiënt met contusio cerebri om – zoals werd voorgesteld – te kijken in hoeverre het paradigma der operante konditionering perspectief kan brengen in de onduidelijke situatie waarin deze patiënt en het revalidatiecentrum zich bevinden.

Aan de hand van informatie vanuit patiëntenstatussen wordt een „beeld” gegeven van de patiënt met contusio cerebri. Vervolgens wordt een voorlopige assessment en modifikatiestrategie ontworpen. De huidige stand van zaken maakt het niet goed mogelijk nu reeds een theoretisch model te ontwikkelen, waaruit duidelijke richtlijnen gedestilleerd kunnen worden voor assessment en behandeling van de diversiteit aan problemen, waarvoor de patiënt met contusio cerebri en zijn omgeving zich gesteld zien. Wanneer de doelstellingen in eerste instantie iets bescheidener worden gehouden, dan kan men tevreden zijn indien men zou kunnen komen tot een wat systematischer wijze van gegevens verzamelen en een wat meer gecoördineerde behandeling aan de hand van één duidelijk geëxpliciteerde strategie: de operante konditionering. Derhalve wordt in dit hoofdstuk gesproken over een voorlopige assessment en modifikatieprocedure. Een procedure dus, die alleen geldig mag zijn in een oriëntatiefase, waarbij in de daaropvolgende hoofdstukken wordt nagegaan in hoeverre dit operante model nader moet worden gekorrigeerd en aangevuld. Het zal later blijken dat er dankzij de hantering van een strakke behandelingsstrategie, die als voorlopige strategie werd opgezet, een betere theorievorming en behandelingswijze mogelijk is.

2.1.2. Inventarisatiebronnen

Aan het begin van iedere empirische cyclus in de reflectie staat een poging tot inventarisatie van op een bepaald moment beschikbare gegevens. Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven bestond deze inventarisatie uit een bestudering van 25 statussen van ontslagen patiënten met contusio cerebri en wel door iedere discipline apart. Dat als nader te bestuderen probleemgroep de categorie van de patiënten met contusio cerebri werd gekozen, wordt verklaard doordat met name deze groep de revalidatie met een aantal niet of nauwelijks op te lossen problemen konfronteert.

Deze inventarisatie zal, vanuit een referentiekader dat gedrag centraal stelt, in dit hoofdstuk nader worden toegelicht.

De 25 statussen vormden een der belangrijkste uitgangspunten van waaruit een poging tot de konstruktie van een gedragsassessment werd ondernomen. Hierbij dient vermeld te worden dat deze 25 statussen geen representatieve gerandomiseerde steekproef vormden uit de populatie der patiënten met contusio cerebri. Het was eerder het enige materiaal dat direkt voor exploratie toegankelijk was. Gedurende

de jaren dat het centrum zich van verpleegtehuis ontwikkelde tot revalidatiecentrum waren deze statussen de neerslag van de revalidatiepogingen gericht op de patiënten met contusio cerebri. Als schoonheidsfout dient bovendien genoemd te worden dat deze verzameling zich niet mag beroepen op een homogene samenstelling, aangezien er enkele patiënten met cerebrovasculaire accidenten, subdurale hematomen en een enkele patiënt met een schotwond in voorkomen. Niettemin bestaat het merendeel uit patiënten met contusio cerebri en dit werd, gezien de bescheiden doelstelling, als voorlopig uitgangspunt akseptabel geacht.

Het statusmateriaal bestond in alle gevallen voor het merendeel uit een neerslag van teambesprekingen. Op de teambespreking vond de eerste informatieverzameling vanuit de disciplines plaats, welke vervolgens via verslaglegging in de status belandde. Met andere woorden de teambespreking ging vooraf aan de neerslag van de therapie-activiteiten in de status.

Bij beide vormen van informatierapportage zijn kritische kanttekeningen te maken, echter de inventarisatie van deze informatie vormde de enige mogelijkheid van waaruit een meer gesystematiseerde gedragsobservatie kon worden opgezet.

De hoeveelheid informatie die in de statussen wordt aangetroffen blijkt overweldigend. Niet slechts wat betreft de kwantiteit aan informatie, maar eveneens wat betreft de mogelijke gevolgtrekkingen.

De status als neerslag van onderzoek en behandeling werd meestal als volgt samengesteld aangetroffen:

- 1e. Een vrij uitgebreid intake-verslag van de revalidatie-arts als weergave van het eerste medische onderzoek, waarbij het aksent viel op somatische aspecten.
- 2e. Een verzameling korrespondentie van de specialisten, die de patiënt hadden behandeld. Eveneens met aksent op fysieke toestand.
- 3e. Neerslagen van teambesprekingen, volgens datum gerangschikt. Elke teambespreking was samengesteld uit medische gegevens en informaties verstrekt door fysiotherapie, verpleging, arbeidstherapie (ergotherapie) logopedie, maatschappelijk werk en psychologie. Deze gegevens werden gevolgd door de weergave van de teamdiskussie en afspraken voor een verder te volgen behandelingskoers.
- 4e. De ontslagbrief, waarin de bereikte eindtoestand werd vermeld en gegevens omtrent verdere verwijzingen.
- 5e. Informaties inzake poliklinische follow-up onderzoeken.

De inhoudsanalyse van de vele gegevens uit de statussen vond plaats naar een drietal criteria:

- A. Patiëntengegevens: deze zouden ook de medische gegevens genoemd kunnen worden, aangezien deze in hoofdzaak betrokken werden uit zgn. intake-gesprekken en de korrespondentie met specialisten. Een moeilijkheid bij de verzameling van deze gegevens was, dat gezocht diende te worden naar variabelen die zich per patiënt herhaalden. Wanneer er in een bepaalde status uitputtend over het ziektebeeld werd gesproken en er zodoende 10 variabelen naar voren kwamen, dan was het tamelijk frustrerend indien in een andere status – na eindeloos zoeken – slechts 3 van de eerste 10 variabelen konden worden teruggevonden. Ter vaststelling van de al dan niet aanwezige homogeniteit van een groep moest uitgegaan worden van vergelijkbare gegevens en dit had derhalve tot resultaat, dat hier slechts een zeer beperkt aantal genoemd kunnen worden. Er kon een onderscheid gemaakt worden in het geslacht, leeftijd, tijd die verlopen was tussen het trauma en de opname in het revalidatiecentrum, duur van coma (danwel de tijd tussen trauma en de eerste

gecontroleerde respons van de patiënt op een bepaalde stimulus), opnameduur en tenslotte moeizaam, het type contusio en medikatie.

- B. Assessment in kwalitatief opzicht: deze gegevens werden voornamelijk betrokken uit de opeenvolgende teambesprekingen. Het ging hierbij om de vraagstelling „Hoe drukt een bepaalde therapeut zich uit omtrent de patiënt?” – Bij de inventarisatie werden derhalve onderscheidingen gemaakt in de meningen van iedere discipline apart en de mening van het team in zijn totaliteit. Hierdoor konden twee soorten variabelen worden onderscheiden:
- a. Min of meer disciplinegebonden uitspraken (de fysiotherapeut doet een uitspraak over het looppatroon, de logopedist spreekt over de afasie, de arbeidstherapeut heeft een mening over de fijne motorische coördinatie etc.). Hier wordt gesproken over „min of meer” disciplinegebonden criteria, aangezien de meningen hierover nogal verdeeld zijn en bijvoorbeeld in Amerika de ADL-training ook door fysiotherapeuten geschiedt, terwijl deze in ons land typisch het terrein zou zijn van de ergotherapeut en/of verpleging.
 - b. Het blijkt dat iedere discipline naast zijn min of meer typisch disciplinegebonden criteria ook algemene uitspraken geeft over het gedrag van de patiënt. Dit soort uitspraken zijn t.o.v. de disciplinegebonden uitspraken in de meerderheid, hetgeen opvallend genoemd kan worden.
- Deze uitspraken werden alle ontleend aan „gedragsobservaties” en geven een reële of vermeende gedragsdeviatie aan. Voorlopig werden deze beschrijvingen in hun vaagheid, veelheid en diversiteit als gegevens ter verdere uitwerking gehanteerd.
- C. Assessment in kwantitatief opzicht: Het leek van belang niet slechts de soort der uitspraken te kennen, maar eveneens de frekwentie van voorkomen en eventuele toe- of afname der gedragsdeviaties. Een eerste moeilijkheid die zich hierbij presenteerde was de, overigens vrij reële zaak, dat niet iedere patiënt even veelvuldig op de teambespreking werd gepresenteerd. Afhankelijk van de aandoening, de voor- of achteruitgang werd een patiënt soms gedurende 3 maanden om de 14 dagen besproken. Een andere patiënt verscheen de eerste 2 maanden iedere week op de „rol” en kwam daarna anderhalve maand niet meer op de besprekingen voor.
- Teneinde ook hier een vergelijkbaarheid te verkrijgen werd de gemiddelde frekwentie van bespreken berekend. Dit leverde op dat in een tijdsbestek van 2 maanden iedere patiënt gemiddeld bij benadering driemaal werd besproken (range 5 per 2 maanden). De uitspraken inzake gedragsdeviaties zoals aangegeven bij de kwalitatieve assessment werden over deze twee maanden gesommeerd en vervolgens over de totale verblijfsduur van de patiënt.
- Een tweede, niet zo vanzelfsprekende bevinding, was dat een klacht in eerste instantie wel werd gesignaleerd, maar dat de status geen duidelijke informatie gaf omtrent het verdere beloop hiervan. De toename van het aantal opmerkingen omtrent een bepaalde gedragsdeviatie over de tijd genomen zou geïnterpreteerd kunnen worden als een achteruitgang, als een toename van de deviatie zelf. Hoewel dit lang niet altijd zo duidelijk naar voren kwam, kon hier toch bij de inventarisatie rekening mee worden gehouden. Wanneer echter een gedragsdeviatie ophield te bestaan, dan werd dit vaak niet gesignaleerd. Ze kwam niet meer ter sprake op de teambespreking – want deze is immers eerder gericht op het bespreken van problemen – òf, als dit wel voorkwam, werd dit niet genotuleerd.

In een dergelijke situatie was het dus niet mogelijk om aan de hand van de statussen een uitspraak te doen, omtrent een eventuele afname of continuering van een bepaalde gedragsdeviatie.

Bij de inventarisatie werd het niet meer voorkomen van de klacht op de bespreking geïnterpreteerd als het voortduren van dit eerder gesignaleerde defect.

Alleen wanneer er duidelijk gesproken werd over verbetering van de bepaalde klacht werd dit als zodanig in de inventarisatie opgenomen.

2.1.3. Resultaten van de inventarisatie

In deze paragraaf worden de resultaten der statusinventarisatie gepresenteerd, na bewerkingen ter verbetering van de overzichtelijkheid.

Deze bewerkingen resulteerden in een aantal tabellen waarbij de noodzakelijke toelichtingen onder de desbetreffende tabel worden vermeld.

tabel 1. Patiëntengegevens.

Leeftijd in jaren	M.	Md.	R	G.A.
M. 9 - 16 - 16 - 17 - 18 - 18 - 19 - 20 - 21 - 21 - 22 - 25 - 26 - 29 - 35 - 40 - 41 - 45	24,33	21	37	7,85
V. 10 - 17 - 20 - 20 - 20 - 0 - 41 - 43	24,42	20	34	10,03
M./V.	24,36	20	37	8,23
tijd trauma tot opname RCH (in maanden)				
M. 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 5 - 6 - 6 - 6 - 6 - 82 - 108 - 120	20,00	3	120	27,77
V. 1 - 1 - 13 - 14 - 42 - 240 - 333	92,00	14	333	111,14
M./V.	40,14	5	533	43,85
duur coma (in dagen)				
M. 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 10 - 10 - 14 - 15 - 20 - 35 - 36 - 36 - 49 - 56 - 63 - 75	32,76	14,5	69	18,55
V. 7 - 3 - 7 - 14 - 36 - 70 - 90	36,66	14	88	28,88
M./V.	34,00	14	88	21,68
verblijfsduur RCH (in dagen)				
M. 13 - 24 - 26 - 60 - 75 - 93 - 105 - 120 - 120 - 120 - 120 - 135 - 150 - 180 - 180 - 270 - 425 - 700	162,00	120	688	105
V. 30 - 44 - 60 - 120 - 180 - 210 - 240	126,28	120	211	71,75
M./V.	152,00	120	688	93,52

M. = mannen V. = vrouwen

M = rekenkundig gemiddelde Md = mediaan R = range G.A. = gemiddelde afwijking

type contusio	N	medikatie
stamcontusio + hemiparese rechts	1	neuleptil
stamcontusio + hemiparese links	1	valium - neostygmine-neurotoxin
stamcontusio	3	neuleptil-limbitrol-luminal-diphantoine
contusio cerebri + hemiparese rechts	6	luminal (3x)-diphantoine (2x)-ronicol (2x)-valium neuleptil (2x)-hydergine (2x)-limbitrol cedulamine (2x)-luminal-duraboline bellergal (2x)-nolibrium (2x)-refusal-rhonal
contusio cerebri + impressiefraktuur links	2	geen medikatie
contusio cerebri + impressiefraktuur rechts	2	neuleptil-luminal-limbitrol-diphantoine
contusio cerebri + tetraparese	1	
contusio cerebri + subduraal hematoom	1	
stamcontusio + contusio cerebri + hemiparese rechts	1	mogadon
stamcontusio + contusio cerebri	1	furadentil
verder:		
hersenvloeding	2	luminal
tetraparese	1	limbitrol-dermopan
subduraal hematoom	1	luminal-neuleptil
hemiparese t.g.v. schotwond	1	luminal-decaduraboline-diphantoine-coffeine
arthropathie cerebri	1	neuleptil-prasine-diphantoine-luminal-tregretol

tabel 2 Overzicht observatie-items

gedragsstoornissen (alle disciplines)

P > 5	N	P	P-	P+
ongemotiveerd	73	20	8	1
slordig in zelfverzorging	27	15	7	2
treuzelen, herhalen	30	13	9	3
inactief	30	14	4	2
wil de baas spelen	40	13	8	2
infantiel, lacherig	22	12	2	1
onrustig, ontremd	22	14	4	1
aandacht afdwingend	21	12	5	0
niet coöperatief	16	7	4	0
gebrek zelfkritiek	16	6	4	0
klagen	15	8	2	0
prikkelbaar, agressief	14	9	5	0
zich afzonderend	11	7	0	4
hullen	11	8	2	0
depressief	11	6	2	0
onzelfstandig	10	5	0	4
angstig	8	5	2	1
(P > 5) 17 items (P 1-4) ± 30 items (tot.) ± 50 items	377	174	68	21

N = aantal beoordelingen over 25 patiënten genomen over de totale verblijfsduur

P = aantal patiënten, waarbij deze beoordelingen werden aangetroffen

P- = aantal patiënten waarbij (vermoedelijk) sprake was van vermeerdering der bevindingen (= achteruitgang)

P+ = aantal patiënten waarbij (vermoedelijk) sprake was van vermindering der bevindingen (= vooruitgang)

0 in de kolommen P-, en P+ betekent of geen duidelijke informatie of

ogenschoonlijk een konstant beeld in het klachtenpatroon

voor P > 5: Σ items = 38; Σ N = 635; Σ P = 363; Σ P- = 79; Σ P+ = 68;

Σ P0 = 363 - (79 + 68) = 216

Σ (P > 5) = 38 items

Σ (P 1-4) = ± 80 items

Σ (tot.) = ± 120 items

1) fysiotherapie: gegevens inzake spierstatus zijn niet betrokken in deze verzameling

min of meer discipline-gebonden bevindingen

P > 5	N	P	P-	P+	P > 5	N	P	P-	P+
arbeids/ergotherapie					psychologisch rapport				
visuele perceptiestoornis	28	14	1	1	geheugenstoornis	23	13	2	0
geringe spanningsboog	17	12	3	4	concentratiestoornis	20	10	0	0
slechte fijne mot. coördinatie	12	11	0	5	slecht algemeen begrip	14	8	0	0
gestoorde oriëntatie tijd, plaats, persoon	10	5	0	2	traag tempo	14	11	0	0
werkt niet zonder begeleiding	9	8	1	0	IQ < 70	8	7	0	0
					IQ 70-90	6	6	0	0
(P > 5) 5 items (P 1-4) ± 10 items (tot.) ± 15 items	76	50	5	12	(P > 5) 6 items (P 1-4) ± 12 items (tot.) ± 18 items	85	55	2	0
fysiotherapie¹⁾					verpleging				
algemene motoriek slecht	14	12	2	5	inkontinentie	8	6	0	0
slechte grove mot. coördinatie	12	10	0	4					
evenwichtstoornissen	8	8	0	3	(P > 5) 1 items (P 1-4) ± 8 items (tot.) ± 9 items	8	6	0	0
(P > 5) 3 items (P 1-4) ± 5 items (tot.) ± 8 items	34	30	2	12					
logopedie					maatschappelijk werk				
afasie	8	8	0	4	pathologisch thuismilieu	9	9	0	0
spreken algemeen slecht	17	13	2	7	onhandelbaar thuis	7	6	3	0
dysarthrisch	8	7	0	0					
auditive perceptiestoornis	6	5	0	1	(P > 5) 2 items (P 1-4) ± 9 items (tot.) ± 11 items	16	15	3	0
(P > 5) 4 items (P 1-4) ± 7 items (tot.) ± 11 items	39	33	2	12					

Tusschen tabel 2

1c. De gedrags- en defektesbeschrijvingen worden geïnterpreteerd in de terminologie van de therapeuten. Dit waren: arbeids/ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, psychologie, verpleging en maatschappelijk werk. Diverse omschrijvingen met oegenschijnlijk gelijke inhoud zijn desalniettemin niet samengevoegd.

2c. Als criterium voor opname in de tabel geldt, dat de uitspraak op minstens vijf patiënten in de loop van de tijd was toegepast (P > 5). Uitspraken die op minder dan vijf patiënten werden toegepast (P 1-4) zijn niet opgenomen. Alleen het totale aantal werd vermeld.

tabel 3a. Frekwentieverdeling der gedragsobservatie-items

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	←N
ongemotiveerdheid	4	1	6	1	5	6			1	3	10	3	5	1	3	8	7	1		4	1	2	1			73
slordig in zelfverzorging		2	1		2	1			1	1	4	3		1	2	3	3			1	1	1				27
wil de baas spelen		4	1	3		4			2	2	5		1	1	12	1	2									40
treuzelen, herhalen		2	2	2		1	2		2	2	4				4		3	2			2		2			30
inactief	3	1	3	1	3	2			1	1	4	2	4					2			2	1				30
infantiel, lacherig		2	5	1					2		2	3		1	1					1		2	1			22
ontremd, onrustig							2		1	3	1	1	1	1	1	5	1				1	2	1	1		22
aandacht afdwingend	2	2	2	1					2	3	3	2			1		1					1	1			21
niet coöperatief						2				3	1				2		6	1	1							16
gebrek aan zelfkritiek		1						1									8	3			2	1				16
klagen		2						2		2	2	2						2	2					1		15
prikkelbaar, agressief		2		1	3				2	1		1			1	2					1					14
zich afzonderend					2				1	2								1	2		2	1				11
huilt		2						2		1	1	2						1	1					1		11
depressief	1	1								2	1	5						1								11
onzelfstandig	2											2			4			1			1					10
angstig		1										2			1							2	2			8
totaal gedragsdeviaties	9	18	26	9	11	18	9	4	14	20	42	17	20	10	2	31	1	38	26	7	0	18	12	9	7	377

toelichting tabel 3a

Deze tabel geeft een frekwentieverdeling van de belangrijkste bevindingen, c.q. observaties inzake gedragsdeviaties ($P > 5\%$) per patiënt.

De in deze tabel verspreid voorkomende cijfers geven het aantal malen aan waarbij een bepaalde gedragsdeviatie bij een bepaalde patiënt door een teamlid werd gesignaleerd.

Deze items werden in horizontale zin gesommeerd teneinde een indruk te geven welke items het meest in de statussen werden genoemd.

De vertikale sommatie geeft een indruk inzake het totaal aantal, eventueel de verscheidenheid der items per patiënt.

N = Kodenummer van patiënt

tabel 3b. Frekwentieverdeling van gesignaleerde defekten per discipline

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	←N
arbeids/ergotherapie																										
visuele perceptiestoornis	3		3	1	2	1		1	2	1	1	2		4	4		2					1	1	1	1	28
geringe spanningsboog			1											1	2		1	2					1	2		17
slechte fijne motorische coördinatie						2	1							1	1	1				1		1	1	1	1	12
gestoorde oriëntatie tijd, plaats, persoon			2		2				1			3														10
werkt niet zonder begeleiding			1	1		1	1		1	1	1					2										9
fysiotherapie																										
algemene motoriek slecht	2	1	1					1	2	1		1		1	1							1		1		14
slechte grove motorische coördinatie								1	2	1		1		1		1						1	1	1	1	12
evenwichtsstoornissen		1						1		1		1	1		1				1					1		8
logopedie																										
spreeken algemeen slecht	2		1	1					1	2	1	3			1	1		1	1		1			1	1	17
afasie										1		1			1	1						1		1	1	8
dysarthrisch										2	1				1	1		1	1							8
auditiële perceptiestoornis	1		1						1			2					1									6
psychologie																										
geheugenstoornis		2	3		2	2				2			2		2			1	2				1	2	1	23
concentratiestoornis			2			2			1	1			4		4			2	2				1	1	2	20
slecht algemeen begrip		2		1					3	2	1	2		1			2									14
traag tempo	1		1	1	1									1	2		1	2	1					2		14
IQ < 70		2		1					1			1	1	1		1	1	1								8
IQ 70-90																						1	1			6
verpleging																										
inkontinentie				1					1					1		2		2				1				8
maatschappelijk werk																										
pathologisch thuismilieü	1	1		1		1	1					1		1						1		1				9
onhandelbaar thuis		2	1		1	1						1	1													7
totaal disc. gebonden stoornis opname duur	13	10	16	9	8	12	7	6	14	10	10	18	8	6	11	25	5	11	12	3	3	10	9	12	9	257
	12	5	23	1	7	7	5	7	5	5	7	5	3	1	3	11	3	7	5	2	5	7	3	5	3	
subjektief resultaat	?	?	?	?	-	-	?	?	+	-	-	+	-	?	+	-	-	-	-	?	+	?	+	+	+	+

toelichting tabel 3b.

Deze tabel geeft een frekwentieverdeling van gekonstateerde gedragstekorten zoals geobserveerd en gesignaleerd (in de status) per discipline apart.

Ook werd in deze tabel de verblijfsduur der patiënten opgenomen en wel afgerond op hele maanden. Bovendien is het subjectieve resultaat der behandeling vermeld waarbij + betekent succesvol, - niet succesvol, ? onzeker, of niet duidelijk.

De sommatie in horizontale zin geeft een indruk omtrent de frekwentie der diverse gedragstekorten. Sommatie in verticale zin geeft verscheidenheid en totaliteit der gedragstekorten per patiënt weer.

N = Kodenummer van patiënt.

2.1.4. Bespreking der resultaten van de inventarisatie

Tabel 1 geeft de samenstelling weer van de patiëntengroep
Hieruit blijkt:

- 1e. Aantal mannen is bij benadering tweemaal zo groot als het aantal vrouwen. De gemiddelde leeftijd is bij mannen en vrouwen gelijk, nl. 24 jaar. De spreiding in leeftijd is echter bij beide groepen vrij groot nl. vanaf 10-45 jaar.
- 2e. Tijd van trauma tot opname is door enkele uitschieters vooral bij de vrouwelijke patiënten nogal uiteenlopend.
Bij mannen bedraagt deze tijd gemiddeld 20 maanden, bij vrouwen is deze tijd 92 maanden. Bij vrouwen en mannen tesamen gemiddeld 40 maanden, dus ca. 3½ jaar.
De range en gemiddelde afwijking zijn bij beide groepen vrij groot.
- 3e. De comaduur kon in 6 gevallen niet worden nagetrokken. Bij mannen en vrouwen lijkt de duur van het coma niet uitgesproken verschillend. Het gemiddelde van de totale groep bedraagt 34 dagen. Ook hier echter weer grote range en gemiddelde afwijking.
- 4e. Gemiddelde verblijfsduur ligt op 152 dagen, dus ca. 5 maanden met eveneens grote range en gemiddelde afwijking.
- 5e. De patiëntengroep bestaat uit 5 stamcontusio's (en hemisfeer beschadigingen); 12 contusio cerebri (en verdere aandoeningen); 2 mengvormen van stamcontusio en contusio cerebri; 6 patiënten, waarbij het beeld nogal atypisch was voor de contusio.
- 6e. Er werden 23 verschillende medikamenten aangewend, in diverse combinaties, met als meest voorkomende medikatie resp. luminal (10×) neuleptil (7×), diphantoine (6×) en limbritol (4×).

Tabel 2.

Bij een eerste poging tot inventarisatie en eventuele voorzichtige interpretatie der gegevens dringt zich een moeilijkheid op inzake de terminologie. Een moeilijkheid die zich overigens nog wel enkele keren zal herhalen. Reeds bij een globale inspectie van de gegevens is het duidelijk dat er allerlei verschillen bestaan in de data van de „niet-disciplinegebonden uitingen” versus de „disciplinegebonden uitingen”.

Dit geeft echter hoogstens aan dat de klachten gekonstateerd werden door een verzameling van diverse therapeuten in bepaalde situaties in vergelijking tot één therapeut in een specifieke situatie, het geeft voorlopig nog weinig informatie omtrent de patiënt zelf.

Een onderscheid dat zich onwillekeurig opdringt is „de disciplinegebonden uitingen” in verband te brengen met cognitieve en motorische funktiestoornissen en de „niet-disciplinegebonden uitingen” met gedrag in interactie met de medemens. Vanuit leertheoretisch standpunt gaat het echter in beide gevallen om gedrag. De konkluderende dat de „disciplinegebonden bevindingen” funktiestoornissen zijn, is een gevolgtrekking die eerst nog eens waargemaakt moet worden. Het is voorlopig onzeker of de benaming „gedrag in interactie” dit gedrag wel voldoende adequaat weergeeft. Daarbij komt bovendien de vraag of dit gedrag niet eveneens bepaald wordt door funktiestoornissen en omgekeerd.

In feite doen beide uitspraken over gedrag, zij het in verschillende situaties, namelijk:

- 1e. „De disciplinegebonden observaties” werden grotendeels uitgevoerd in een testsituatie waarbij de patiënt gekonfronteerd werd met een opgave en waarbij de betreffende therapeut beoordeelde of en hoe de patiënt deze opdracht uitvoerde. *Dit is nu juist het gedrag waarop de fysieke revalidatie zich tot op*

heden voor het merendeel richt. Men zou het het doelgedrag van de fysieke revalidatie kunnen noemen.

- 2e. „De niet disciplinegebonden observaties” werden voor het merendeel uitgevoerd in een „niet-testsituatie”. Het feit alleen al dat ze door een meerderheid der disciplines dus in allerlei situaties werden gesignaleerd en dan meestal nog in het voorbijgaan, geeft aan dat het hier om gedrag gaat, dat niet-testgebonden is. Het kwam bij diverse therapieën, maar ook op het dagverblijf naar voren en werd dan als hinderlijk door de omgeving ondervonden en als belemmerend voor een verdere therapietoepassing. *Men zou het revalidatiebelemmerend gedrag kunnen noemen.*

Er lijken dus twee soorten onderscheidingen mogelijk te zijn: Enerzijds „testgedrag” en „niet-testgedrag” (onderscheid naar context of stimulus), anderzijds „revalidatiebevorderend doelgedrag” en „revalidatiebelemmerend gedrag” (onderscheid naar doelstelling).

Aan beide onderscheidingen zijn nadelen en onduidelijkheden verbonden. Het onderscheid naar „test”- en „niet-testgedrag” is wellicht belangrijk, maar het voegt niets toe aan „disciplinegebonden” en „niet-disciplinegebonden” observaties.

Het onderscheid naar „revalidatiebevorderend” en „revalidatiebelemmerend gedrag” lijkt verwarrend. Het opheffen van belemmerend gedrag zou immers ook tot de doelstellingen van de revalidatie kunnen of moeten behoren.

Het onderscheid dat hier geïntroduceerd wordt brengt aansluiting tussen leertheoretische principes en revalidatie.

- 1e. De gehele revalidatie is in eerste instantie gericht op het constateren van *gedragstekorten*. Men kan hierbij al dan niet onderliggende funktiestoornissen postuleren, echter het tekort kan alleen gekonstateerd worden in het gedrag van de persoon. *Na de konstatering van een gedragstekort tracht men over te gaan tot eliminatie van het gedragstekort d.m.v. nieuwe gedragsvorming.*
- 2e. *Teneinde nieuwe gedragsvorming te realiseren is het nodig dat er een aantal voorwaarden aanwezig zijn, nl. die voorwaarden die het leren van nieuw gedrag mogelijk maken en ondersteunen.* Deze voorwaarden moeten aanwezig zijn in der persoon en in de omgeving (revalidatie-thuis- en werkmilieu). Gedragsvorming wordt moeilijk, indien deze voorwaarden bij de persoon en/of de omgeving niet aanwezig zijn. Gedragsvorming (dus ook revalidatie) wordt onmogelijk indien er in plaats van de leervoorwaarden, kondities aanwezig zijn die nieuwe gedragsvorming belemmeren of tegenwerken. *Men zou kunnen spreken van blokkeringen tot gedragsvorming of kortweg „gedragsbelemmering”.* Een van deze gedragsbelemmeringen is de aanwezigheid van een zo dominerend gedragspatroon, dat er a.h.w. geen mogelijkheid meer is voor een ander gedrag of andere gedragsvorming. Hierbij dient aangetekend te worden, dat de nieuwe gedragsvorming in de revalidatie in een groot aantal gevallen weinig reïnforcerend en vaak ook aversief is. Het gedrag dat nieuwe gedragsvorming tegengaat heeft voor de patiënt een hogere bekrachtigende waarde dan het nieuwe aan te leren gedrag. Dit kan zowel opgaan voor bijvoorbeeld „agressief” gedrag als „passief” gedrag. Beide gedragingen ontstaan zoveel gemakkelijker omdat ze veelal als reactie op bijv. teleurstellingen, pijn, moeilijkheden, al heel vroeg zijn aangeleerd. Eenmaal aangeleerd staan ze vorming van het nieuwe gedrag dat van de patiënt verwacht wordt en dat mogelijk ook nog aversief wordt beleefd, in de weg. Vanuit gedragsvormend standpunt is hier een blokkering, die in dit geval bestaat uit ongewenst gedrag dat met een te grote frekwentie (nl. meestal of altijd) optreedt, waardoor het nieuwe aanleren van

gedrag onmogelijk wordt. Gedragsbelemmeringen zijn echter niet beperkt tot excessief gedrag, voorkomende bij de patiënt zelf. Andere gedragsbelemmeringen kunnen aangetroffen worden in het revalidatiemilieu (te weinig bekrachtiging), het thuismilieu (ondersteuning van het revalidatiebelemmerende gedrag) en eventueel, hoewel hypothetisch, in het functioneren van het organisme zelf. (zie hoofdstuk 4 en 5).

Het antagonistische koppel: gedragsvorming en de belemmeringen tot gedragsvorming, resp. tussen willen en weerstand is in de psychologie reeds lang een vertrouwd idee. (zie bijv. Rümke 1951 p. 93 of Klages 1926)

Om deze tegenstelling te ontmoeten hoeft men overigens niet persé naar historische psychologische publikaties om te zien. In de hedendaagse fysiotherapeutische literatuur treft men soortgelijke uitspraken aan: „Abnormale gedragingen kunnen”, aldus Kugel (1976 p. 260), „zo geïncorporeerd worden in het gedragspatroon, dat men normale gedragingen als aanstellerig ervaart en derhalve niet uitvoert”.

Uit bovenstaande, korte uiteenzetting blijkt dat de ideeën inzake gedragsvorming en gedragsbelemmeringen, zij het in andere bewoordingen, in verleden en heden in verscheidene kaders worden aangetroffen. Uitspraken, voorkomende in de status en weergegeven in tabel 2. kunnen dus, gebruik makend van leertheoretische indelingen, maar ook vanuit andere bronnen, in twee categorieën worden verdeeld.

Bij de verdere bewerking van tabel 2 en daaropvolgende assessment en modifikaties wordt derhalve een onderscheid gemaakt in:

- 1e. *Tekorten aan gewenst gedrag resp. gedragstekorten.* Deze werden (wat tabel 2 betreft) gekonstateerd door de diverse disciplines apart en hadden hoofdzakelijk betrekking op somatische gedragstekorten. Dit impliceert dat er een grotere variëteit van gedragstekorten (bijvoorbeeld sociale vaardigheden) bestaan echter zij werden in de studie der statussen niet aangetroffen en derhalve ook niet opgenomen in de voorlopige assessmentprocedure.
- 2e. *Gedragsbelemmeringen.* Deze werden (wat tabel 2 betreft) gekonstateerd door de diverse disciplines gezamenlijk en door de maatschappelijk werkenden apart. Zoals deze in tabel 2 zijn geformuleerd hebben ze hoofdzakelijk betrekking op ongewenst gedrag (vanuit gedragsvormend standpunt) dat in te grote frequentie (meestal, altijd, tijdens pogingen tot gedragsvorming) optrad. Dit impliceert dus eveneens dat er verschillende gedragsbelemmeringen kunnen bestaan, echter ook deze werden niet aangetroffen in de status en derhalve niet opgenomen in de voorlopige assessment.

Het onderscheid in gedragstekorten en gedragsbelemmeringen is leertheoretisch verantwoord en het leent zich uitstekend voor de bespreking van tabel 2. In de revalidatie lijkt door de introductie van „gedragsbelemmeringen” het aksent te zijn gelegd op een gebied dat tot nu toe niet de aandacht kreeg die het verdiende.

- 1e. Indien deze indeling naar gedragstekort en gedragsbelemmering wordt gehanteerd, dan blijkt het aantal items voor beide groepen gelijk te zijn, nl. 19-19. (17 gedragsbelemmeringen in de kliniek en 2 gekonstateerd door maatschappelijk werk).
- 2e. De gedragsbelemmeringen, waarbij $p \geq 5$ zijn: ongemotiveerdheid, slordigheid, de baas willen spelen, truzelen, herhalen, inaktiviteit, infantiel-lacherig gedrag, ontremd-onrustig gedrag, aandachtafdwingend, het niet-coöperatieve gedrag, gebrek aan zelfkritiek, klagen, prikkel-

baarheid-agressiviteit, zich afzonderend gedrag, huilen, agressie, onzelfstandigheid, angst, pathologisch thuismilieu en onhandelbaarheid van patiënt in thuissituatie.

De gedragstekorten, waarbij $p \geq 5$ zijn:

visuele perceptiestoornis, beperkte spanningsboog, slechte fijne motorische coördinatie, gestoorde oriëntatie in tijd, plaats en persoon, werkt niet zonder begeleiding, algemeen slechte motoriek, slechte grove motorische coördinatie, evenwichtsstoornis, slechte algemene spraak, afasie, dysartrie, slecht algemeen begrip, auditieve perceptiestoornis, geheugenstoornis, concentratiestoornis, traag tempo, IQ onder gemiddelde, inkontinentie.

- 3e. Het aantal gedragsdeviaties over 25 patiënten genomen over de totale verblijfsduur bedraagt voor de gedragsbelemmeringen $(377 + 16) = 393$; voor de gedragstekorten 242. D.w.z. het aantal gedragsbelemmeringen bedraagt $1,6 \times$ het aantal gedragstekorten.
- 4e. Het aantal patiënten waarbij deze deviaties worden aangetroffen (P) is wat betreft de gedragsbelemmeringen $(174 + 15) = 189$ en wat betreft de gedragstekorten 174. D.w.z. het aantal patiënten met gedragsbelemmeringen is nagenoeg even groot als het aantal patiënten met gedragstekorten. Dit behoeven niet noodzakelijk dezelfde patiënten te zijn. (P is hierbij zoals tabel 2 aangeeft de sommatie der diverse deviaties over het aantal patiënten).
- 5e. Het aantal patiënten waarbij (vermoedelijk) sprake was van vermeerdering der deviaties (P-), bedraagt voor de gedragsbelemmeringen $(68 + 3) = 71$ en voor de gedragstekorten 11. D.w.z. een ca. 6 maal zo grote toename van patiënten met gedragsbelemmerende factoren in vergelijking met de toename van patiënten met gedragstekorten.
- 6e. Het aantal patiënten waarbij (vermoedelijk) sprake was van vermindering der klachten (P+), bedraagt voor de gedragsbelemmeringen 21 en voor de gedragstekorten 47. D.w.z. een ongeveer 2 maal zo grote verbetering van patiënten met gedragstekorten in vergelijking tot patiënten met belemmerende factoren.

Tabel 3 a. en b.

Deze tabel leent zich voor talloze overwegingen en konstateringen van tendenties. Het aantal gevallen biedt echter geen kans voor een zinvol gebruik van statistische toetsen. Er dient daarom voor gewaakt te worden voorbarige konklusies te trekken, derhalve worden de volgende gedachtengangen slechts als uitspraken gepresenteerd. Sommige hiervan zijn vanzelfsprekend, andere daarentegen wellicht onverwacht.

A. Inzake het samen optreden van klachtenuitingen.

- 1e. „Pathologie in thuismilieu” hoeft niet samen te gaan met „gestoord gedrag van patiënt thuis”. De samenhang werd slechts in 3 van de 9 gevallen gekonstateerd.
- 2e. „Concentratiestoornis” gaat in 9 van de 10 gevallen samen met „geheugenstoornis”.
- 3e. a. „Auditieve perceptiestoornis” gaat in 4 van de 5 gevallen samen met „slecht spreken in het algemeen”.
b. „Dysartrie” gaat in 6 van de 7 gevallen samen met „slecht spreken in het algemeen”.
c. „Afasie” gaat in 6 van de 8 gevallen samen met „slecht spreken in het algemeen”.

- 4e. a. „Evenwichtsstoornis” gaat in 6 van de 8 gevallen samen met „slechte algemene motoriek”.
 b. „Slechte grove motorische coördinatie” gaat in 8 van de 10 gevallen samen met „slechte algemene motoriek”.
- 5e. a. „Slechte fijne motorische coördinatie” gaat in 8 van de 11 gevallen samen met „visuele perceptiestoornis”.
 b. „Werkt niet zonder begeleiding” gaat in 5 van de 8 gevallen samen met „geringe spanningsboog”.

B. Inzake het falen van de revalidatie.

Een interessante vraag lijkt te zijn, waar nu het succes of falen van de revalidatie bij patiënten met contusio cerebri door bepaald wordt. Van 8 patiënten kon met redelijke betrouwbaarheid uit de status gekonkludeerd worden dat hun revalidatie succesvol was verlopen. Uit de statussen bleek nl. dat het aantal uitspraken van verbetering groot was en dat er geen uitlatingen meer voorkwamen omtrent eerder gekonstateerde deviaties. Van 8 patiënten kon overigens onder hantering van dezelfde criteria het tegengestelde vastgesteld worden. Het aantal deviatie-uitspraken nam toe, terwijl over positieve bevindingen niet werd gerept. Van 9 patiënten is geen duidelijke konklusie mogelijk.

Indien men de 8 succesvolle patiënten vergelijkt met de 8 onbevredigd behandelde patiënten, dan presenteert zich het volgende beeld.

Tabel 4: Vergelijking „suksessen” en „falen”

suksessen P (+)	9	12	15	17	21	23	24	25	Σ
gedragsbelemmeringen	14	18	2	1	0	12	9	7	63
gedragstekorten	14	18	11	5	3	9	12	9	81
falen P (–)	5	6	10	11	13	16	18	19	
gedragsbelemmeringen	12	19	20	43	21	31	38	26	210
gedragstekorten	7	11	10	9	7	25	11	12	92

P (+) en P (–) geeft het (fiktieve) patiëntennummer aan uit tabel 3. Gedragsbelemmeringen blijken vooral gesignaleerd te worden bij uitspraken door maatschappelijk werk en bij de niet-disciplinegebonden uitspraken uit tabel 3. Gedragstekorten zijn te herkennen onder klachtenuitingen voortkomend uit de disciplinegebonden uitspraken uit tabel 3.

Bij bestudering van tabel 4 blijkt:

- 1e. Het aantal gedragstekorten is voor beide groepen nagenoeg gelijk. Succesvol behandelde kregen 81 uitspraken inzake gedragstekorten. Niet-succesvol behandelde kregen 92 uitspraken inzake gedragstekorten.
- 2e. Het aantal gedragsbelemmerende uitspraken is voor de niet-succesvol behandelde groep aanzienlijk groter in vergelijking tot de succesvol behandelde groep nl. 210 : 63 (faktor 3,3).

2.1.5. Samenvatting.

De status als neerslag van een teambespreking is op zichzelf een reductie en een min of meer willekeurige verzameling van min of meer betrouwbare informaties. Het is derhalve wel een vreemd uitgangspunt om juist de status als basis te gebruiken voor het opzetten van een mogelijk betere revalidatieprocedure. De status was echter het

enige ruwe materiaal, dat direkt beschikbaar was. Informaties uit de status dienen derhalve met reserve te moeten worden gezien en onder voorbehoud te worden geïnterpreteerd. De eventueel hieruit voortkomende strategie kan alleen een strategie in alle voorlopigheid zijn.

Na hergroepering van de gegevens uit de status konden een drietal overzichten worden gegeven inzake:

- a. de samenstelling der groep patiënten met contusio cerebri, naar aard van aandoening en andere parameters die hierbij relevant leken.
- b. de soort en het aantal uitingen inzake gedragsdeviaties.
- c. de verdeling van de deviaties over de patiënten.

De onderverdeling der gedragsdeviatie-uitspraken in „gedragstekorten” zoals geconstateerd door de diverse disciplines apart en „gedragsbelemmeringen” zoals geconstateerd door de diverse disciplines tesamen, geeft een goed uitgangspunt voor de integratie van leertheorieën en behandelingsstrategieën in de revalidatie. De gedachte die aan deze indeling ten grondslag lag was de overweging dat revalideren in eerste instantie het opnieuw vormen van gedrag c.q. het aanleren van dit nieuwe gedrag is. Bij dit aanleren dienen allerlei kondities optimaal te zijn. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan is er veelal sprake van belemmerende kondities, factoren die het leren, het opnieuw vormen van gedrag tegenwerken.

De gedragsbelemmeringen lijken uit diverse factoren te kunnen bestaan. Eén daarvan is ongewenst gedrag dat excessief optreedt.

Na deze indeling in gedragstekorten en gedragsbelemmeringen konden een aantal voorlopige, maar opmerkelijke bevindingen uit de overzichtstabellen worden betrokken:

- 1e. Het aantal gedragsbelemmeringen is aanzienlijk groter dan het aantal gedragstekorten.
- 2e. Het aantal uitspraken inzake gedragsbelemmeringen neemt in de loop der revalidatieperiode *meer toe* dan het aantal uitspraken inzake gedragstekorten.
- 3e. Patiënten die in de revalidatie als onbevredigd behandeld werden beschouwd tonen aanzienlijk *meer* gedragsbelemmeringen dan zij, die als succesvol behandeld werden gezien. Bij deze groepen waren de gedragstekorten nagenoeg gelijk.

Als een voorlopig plausibele konklusie is te stellen, dat bij de revalidatie van patiënten met contusio cerebri een aantal gedragsbelemmeringen bestaan, die het opheffen van gedragstekorten in de weg staat.

Herkenning van deze gedragsbelemmeringen en eliminatie ervan lijkt derhalve de primaire opgave te zijn voordat gedacht en gewerkt kan worden aan herstel of opnieuw vormen van gedrag.

Bij de groep der patiënten met contusio cerebri lijkt dit zelfs het eerste doel te zijn waarop de revalidatie zich zou moeten richten.

2.2. Samenstelling van een voorlopige assessmentprocedure

2.2.1. Inleiding

In deze paragraaf wordt teruggegrepen op datgene wat bij de verzameling der gegevens werd geconstateerd. Een onregelmatige verzameling van weinig gestruktureerde subjectieve informatie kan geen basis vormen waarop een strategie moet worden opgebouwd. Er dient dringend aandacht besteed te worden aan een

mogelijkheid om op een meer gestandaardiseerde wijze, binnen regelmatige tijdsintervallen, objectieve informatie te krijgen inzake relevante repeterende (dus dezelfde) criteria.

Als gedragsvariabelen waarop de informatie betrekking moet hebben, werden bij de inventarisatie der contusio-problematiek reeds genoemd: enerzijds gedragstekorten en anderszijds gedragsbelemmeringen.

Teneinde deze variabelen minder afhankelijk te maken van een subjectieve hantering dienen ze nader uitgewerkt te worden. Dat geldt zondermeer voor de gedragsbelemmeringen. Maar ook de gedragstekorten verdienen de aandacht, aangezien niet zondermeer kan worden aangenomen dat de criteria relevant zijn en dat de zo gewenste objectiviteit door iedere discipline in gelijke mate wordt nagestreefd of geambieerd.

De regelmatige herhaling van informatieverzamelen vormt hier een apart probleem. Deze bepaalt in aanzienlijke mate welke variabelen voor regelmatig gestandaardiseerde informatie kunnen worden bewerkt. Dit zijn de niet-disciplinegebonden gedragsbelemmeringen, aangezien deze door geen enkele discipline als privé terrein worden beschouwd, en uiteraard gegevens vanuit het psychologisch rapport. Vanuit deze, eveneens weer door praktijkomstandigheden inzake toegankelijkheid gevormde invalshoek, wordt de voorlopige assessmentprocedure opgezet.

2.2.2. De psychologische onderzoekprocedure

Aangezien psychologische tests doorgaans gestandaardiseerd zijn en bovendien met regelmatige tijdsintervallen door de afdeling psychologie afgenomen kunnen worden, werden deze als een eerste onderdeel in de voorlopige assessmentprocedure opgenomen.

2.2.2.1. Samenstelling

Bij de samenstelling van de psychologische onderzoekprocedure werd rekening gehouden met:

- a. De criteria welk genoemd werden onder inventarisatie der problematiek.
- b. Met de ter beschikking staande gestandaardiseerde en genormeerde tests.
- c. Voor zover dit enigszins kon, met de afnamemogelijkheid bij de soms zwaar gehandicapte revalidatiepatiënten.

1. Algemene intelligentie,

Aangezien het een ervaringsfeit is, dat intelligentiebepaling d.m.v. één test een onvolledig en vaak vertekend beeld oplevert, werd een combinatie van twee intelligentietests voor iedere patiënt met contusio cerebri nagestreefd. Afhankelijk van de handicap werd een keuze gemaakt uit: Raven Progressive Matrices, volwassen of kindervorm; WAIS-verbaal; WAIS-performance; WISC – verbaal; WISC-performance; GIT en SON.

De normering werd betrokken uit de handleiding behorende bij de betreffende test.

2. Geheugen (korte termijn).

Literatuurgegevens en praktijkervaring suggereerden, dat er rekening moest worden gehouden met de modaliteit waarin de stimuli werden aangeboden, de wijze van stimuluspresentatie en de aard van de gewenste reproductie. Derhalve werd hier onderscheid gemaakt in:

- a. Recognitie: het presenteren van een aantal stimuli, de inprenting en de opslag hiervan, het herkennen van de stimuli uit verschillende tegelijkertijd aangeboden stimuli.

a-1. Recognitie visueel: Eigen testontwikkeling (naar voorbeeld: geheugen voor plaatjes SON.)

a-2. Recognitie auditief: Eigen testontwikkeling

b. Recall: het presenteren van een aantal stimuli, inprenting en opslag hiervan en het reproduceren in een volgorde, die niet noodzakelijk overeen hoeft te komen met de presentatie.

b-1. Recall visueel: Benton

b-2. Recall auditief: 15-woordentest.

Onder korte termijn wordt verstaan: reproductie 5 seconden na presentatie. Normering voor a-1 en a-2 vond plaats op 30 leerlingen van de opleidingen logopedie en arbeidstherapie in de leeftijdsgroepen 18-25 jaar met een GIT-IQ tussen de 100-120 punten.

In de gegeven omstandigheden diende genoeg genomen te worden met de normeringstekorten wat betreft de niet a-selekte steekproef, het te hoge IQ in relatie tot de gemiddelde patiënt met contusio cerebri en een te kleine groep voor vergaande statistische uitspraken.

3. Concentratie.

Als concentratie-aspekt werd de zgn. „attention span” gekozen, waarbij dus andere aspecten als „selektiviteit” en „focus” voorlopig buiten beschouwing bleven. Concentratie wordt hier gedefinieerd als het vermogen van een persoon om met een bepaalde taak bezig te zijn en te blijven, met een zekere snelheid, regelmatigheid en nauwkeurigheid. In ons land wordt hiervoor als onderzoeksmethode De Bourdon-Wiersmatest gebruikt, waarbij het volhouden van de taak een vereiste is en het tempo per regel, het aantal fouten en de dispersie worden bepaald. Voorlopig werd gemeend ook deze Bourdon-Wiersma voor het genoemde concentratie-aspekt te kunnen hanteren.

Normering werd betrokken uit het academisch ziekenhuis te Groningen, afdeling neurologie. Er bestaan hieromtrent enkele officiële publikaties.

2.2.2.2. Assessmentuitvoering

Aangezien in de inventarisatie met name geheugen en concentratietekorten werden genoemd en er wat betreft de modifikatie hiervan enkele publikaties bestonden, werden deze gedragstekorten in aanmerking genomen voor een poging tot gedragsvorming. Het intelligentieniveau gold hier slechts als een extra parameter. Een poging tot modifikatie van intelligentietekort werd nog niet ondernomen. De strategie ter modifikatie van geheugen- en concentratietekorten wordt onder 2.2.3. behandeld.

Als indicatie voor geheugen resp. concentratietekort gold steeds de voorwaarde, dat betreffende patiënt vergeleken met zijn normeringsgroep duidelijk onderscoorde op geheugen en concentratietest, maar daarnaast toch een gemiddeld IQ > 90 bezat. De effectassessment vond voor iedere patiënt om de drie maanden plaats. Aangezien vrijwel iedere behandeling minstens 5 à 6 maanden duurde, was er dus gelegenheid tot het afnemen van minimaal twee assessmentprocedures. De kans op testgewinning leek met een tussenperiode van drie maanden vrij gering. Hierdoor werd afgezien van het gebruik van paralleltests.

Vergelijking der scores vond plaats in decielen voor de geheugen en concentratietests; bij de intelligentietests werden de standaardscores vergeleken. Aangezien de onder 2.2.3. te behandelen observatie van gedragsbelemmeringen plaatsvond in een 5-puntsschaal werd ter verkrijging van overzichtelijkheid ook de geheugen- en

concentratiedecielen en de intelligentiestandaardscores omgezet in een „punt” schaal.

Tabel 5 geeft een overzicht van deze omzetting.

Tabel 5: Omzetting van Testscores in „punt”schaal

	gem. IQ	Geheugen-Units-Kort				concentratie		
„punt”- schaal	standaard- scores	decielen		decielen		decielen		
		recognitie		recall				
		vis.	aud.	vis.	aud.	tempo	disp.	fouten
5,0	< 60 ¹⁾	I ¹⁾	I ¹⁾	I ¹⁾	I ¹⁾	I ¹⁾	I ¹⁾	I ¹⁾
4,5	60-70	II	II	II	II	II	II	II
4,0	70-80	III	III	III	III	III	III	III
3,5	80-90	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
3,0	90-100	V	V	V	V	V	V	V
2,5	100-110	VI	VI	VI	VI	VI	VI	VI
2,0	110-120	VII	VII	VII	VII	VII	VII	VII
1,5	120-130	VIII	VIII	VIII	VIII	VIII	VIII	VIII
1,0	> 130	IX + X	IX + X	IX + X	IX + X	IX + X	IX + X	IX + X
1) of niet afneembaar, resp. testbaar								

2.2.3. De Gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC)

2.2.3.1. Samenstelling van de items

Ten behoeve van het onderzoek diende een betrouwbare en valide observatiemethode ontwikkeld te worden. Een dergelijk instrument moet uiteraard voldoen aan minimale voorwaarden.

Uitgaande van deze voorwaarden inzake de opzet van de schaal werd de samenstelling zelf als volgt uitgevoerd:

- 1e. Er werd uitgegaan van de 17 gedragsbelemmeringen, zoals die uit de inventarisatie van de problematiek bij de niet-discipline-gebonden uitingen naar voren kwamen.
- 2e Vervolgens werd in een drietal bestaande gedragsobservatieschalen gezocht of de 17 gedragsbelemmeringen hierin waren vertegenwoordigd. Deze schalen waren de WAV (Burger 1971), Graffelschaal (Burger 1966) en een schaal voor een psychiatrisch centrum (Marinkelle 1969).
- 3e. Indien een gedragsbelemmerend item in deze schalen werd aangetroffen, dan werden de omschrijvingen die deze bestaande schalen gebruikten genoteerd op een aparte lijst en wel iedere uitspraak op een aparte regel.
Hierbij werden alleen of hoofdzakelijk gedragsomschrijvingen geselecteerd en bijv. geen „selfreport”. Op deze wijze ontstonden ca. 300 uitspraken die apart getypt werden op strookjes papier.
- 4e. De ca 300 strookjes met uitspraken werden vervolgens at random aangeboden aan drie personen (niet-psychologen) met het verzoek:

- a. Deze te sorteren onder de hoofden die gevormd werden door de 17 gedragsbelemmeringen.
 - b. Vervolgens te trachten een volgorde in 4 stappen aan te brengen van „licht aanwezig” tot „de betreffende gedragsbelemmering is maximaal aanwezig”.
 - c. Tenslotte werd gevraagd „het niet aanwezig zijn van bepaalde klacht” in eigen woorden te omschrijven.
- 5e. Als criterium voor de opname van een uitspraak gold, dat deze uitspraak door twee van de drie personen overeenkomstig werd beoordeeld en gerangschikt.
 - 6e. Voor twee soorten gedragsbelemmeringen waren zo veel uitspraken beschikbaar dat werd overgegaan tot opsplitsing namelijk in: Dwangmatig gedrag in resp. werk en zelfverzorging. Slordigheid in resp. werk en zelfverzorging.
 - 7e. Tenslotte werden de gedragsbelemmeringen in twee groepen opgesplitst, met het oog op hun relevantie voor eventuele modifikatiepogingen.
- A. Gedrag dat in de regel: „hulp, aandacht, medelijden, ondersteuning” vanuit de omgeving oproept.

I: Huilen II: Angstig gedrag III: Depressief gedrag IV: Klagen V: Onzelfstandig gedrag	VI: Afzonderings gedrag VII: Opdringerig gedrag VIII: Dwangmatig gedrag IX: Euforie.
---	---
 - B. Gedrag dat in de regel „afkeer, irritatie, agressie” spontaan vanuit de omgeving oproept.

X: Slordigheid XI: Niet-coöperatief gedrag XII: Onrustig, ontremd gedrag XIII: Verbale en Motorische Agressie	XIV: Dominant gedrag XV: Inactief, traag gedrag XVI: Ongemotiveerd gedrag XVII: Gebrek aan zelfkritiek.
--	--

Dit onderscheid in A en B bleek in de praktijk – zoals te verwachten was – niet relevant (zie hoofdstuk 3)

- 8e. Het resultaat van deze handelwijze werd tesamen met instructies voor de beoordelaar (zie bijlage 1) als een boekje gepresenteerd aan het team.

N.B. De psychometrische aspecten van deze schaal worden in hoofdstuk 3 besproken.

2.2.3.2. Assessment door gedragsobservatoren

- 1e. Teneinde wederzijdse beïnvloeding te voorkomen dient observatie en rapportage buiten de groep te gebeuren. Dit betekent dat de observator aan de hand van zo veel mogelijk geëxpliciteerde gedragsomschrijvingen individueel een keuze doet uit alternatieven, deze keuze schriftelijk vastlegt en naar een centraal punt opstuurt.
- 2e. Daar het gedrag een functie is van de voorgaande stimulus en de daaropvolgende omgevingskontingenties zal de patiënt in verschillende situaties geobserveerd dienen te worden. Op deze wijze wordt een indruk verkregen omtrent het voorkomen van gedrag binnen diverse situaties.
- 3e. Dientengevolge zullen er ook verschillende observatoren moeten zijn. Dit lijken bij voorkeur dezelfde personen te moeten zijn, die op ongeveer regelmatige en dezelfde tijdstippen de observatie uitvoeren en tot een indruk komen.

- 4e. Hoewel het van belang is rekening te houden met de specifieke stimulussituatie moet wel in acht genomen worden dat deze aparte scoreverzameling het werk zal zijn van één hooguit twee observatoren, die dan toevallig in dezelfde plaats werkzaam waren. Het is hiernaast nodig en vermoedelijk meer betrouwbaar een indruk te krijgen van de totaalscore over verscheidene observatoren. Deze visie wordt ook ondersteund door Burger: „Door individuele beoordelingen te combineren worden synthetische beoordeelaars gevormd, wier beoordelingen een hogere interbeoordeelaarsbetrouwbaarheid te zien geven en tot hogere validiteitscijfers kunnen leiden dan de beoordeling van individuele beoordeelaars”. (Burger 1966, p.1)

Aan bovenstaande richtlijnen en ideeën gevolg gevend werd een vast beoordelaarsteam samengesteld bestaande uit 3 verplegenden, 2 fysiotherapeuten, 1 logopediste, en 2 arbeids/ergotherapeuten. Deze 8 beoordelaars werden niet opgeleid, maar slechts verzocht zich dringend aan de instructies te houden, die in de inleiding van de GOCC waren opgenomen (zie bijlage 1).

2.2.3.3. Assessmentuitvoering

Iedere patiënt met contusio cerebri kwam na een adaptatieperiode in aanmerking voor gedragsobservatie d.m.v. de „Gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC)”. Aangezien echter niet iedere patiënt evenveel therapieessies per dag verkreeg, werd niet iedere patiënt door de 8 personen van het observatieteam geobserveerd. Er werd echter wel altijd naar gestreefd een minimum aantal van 5 observatoren per patiënt bij de observatie te betrekken. In totaal werden voor iedere patiënt drie observaties uitgevoerd, die eenmaal per 14 dagen plaats vonden.

Indien uit de observatie van de observatoren bleek dat er geen reden was om het gedrag van de patiënt voor een bepaalde situatie apart te bezien, dan werden de scores (lopende van 1-5) gesommeerd en gedeeld door het aantal observatoren (N.B. Zie inzake psychometrische overwegingen hoofdstuk 3).

Indien er toch reden bestond om de eventueel gekonstateerde gedragsbelemmerende factoren per situatie apart te bezien dan vond evenoged sommatie en middeling plaats. De konstatering van deze stimuluscontrole vormde dan een aanwijzing voor het opstellen van eventueel te ondernemen modifikatie van gedragsbelemmeringen. Het resultaat van een driemaalige observatie over 6 weken wordt in figuur 1 weergegeven.

Indien na 3 observaties bleek dat er een of meer gedragsbelemmeringen hoog, d.w.z. boven de 3 bleven, dan kwam de patiënt in aanmerking voor programmering van gedragsmodifikatie.

De gedragsmodifikaties zullen behandeld worden in 2.3.: de voorlopige revalidatiestrategie. Het lijkt hierbij nuttig nu reeds te vermelden dat er – evenals bij gedragsvorming – bij de gedragsmodifikatie van excessief gedrag een „procesassessment” plaats vond. Deze procesassessment stond naast „effectassessment”. De procesassessment „begeleidde” a.h.w. de therapie van moment tot moment zoals in 3.1. zal blijken. De effectassessment der GOCC werd voor en na de therapie gerealiseerd. Voor de therapie bestond zij uit drie synthetische observaties, waarbij de laatste observatie het criterium vormde voor verdere begeleiding. De meeste gedragsmodifikaties van excessief gedrag bleken niet langer dan 2 à 3 maanden te duren. Deze werden dan afgesloten met een GOCC-observatie. Indien een gedragsmodifikatie of gedragsvorming langer duurde werd daarna om de drie maanden een GOCC-observatie uitgevoerd. Op deze wijze werd zoveel mogelijk parallel gewerkt met de eerder besproken psychologische onderzoekprocedure.

FIG. 1. Registratie van GOCC observaties

2.2.4. Samenvatting

De bewerking der gegevens uit de inventarisatie tot een voorlopige assessment-procedure bleek niet onmiddellijk voor alle gegevens mogelijk. Enerzijds was er bij iedere aparte discipline een hechting aan eigen specialisatie, anderzijds leek het raadzaam om bij een poging tot herstructurering niet direkt op een al te grote schaal op wijzigingen aan te dringen. Derhalve bleef een poging tot herziening der informatieverzameling beperkt tot het psychologische onderzoek en de observatiegegevens van de gedragsbelemmeringen die niet-disciplinegebonden waren. Dit resulteerde in een zogenaamde voorlopige assessmentprocedure, welke bestond uit twee delen:

- 1e. Een psychologisch onderzoek (PO) t.b.v. het vaststellen van gedragstekorten op het gebied van:
 - a. de algemene intelligentie
 - b. het geheugen op korte termijn en wel voor auditieve en visuele recognitie en recall
 - c. de concentratie: (tempo, regelmaat, fouten bij het uitvoeren van een taak).
- 2e. De Gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC). Deze bestond uit 17 gedragsbelemmerende criteria, zoals aangetroffen bij de inventarisatie.

Zowel PO als GOCC werden zodanig opgezet, dat de resultaten van beide uitgedrukt konden worden in een 5-puntschaal, ter onderlinge vergelijking en eveneens latere statistische bewerkbaarheid.

Bij de afname der PO en GOCC werd er naar gestreefd een parallellopende verzameling van informatiewerving te verkrijgen, waardoor het effect van een bepaalde vorm van begeleiding tegelijkertijd op beide schalen zichtbaar zou kunnen worden.

Naast deze effectassessment werd de procesassessment genoemd. Deze laatste vorm dient niet verward te worden met de eerstgenoemde. De procesassessment bedoelt het beloop van een strategie op de voet te volgen, de effectassessment beoogt de evaluatie van begin- en eindstand van de behandeling.

2.3. Opzet voor een voorlopig modifikatiestrategie

2.3.1. Inleiding

Bij de patiënt met contusio cerebri trachtte men in het verleden tot nieuwe gedragsvorming te komen. Indien na langdurig uitproberen bleek dat het optreden van nieuw gedrag mislukte, dan werd uitdrukkelijk stilgestaan bij allerlei kondities, die dit opnieuw leren blokkeerden. Het is niet goed duidelijk in hoeverre men in staat was tot inventarisatie en eliminatie van deze gedragsbelemmeringen, echter het aantal patiënten met contusio cerebri, waarvan de revalidatie onbevredigend was verlopen bleek het aantal bevredigend behandelde patiënten minstens te evenaren. Bij een surplus aan factoren die gedragsvorming tegengaan, wordt de revalidatie maar al te snel als onmogelijk beschouwd. De desbetreffende patiënt wordt veelal ontslagen of vaker nog overgeplaatst naar een psychiatrisch ziekenhuis. De problematiek der dubbel gehandicapten wordt telkenmale in het revalidatiecentrum als een blijvend en voorlopig onoplosbaar gegeven ervaren. Toch wordt gemeend dat het revalidatiecentrum bij uitstek de plaats is om deze problematiek daadwerkelijk aan te pakken:

Eliminatie van deze gedragsbelemmeringen (in de persoon, in de revalidatie-omgeving, in het thuismilieu en eventueel eveneens in processen in het organisme zelf) wordt hier gezien als een der doelstellingen van de revalidatie.

De principes van gedragsvorming bij gedragstekorten en de opheffing van gedragsbelemmeringen bij blokkades in het leerproces gelden in alle fasen van de revalidatie.

Uit deze overwegingen (waar in hoofdstuk 4 en 5 uitgebreider bij stil zal worden gestaan) volgt dat een revalidatie een twijfelachtige zaak wordt, indien deze zich slechts bezighoudt met gedragsvorming vanuit een eenzijdige aanpak. Er zijn meer benaderingen denkbaar en het is evengoed mogelijk dat er, eer men tot gedragsvorming kan overgaan, een gedragseliminatie moet worden nagestreefd.

De volgende paragraaf tracht een aanzet te vormen tot een modifikatiestrategie in alle voorlopigheid vanuit een leertheoretisch denkkader. Allereerst wordt stilgestaan bij de situatie waarin en de wijze waarop gedragstekorten en excessief gedrag, dat deze vorming tegengaat, worden gesignaleerd.

Vervolgens wordt vanuit leertheoretisch standpunt aandacht besteed aan de reeds verscheidene keren genoemde gedragsdeviaties in de zin van gedragstekorten en excessieve gedragingen. De gedragstekorten komen in principe in aanmerking voor correctie in de zin van nieuwe gedragsvorming. Het excessieve gedrag wordt, zoals reeds werd aangegeven, in het kader van deze studie gezien als één der gedragsbelemmeringen. Tenslotte wordt besloten met de behandeling van gedragstherapeutische technieken ter modifikatie van gedragstekorten en gedragsexcessen, zoals ze binnen deze studie werden toegepast.

2.3.2. Situaties en probleemgedrag

Gedragstekorten en gedragsbelemmeringen spelen zich af in een bepaalde context en worden over het algemeen op een specifieke manier door een omgeving gesignaleerd.

Bijeen poging om een veranderingsproces te realiseren zal aandacht moeten worden besteed aan context, wijze van signaleren van het probleemgedrag en de soort van het probleemgedrag.

2.3.2.1. Situaties waarin gedragsdeviaties gesignaleerd kunnen worden

Er zijn een vijftal situaties, waarin of waaruit zowel tekorten als belemmeringen gesignaleerd kunnen worden.

- 1e. Premorbide gedragsgegevens in preklinische of de pre-opname situatie.
- 2e. Testsituatie in de kliniek.
- 3e. Gedrag buiten de testsituatie in de kliniek.
- 4e. Gedrag na klinische fase, maar vóór ontslag: nabehandelingssituatie.
- 5e. Na ontslag naar het thuis- of werkmilieu, de postopnamesituatie of kortweg „thuisituatie”.

ad. 1. Premorbidesituatie.

Het premorbide gewoontegedrag is bij cerebraal gestoorden een weinig geëxploreerd terrein. Hoewel het in principe mogelijk lijkt waardevolle informatie te betrekken over de toestand vóór het trauma is de wijze waarop dit zou moeten gebeuren nog onzeker en wellicht ook moeilijk te realiseren. Bij het opstellen van een strategie dient zeker ook rekening gehouden te worden met gedragstekorten die reeds in het thuis-, werk- of schoolmilieu werden gekonstateerd. Het nadeel is hierbij

dat het in een meerderheid der gevallen informatie zal zijn uit de tweede of derde hand. Vaak ook is bepaald gedrag na het trauma ineens belangrijk geworden en heeft men geen idee hoe dit gedrag vóór het trauma was, tenzij uiteraard dit bepaalde gedrag of gedragstekort opvallend duidelijk aanwezig was. Maar ook dan heeft men te maken met een speciale manier van informatieverzameling, waarbij twijfel blijft bestaan omtrent de betrouwbaarheid van deze hetero-anamnestiche informatie. Gedragstekorten zouden misschien nog wel enigszins door thuis- of schoolmilieu kunnen worden aangegeven. Gedrag dat gedragsvorming tegenwerkt lijkt minder gemakkelijk te signaleren, zeker in die situatie waar het gedrag van personen uit het thuismilieu zelf mogelijke nieuwe gedragsvorming in de weg zou kunnen staan. Uit de statusgegevens is geen of weinig systematische informatie inzake gedragstekorten en gedragsbelemmering in de preklinische situatie te putten.

ad. 2. Testsituatie.

Onder testsituatie wordt hier verstaan een gestandariseerde context waarbij de patiënt wordt gevraagd of gestimuleerd een bepaalde taak uit te voeren. Het niet kunnen uitvoeren van de handeling wordt in dit verband als een gedragstekort van patiënt opgevat en soms gezien als een taak voor de therapeut n.l. te trachten dit tekort weg te werken d.m.v. nieuwe gedragsvorming. De testprestaties worden in het algemeen gezien als signalen die, mits goed geïnterpreteerd, generalisaties toelaten voor de niet-testsituatie. Het getuigt echter van meer nauwkeurigheid om te zeggen dat het gedrag van de mens bepaald wordt door de *kombinatie* van gedragsmogelijkheden en omgevingsinvloeden. Responsies op een testsituatie zijn één soort gedrag. Wat de persoon doet in een niet-testsituatie, kan een ander soort gedrag zijn. Deze twee soorten prestaties moeten eerst gekorreleerd worden voor er generalisaties en eventueel voorspellingen gedaan kunnen worden. Naarmate de testsituatie minder lijkt op de criteriumsituatie wordt de generalisatie mogelijkheid en wordt de prediktieve validiteit van de test minder.

De nauwkeurigheid van generalisatie en voorspellingen hangen samen met de standaardisatie en normering van de test (begrippen waarvan de bekendheid hier verondersteld wordt, of waarvoor verwezen kan worden naar Drenth 1966). Deze overwegingen gelden in principe voor alle disciplines in de revalidatie, dus niet slechts voor psychologisch onderzoek, maar eveneens op het terrein van geneeskunde, logopedie, arbeidstherapie, fysiotherapie e.d. Revalidatieprogramma's worden gekonfronteerd met al de drie genoemde problemen: korrelatie van test-kriterium, de standaardisatie en normeringsmoeilijkheden. Het is zelden dat alle criteria adequaat zijn bepaald, vaker is aan geen dezer criteria de nodige aandacht geschonken. Talloze misverstanden zijn hiervan het gevolg.

Als voorbeeld: Een patiënt toont bij psychologisch onderzoek geen geheugenstoornissen, toch vergeet hij altijd op welk moment hij naar een bepaalde therapie toe moet. Een ander onderzoek levert duidelijk stoornissen in ruimtelijke oriëntatie op, maar hoe is het dan mogelijk dat de patiënt wel zijn weg weet te vinden in het doolhof van gangen in het revalidatiegebouw? De testsituatie is niet altijd de meest adequate invalshoek voor het vaststellen van een gedragstekort en voor daar op aansluitende gedragsvorming. Er moet omgezien worden naar andere situaties.

ad. 3. Klinische observatiesituatie.

De uiteindelijke criteriumsituatie is de leefruimte waar de patiënt na ontslag terecht zal komen. Deze situatie zal pas goed aan het licht brengen welke gedragstekorten de patiënt vertoont. Vaak komt ook voor dat een patiënt, na enige tijd te hebben verkeerd in zijn thuissituatie, opnieuw in een revalidatiecentrum wordt opgenomen

ter gedragvorming van die tekorten, die eerst in zijn „werkelijke leven” worden gekonstateerd. Even zo vele malen echter blijkt ook een patiënt met contusio cerebri in thuis- of werkmilieu zo vast te lopen dat hij na het veroorzaken van diverse crises wordt overgeplaatst naar een psychiatrisch centrum of anderszins zogenaamd „beschut milieu”.

Het is derhalve gewenst om extra criterium-situaties in te bouwen, tussen test- en thuissituaties: de klinische observatie- en nabehandelings situaties. Deze klinische observatiesituatie zou idealiter informatie moeten geven omtrent het gedrag tussen testsituatie en de nabehandelingssituatie; ook hier hoopt men op een hoge prediktieve validiteit tussen klinische observatiegedragsprestaties en nabehandelingsgedragsprestaties.

Onder klinisch criteriumgedrag zou men kunnen verstaan het gedrag van de patiënt op het dagverblijf, in kantine, op gangen, toilet, tuin, kamer etc. Onder klinisch criterium valt bijvoorbeeld de vraag of patiënt in staat is de weg te vinden in het gebouw, liften zelfstandig te bedienen, gebruik van toilet te maken, zich redelijk sociaal weet op te stellen, een telefoongesprek kan uitvoeren enz. enz. enz. Het gedrag van de patiënt op de zaal, het dagverblijf, de recreatie e.d. zou in principe ook in aanmerking kunnen komen voor konstateren van mogelijke gedragsbelemmeringen. Het is hierbij een eerste stap om te stellen, dat bijvoorbeeld het niet-coöperatieve gedrag van een patiënt op het dagverblijf hinderlijk werkt op de verpleging en andere patiënten stoort in hun revalidatie, waarbij somatische revalidatie van de patiënt zelf niet gestoord hoeft te zijn. Een tweede stap lijkt aanwezig, indien dit niet-coöperatieve gedrag niet beperkt blijft tot het dagverblijf, maar ook optreedt op plaatsen waar fysiotherapie, arbeidstherapie, e.d. wordt bedreven. In zulk een geval lijkt sprake van gedragsbelemmeringen bij de patiënt zelf, die de fysieke revalidatie tegenwerken.

Een derde stap lijkt noodzakelijk te moeten worden toegevoegd, indien de gedragvorming niet overwegend op het somatische functioneren betrekking zou hebben. Stelt men zich als revalidatiecentrum ten doel ook bijv. sociale vaardigheden te vormen (tafelmanieren etc.), dan wordt het niet-coöperatieve gedrag een belemmering voor de vorming van dit sociale gedrag.

In alle drie gevallen is sprake van gedragsfactoren, die belemmerend werken voor de gedragvorming in het revalidatiecentrum.

Waar de testsituatie de laboratoriumsfeer vertegenwoordigt en een gedragspartikel op een sterk gecontroleerde manier pretendeert te meten, zou de klinische observatiesituatie gezien kunnen worden als een betere benadering van de realiteit van het alledaagse leven. Hier zou men in principe een groot aantal gedragingen, weliswaar op een minder gestandariseerde manier, kunnen nagaan.

ad. 4. Nabehandelingssituatie

Zoals de naam reeds aangeeft is deze situatie een intermediair tussen de kliniek en de thuissituatie. In de klinische situatie worden pogingen aangewend tot nieuwe gedragvorming, die door het trauma direct noodzakelijk zijn. In de nabehandelingssituatie vindt eerder een voorbereiding plaats op bijvoorbeeld het arbeidsproces door het volgen van speciale cursussen. Hoewel ook dit als nieuwe gedragvorming gezien kan worden is deze eerder afgestemd op noodzakelijke eisen vanuit een speciale positie in de maatschappij van waaruit meer specifieke en gerichte „eisen” gesteld kunnen worden.

ad. 5. Thuissituatie.

He thuis- en werkmilieu vormt het definitieve criterium voor de vraagstelling: „Is

de persoon, gegeven zijn handicap, in staat op een optimaal niveau te functioneren?" Het thuis- en werkmilieu zal een doorslaggevende rol spelen inzake de „beklijving” van het nieuw-gevormde gedrag d.w.z. het thuis-milieu kan het gedrag dat in het centrum werd aangeleerd gaan ondersteunen, tegenwerken of ontmoedigen. Hoewel hier het standpunt wordt ingenomen dat het thuismilieu tijdens de klinische fase participeert in de gedragsvorming, zal eveneens grote aandacht besteed moeten worden aan de zgn. „nazorg”. Het lijkt niet eenvoudig om een goede informatie of observatie in het thuis- of werkmilieu te realiseren, die gericht is op gedragstekorten bij de patiënt en op gedrag van patiënt en/of zijn omgeving dat gedragsbeklijving ondersteunt of tegenwerkt.

Premorbide, klinische test-, klinische observatie-, nabehandeling- en thuissituatie komen alle in aanmerking voor de konstatering zowel van gedragstekorten bij de patiënt als van gedrag bij patiënt of omgeving dat gedragsvorming resp. gedragsbeklijving tegengaat.

2.3.2.2. Konstatering van gedragsdeviaties

Hierna volgend zal nader worden ingegaan op de wijze waarop gedragstekorten en gedragsbelemmeringen zijn te konstaten.

A. Gedragstekorten worden gekonstateerd:

1e. Door een systematische informatieverwerving.

2e. Doordat ze gesignaleerd worden door de patiënt of door de omgeving.

ad. 1. Systematisch informatieverwerving veronderstelt een plan of schema volgens welke deze exploratie zu kunnen worden opgezet en wel met betrekking tot de diverse vormen van menselijk functioneren. Idealiter lijkt een dergelijk plan gesteund te moeten worden door één gemeenschappelijke visie, geldend voor alle disciplines. Iedere discipline zou dan vanuit dit gezichtspunt kunnen trachten de te onderzoeken gedragsaspecten in kaart te brengen. Vervolgens zou iedere discipline zijn deelgebied kunnen exploreren, d.w.z. de gedragstekorten zouden per patiënt volgens dit ideaalschema per discipline kunnen worden nagegaan. Tenslotte zou dan een rapportage moeten plaatsvinden waarbij iedere discipline zijn bevindingen rapporteert aan het team.

Van een dergelijke systematische exploratie alsmede van de ondersteunende voorwaarden daarvoor is voorsnog geen sprake, noch wat betreft de klinische testsituatie, noch wat betreft de klinische observatiesituatie.

Klinische testsituatie.

Wanneer men de situatie beziet zoals deze zich op het terrein der psychologie presenteert en dan nog wel in de testsituatie, dan is deze toestand uitermate onbevredigend. Toch voeren, althans deeldisciplines in de psychologie, met name de psychologische funktieleer, reeds geruime tijd het streven naar objectiviteit, meetbaarheid en systematiek in hun vaandel. In de fundamentele research is men hierin in belangrijke mate gevorderd, zij het met beperking t.a.v. toepasbaarheid door de veelal specifieke onderzoekspopulaties. Deze bestaan doorgaans uit studenten aan universiteiten. Van enige overlap met revalidatiepopulaties is nog geen sprake en een taxonomie van testgedrag, waarmee gedragstekorten op een systematische wijze zouden kunnen worden geëxploreerd is niet beschikbaar. Minstens gelijkwaardige beperkingen lijken te gelden voor disciplines als fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Bij geen der disciplines in de revalidatie bestaat een referentiesysteem, dat zou kunnen fungeren als kompas voor het in kaart brengen van de diverse testgedragingen. Er zijn er verscheidene, alle met hun mogelijkheden, maar eveneens hun tekorten. Er bestaat in deze dus weinig (of geen) overeenstem-

ming in de visie op en het onderzoek naar het menselijk functioneren in een testsituatie.

Klinische observatiesituatie.

Wanneer het principe der systematische exploratie ook doorgevoerd wordt op het terrein waar het gedrag een functie is van een wat meer complexe situatie dan treft men daar eenzelfde beeld. De gedragsobservatieschalen, als geëigend instrument tot het bestuderen van dit gedrag, worden aangetroffen ten behoeve van de populaties der psychiatrie en zwakzinnigenzorg, maar dan nog steeds vanuit hoofdzakelijk één referentiekader, nl. het psychologisch denkframe.

Een gedragsobservatieschaal ten behoeve van revalidatiepatiënten werd in de Nederlandstalige en Angelsaksische literatuur nergens aangetroffen. Bij gebrek aan een dergelijk instrument is de informatie in de klinische observatiesituatie een verzameling van indrukken gebleven.

Systematische verzameling van de premorbide, de nabehandeling en thuismilieuge-dragsinformatie vond in de onderhavige onderzoekfase niet plaats.

Ad. 2. De signalering van een gedragstekort door patiënt of omgeving. Wanneer men het principe van systematische exploratie prijs geeft, dan krijgen allerlei andere informatieve activiteiten vrij spel. De gegevens, die hieruit naar voren komen, wisselen sterk qua betrouwbaarheid. Het probleem is dat men nooit met zekerheid kan zeggen welke informatie betrouwbaar is. Het komt erop neer, dat men het gesproken woord van de goedwillende, maar op dat moment veelal labiele echtgenote als de onverdachte waarheid aangeboden krijgt, kortom, dat de kans bestaat, dat een moeizame poging tot objectiviteit voor de zoveelste maal wordt verdrongen door het „invoelend vermogen” van diverse therapeuten tesamen.

B. Konstatering van gedragsbelemmeringen.

Gedragsbelemmeringen kwamen eerst tijdens het verloop van de pogingen tot gedragsvorming naar voren en werden daarna eerst terloops en tenslotte welbewust en in grotere frekwentie door verscheidene teamleden gesignaleerd. Van een systematische exploratie was ook hier geen sprake. De GOCC kan gezien worden als een eerste poging tot een min of meer systematische exploratie. Dit observatiesysteem is echter een voorlopige benaderingswijze, voortgekomen uit de neerslagen van teambesprekingen.

Resumerend.

A. De verzameling van informatie inzake gedragstekorten bleek gecaliseerd te worden via twee „zoekwegen”.

1. Een testsituatie. Onder afwezigheid van een valide taxonomie werd hier toch min of meer systematisch geëxploreerd.

2. Een premorbide, klinische, nabehandeling- en thuissituatie. De signalering door de omgeving of vanuit de patiënt werd hier niet systematisch geëxploreerd.

B. De verzameling van informatie inzake gedragsbelemmeringen vond tot aan de invoering van de GOCC plaats op een niet systematische wijze. Deze belemmeringen bleken duidelijker naarmate het verblijf van de revalidant langer duurde. De invoering der GOCC betekende een verbetering in systematiek. Zij blijft echter slechts een deel-informatie van alle mogelijke gedrags-belemmeringen, zoals excessief ongewenst gedrag.

2.3.2.3. Het probleemgedrag nader bezien

Hoewel het uitermate verleidelijk is om bijvoorbeeld een gekonstateerd gedragste-

kort in een testsituatie te koderen als „funktiestoornis” om vervolgens over te gaan tot „funktierestauratie”, komen dergelijke stappen hier nog niet ter bespreking. Een dergelijke stap vereist immers meer kennis van zaken, o.a. het kunnen differentiëren van psychische functies, het kunnen lokaliseren van een funktiestoornis binnen een valide taxonomie, het op de hoogte zijn van de diverse soorten trainingsprogramma's en het kunnen uitvoeren van een gecontroleerde „funktierestauratie” enz.

Dergelijke overwegingen gelden eveneens voor gedragsdeviaties in andere situaties. Vóór men genuanceerder over probleemgedrag (per situatie) kan spreken, dient men aandacht te schenken aan (pogingen tot) begripsomschrijving, operationele definities, problemen van meetbaarheid e.d. Vóór men beweert probleemgedrag te kunnen veranderen, zal men dat toch eerst op gecontroleerde wijze moeten aantonen, wil men tenminste niet belanden in messianisme e.d. Op populair wetenschappelijk niveau is de zaak ondertussen al lang geregeld. Hier spreekt men vrijelijk over „hoe wij denken leren en vergeten” (Vester 1976), waarbij de waarschuwing dat „veel nog veronderstelling is” spoedig wordt vergeten bij het doorlezen van dit 25e boek van de maand.

Op wetenschappelijk niveau maant men slechts tot de grootste voorzichtigheid, aangezien veel van het neurologisch apparaat nog onbekend is, van een valide taxonomie nog geen sprake is en ook de waarde van zgn. funktietrainingsprogramma's eerst nog moet worden aangetoond (Dumont 1973 p. 187, Deelman B. G., Elshout J. J., persoonlijke mededelingen). Vanuit het principe van spaarzaamheid inzake het gebruik van concepten wordt derhalve in dit hoofdstuk slechts gesproken over gedragsdeviaties binnen een bepaalde context. In hoofdstuk 4 en 5 zal een voorzichtige poging tot nadere nuancering van probleemgedrag worden ondernomen. Na deze bespreking vooraf valt het probleemgedrag per situatie nader te bezien.

Vanuit de leertheorie zijn er binnen het kader van het operant model een aantal indelingsprincipes bekend van waaruit de modifikatie van „inadekwaat” gedrag in een bepaalde context en geëvalueerd volgens een waardesysteem kan worden ondernomen.

De meeste van deze principes richten zich op de behandeling van aanwezig gedrag dat, waardoor dan ook, is ontspoord. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de meeste praktische toepassingen van leertheorieën – tot nu toe – worden aangetroffen op het gebied van neurotische en psychiatrische patiënten. Andere principes richten zich echter ook op de vorming van nieuw gedrag. Deze praktische toepassingen zijn vergeleken met de voorgenoemde groep wat beperkter en hebben vooral betrekking op de behandeling van kinderen en zwakzinnigen. Ten aanzien van gedragsdeviaties kan volgens het operante model het volgende onderscheid gemaakt worden:

Zie o.a. Okma (1972 p. 9), Berni (1973 H.1, 2 en 7), Fordyce (1971 p. 30)

- 1e. Het gedrag treedt onder geen enkele stimuluskonditie en onder geen enkele bekrachtigende konsekwentie op. Er is geen gedrag. Wanneer dit voor alle kondities geldt, kan men zich afvragen of het organisme nog leeft: absoluut gedragstekort of zero-gedrag.
- 2e. Het gedrag treedt bij de juiste stimuluskonditie wel op, echter de frekwentie van optreden, dan wel de intensiteit is te gering. Er is te weinig gedrag voor die bepaalde context: relatief gedragstekort.
- 3e. Het gedrag treedt met voldoende intensiteit en onder goede frekwentie op, echter het treedt op bij een niet daarbij behorende, of niet volledig juiste stimuluskonditie. Er wordt dan gesproken van onvoldoende of onjuiste stimuluskontrolle.

- 4e. Het gedrag treedt op bij een bepaalde stimuluskonditie met een te grote frekwentie of een te grote intensiteit. Er is dan in die bepaalde context sprake van excessief gedrag.
- 5e. Het gedrag treedt bij een bepaalde stimuluskonditie op met een juiste frekwentie en/of intensiteit.

Uit dit overzicht zal duidelijk zijn, dat een interventie vanuit gedragstherapeutisch gezichtspunt gericht moet zijn op:

- A. De gedragstekorten. Hieronder vallen: 1. zero-gedrag, 2. relatief gedragstekort en 3. gedrag dat onder onvolledige stimuluskontrolle staat.
- B. De gedragsbelemmeringen. Bezien vanuit het gezichtspunt der gedragsvorming valt alleen punt 4 hieronder, nl. excessief gedrag. Hiermee wordt bedoeld dat zowel bijvoorbeeld het optreden van agressief gedrag als ook inactiviteit vanuit een poging tot nieuwe gedragsvorming in die situatie als excessief wordt gezien. De vorming van nieuw gedrag is er alleszins bij gebaat, indien zowel agressie als inactiviteit totaal niet optreden en hun frekwentie dus – in die situatie – gelijk is aan nul. Het wel optreden van deze en andere soorten van gedrag in een situatie waar dit in feite ongewenst is, aangezien de gedragsvorming belemmerd wordt, maakt hun aanwezigheid excessief voor die en geen andere situatie.

2.3.3. Gedragstherapeutische technieken t.b.v. modifikatie.

Het te modificeren gedrag werd konstateerbaar geacht in een vijftal situaties: premorbide, testklinische, observatieklinische, nabehandeling en thuissituatie. Niet alle situaties werden bij iedere patiënt als veld van informatie aangetroffen.

De wijze waarop het te modificeren gedrag kon worden gekonstateerd werd herleid tot een systematische exploratie (waarbij al dan niet een valide taxonomie aanwezig was) en een signalering ad hoc.

Het te modificeren gedrag kon ingedeeld worden naar: 1e. gedragstekorten, nl. zero-gedrag, relatief gedragstekort, gedrag dat onder onvoldoende stimuluskontrolle stond en 2e. gedrag dat gedragsvorming belemmerde: vanuit gedragsvormend gezichtspunt kon hier excessief gedrag onder geplaatst worden.

Gedragsdeviaties, gedefinieerd naar context, wijze van konstatering en ingedeeld naar leerprincipes vanuit het operante model lijken nu nader beschouwd te kunnen worden wat betreft de modifikatiestrategieën.

De gedragstherapeutische technieken, die hieraan ten grondslag liggen, werden ontleend aan: Kazdin A. E. (1973 p. 134-140), Sand P. L. (1970 p. 11-24), Berni R. (1971 p. 2180-2182), Hollon T. H. (1973 p. 65-68), Kanfer and Philips (1970 p. 241-318).

- 1e. Ter modifikatie van zero-gedrag leent zich in principe: „responsdifferentiatie” of „shaping”.

Indien de gedragsfrekwentie = 0 is, dan moet voor een bepaalde stimuluskonditie nieuw gedrag gevormd worden. Binnen het operante model worden de technieken, die hiertoe aangewend worden, benoemd met de verzamelnaam „shaping”. De meest bekende zijn wel: verbale opdracht, imitatie, „prompting” succesieve approximatie. Meestal tracht men ook in deze genoemde volgorde te ontdekken of een bepaalde techniek effect heeft of niet.

a. Verbale opdracht: Onder de gegeven stimuluskonditie wordt opdracht gegeven (of gevraagd) een taak uit te voeren. Indien dit lukt, volgt bekrach-

tiging, waarbij de vorm der bekrachtiging aangepast zal zijn aan de persoon.

b. Imitatie: Indien uitvoering van de taak na verbale opdracht niet lukt, wordt de diskriminatieve stimulus (reeks) uitgebreid: Eerst verbale opdracht, gevolgd door het voordoen van het gewenste gedrag met tenslotte het verzoek dit gedrag te imiteren. Bij sukses volgt bekrachtiging.

c. „Prompting”: Samen met patiënt het gedrag uitvoeren. De diskriminatieve stimulus wordt: verbale opdracht, therapeut pakt handen of armen van patiënt en stuurt deze zodanig, dat de taak wordt uitgevoerd. Bij sukses volgt bekrachtiging.

d. Suksessieve approximatie met gebruikmaking van verbale opdracht, imitatie en/of prompting. Wanneer blijkt, dat de opdracht door middel van prompting niet kan worden gerealiseerd, wordt getracht deze taak onder te verdelen in deeltaken. Iedere deeltaak wordt daarna apart geoefend, hetzij onder verbale opdracht, imitatie of prompting. Van belang is dat men daarbij met het laatste onderdeel der taak begint. De argumentering hierbij is, dat de persoon bekrachtiging en gedrag bij voorkeur zo snel en direkt mogelijk met elkaar in verband moet kunnen brengen.

e. Suksessieve approximatie onder differentiële bekrachtiging alleen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van verbale-, imitatie-, of prompting cues. Men tracht de soort van spontaan optredende responsies in de bepaalde stimulus-situatie door het principe der differentiële bekrachtiging dusdanig te versmalen, dat alleen het gewenste soort gedrag voor die situatie resteert.

Deze eerste vier gedragsvormende principes hebben alle gemeen, dat de steun van een begeleider noodzakelijk is. Uiteindelijk zal de persoon het zonder steun moeten stellen. Nadat de patiënt het gedrag met hulp beheerst wordt deze hulp dan ook geleidelijk aan weggenomen. Het langzaam afnemen van deze hulp wordt „fading” genoemd.

Alle onder „shaping” genoemde technieken hebben overigens het kenmerk der differentiële bekrachtiging: het gewenste gedrag (of delen hiervan) worden bekrachtigd, het ongewenste gedrag (of delen hiervan) worden geëxtingeerd. Kanfer and Philips (1970 p. 287) verduidelijken dit door te stellen: „Shaping employs differential reinforcement *and* differential extinction to gradually shift the topography and organization of a response into a new constellation of components. By applying differential reinforcement to one extreme subclass of a set of responses and extinction to all the other responses in the set, the more extreme subclass is differentially strengthened and becomes dominant. By successive applications of this procedure, complex behaviors can be established.”

- 2e. In het geval dat het gedrag wel optreedt, maar met een te lage frekwentie of intensiteit wordt ter modifikatie kontingente bekrachtiging na optreden van het gedrag toegepast.

Een van de belangrijkste empirisch ondersteunde leerprincipes is dat als gedrag in een situatie wordt gevolgd door positieve bekrachtiging, de frekwentie of de intensiteit van dat gedrag in die situatie zal toenemen. Een konsekwentie hiervan is, dat in de periode waarop het gewenste gedrag wordt bekrachtigd, eventueel ander gedrag inclusief de afwezigheid van gedrag moet worden genegeerd.

Indien men bijvoorbeeld wenst dat een patiënt, die ooit eens heeft laten zien dat hij met mes en vork kan eten, dit in de toekomst vaker gaat doen, dan zal men

tijdens de maaltijd geen aandacht moeten besteden aan het eten met de handen, maar wel positieve reinforcement moeten geven op de momenten waarbij met mes en vork gegeten wordt.

Ook hier geldt dus het principe van de differentiële bekrachtiging.

- 3e. In het geval dat het gedrag wel optreedt met goede frekwentie en intensiteit, maar niet onder de juiste stimuluskondities wordt ter modificatie „fading” toegepast.

Voorbeelden van een dergelijk gemis aan stimuluskontrolle zijn:

a. iemand die zich uitgebreid gaat voorstellen in de treincoupé aan alle medereizigers.

b. het kind dat wel zijn best doet als de onderwijzer in zijn buurt staat, maar ophoudt met werken als deze weg is.

c. de man die (na trauma) weer met veel moeite geleerd heeft zich uit te kleden en dit daarna overal demonstreert.

d. de persoon die wel de blokpatronen van de Wechsler kan vormen als de nodige blokken voor hem eerst met de goede kant naar boven worden gelegd, maar dit niet kan als hij deze steun mist.

Bij de voorbeelden a. en c. is zonder meer het vermogen tot stimulusdiskriminatie van belang. Bij de voorbeelden b. en d. is hiernaast vereist het vermogen tot gemis aan stimulusfacilitatie. Stimulusfacilitatie staat nauw in verband met stimuluskontrolle en vaak kunnen de effecten en mechanismen niet van elkaar worden onderscheiden (zie ook Kanfer and Philips 1971 p. 295).

De techniek, die gebruikt wordt om te trachten de respons onder de juiste kondities te doen optreden wordt „fading” genoemd.

Stimulusdiskriminatie: men beziet hierbij eerst onder welke kondities de respons wel optreedt en verandert vervolgens geleidelijk aan stimuluselementen tot de nieuwe situatie onder behoud van de respons wordt bereikt. Het optreden van de respons wordt uiteraard bij voortdurende bekrachtigd. Het optreden van de respons in de niet gewenste situaties (en dat kan ook de oorspronkelijke situatie zijn, waarin de respons wel optrad) wordt geëxtingeerd.

Ook hier dus weer het principe der differentiële bekrachtiging.

Vermindering van stimulusfacilitatie: Het woord „facilitatie” houdt in, dat er in de stimuluskonditie elementen zitten, die het optreden van de respons faciliteren. Wegname van de elementen maakt het optreden van de respons moeilijker. Een geheugenprestatie (het reproduceren van een aantal woorden) kan „gefaciliteerd” worden doordat de persoon eventueel door een gering aantal stimuli „een geheugensteuntje”, „een kapstok”, „een visueel beeld” kan ontdekken. Dit faciliterende effect kan wegvallen als het aantal te memoriseren eenheden groter wordt. „Fading” wil in dit geval zeggen, het in stand houden van de juiste respons (adequate reproductie) onder geleidelijke afname van facilitatie. Uiteraard zijn er meer en andere voorbeelden denkbaar. Het behoeft verder geen betoog, dat ook hierbij extinktie van inadequante responsies optreedt m.a.w. het principe der differentiële bekrachtiging treedt ook hier op. (Hoewel in H. 4 op deze materie verder wordt ingegaan, kan hier reeds opgemerkt worden, dat er een schijnbaar opmerkelijke verbetering van het geheugen wordt bereikt, door het ontwikkelen van een „altheid” voor en het gebruik van faciliterende elementen (Lindeboom J. 1976). Hoewel een dergelijke ontwikkeling uiteraard zeer waardevol is, is het een (dankbare) „prothese”. De geheugentraining, die volgens het fading-principe werkt, begint echter pas hierna. Immers na het vaststellen onder welke faciliterende kondities

een persoon weet te onthouden, dient alsnog door langzame terugname of vervaging der faciliteiten, de geheugenrespons op hetzelfde pijl gehouden te worden).

Zowel bij verbetering van stimulusdiskriminatie als bij vermindering van stimulusfacilitatie d.m.v. fading wordt aan de respons zelf niets veranderd. Het aksent ligt in beide gevallen op een zorgvuldige manipulatie van antecedente stimuli onder differentiële bekrachtiging ter behoud van de respons.

- 4e. In geval van excessief gedrag kan modifikatie ondernomen worden door versterking van de incompatibele respons.

De voorafgaande beschreven toepassingen van differentiële bekrachtiging hadden betrekking op het verbeteren of versterken van gewenst gedrag, dat een deficiet vormde in het gedragsrepertoire van de patiënt. Wanneer de „problematische” respons daarentegen een gedragsexces vertegenwoordigt dan is geen principieel andere strategie, maar wel een andere „gerichtheid” gewenst, d.w.z. meer nadruk op extinktie in eerste instantie.

De meest effectieve manipulatie is hierbij de positieve bekrachtiging van gedrag dat onverenigbaar is met het excessieve gedrag. Wanneer twee responsklassen competitief zijn en niet tegelijkertijd kunnen optreden, dan leidt versterking van de meer gewenste klasse tot een reductie van de waarschijnlijkheid van optreden van de ongewenste symptomatische responsklasse. Het versterken van incompatibele responsen (ook wel counter konditionering genoemd) heeft voordelen boven het „straffen” van het ongewenste gedrag, of het toepassen van alleen extinktie d.m.v. wegname der onderhoudende bekrachtigers:

a. Als een gedrag d.m.v. extinktie of „straf” verwijderd wordt, dan wordt datgene wat vervolgens de ontstane gedragsleemte gaat opvullen aan het toeval overgelaten.

b. Als iemand dankzij symptomatisch gedrag belangrijke bekrachtigende konsekwenties heeft ervaren, zonder dat hem alternatieve aangename bekrachtigende kondities worden geboden, dan mislukt de extinktie.

Het bekrachtigen van de incompatibele respons bevordert dus niet alleen een duidelijke opvulling van de leemte in het gedrag, maar voorkomt ook een gemis aan bekrachtigende kondities waardoor extinktie van symptomatisch gedrag effectiever wordt.

Resumerend kan gesteld worden dat vanuit het operante paradigma het principe der differentiële bekrachtiging en extinktie toepasbaar is voor: zero-gedrag, relatief gedragstekort, onjuiste stimuluskontrolle en excessief gedrag. Volgens de gedragsvergelijking $S \rightarrow O \rightarrow R \rightarrow K \rightarrow C$ liggen weliswaar de aangrijpingspunten voor therapeutische interventie voor de diverse behandelingen verschillend, het principe van bekrachtiging van gewenst en de extinktie van ongewenst gedrag blijft echter gelden.

2.3.5. Samenvatting

Vanuit de gedachtengang, dat gedrag onder meer een funktie is van de voorafgaande stimulussituatie, werden de situaties waarin bij patiënten deviant gedrag werd gesignaleerd onderscheiden in:

- 1e. Premorbidesituatie.
- 2e. Klinische testsituatie.
- 3e. Klinische observatiesituatie.
- 4e. Nabehandelingsituatie.
- 5e. Thuissituatie.

Hoewel al deze situaties waardevolle gegevens zouden kunnen verstrekken inzake het gedrag van patiënt en omgeving konden zij niet alle als zodanig benut worden.

De wijze waarop gedragsdeviaties wordenesignaleerd werd beschreven. Deze signalering geschiedde in een meerderheid der bovengenoemde situaties dankzij de observatie van één of meer teamleden. Hoewel een meer systematische exploratie van de aanwezigheid van deviant gedrag gewenst zou zijn, lijkt de realisering hiervan een niet geringe opgave.

De indeling van gedragsdeviaties in gedragstekorten en excessieve gedragingen bleek ondersteuning te vinden vanuit de operante konditionering, die een soortgelijke verdeling toepast. Hiernaast werden vanuit deze leertheorie de gedragstekorten onderverdeeld in zero-gedrag, relatief gedragstekort en gedrag, dat onder onvoldoende stimuluscontrole staat. De modifikatietechnieken, welke aangereikt werden vanuit het operante model zijn:

- 1e. Voor zero-gedrag: de diverse vormen van shaping.
- 2e. Voor relatief gedragstekort: selectieve bekrachtiging van het te vermeerderen gedrag.
- 3e. Ter handhaving van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit: fading.
- 4e. Ter reductie van excessief gedrag: differentiële bekrachtiging.

Alle, in deze studie gebruikte gedragsmodifikatietechnieken zijn te herleiden tot de bekrachtiging van het gewenste gedrag en de extinktie van ander, minder gewenst gedrag.

HOOFDSTUK 3

UITVOERING EN EVALUATIE van een EXPERIMENTELE REVALIDATIESTRATEGIE

3.1. Uitvoering van modifikatie en assessment

3.1.1. Inleiding

In hoofdstuk 2. werd een indruk gegeven omtrent de samenstelling van een assessmentprocedure (d.m.v. gedragsobservatie en psychologisch onderzoek) en een viertal modifikaties (reduktie van gedrag, toename van gedrag, gedragsvorming en behoud van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit).

Het geheel werd gepresenteerd als een voorlopige revalidatiestrategie. Thans is de wijze waarop de diverse modifikaties werden uitgevoerd aan de orde alsmede hun samenhang met een voorafgaande, begeleidende en afsluitende assessment.

Vanuit het strikt experimentele karakter van deze voorlopige strategie maar eveneens met het oog op mogelijke konsekwenties is extra veel aandacht besteed aan assessmentuitvoering.

Achtereenvolgens zullen de diverse programmastappen worden behandeld die voorkomen bij:

Gedragsvorming bij zero-gedrag

Toename van gedrag

Behoud van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit

Reduktie van excessief gedrag

3.1.2. Gedragsvorming bij zero-gedrag

1e. Effektaassessment.

a. Deze betreft de gedragsobservatie (dmv. GOCC) volgens synthetische beoordeling gedurende de 2e-, 3e-, 4e-, 5e-, 6e- en 7e- week na opname. Per patiënt werden 3 verzamelingen van observaties door minimaal 5 beoordelaars verkregen. Iedere verzameling werd gemiddeld indien geen duidelijke afwijken-de scores bij een of twee beoordelaars werden gevonden. Wanneer aan de hand van deze GOCC of naar aanleiding van signaleringen ad hoc besloten werd tot een modifikatieprocedure, dan gold de laatste (dus 3e observatie) als uitgangsaassessment.

b. Psychologisch onderzoek (PO). Hieronder bevonden zich altijd tests genoemd in 2.2. nl. intelligentieniveau, geheugen en concentratie. Hiernaast werden vaak ook andere tests afgenomen en werd geleidelijk aan het gehele arsenaal uitgebreid. Alleen genoemde tests behoorden echter bij de effektaassessment en zijn bij de empirische toetsing betrokken. Afname van het PO vond plaats tussen de 4e en 7e week na opname.

2e. Vaststelling van probleemgedrag.

De konstatering van het probleemgedrag, in casu het totaal ontbreken van een bepaald soort gedrag, vond in dit geval niet plaats aan de hand van de GOCC of PO. Het zero-gedrag, waar deze studie op was georiënteerd had betrekking op gedragstekorten als: patiënt komt nooit op tijd op therapie, vindt de weg niet van bed naar toilet, kleedt zich niet aan e.d. De signalering van de totale afwezigheid van een gedrag was een signalering ad hoc en gebeurde in de meerderheid der gevallen door de verpleegkundigen. De criteriumsituatie waarin het gedragstekort werd vastgesteld was derhalve bijna steeds de klinische observatiesituatie.

3e. Vaststelling doelgedrag, modifikatieprocedures en bekrachtigende kondities.

Het doelgedrag was bij de konstatering van zero-gedrag het komplement van het probleemgedrag. Wanneer een patiënt nooit op tijd komt, nimmer zijn

prothese hanteert, de weg naar het toilet niet vindt e.d., dan vloeit het te realiseren doelgedrag hier a.h.w. direkt uit voort.

De modifikatieprocedure bestond uit een vorm van shaping, waarbij het niveau van funktioneren van patiënt de vorm welke hier moest worden toegepast, bepaalde. De voorbereiding van de shaping vereiste meestal het vervaardigen van een nauwgezet „draaiboek”, waarbij voor iedere dag werd aangegeven welke activiteiten er door de modifikatiegroep uitgevoerd diende te worden, hoe en wanneer de bekrachtiging moest worden gegeven en op welke wijze de gedragingen van patiënt en begeleider moesten worden geregistreerd.

Bij zero-gedrag was het soms moeilijk een adekwate bekrachtiging te vinden. Over het algemeen bleek sociale reinforcement in de zin van goedkeuring en aandacht redelijk te werken.

- 4e. Vaststelling van basislijn naar frekwentie of intensiteit van voorkomen van het probleemgedrag.

Dit was bij zero-gedrag niet eenvoudig. Het gedrag dat gevormd moest worden trad nooit op. Het probleem was juist dat het nooit optrad. Derhalve werd ter vaststelling van frekwentie of intensiteit van het probleemgedrag, altijd een soort afgeleid gevolg van dit probleemgedrag genomen. Bij voorbeeld: als patiënt de weg naar het toilet niet kon vinden dan gold als probleemgedrag „het aantal malen natte kleding per etmaal”. Op deze wijze was het mogelijk een basislijn vast te stellen. Ook werd wel gebruik gemaakt van de zogenaamde „time-sampling”-methode waarbij op regelmatige tijdstippen de frekwentie van voorkomen van dit (afgeleide) probleemgedrag werd nagegaan.

- 5e. Uitvoering der modifikatie en procesassessment.

De duur van de shapingsprocedure was uiteraard afhankelijk van doelgedrag, type patiënt, konsekwentheid der uitvoering e.d. Over het algemeen lag deze periode tussen 1 en 3 maanden.

De uitvoering vond plaats door samenwerking van diverse disciplines, waarbij de verpleegkundigen vaak een zeer belangrijk aandeel hadden. Iedere stap van het „draaiboek” werd dagelijks aan de hand van de vastgestelde shapingsprocedure door leden van diverse disciplines uitgevoerd. Bij succes volgde bekrachtiging, bij falen geen. Na het bereiken van een bepaalde stap volgde 100 % overlearning in de tijd, d.w.z. indien patiënt er 3 dagen over had gedaan om een bepaalde stap te bereiken, dan werd dit gedeelte van de training nog 3 dagen daarna voortgezet. Pas daarna werd overgegaan tot het aanleren van het volgende deel. Iedere trial werd nauwgezet geregistreerd wat betreft:

- a. naam van de begeleider (verondersteld werd, dat hierdoor een kompetitievelement geïntroduceerd werd, waardoor mogelijke intermitterende reinforcement voor de begeleider zou kunnen gaan meespelen).
- b. het al dan niet realiseren van het (sub)doelgedrag.
- c. het al dan niet toedienen van reinforcement.

- 6e. Vaststelling van eindlijn van het probleemgedrag:

Na de vorming van het doelgedrag was het noodzakelijk nauwgezet te observeren en te registreren of het (afgeleide) probleemgedrag nog optrad. Dit gebeurde opnieuw volgens de time-sampling-methode, d.w.z. op regelmatige tijdstippen (meestal het eerste kwartier van ieder uur) werd door de therapeut die in de buurt van patiënt was, geobserveerd of het probleemgedrag optrad. Over een gehele week betekende dat bij c.a. 15 observatiekwartieren per dag, ongeveer 100 observaties. Per dag werd het gemiddelde bepaald.

- 7e. Effektaassessment.

Na het eind der behandeling volgde opnieuw de effektaassessment, zoals

omschreven onder ad. 1. De GOCC werd éénmaal afgenomen volgens de synthetische beoordeling. Deze afname vond plaats na het bereiken van het doelgedrag en na de probleemassessment, en bestreek een periode van 2 weken. In deze 2 weken werd eveneens het psychologische onderzoek afgenomen.

8e. Recapitulatie.

Na het realiseren van de effectassessment werd in het team een nieuw doelgedrag (of het continueren van de poging het eerste doelgedrag te vormen) besproken.

Op deze wijze kreeg de behandeling een cyclisch verloop. Het was uiteraard ook mogelijk dat de behandeling na genoemde 1-3 maanden werd beëindigd. Een en ander werd bepaald door het resp. succesvol beëindigd zijn van de behandeling danwel het uitblijven van enig gewenst resultaat.

Voorafgaande 8 fasen gelden mutatis mutandis bij alle andere modifikatieprocedures. Op enkele inhoudelijke verschillen zal in het nu volgende worden ingegaan.

3.1.3. Toename van gedrag

1e. Effectassessment (geheel overeenkomstig 3.1.2.).

2e. Vaststelling van probleemgedrag.

Hierbij gold als probleemgedrag: in een bepaalde situatie is het gewenste gedrag wel aanwezig, de intensiteit of de frekwentie van voorkomen is te laag. Het infrekvente gedrag dat voorkwam tijdens de opzet en realisering van deze studie bestond o.a. uit: een patiënt is in staat gedurende een korte tijd een taak uit te voeren, het zou gewenst zijn deze tijd op te voeren; patiënt is in staat zich aan te kleden, te wassen etc., maar doet het niet vaak genoeg; patiënt is over het algemeen slordig, maar hij is soms wel netjes, hoe is zijn netheid te vermeerderen? enz.

De signalering van dit infrekvente gedrag was een signalering ad hoc, zowel in de klinische observatiesituatie door verscheidene disciplines, alsook in de klinische testsituatie.

3e. Vaststelling doelgedrag, modifikatieprocedure, bekrachtiging.

Doelgedrag was in alle gevallen: toename van frekwentie en/of intensiteit van het reeds aanwezige gedrag in de bepaalde situatie.

De modifikatie bestond uit de toepassing van selectieve reinforcement na optreden van het betreffende gedrag. Het programma der modifikatie vertoonde gelijkenis met de gedragsvorming bij zero-gedrag (zie 3.1.2.). Ter verhoging der frekwentie of intensiteit van optreden werden gedragsdoelstellingen of subdoelstellingen gemarkeerd. Bij de gedragsvorming (3.1.2.) hadden deze stappen betrekking op uitbreiding van het gedragsrepertoir. Bij infrekvent gedrag was dit niet nodig, aangezien in principe het vereiste gedragsrepertoir reeds aanwezig was. De stappen of subdoelen hadden hier betrekking op het trapsgewijs verlengen van de tijd of het verhogen van de sterkte van de handeling.

De bekrachtiging zelf bestond voor alle gevallen welke in deze studie betrokken zijn uit tokens, die aan het eind van de dag, ochtend, middag of week, ingeruild konden worden voor goederen of privileges waar de patiënt veel waarde aan hechtte.

4e. Vaststelling basislijn van het probleemgedrag.

Bij de pogingen tot modifikatie van infrekvent gedrag behoeft in tegenstelling tot zero-gedrag geen afgeleide vorm te worden gezocht. Het vaststellen van de

- basislijn van het probleemgedrag gebeurde eveneens volgens de time-sampling-procedure zoals behandeld onder 3.1.2. punt 6.
- 5e. Uitvoering van modifikatie en procesassessment.
In aansluiting op paragraaf 3.1.2. sub. 5e. zij hier het volgende vermeld:
- Duur: 1-3 maanden
 - Uitvoering: door alle disciplines
 - Wijze van uitvoering verliep volgens stapsgewijze benadering van het vastgestelde doelgedrag (bijv. 10 minuten lang met een taak bezig kunnen zijn). Bij iedere gerealiseerde stap trad 100 % overlearning op. Pas daarna overgang naar een volgend gedragsdoel.
 - De registratie betrof naam begeleider, realisering van het subdoel en al of geen toediening van bekrachtiging.
- 6e. Vaststelling van eindlijn (zie 3.1.2. - 6e).
- 7e. Effektaassessment (zie 3.1.2. - 7e).
- 8e. Recapitulatie (zie 3.1.2. - 8e).

3.1.4. Behoud van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit

- 1e. Effektaassessment (zie 3.1.2. - 1e).
- 2e. Vaststelling van probleemgedrag.
Hierbij gold als probleemgedrag: Het gedrag treedt op met gewenste frekwentie en intensiteit onder bepaalde stimuluskondities, echter niet of minder korrekt onder andere stimuluskondities.
Het probleemgedrag dat onder deze studie viel en waarop een modifikatiepoging werd ondernomen, had alleen betrekking op geheugen- en/of concentratietekort.
Signalering van deze gedragstekorten trad op in de psychologische onderzoekssituatie. Hoewel gewerkt werd met een inadekwate taxonomie van gedragstekorten in de testsituatie werd wel systematisch geëxploreerd.
- 3e. Vaststelling van doelgedrag, modifikatieprocedure en bekrachtiging.
Als doelgedrag werd gesteld: het doen optreden van een korrekte geheugen-respons onder toenemende stimuluscomplexiteit. Onder korrekte geheugen-respons werd verstaan de recognitie van een eerder aangeboden stimulus uit verscheidene stimuli en de reproductie van een aangeboden verzameling van stimuli. De stimuli konden hierbij van visuele of auditieve aard zijn. De modifikaties die in deze studie werden betrokken, betroffen de zgn. korte termijnopslag, d.w.z. recognitie of recall 5 sekonden na aanbieding.
Bij „concentratietekort” werd als doelgedrag gesteld: het doen optreden van een handeling met een bepaald tempo, regelmaat en fouten onder toenemende moeilijkheidsgraad.
Als modifikatieprocedure werden zowel voor de geheugen- als concentratietraining een aantal moeilijkheidsgraden ontworpen. Voor de geheugentraining bestonden de parameters der moeilijkheidsgraad uit de hoeveelheid stimuli, lengte, of complexiteit der stimuli en de bekendheid resp. kodificeerbaarheid der stimuli. Bij de concentratietraining werd de moeilijkheidsgraad voornamelijk bepaald door de samenstelling of de soort van het materiaal: het aanstrepen van bepaalde stimuli in een rij van andere stimuli, het sorteren of rangschikken van zeer eenvoudige stimuli etc.

Naast geleidelijk verhogen van de moeilijkheidsgraad werd tijdens de training gebruik gemaakt van overlearning. Pas indien patiënt een aantal oefeningen

van gelijke moeilijkheidsgraad onder bepaalde kondities kon uitvoeren werd overgegaan op een volgende moeilijkheidsgraad.

Bekrachtiging: Hoewel dit ook bij andere modifikatieprocedures het geval was, bleek dat met name de „relatievorming” bij de onderhavige procedure een belangrijke faktor was. Door patiënt en therapeut werd eerst een streefniveau vastgesteld, d.w.z. er werd aan de patiënt gevraagd welke moeilijkheidsgraad hij dacht te kunnen beheersen. Na de uitvoering werd onmiddellijke feedback gegeven omtrent het aantal goede prestaties en werd een patiënt de eventuele vooruitgang in een grafiek getoond. (zie verder 3.4)

4e. Vaststelling van basislijn van het probleemgedrag.

Deze vond plaats door met patiënt een aantal moeilijkheidsgraden door te nemen, waarbij uiteraard begonnen werd bij de eenvoudigste, en vervolgens verder gegaan werd naar moeilijker niveaus. De prestaties werden grafisch weergegeven. Horizontaal werd de tijd uitgezet en vertikaal de moeilijkheidsgraden. Na enige tijd bleek de patiënt in een bepaalde moeilijkheidsgraad te stagneren. Dit niveau vormde de basislijn en het uitgangspunt voor de training.

5e. Uitvoering van modifikatie en procesassessment.

De duur der modifikatie lag meestal minimaal op 5 à 6 maanden. Om vergelijkbaarheid der modifikaties mogelijk te maken vond echter de effectassessment steeds na 2 à 3 maanden plaats.

De uitvoering van de modifikatie in deze, vond plaats door onderwijskrachten, geassisteerd door speciaal hiertoe aangetrokken assistenten, waarbij meestal voor iedere patiënt een samensteld programma werd uitgevoerd in de visuele en auditieve modaliteit. De te trainen stappen werden gevormd door de diverse moeilijkheidsgraden.

Van iedere trial vond nauwgezette registratie plaats: de tijdens de training verkregen grafieken verschaften informatie aan de patiënt, de therapeut en het team.

6e. Vaststelling van eindlijn van het probleemgedrag.

Na het doorlopen van een aantal moeilijkheidsgraden trad na enige tijd opnieuw een „stabilisatie” der prestaties op. Indien gedurende een week geen voortgang werd geboekt, werd aangenomen dat het maximale niveau voor de patiënt bereikt was. Aan dit criterium voor stabilisatie werd echter eveneens de eis verbonden dat de horizontale lijn in de geregistreerde kurve zich zowel in de visuele als in de auditieve modaliteit moest presenteren.

7e. Effectassessment (zie 3.1.2. – 7e).

8e. Recapitulatie (zie 3.1.2. – 8e).

3.1.5. Reduktie van excessief gedrag

1e. Effectassessment (zie 3.1.2. – 1e).

2e. Vaststelling van probleemgedrag.

De konstatering van het probleemgedrag in de vorm van excessief ongewenst gedrag vond plaats aan de hand der GOCC in de klinische observatiesituatie volgens een systematische exploratie. De GOCC signaleerde over het algemeen een verhoging bij verscheidene gedragskriteria. De selectie van het probleemgedrag werd bepaald door o.a. de hoogte der score, de herhaling van een hoge score op het betreffende gedragskriterium, de bekendheid van een modifikatiestrategie bij het team.

3e. Vaststelling van doelgedrag, modifikatie en bekrachtiging.

Indien het probleemgedrag bekend was, werd gezocht naar gedrag, dat hiermee

onverenigbaar was. Als doelgedrag werd gesteld: toename van dit incompatibele gedrag.

Aangezien het excessieve ongewenste gedrag in de regel door een intermitterend bekrachtigingsschema werd onderhouden, vereiste de extinktie hier bijzondere aandacht. Tegelijkertijd diende het incompatibele gedrag te worden bekrachtigd. Ter modifikatie werd nu zowel extinktie van probleemgedrag als bekrachtiging van incompatibel gedrag gedurende 2-4 maanden kontinu toegepast. In extreme gevallen van excessief probleemgedrag diende de omgeving aanzienlijk gereduceerd te worden. Nadat gebleken was dat de modifikatieprocedure een verschuiving in het gedragsrepertoire tot gevolg had in de sterk gereduceerde omgeving werd onder handhaving van continue extinktie- en bekrachtigingsschema's overgegaan tot stimulusgeneralisatie. De patiënt werd geleidelijk aan in een diversiteit van stimulussituaties gebracht. Indien bleek dat het probleemgedrag niet of nauwelijks meer optrad, werd in de meer gevarieerde omgeving overgegaan op intermitterende schema's.

Een en ander vereiste een zorgvuldige planning, uitvoering en registratie. Wat betreft de bekrachtiging werd in vrijwel alle op deze wijze behandelde gevallen gebruik gemaakt van een variëteit aan mogelijke bekrachtigingen (zie verder onder punt 5).

4e. Vaststelling van basislijn van het probleemgedrag en doelgedrag.

In vele gevallen werd een dubbele basislijn vastgesteld, namelijk de basislijn, die de frekwentie van voorkomen van het probleemgedrag aangaf en die van het optreden van het incompatibele gedrag. Beide basislijnen werden samengesteld volgens de time-sampling-procedure. Bovendien werd aandacht besteed aan de stimuluscondities, die het probleemgedrag leken uit te lokken, alsmede aan de bekrachtiging, die het probleemgedrag in stand hield.

5e. Uitvoering van modifikatie en procesassessment.

Duur: 2-4 maanden.

De uitvoering werd verzorgd door alle disciplines. In verband met de extinktie werd getracht er voor te zorgen, dat patiënt alleen contact had met hen die op de hoogte waren van deze procedures.

Bij patiënten met extreem probleemgedrag stuitte dit op allerlei haast onoverkomelijke moeilijkheden. Ieder moment bleek de continue extinktieprocedure in gevaar te kunnen verkeren. Aangezien een voortdurende begeleiding van de patiënt niet realiseerbaar was, werd in enkele gevallen overgegaan tot „relatief isolement”. Met toestemming van naaste familieleden en zo mogelijk ook van patiënt zelf, werd deze in een kamer geplaatst. Toegang tot de kamer hadden alleen die personen, die op de hoogte waren van de behandeling. Dit impliceerde dat de patiënt geen contact kon opnemen met personen die niet op de hoogte waren van vereisten ter extinktie. Overigens had de patiënt ondertussen meer sociaal contact dan enige andere patiënt, aangezien hij om het half uur door een lid van het team bezocht werd. Bij het binnenkomen werd de patiënt de diskriminatieve stimulus gepresenteerd, waarvan uit de time-sampling bekend was geworden, dat deze het probleemgedrag uitlokte. Bij optreden van het nauwkeurig omschreven probleemgedrag werd de kamer zondermeer verlaten. Bij het achterwege blijven van probleemgedrag en het optreden van het incompatibele gedrag volgde bekrachtiging. Deze bekrachtiging kon per patiënt variëren van verbale goedkeuring, langer sociaal contact, snoep, tokens tot combinaties hiervan.

Registratie der procesassessment: ieder half uur werd dit bezoek herhaald waarbij nauwkeurige registratie plaats vond van:

- a. de personen die de kamer binnen waren gegaan.
- b. het al dan niet optreden van het probleemgedrag.
- c. het al dan niet kunnen uitvoeren van extinktie.
- d. het eventueel optreden van incompatibel gedrag.
- e. het adequaat toepassen van bekrachtiging na incompatibel gedrag.

Zodra aan de hand der dubbele grafieken duidelijk werd, dat de procedure „aansloeg” werd overgegaan tot stimulusgeneralisatie door de patiënt in aanraking te brengen met andere personen, o.a. familieleden en andere omgevingen. Ieder half uur werd echter de diskriminatieve stimulus aangeboden en volgde bekrachtiging en/of extinktie. Na geslaagde stimulusgeneralisatie werd overgegaan van een kontinu op een intermitterend bekrachtigings-schema totdat de bekrachtiging achterwege kon blijven.

6e. Eindlijn van probleem- en doelgedrag.

Nadat via bovenstaande procedure het probleemgedrag vervangen was door het doelgedrag werd opnieuw de time-sampling-procedure toegepast: gedurende een week werd in het eerste kwartier van ieder uur de frekwentie van optreden van probleem en het doelgedrag geobserveerd en geregistreerd.

7e. Effektafmeting (zie 3.1.2. - 7e).

8e. Recapitulatie (zie 3.1.2. - 8e).

3.1.6. Samenvatting

In het voorgaande werd weergegeven hoe modifikatie- en assessmentprocedures in hun onderlinge samenhang werden uitgevoerd.

Zowel gedragsvorming, gedragsstename, gedragsbehoud en gedragsreductie bestonden uit de volgende programma stappen:

- 1e. Effektafmeting
 - a. GOCC-observatie volgens het principe der synthetische beoordeling.
 - b. Afname van het psychologisch onderzoek
- 2e. Vaststelling van het probleemgedrag
- 3e. Vaststelling van het doelgedrag, modifikatieprocedure en bekrachtigingswijze.
- 4e. Vaststelling van basislijn ten behoeve van probleemassessment.
- 5e. Uitvoering van modifikatie en registratie (ten behoeve van procesassessment).
- 6e. Vaststelling van eindlijn ten behoeve van probleemassessment.
- 7e. Effektafmeting.
- 8e. Recapitulatie met eventueel opnieuw vaststelling van doelgedrag voor een volgende cyclus.

3.2. Statistische bewerking der Gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC)

3.2.1. Inleiding

De GOCC werd als een vast onderdeel opgenomen in de voorlopige assessment-procedure. Mede op basis van de GOCC-scores werd de indicatie tot gedragsbehandeling gesteld. Bovendien verschaft de GOCC in een aantal gevallen informatie omtrent het probleem- en doelgedrag. Tenslotte vormde de GOCC een onderdeel van de zgn. effektafmeting, waarbij uit de vergelijking van scores voor en na de behandeling een partieel oordeel omtrent het effect der behandeling werd gevormd. In de loop van 3 jaren werd zodoende het gedrag van 104 patiënten aan de hand van de GOCC geobserveerd en beoordeeld. In een groot aantal gevallen

werd de GOCC minstens tweemaal en vaak driemaal per patiënt toegepast. De GOCC-grafiek kwam tot stand door sommatie en middeling van de scores van minstens vijf onafhankelijke beoordelaars. Indien een patiënt voor een behandeling in aanmerking was gekomen, werd deze na de behandeling nogmaals aan de hand der GOCC geobserveerd. Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke schaal, die door verscheidene personen zo veelvuldig werd gehanteerd een nadere beschouwing vereist en verdient.

Voor statistische bewerking kwamen de volgende drie aspecten in aanmerking:

- 1e. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de mate van overeenstemming tussen de scores van de diverse beoordelaars.
- 2e. Intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid: De mate van overeenstemming tussen de scores van eenzelfde beoordelaar in een periode, waarin geacht werd dat het gedrag der patiënt niet of nauwelijks veranderde.
- 3e. De mogelijkheid tot reductie van de 17 items der GOCC tot een beperkter aantal door middel van faktoranalyse.

In het navolgende zal een verslag worden gegeven van dataverzameling en resultaten van deze statistische bewerkingen uitgevoerd door de afdeling informatieverwerking van de Medische Fakulteit te Maastricht (drs. L. Strijbosch) in samenwerking met het komputercentrum te Eindhoven.

3.2.2. Dataverzameling

Bij de dataverzameling werd uitgegaan van de volgende overwegingen:

- a. De beoordelaars moeten per patiënt over alle in de bewerking te betrekken gegevens dezelfde personen zijn.
- b. Deze beoordelaars moeten de patiënten in achtereenvolgende perioden en wel binnen 14 dagen hebben geobserveerd en beoordeeld.
- c. Mede in verband met de te berekenen intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid moet of de 1e en 2e of de 2e en 3e waarnemingsperiode ter bewerking worden opgenomen.
- d. Het aantal patiënten dat door dezelfde beoordelaars binnen 14 dagen werd beoordeeld, moet bij voorkeur zo groot mogelijk zijn.
- e. Het aantal beoordelaars dat eenzelfde patiënt binnen 14 dagen heeft beoordeeld moet bij voorkeur zo groot mogelijk zijn.
- f. De beoordeling heeft bij voorkeur alleen betrekking op de contusio cerebri patiëntengroep.

Het bleek reeds snel dat vooral onder handhaving van de eerste overweging, het aantal patiëntengegevens dat voor bewerking in aanmerking kwam, te beperkt zou zijn. Er waren wel steeds minimaal vijf observatoren per patiënt, maar om allerlei praktische redenen konden dit niet steeds dezelfde observatoren zijn. In verband met deze onbevredigende situatie werd besloten de te bewerken gegevens te verdelen in twee verzamelingen.

Eind 1975 was uit 42 geobserveerde patiënten bij 17 patiënten aan bovenstaande voorwaarden voldaan. Deze 17 patiënten waren alle door 5 dezelfde observatoren beoordeeld en wel tweemaal binnen een periode van 14 dagen, gedurende de 2e en 3e waarnemingsperiode. Deze patiënten behoorden overwegend tot de contusio cerebri populatie. Totaal $17 \times 17 \times 5 \times 2 = 2890$ GOCC-scores.

Eind 1976 was uit 96 geobserveerde patiënten bij 30 patiënten voldaan aan

beoordeling door 5 dezelfde observatoren en wel tweemaal binnen een periode van 14 dagen gedurende de 2e en 3e waarnemingsperiode. Deze patiënten behoorden overwegend tot de contusio cerebri populatie. Totaal $40 \times 17 \times 5 \times 2 = 6800$ GOCC-scores.

Hierbij dient wel vermeld te worden dat bij de tweede patiëntenverzameling eveneens het merendeel van de eerste patiëntenverzameling was betrokken. In onderstaande tabellen wordt de samenstelling der patiëntengroepen weergegeven.

Tabel 6 Samenstelling patiëntengroep in de eerste verzameling dd. december 1975.

	Mannen N = 10			Vrouwen N = 7			Mannen + Vrouwen N = 17					
	M	Range	Md	M	Range	Md	M	Range	Md			
<i>Patiëntgegevens</i>												
leeftijd in jaren	26	22	26	26	22	24	26	25	26			
tijd trauma tot opname RCH (in mnd.)	25	107	12	27	115	8	26	117	8			
duur coma		1 dag- 1 mnd.	2 weken		1 uur- 1 mnd.	1 mnd.		1 uur- 1 mnd.	1 mnd.			
type contusio:												
stam + linker hemisfeer		2			2			4				
stam + rechter hemisfeer		1			—			1				
stam + beide hemisferen		1			1			2				
alleen stam		2			1			3				
linker hemisfeer		2			—			2				
rechter hemisfeer		—			1			1				
stam + kleine hersenen		1			1			2				
niet te lokaliseren		1			1			2				
intelligentieniveau	< 90	90-110	> 110	onb.	< 90	90-110	> 110	onb.	< 90	90-110	> 110	onb.
	1	5	3	1	3	3	1	4	8	3	2	
funktiestoornissen	ja	nee	on- be- kend	ja	nee	on- be- kend	ja	nee	on- be- kend	ja	nee	on- be- kend
	9	1	—	6	—	1	15	1	1			

Tabel 7 Samenstelling patiëntengroep in de tweede verzameling dd. oktober 1976.

Patiëntgegevens	Mannen N=21			Vrouwen N=9			Mannen + Vrouwen N=30					
	M	Range	Md	M	Range	Md	M	Range	Md			
leeftijd in jaren	29	46	27	31	41	26	30	46	26,5			
tijd trauma tot opname RCH (in mnd.)	17	108	5	25	118	8	20	118	5,5			
duur coma		1 uur-1 mnd.	1 mnd.		1 uur-1 mnd.	1 mnd.		1 uur-1 mnd.	1 mnd.			
type contusio:												
stam + linker hemisfeer	3			1			4					
stam + rechter hemisfeer	2			1			3					
stam + beide hemisferen	3			1			4					
alleen stam	3			1			4					
linker hemisfeer	4			1			5					
rechter hemisfeer	—			1			1					
stam + kleine hersenen	1			1			2					
C.V.A.	2			1			3					
niet te lokaliseren	3			1			4					
intelligentieniveau	<90	90-110	>110	onb.	<90	90-110	>110	onb.	<90	90-110	>110	onb.
	5	7	7	2	4	4	—	1	9	11	7	3
funktiestoornissen	ja	nee	onbe- kend	ja	nee	onbe- kend	ja	nee	onbe- kend	ja	nee	onbe- kend
	19	2		8		1	27	3				1

3.2.3. Bewerking der gegevens

3.2.3.1. Zwakheden in schaalconstructie

Bij de constructie der GOCC werd aan drie beoordelaars in eerste instantie gevraagd kaartjes met gedragsuitspraken te rangschikken in de volgorde: „licht aanwezig zijn van de klacht” en „maximaal aanwezig zijn van de klacht”. Vervolgens

werd getracht uitspraken te vinden die de „afstand” tussen eerst genoemde punten overbruggen in die zin, dat de uitspraken respectievelijk twee- en driemaal zo ernstig waren dan „het licht aanwezig zijn van de klacht”.

Op deze wijze werd geprobeerd een iets krachtiger schaal te konstrueren dan de ordinale schaal, nl. een intervalschaal. Tenslotte werd voor iedere uitspraak een omschrijving bedacht, waarbij de desbetreffende klacht totaal niet aanwezig, c.q. tot nul gereduceerd was.

Ter controle werden alle kaartjes met „dummy-kaartjes” at random tweemaal aan de drie beoordelaars aangeboden met het verzoek de uitspraken te ordenen op een „ernst”-schaal, van 0 tot 100. Aan de hand van deze resultaten werden diverse uitspraken bijgewerkt of herschreven. Het verkregen resultaat is een schaal, die bij benadering voldoet aan de eisen van een intervalschaal, hoewel hier vanuit psychometrisch standpunt bedenkingen tegen aan te voeren zijn.

Kerlinger (1972 p. 426 e.v.) besteedt aan dit psychometrische probleem de nodige aandacht: „Strictly speaking, the statistics that can be used with ordinal scales include rank-order coefficient correlations, ρ , Kendall's W, and the rank order-analysis of variance, medians and percentiles. If only these statistics are legitimate, how can statistics like r , t and F be used with what are in effect ordinal measures? And they are used without a qualm by most researchers”. Hiermee wordt door Kerlinger het probleem gesteld waar men ondanks pogingen tot verbetering van de GOCC niet aan ontkomt. De GOCC is in feite een ordinale schaal, die echter in de praktijk gebruikt werd en in het vervolg van deze studie zal worden toegepast als een intervalschaal. Kerlinger ziet hier geen onoverkomelijk probleem in: „Yet, though *most* psychological scales are *basically* ordinal, we can with considerable assurance often assume an equality of interval”.

De overwegingen inzake het gebruik van ordinale schalen als interval of ratioschalen zijn niet beperkt tot Kerlinger. Het probleem lijkt een algemeen probleem te zijn, dat door veel psychologen wordt ontmoet. Guilford was misschien een der eersten (1954), die deze kwestie naar voren heeft gebracht (p. 15 en 16): „... Experimental data often approach the condition of equal units sufficiently well that there is a tolerable error in applying the various statistics that call for them. This is one of those occasions for making use of approximations, in order that one may extract the most information from this data. This is often justified on the basis of evidence of the internal consistency of the findings and the validity of the outcomes. This does not excuse the investigator, however from being on the alert for intolerable approximations and for results and conclusions that are essential a function of this faulty application of statistics”.

Andere auteurs die in hetzelfde verband genoemd kunnen worden zijn Boneau (1961 p. 260-261), Anderson (1961 p. 305-316) en Lord (1954 p. 264-265). Met Guilford, Lord, Anderson, Boneau en Kerlinger wordt hier een pragmatisch standpunt ingenomen. Met de ter beschikking staande hulpmiddelen werd als „voorlopig instrument” een schaal gekonstrueerd waarvoor het principe van „de aanname der interval gelijkheid” akseptabel wordt geacht.

Uiteraard zijn in deze studie de noodzakelijke maatregelen vereist om bij interpretatie der resultaten het risico te vermijden van te ver gaande konklusies. Deze maatregelen bestaan uit het „tweevoudig bewerken” der scores, zoals hiernavolgend zal worden toegelicht.

3.2.3.2. Inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid

Bij de bewerking der data werd uitgegaan van de volgende dimensies:

Observatordimensie: variërend van 1-5 (0-variabele)

itemdimensie: variërend van 1-17 (i-variabele)

tijddimensie: variërend van 1-2 (t-variabele)

patiëntdimensie: variërend van 1-17 in de eerste verzameling en van 1-30 in de tweede verzameling (p-variabele).

Teneinde statistische bewerking mogelijk te maken en een dubbele controle te realiseren, werden de GOCC-scores, genoteerd per observator, per patiënt, per tijdstip en per item voorbereid door sommatie der GOCC-scores.

De sommatie der GOCC-scores werd op twee manieren uitgevoerd.

1. Sommatie over patiënten.

Op tijdstip t_1 werden per observatie-item, per observator, de GOCC-scores gesommeerd over alle patiënten waaruit de verzameling bestond.

(A) Verzameling 1 ($p=17$); $t=1$:
(17 somscores) $\Sigma \text{ item } x \text{ bij } t_1 = \Sigma_1^{17} \text{ pat. [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{17} \text{ pat [waarneming bij } t_1 \text{ door } o_y \text{ op } i_x \text{ over } p_{1-17}]$

(B) Verzameling 2 ($p=30$); $t=1$:
(30 somscores) $\Sigma \text{ item } x \text{ bij } t_1 = \Sigma_1^{30} \text{ pat. [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{30} \text{ pat [waarneming bij } t_1 \text{ door } o_y \text{ op } i_x \text{ over } p_{1-30}]$

Op tijdstip t_2 werden per observatie item, per observator, de GOCC-scores gesommeerd over alle patiënten waaruit de verzameling bestond.

(C) Verzameling 1 ($p=17$); $t=2$:
(17 somscores) $\Sigma \text{ item } x \text{ bij } t_2 = \Sigma_1^{17} \text{ pat [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{17} \text{ pat [W bij } t_2 \text{ door } o_y \text{ op } i_x \text{ over } p_{1-17}]$

(D) Verzameling 2 ($p=30$); $t=2$:
(30 somscores) $\Sigma \text{ item } x \text{ bij } t_2 = \Sigma_1^{30} \text{ pat [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{30} \text{ pat [W bij } t_2 \text{ door } o_y \text{ op } i_x \text{ over } p_{1-30}]$

2. Sommatie over de GOCC-items.

Op tijdstip t_1 werden per patiënt, per observator de GOCC-scores gesommeerd over alle GOCC-items.

(E) Verzameling 1 ($p=17$); $t=1$:
(17 somscores) $\Sigma \text{ pat } x \text{ bij } t_1 = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [W bij } t_1 \text{ door } o_y \text{ op } p_x \text{ over } i_{1-17}]$

(F) Verzameling 2 ($p=30$); $t=1$:
(17 somscores) $\Sigma \text{ pat } x \text{ bij } t_1 = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [W bij } t_1 \text{ door } o_y \text{ op } p_x \text{ over } i_{1-17}]$

Op tijdstip t_2 werden per patiënt, per observator, de GOCC-scores gesommeerd over alle GOCC-items.

(G) Verzameling 1 ($p=17$); $t=2$:
(17 somscores) $\Sigma \text{ pat } x \text{ bij } t_2 = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [W bij } t_2 \text{ door } o_y \text{ op } p_x \text{ over } i_{1-17}]$

(H) Verzameling 2 ($p=30$); $t=2$:
(17 somscores) $\Sigma \text{ pat } x \text{ bij } t_2 = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [GOCC-sc]} = \Sigma_1^{17} \text{ GOCC [W bij } t_2 \text{ door } o_y \text{ op } p_x \text{ over } i_{1-17}]$

Op deze wijze werden per verzameling vier sommatie-tabellen verkregen, als basis voor de bepaling van de inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënt. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënten werden bij de sommatie over de GOCC-items berekend voor de beoordelaars onderling en voor iedere beoordelaar t.o.v. de gemiddelde beoordeling. Deze berekening werd uitgevoerd voor t_1 en t_2 apart. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënten werden bij de sommatie over de patiënten alleen berekend voor de beoordelaars onderling. Ook deze berekeningen werden uitgevoerd voor t_1 en t_2 apart.

Daar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënten gesommeerd over de GOCC-items, berekend voor de beoordelaars onderling, niet allen significant bleken te zijn, werd tevens deze coëfficiënt bepaald voor de gemiddelde waarden. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënt gesommeerd over de patiënten was meestal wel zeer significant.

De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënt werd (om dezelfde reden) bij de sommatie over de GOCC-items berekend voor de beoordelaars onderling én voor de gemiddelde waarden, tussen tijdstip t_1 en t_2 .

De intrabeoordelaarscoëfficiënt werd bij de sommatie over de patiënten alleen uitgevoerd voor de beoordelaars onderling, tussen tijdstip t_1 en t_2 .

Voor de berekening werd gebruik gemaakt van de produkt-moment-korrelatiecoëfficiënt (Spitz 1968 pg 262).

Tenslotte werd de significantie van al deze korrelaties bepaald door middel van de Student's t-toets (Spitz 1968 pg. 358). Hierbij werd een significantieniveau van $\alpha = 0,01$ gehanteerd onder een éézijdige overschrijdingskans met Pearson's indices (Pearson c.s. 1956).

Voor een overzicht van de uitgevoerde voorbewerkingen wordt verwezen naar bijlage 2.

De hieruit berekende korrelatiecoëfficiënten en toetsingsgrootheden zijn weergegeven in bijlage 3.

3.2.4. Overwegingen inzake faktoranalyse

De gegevens ter berekening van faktorladingen werden ontleend aan de eerste verzameling d.d. december 1975. Dit leverde 6 factoren op, die 99 % der variantie dekten.

Terwijl via faktoranalyse een itemreductie voor de GOCC werd nagestreefd, manifesteerde zich bij de gebruikers een tegengestelde tendens. Ondanks het feit dat er geen onduidelijkheid bleek te bestaan over de formulering van de GOCC-items werd er vanuit de praktijksituatie bij herhaling gesuggereerd dat de GOCC niet het probleemgedrag van alle patiënten met contusio cerebri zou dekken.

Toch werd met name vanuit de verpleegkundige sektor gesteld dat een rekonstruktie van de GOCC-items grote verwarring zou stichten bij diverse beoordelaars. Men had behoefte aan stabilisatie van een observatiesysteem, dat ieder zich met de nodige moeite had eigen gemaakt.

Vanuit theoretisch standpunt is er dus een behoefte tot nadere precisering, betere begripsomschrijving, hergroepering en verdere validatie der GOCC.

Vanuit praktisch standpunt is er een drang tot behoud van het vertrouwde en bekende met hooguit enige aanvulling.

Vanwege deze ambivalentie werd vooralsnog afgezien van de rekonstruktie van de GOCC.

Deze faktoranalyse maakte ondertussen wel duidelijk dat het onderscheid in de sub-groepen A en B (zie 2.2.3.) niet relevant was. Derhalve werd hiervan in deze studie geen verder gebruik gemaakt.

3.2.5. Bespreking der resultaten

Voordat tot een bespreking der resultaten wordt overgegaan dient hier gesteld te worden dat de toegepast statistische procedures slechts globale konklusies toelaten. In de toekomst dient onderzoek uitgevoerd te worden naar de betrouwbaarheid van de items afzonderlijk omdat in de praktijk tenslotte ook over items afzonderlijk en per patiënt een uitspraak wordt gedaan. Dit geldt zowel voor inter- als intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid.

Aangezien het instrument zich ten tijde van deze studie in een ontwikkelingsfase bevond, werd de hier uitgevoerde procedure voorlopig voldoende geacht.

Eerste verzameling

De coëfficiënten voor inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend uit de sommatie over de patiënten zijn alle vrij hoog en significant ($\alpha = 0,01$ en d.f. = 15 volgens de t-toets).

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend over de GOCC-items toont een minder overtuigend beeld. Indien afgezien wordt van de korrelatie van iedere beoordelaar met de gemiddelde beoordelaar, dan zijn bij t_1 8 van de 10 korrelaties niet significant, bij t_2 zijn er 7 van de 10 korrelaties niet significant. Vooral de korrelaties van de beoordelaars 1, 2, 3 en 5 met beoordelaar 4 komen hierbij als niet significant naar voren.

De korrelatie van alle beoordelaars met het gemiddelde zijn daarentegen zeer significant. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend uit de sommatie over de GOCC-items neemt een middenpositie in tussen beide vorige ($\alpha = 0,01$ en d.f. = 15 volgens de t-toets).

Tweede verzameling

De coëfficiënten voor inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend uit de sommatie over de patiënten zijn weer vrij hoog en significant. De waarden gevonden in de tweede verzameling zijn op één uitzondering na alle hoger dan de waarden in de eerste verzameling ($\alpha = 0,01$ en d.f. = 28 volgens de t-toets).

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend uit de sommatie over de GOCC-items toont weer een groot aantal niet significante korrelaties. Ook hier zijn de korrelaties van alle observatoren met observator 4 vrijwel alle niet significant. De korrelatiecoëfficiënten van alle observatoren met het gemiddelde zijn opnieuw zeer significant. Indien men de tweede verzameling met de eerste vergelijkt, vertoont de tweede verzameling geen hogere korrelatiecoëfficiënten dan de eerste. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid ligt ook hier iets beter dan de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ($\alpha = 0,01$ en d.f. = 28 volgens de t-toets).

Vergelijkt men de eerste verzameling met de tweede verzameling, dan blijkt in beide verzamelingen de intrabeoordelaarscoëfficiënten van observator 5 niet significant.

Uit deze resultaten vallen de volgende konklusies te trekken:

- 1e. Indien men aan een groep van vaste observatoren de opdracht geeft een groep patiënten te beoordelen aan de hand der GOCC, dan bestaat er
 - a. indien men alle patiënten eerst scoort op GOCC-item 1, en daarna deze scores over de patiënten sommeert, een grote mate van overeenstemming over de op deze wijze tot stand gekomen somscores. Eenzelfde konklusie geldt mutatis mutandis voor alle overige GOCC-items.
 - b. indien men één patiënt scoort op GOCC-item 1, daarna op 2 enz. en vervolgens deze scores sommeert, een geringe mate van overeenstemming

tussen de verschillende beoordelaars onderling over de op deze wijze tot stand gekomen somscores (over een gehele groep van patiënten genomen). De hoge korrelatiecoëfficiënten bij Σ_1^{17} of Σ_1^{30} pat. [GOCC] sc. in vergelijking tot de lagere korrelatiecoëfficiënten bij de Σ_1^{17} GOCC [GOCC] sc. wordt wellicht verklaard doordat bij eerst genoemde wordt gesommeerd over *eenzelfde* variabele over een aantal patiënten hetgeen tot uitdrukking komt in één getal. Bij laatstgenoemde wordt gesommeerd over verschillende variabelen, die qua inhoud misschien moeilijker te sommeren zijn, waarbij de waarden elkaar ook per patiënt kunnen neutraliseren.

- c. indien men de volgens b. tot stand gekomen somscores middelt, dan bestaat er (zoals overigens te verwachten was) een grote mate van overeenstemming tussen de verschillende somscores der aparte beoordelaars en de gemiddelde somscores.
2. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheidcoëfficiënten zijn in het algemeen significant ($\alpha = 0,01$). Dit geldt voor de beide voorbereidingen van beide verzamelingen.
- 3e. Een enkele observator is te kwalificeren als afwijkend t.o.v. de overige observatoren. Deze konstatering geldt alleen voor het geval waarbij de coëfficiënten berekend worden op basis van sommatie over de GOCC-items.
 - a. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënten van de beoordelaars 1, 2, 3 en 5 t.o.v. 4 is niet significant in beide verzamelingen.
 - b. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid is voor observator 5 niet significant in beide verzamelingen.

3.2.6. Samenvatting

De basis voor een deel der modifikatieproedure is de GOCC, welke in de loop van drie jaren een toenemende mate van toepasbaarheid en bruikbaarheid bewees. Een kritische evaluatie van de GOCC leek derhalve een noodzakelijkheid en hiertoe werd een grote verzameling van scores aan een statistische bewerking onderworpen. Het aksent van deze bewerking werd gelegd op bepaling van inter- en intrabeoordelaarscoëfficiënten van 5 observatoren, betrokken op twee verzamelingen van resp. 17 en 30 patiënten. De belangrijkste resultaten kunnen als volgt geformuleerd worden:

- 1e. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid van de vijf observatoren is goed te noemen, met uitzondering van de berekende waarde van één observator t.o.v. de overigen.
- 2e. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de vijf observatoren is redelijk tot goed, eveneens met uitzondering van de berekende waarden van één observator t.o.v. de overigen.
- 3e. Genoemde uitzonderingen vormen een aanwijzing voor de beperking der observatorengroep, tot enkele vaste observatoren, die voortdurend informatie, opleiding en bijsturing behoeven.
- 4e. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is zeer goed, indien deze bepaald wordt op basis van sommatie over de patiënten per GOCC-item.
- 5e. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is minder goed, indien deze bepaald wordt op basis van sommatie over de GOCC-items per individuele patiënt.

3.3. Evaluatie van modifikatie ter vorming, toename en reductie van gedrag

3.3.1. Inleiding

In deze paragraaf zal de evaluatie van de uitvoering zelf behandeld worden. Dit zal gebeuren in de vorm van casuïstiek nl. inzake de gedragsvorming, gedragstoenames en gedragsredukties. Als zodanig is dit een uitbreiding en nuancering van een pilotstudie, welke eerder werd gepubliceerd (zie Schuerman 1975, 1 en 2).

Deze paragraaf wordt afgesloten met een behandeling van de resultaten waarbij het slechts gaat om algemene tendenties. Een statistische bewerking is hierbij slechts beperkt mogelijk aangezien het aantal behandelingen gering is en er geen kontrolegroep gevormd kon worden.

3.3.2. Datapresentatie

De hiernavolgende casuïstiekbespreking richt zich uitsluitend op de behandeling van patiënten met contusio cerebri. Na de bespreking der resultaten zullen in 3.3.7. ook ervaringen inzake gedragsmodifikatie met anderszins cerebraal gestoorden worden betrokken.

Per behandeling zullen beknopt de bevindingen worden gepresenteerd wat betreft achtereenvolgens: gedragsvorming (V), gedragstoename (T) en reductie van gedrag (R).

Per patiënt met contusio cerebri zal achtereenvolgens aangegeven worden:

- (1) Patiëntgegevens: geslacht, leeftijd, tijd interval tussen ongeval en opname in revalidatiecentrum, duur coma, type ziektebeeld, GOCC en gegevens van het psychologisch onderzoek.
Afgezien is van vermelding van EEG-bevindingen aangezien deze in de meerderheid der gevallen ontbraken. De medikatievermelding verviel op grond van de zeer gevarieerde en wisselende toepassing van diverse medikamenten.
 - (2) Probleemgedrag: probleemgedrag werd afgeleid uit de GOCC of uit signalering ad hoc. In verband met de probleemassessment werd gezocht naar een meetbaar criterium dat het probleemgedrag zo goed mogelijk weergaf of hiermee in directe relatie stond.
 - (3) Doelgedrag: het doelgedrag was meestal een afgeleide van het probleemgedrag. Het gaf aan waar het einddoel van de behandeling op gericht was.
 - (4) Behandelingsplan: het behandelingsplan omschrijft de weg waarlangs het doelgedrag wordt benaderd.
 - (5) Uitvoering: In de „uitvoering” wordt zeer in het kort ingegaan op ondervonden moeilijkheden, suksessen en mislukkingen bij de realisering van de modifikatie-procedure.
 - (6) Probleemassessment
 - (7) Procesassessment
 - (8) Effectassessment
- Deze drie vormen van assessment geven de resultaten der behandeling in grafiekvorm weer.
- (9) Resultaten bespreking
Bij de resultaten bespreking wordt ingegaan op:
 - a. afname of toename van probleemgedrag
 - b. de realisering van het doelgedrag
 - c. de weerspiegeling van het effect der procedure in GOCC en psychologisch onderzoek.

3.3.3. Gedragsvorming

Patiënt V-1

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♂, 33 jaar
- tijd trauma tot opname: 3½ maand
- duur coma: onbekend
- contusio cerebri
- niet testbaar m.b.v. psychologisch onderzoek

(2) *Probleemgedrag:* Diverse stoornissen. Niet objectief vast te stellen. Als subjectief (voor verpleging en thuismilieu) meest storende gedrag: regelmatige urinelozing en defaecatie in hoek van slaapkamer. Vermoedelijke reden: kan toilet niet vinden door geheugen- en/of oriëntatiestoornis. Er bestond geen organische verklaring voor inkontinentie.

Definitie probleemgedrag: Het aantal malen inkontinent per etmaal. Een week voor en een week na de behandeling werd deze frekwentie van voorkomen nagegaan om 4.00, 8.00, 12.00, 16.00, 20.00 en 24.00 uur.

(3) *Doelgedrag:* Bij „aandrang” zelfstandig vanuit plaats waar patiënt zich bevindt naar toilet kunnen gaan, alle noodzakelijke handelingen kunnen verrichten en weer teruggaan. Aangezien dit moeilijk controleerbaar te maken was, werd een meer specifiek doelgedrag omschreven: Bij de diskriminatieve stimulus bestaande uit de vraag: „Moet u naar het toilet?” moet patiënt in staat zijn (indien nodig) het toilet vanuit zijn bed (waar patiënt doorgaans verbleef) te kunnen vinden, alle noodzakelijke handelingen ter plekke te verrichten en weer zelfstandig naar het bed terug te kunnen gaan.

(4) *Behandelingsplan:* Suksessieve approximatie (volgens traject-bed-w.c.-bed) met verbale instructie, prompting, selectieve bekrachting en fading. De oefeningen vonden plaats om de twee uur (net „droge” periode) overdag en 's nachts. Iedere deelhandeling werd altijd begonnen met de vraag „moet u naar het toilet?” en bij succesvolle trial beëindigd met sociale bekrachting (goedkeuring) volgens onderstaand behandelingschema:

a. Begeleiding vanaf bed tot w.c.-bril – rest doet patiënt zelf – begeleiding naar het bed terug.

b. Begeleiding vanaf bed tot w.c.-deur – rest zelf – begeleiding tot achter kamerdeur – rest zelf.

c. Begeleiding vanaf bed tot halverwege de gang – rest zelf – begeleiding tot vóór kamerdeur – rest zelf.

d. Begeleiding vanaf bed tot achter kamerdeur – rest zelf – begeleiding vanaf w.c. tot halverwege gang – rest zelf.

e. Begeleiding vanaf bed tot vóór kamerdeur – rest zelf – begeleiding t/m sluiten van w.c.-deur – rest zelf.

f. Instructie „moet u naar het toilet?” – rest zelf (geen begeleiding terug naar bed). Bekrachting werd gegeven nadat „rest zelf” in bovenstaand schema inderdaad door patiënt kon worden gerealiseerd. Bij aarzelen of falen tijdens „rest zelf” werd weer met prompting begonnen.

(5) *Uitvoering:* Deze werd gerealiseerd door het verplegenden-team over een periode van 7 weken (met onderbreking van een week ziekenhuisopname). Voor en na de behandeling vond probleemassessment en effectassessment plaats, waardoor de gehele behandeling ca. 9 weken duurde. Tijdens de behandeling vond procesassessment plaats, d.w.z. er werd geregistreerd of patiënt in staat was de deelhandelingen uit te voeren.

(6) Probleemassessment:

t = tijd in dagen, gedurende observatieweek
N = aantal malen inkontinentie per etmaal;
6 observaties om de 4 uur
x = voor behandeling
o = na behandeling

(7) Procesassessment:

P = programmastappen
Afstand (A-B) (B-C) enz. op te vatten als verdeeld in percentages. Bereiken van punt B wil zeggen 100% (= 12 x) succesvol per etmaal
t = tijd in weken

(8) *Effektassessment:*

x = voor behandeling

o = na behandeling

S = GOCC-scores

i = GOCC-item

psychologisch onderzoek niet mogelijk

(9) *Resultaten:*

- Afname van probleemgedrag (van 4,7 maal incontinent per etmaal vóór behandeling naar 0,3 maal per etmaal na behandeling); (~ 94 % afname).
- Procesassessment: doelgedrag gerealiseerd in 7 weken.
- Afname van GOCC-score op observatie-item nr. 5 (onzelfstandig gedrag) (alleen afname of toename van > 1 puntscore worden als betekenisvol gezien)
- Terugval na ziekenhuisopname, echter spoedig herstel op vroegere niveau na 1½ week training (zie procesassessment).

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♂ 23 jaar
- tijd trauma tot opname: 6 jaar, 8 maanden (eerst in diverse andere centra geweest)
- duur coma: onbekend
- stamcontusio en parese van de rechter lichaamshelft van cerebrale aard
- ernstige geheugen- en concentratiestoornis. Na drie maanden geheugen- en concentratietraining werden geen verbeteringen in desbetreffende tests gekonstateerd. Deze training ging vooraf aan de hieronder behandelde gedragsvorming.

(2) *Probleemgedrag:* De signalering van het probleemgedrag vond ad hoc plaats. Allerlei therapieën werden door patiënt niet bezocht en indien deze toch bezocht werden, dan kwam patiënt veel te laat. Op den duur werd hierin voorzien door patiënt door een verpleegkundige naar de therapieën te doen vergezellen. Bij verdere navraag ontstond de algemene indruk dat het hier ging om samengesteld probleemgedrag bestaande uit:

- a. patiënt weet de weg niet in het centrum, kan zich deze ook niet inprenten.
- b. patiënt vergeet op de tijd te letten en weet op een bepaald tijdstip ook niet wat er op dat moment op het programma staat. Definitie probleemgedrag: Aantal malen *niet* op tijd op de juiste plaats aanwezig zijn (zonder begeleiding). Plaats en tijd werden volgens een konstant dagelijks schema vastgesteld: 9.15 uur zwembad; 10.15 uur afd. arbeidstherapie; 12.15 uur verblijfsafdeling; 14.15 uur afd. ergotherapie; 15.15 uur afd. onderwijs; 16.15 uur verblijfsafdeling. Totaal dus 6 controlemomenten en controleplaatsen. Voor en na behandeling werd gedurende een week nagegaan hoe groot de frekwentie was van aanwezigheid, „op juiste plaats en op tijd”.

(3) *Doelgedrag:* Zonder hulp weten wat op een bepaald tijdstip wat betreft therapie moet gebeuren, naar betreffende plaats gaan (met gebruik maken van lift, indien nodig) en op tijd aankomen.

(4) *Behandelingplan:* Dit viel uiteen in twee onderdelen.

A. Trajektbegeleiding. Er werden zes trajekten geselecteerd, die overeenkwamen met onder „probleemgedrag” genoemde controleplaatsen. Te weten: dagverblijf-zwembad; zwembad-arbeidstherapie; arbeidstherapie-dagverblijf; dagverblijf-ergotherapie; ergotherapie-onderwijs; onderwijs-dagverblijf. Ieder trajekt werd vervolgens onderverdeeld in 4 tot 6 onderling gelijke afstanden, waarbij zogenaamde „herkenningspunten” van te voren werden vastgesteld.

Als voorbeeld trajekt (a): van dagverblijf naar zwembad: herkenningspunten

- 6. lift (drukken op knop „beneden”. Hierna zie je „pilaren”).
- 5. pilaren (na pilaren komt bocht waarna glazendeur).
- 4. glazendeur (na glazendeur komt muur, die twee ruimten scheidt).
- 3. muur: (voorbij de muur ligt podium).
- 2. podium: (tegenover podium is middelste blauwe deur).
- 1. middelste blauwe deur (geeft toegang tot het zwembad).

Training vond plaats d.m.v. begeleiding waaronder bij ieder herkenningspunt verbale instructie plaatsvond d.w.z. er werd geattendeerd op het herkenningspunt en gevraagd waar patiënt naar toe moest. De volgorde der begeleidingspunten verliep van 6-5-4-3-2-1. Nadat het trajekt op deze wijze onder begeleiding en verbale instructie enige dagen was geoefend, werd overgegaan op backward-fading. D.w.z. de begeleiding vond niet meer plaats van 6 t/m 1, maar van 6 t/m 2 (begeleidster stopt bij 2) en vervolgens van 6 t/m 3, 6 t/m 4, 6 t/m 5.

Op deze wijze werd ieder trajekt dagelijks éénmaal afgewerkt. M.a.w. er werden per dag 6 trajekten getraind.

B. Tijdsondersteuning: Hierbij werd gebruik gemaakt van een „parkeerwekkertje” en het inoefenen van een bepaalde handelingssekwentie onder gebruik maken van een programma.

Handelingssekwentie:

- Patiënt kijkt op afdelingsklok
- Patiënt stelt wekkertje in om 8 uur, zodat het over één uur afloopt
- Stopt wekker in rechterbroekzak
- Wekker loopt af om 9 uur, patiënt kijkt op afdelingsklok, patiënt stelt wekker in zodat deze om 10.00 uur afloopt
- Stopt wekker in rechter broekzak
- Neemt kaart uit linker borstzak
- Kijkt op kaart waar hij naar toe moet en stop kaart weer terug
- Gaat naar plaats van bestemming (in eerste instantie met begeleiding)

Backward-fading werd gerealiseerd door: instructie op kaart te minimaliseren, kaart wegnemen, wekker het laatste uur laten vervallen, geleidelijk de gehele middag en tenslotte volledig.

Als reinforcement werd een simpel kruisje gebruikt dat door de therapeut op een kaart geplaatst wordt indien patiënt op het „juiste moment op de juiste plaats” aanwezig was.

- (5) *Uitvoering:* Deze werd volledig gerealiseerd door de begeleiding van één psychologisch assistente, die telkens op het juiste moment aanwezig moest zijn. Tijdsondersteuning en trajectbegeleiding vonden direct na elkaar plaats. De gehele behandeling werd gerealiseerd in 5 weken.

- (6) *Probleemassessment:*

n = aantal malen niet op tijd op juiste plaats

t = tijd in dagen

x = vóór behandeling

o = na behandeling

(7) *Procesassessment:* (voorbeeld traject a)

p = programmastappen

(iedere stap werd 1 x per dag geoefend)

t = tijd in dagen

// = weekend-onderbreking

(voor de overige trajecten geldt eenzelfde soort grafiek)

(8) *Effektassessment:*

x = voor behandeling -

o = na behandeling -

s = GOCC-score

i = GOCC-item

Geen verandering van scores op psychologisch onderzoek vóór en na gedragsvorming (zie overzichtstabel bijlage 4)

(9) *Resultaten:*

(a) Afname van probleemgedrag. Van 5,7 maal niet aanwezig op juiste moment en plaats vóór behandeling tot 0,0 niet aanwezig na behandeling.

(b) Procesassessment: Doelgedrag van 6 trajectbegeleidingen en 6 tijdsondersteuningens gerealiseerd in 5 weken.

(c) Effektassessment: Afname der GOCC-scores op item nr. 5 (onzelfstandiggedrag).

3.3.4. Toename van gedrag

Patiënt T-1

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♂, 16 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 11½ maand
- duur coma: 5 maanden
- contusio cerebri en hemiplegie links
- moeilijk testbaar met psychologisch onderzoek mede in verband met sterke motorische stoornissen; spreekt zeer moeilijk en werkt traag; vermoedelijk geheugen- en concentratiestoornissen; IQ weinig betrouwbaar; volgens GOCC zijn er gedragsbelemmeringen.

(2) *Probleemgedrag:* De GOCC signaleerde o.a. gedragsbelemmeringen op het gebied van inaktiviteit en traagheid. Dit werd door diverse disciplines bevestigd. Vanuit fysiotherapie en ergotherapie kwam de mening naar voren dat deze inaktiviteit en traagheid geen zuiver motorische basis zou hebben. Het probleemgedrag zou globaal gedefinieerd kunnen worden als het langzaam uitvoeren van een aantal handelingen, terwijl dat in principe sneller zou kunnen. Ter nadere definitie werden vijf activiteiten geselecteerd om de basislijn van het probleemgedrag te bepalen. Te weten: fysiotherapie: 40 meter lopen; verpleging: aankleden; sport en spel: 6 breedte banen zwemmen; onderwijs: cijfers leggen; logopedie: lezen van 50 tweelettergrepen woorden.

Vóór en na de behandeling werden de diverse handelingstijden bepaald.

(3) *Doelgedrag:* Het verhogen van het tempo op de vijf genoemde gebieden in die zin dat voor de strikt omschreven activiteiten minder tijd vereist zou gaan worden.

(4) *Behandelingsplan:* Na het vaststellen van de basislijn van het probleemgedrag (per aparte activiteit) werd door iedere discipline het eerste niveau vastgesteld van waaruit het doelgedrag benaderd zou worden. Dit beginniveau van het doelgedrag lag lager (d.w.z. minder tijd ter beschikking) in vergelijking met de basislijn van het probleemgedrag. Indien patiënt het eerste doelniveau behaalde, verdiende hij per succesvolle activiteit één token en een verbale goedkeuring. Per week konden dus 25 tokens verdiend worden als alle activiteiten iedere dag eenmaal werden uitgevoerd. Indien patiënt 20 tokens per week verdiende betekende dit (als reinforcement) dat hij zijn loopsteunen mee naar huis mocht nemen om thuis te oefenen. (Dit bleek voor patiënt een enorme bekrachtiging te zijn). Het doelniveau werd iedere week opnieuw gezien en lager gesteld. Het aantal vereiste tokens bleef gehandhaafd.

(5) *Uitvoering:* Deze werd gerealiseerd door vaste medewerkers uit 5 verschillende disciplines: fysiotherapie, verpleging, sport en spel, onderwijs en logopedie. De behandeling duurde 6 weken, waarbij dagelijks op 5 activiteiten werd geoefend. Het bleek niet altijd mogelijk om iedere week het doelniveau te verlagen. Enerzijds bestond soms de indruk dat patiënt bepaalde activiteiten niet sneller kon uitvoeren. Anderszijds had men het idee dat patiënt werkte tot het minimum aantal tokens was verdiend en het daarna wel geloofde. Na drie weken werd besloten als eis te stellen dat patiënt alle tokens (25) per week moest behalen. Een belangrijke vraag was, in hoeverre het op deze wijze verhoogde tempo ook zou generaliseren naar andere activiteiten.

Na 7 weken behandeling werd een week observatie ingelast zonder bekrachtigende kondities. Het tempo nam in deze week weer af, maar bereikte niet de basislijn van het probleemgedrag. Hierna werd overwogen meer activiteiten ter tempobekrachtiging in het programma te verdiskontoren. Een gesprek met familieleden thuis wees er ondertussen op, dat van die zijde weinig inzicht en medewerking te verwachten was. (Patiënt werd bijvoorbeeld thuis met aankleden geholpen, terwijl hij dit in de kliniek zelfstandig wist te doen). Aangezien bovendien bekend was, dat patiënt binnen afzienbare tijd in een ziekenhuis zou worden opgenomen, werd van verdere behandeling afgezien.

(6) *Probleemassessment:*

t = benodigde tijd in minuten

De in kolommen geplaatste niveaus zijn gemiddelden van 3-5 metingen per week

— voor behandeling

- - - na behandeling

(7) *Procesassessment:* (als voorbeeld logopedie, 50 tweelettergrepige woorden noemen)

T = tijd in seconden

t = tijd in dagen

(8) *Effektassessment:*

i = GOCC-item

s = GOCC-score

x = voor behandeling

o = na behandeling

PO: geen of nauwelijks verandering in scores vóór v.s. na behandeling (zie verzameltabel, bijlage 4)

(9) *Resultaten:*

(a) Probleemassessment: Afname van benodigde tijd (tempoverhoging) voor alle activiteiten. Probleemassessment vond voor en behandeling plaats onder niet bekrachtigende kondities. Eindscore van de probleemassessment ligt echter hoger dan eindniveau der doelassessment. Algemene indruk bestond dat patiënt wel sneller kon, indien hij hiertoe gestimuleerd werd ($\pm 60\%$ sneller).

(b) Procesassessment: Vrijwel alle activiteiten tonen een afname van benodigde tijd.

- 40 meter lopen van niveau 1 (op 16 minuten) naar niveau 4 (op 7 minuten)
- aankleden: van niveau 1 (op 18 minuten) naar niveau 3 (op 11 minuten)
- 6 breedtebanen zwemmen: van basislijn op 4 minuten naar blijvend niveau van 3 minuten
- cijferleggen: van basislijn probleemgedrag op 3 minuten naar blijvend niveau van 2 minuten.

- 50 twee-lettergrepen: van niveau 1 (op 2'50") naar niveau 6 (op 1'20").

(c) Effectassessment: Afname van 6 gedragsbelemmeringen nl. de observatie-items: 5-6-10-11-16 en 17 (resp. onzelfstandigheid, zich afzonderend, slordigheid, niet coöperatief, ongemotiveerd, gebrek aan zelfkritiek).

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♂, 4 jaar
- tijd trauma tot opname in centrum: 6 weken
- duur coma: 10 dagen
- stamcontusie
- volgens GOCC zijn er gedragsbelemmeringen; volgens PO zijn er hoofdzakelijk concentratiestoornissen (zie effectassessment).

(2) *Probleemgedrag:* Patiënt is niet in staat langdurig met een bepaalde opdracht bezig te zijn.

De GOCC signaleerde met name onrustig, ontremd, gejaagd gedrag. Besloten werd geen aandacht te besteden aan het ontreemde gedrag (in feite hield dit dus reeds negatie in), maar het aksent te leggen op toename van „attentionspan”, m.a.w. het langduriger bezig kunnen zijn met bepaalde activiteiten. Dit betekent dus dat het zwaartepunt der behandeling lag op toename van reeds bestaand gedrag en niet op de afname van *probleemgedrag* zoals bij de gedragsreductie. Teneinde het probleemgedrag nader te specificeren werden per 4 disciplines (fysiotherapie, sport en spel, verpleging en ergotherapie) een aantal (5) spelactiviteiten uitgezocht als „balgooien” bij sport en spel, „mens-erger-je-niet” bij verpleging e.d. Uiteraard zal de interesse per spel, therapeut en situatie verschillend zijn. De basislijn werd vóór de behandeling per discipline over dezelfde soorten spelactiviteiten vastgesteld. Dit gebeurde eveneens na de behandeling.

(3) *Doelgedrag:* Toename van „attentionspan” d.w.z. het langduriger bezig kunnen zijn met een bepaalde activiteit.

(4) *Behandelingsplan:* Iedere deelnemende discipline was per dag een half uur met patiënt bezig. In dit half uur werden de 5 (per discipline) geselecteerde spelactiviteiten uitgevoerd. Aangezien de basislijn per discipline verschillend lag werd het beginniveau van het doelgedrag per discipline apart bepaald op een halve minuut onder deze basislijn. Een eierwekker werd ingesteld op de tijdsspanne, waarin patiënt volgens het afgesproken doelniveau bezig moest blijven. Indien patiënt nog met het spel bezig was als de eierwekker afliep, volgde bekrachtiging in de vorm van snoep en aanhaling. Bij falen werd geen bekrachtiging gegeven. Iedere therapeut probeerde de tijd in iedere volgende sessie telkens met een halve minuut op te voeren.

De doelassessment bestond uit de registratie van het percentage der activiteiten dat patiënt gedurende de vastgestelde tijd had weten vol te houden.

(5) *Uitvoering:* Deze vond plaats in een relatief stimulusarme ruimte gedurende ca. 6 weken en wel iedere dag door leden van 4 aparte disciplines. Het plan leek in eerste instantie tot mislukken gedoemd, aangezien de bekrachtiging (snoep en lichamelijk contact) niet langer dan één week bleek te werken. Hierna werd echter overgegaan op het gebruik van een „model” nl. een leeftijdsgenoot van patiënt. Dit bewerkstelligde uiteraard eveneens „het samen kunnen spelen”. Het model werd voor het volhouden van het spel bekrachtigd door goedkeuring en als patiënt eveneens (zonder afleiding) had weten mee te spelen, volgde voor hem eveneens verbale goedkeuring. Na 2 weken werd overgegaan op „fading” d.w.z. de spelgenoot was als model niet meer aanwezig. De therapeut nam de rol van het „model” over en op deze wijze was de situatie gelijk aan de situatie in de eerste week.

Daarmee werd nog 2 weken voortgegaan waarna onder afwezigheid van bekrachtiging werd gezien hoe lang patiënt nu met de desbetreffende activiteiten kon bezig zijn.

(6) Probleemassessment:

T = attention span in minuten

— voor behandeling

= na behandeling

De weergegeven niveaus zijn de gemiddelden van 5 spelen genomen over 4 observatiedagen. (d.w.z. per discipline 20 spelactiviteiten)

(7) Procesassessment: (geïllustreerd aan behandelingsbijdrage door verpleegkundigen)

T = attention span in minuten

t = tijd in weken

— = doelniveau (verhoging)

--- = gemiddelde attention span per ½ uur training genomen over 5 spelen

(8) Effektafmeting:

GOCC

s = GOCC-score

i = GOCC-item

x = voor behandeling

o = na behandeling

Psychologisch onderzoek PO

s = PO-score (in punt-score)

IQ = intelligentiequotiënt

Re/A = Recognitie-auditief

Re/V = Recognitie-visueel

Ra/A = Recall-auditief

Ra/V = Recall-visueel

T = tempo

R = regelmaat

F = fouten

(9) Resultaten:

(a) Probleemassessment: Toename van attention span voor activiteiten met alle disciplines.

(b) Procesassessment: Verhoging van doelniveau kon voor iedere discipline in geplande tijd gerealiseerd worden. All grafieken tonen een vrijwel overeenkomstig beeld, d.w.z. een „dip“ in tweede week, stijging bij inschakeling van model en stabilisering na afwezigheid van model.

(c) Effektafmeting: GOCC-afname op punten 4, 5, 6, 12 (resp. klagen, onzelfstandigheid, zich afzonderend, onrustig ontremd gedrag). PO enige verbetering van concentratie-items (tempo, regelmaat, fouten).

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♀, 4 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 2½ maand
- duur coma: onbekend
- contusio cerebri
- geen psychologisch onderzoek mogelijk door motorische stoornissen en probleemgedrag.
- GOCC op 6 punten > 3.

(2) *Probleemgedrag:* per dag moet patiënte verscheidene afstanden afleggen. Ze doet dit kruipend, terwijl het lopend zou kunnen. Als ze lopen moet, zeurt en huilt ze en valt neer. Door dat zeuren, huilen en neervallen zijn fysiotherapie-oefeningen onmogelijk. Besloten werd de gedragingen, die gedragsvorming tegenwerkten volkomen te negeren, en het aksent te leggen op toeneming van het lopen, dat wel in het gedragsrepertoire aanwezig was. Als probleemgedrag werd genomen het aantal malen dat ze tijdens een behandelingssessie van staande houding (gesteund door therapeut) over wilde gaan op kruipen. Dit werd nagegaan vóór en na de gedragsmodifikatie.

(3) *Doelgedrag:* Patiënte moet zelfstandig kunnen lopen met hulp van een rollator. Dit criterium was volgens fysiotherapie haalbaar en werd als doelgedrag gesteld.

(4) *Behandelingsplan:*

(a) Selektieve reinforcement bij iedere volgehouden looppoging onder negatie van niet-coöperatief gedrag (zeuren, op de grond vallen e.d.). Bekrachtiging moest direkt en snel zijn, daarom werd afgesproken dat zodra patiënte een eerste wankelend pasje zou zetten er onmiddellijk reinforcement zou komen. Bekrachtiging hield in: snoepje geven en lichamelijk contact (d.w.z. even aanhalen). Vooral in het begin leek dit nogal wat moeite op te leveren: stapje, snoepje, twee stapjes, snoepje enz. enz. De negatie hield in dat men patiënte ter plekke op de grond liet liggen, terwijl de therapeut zich verwijderde en pas weer aanstalte tot benadering toonde als patiënte probeerde op te staan.

(b) Successieve aproximatie van het doelgedrag "lopen met rollator". Er werden 4 betrekkelijk korte afstanden geselecteerd die door drie disciplines iedere dag getraind werden.

Verpleging: van kamer naar toilet en terug, van kinderkamer naar eetkamer en terug.

Fysiotherapie: van kamer naar oefenkamer (op dezelfde afdeling) en terug.

Ergotherapie: van kamer naar ergotherapiekamer en terug.

De aproximatiestappen:

1e week: lopen met vasthouden van twee handen door therapeut die vóór patiënt loopt.

2e week: lopen met alleen vasthouden van rechterarm.

3e week: lopen met vasthouden van de linkerarm.

4e week: lopen met rollator, beide handen aan de handgrepen vasthouden, terwijl de rollator mee naar voren wordt getrokken door therapeut.

5e week: Alleen de linkerhand wordt door therapeut vastgehouden, terwijl de rollator door therapeut mee naar voren wordt getrokken.

6e week: patiënte houdt rollator vast, therapeut trekt rollator vooruit.

7e week: patiënte duwt zelf rollator en loopt.

(5) *Uitvoering:* De diverse aproximatie-stappen over de vier genoemde afstanden werden dagelijks door drie disciplines driemaal getraind (5 dagen per week). Hierbij werden nogal problemen ondervonden door het gedrag dat gedragsvorming tegenwerkte. Het gebeurde vooral dat patiënte zich op de grond liet vallen als ze tijdens de oefeningen op een plaats kwam waar meer of andere personen (dan therapeut) haar konden zien. Met name de route naar ergotherapie werd hierdoor verstoord. In een dergelijk geval werd afgesproken, dat therapeut patiënte zonder commentaar zou oppakken, naar afdeling ergotherapie zou dragen en haar daar weer neerzetten. Tijdens de uitvoering ontwikkelde zich ook „stottergedrag”. Dit gaf aanleiding tot diverse kritieken, die neerkwamen op een té

enerverend zijn van de behandeling voor patiënte. Het stottergedrag verdween echter toen ook dit werd genegeerd.

Deze kritiek werd met name geuit door personen, die meenden dat men spontane groei, rijping of ontwikkeling diende af te wachten en zeker niet moest proberen de zaak te forceren. Aangezien patiënte reeds ca. 4 maanden in het centrum aanwezig was, waarbij voortdurend voorzichtig geprobeerd was „iets” te bereiken, werd van verder afwachten afgezien.

Kortom: een niet eenvoudige behandeling, die door allerlei commentaar extra beladen en bemoeilijkt werd. Bovendien moest de behandeling 3 weken onderbroken worden, doordat patiënte mazelen kreeg.

- (6) *Probleemassessment*: Geen kwantitatieve bepaling van frekwentie van voorkomen van het probleemgedrag per dag over een week. Mondelinge verslaggeving: neiging tot kruipen of vallen kwam vóór de behandeling in 75-90 % der loopprogingen voor, na de behandeling kwam dit niet meer voor.

Afname 100 %

- (7) *Procesassessment*:

t = tijd in weken

P = percentage succesvolle trials per dag (maximaal 9x per dag).

- (8) *Effectassessment*:

s = GOCC-score
i = GOCC-items
x = voor behandeling
o = na behandeling

PO: niet mogelijk voor en na behandeling (zie verzameltabel, bijlage 4)

- (9) *Resultaten*:

- (a) *Probleemassessment*: afname van probleemgedrag in de orde van grootte van 100 %
(b) *Procesassessment*: ondanks vele bezwarende omstandigheden werd doelgedrag in 7 stappen gerealiseerd. Totale duur der behandeling bedroeg mede door ziekte van patiënte 13 weken.
(c) *Effectassessment*: 10 van de 17 observatie-items tonen afname van méér dan één puntscore. Sterke afname van 4, 5 en 11 (resp. klagen, onzelfstandig en niet-coöperatief gedrag)

3.3.5. Gedragsreductie

Patiënt R-1

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♀, 20 jaar
- duur trauma tot opname: 6 maanden
- duur coma: 2 maanden
- stamcontusio, hemiparese rechts, dysarthrie
- niet testbaar, verscheidene gedragsbelemmeringen.

(2) *Probleemgedrag:* Uit GOCC blijkt dat bij voortdurende aanwezigheid: inactiviteit, ongemotiveerdheid, zich afzonderend gedrag, niet coöperatief, gebrek aan zelfkritiek, onzelfstandigheid.

Patiënte wordt door het thuismilieu beschreven als zeer moeilijk opvoedbaar en niet coöperatief.

Nadere definitie: Bij opdracht eerst niets zeggen, weigeren en bij aandringen verbale agressie (schelden). Ter bepaling van frequentie van voorkomen werd vóór en na de behandeling ieder eerste kwartier van elk uur vastgesteld of en hoe vaak het niet-coöperatieve gedrag optrad.

(3) *Doelgedrag:* Reductie van niet-coöperatief gedrag (zoals gedefinieerd in de GOCC), opdracht uitvoeren zonder protest.

(4) *Behandelingsplan:*

1e. Het probleemgedrag modificeren door onthouding van bekrachtiging (aandacht) bij niet-coöperatief gedrag en het geven van bekrachtiging bij coöperatief gedrag.

2e. Het geleidelijk aan verhogen van allerlei eisen, die door de omgeving aan patiënte kunnen worden gesteld eveneens door gebruik te maken van bekrachtiging.

3e. Bekrachtiging vindt in eerste instantie plaats door zg. sociale bekrachtiging. Dit geschiedt op basis van een continu bekrachtigingsschema. Geleidelijk aan wordt overgegaan op andere vormen van bekrachtiging op intermitterende basis.

4e. Het ondernemen van generalisatiepogingen. Patiënte diende niet slechts coöperatief te reageren op het directe behandelend personeel, maar eveneens op het gedrag van andere personeelsleden en patiënten.

(5) *Uitvoering:* (Stap 1) Aangezien het probleemgedrag intermitterend werd bekrachtigd werd overgegaan tot „relatief isolement” d.w.z. isolering van patiënt op een éénpersoonskamer. Om het half uur werd patiënte bezocht door een der leden van het behandelingsteam (dat ondertussen uit 15 personen bestond). Ieder van hen presenteerde bij binnenkomst de diskriminatieve stimulus (opdracht, opmerking, kritiek). Indien patiënte daarop probleemgedrag manifesteerde werd direct (zonder agressief vertoon) de kamer verlaten. Indien patiënte de opdracht of kritiek aanvaardde werd dit „beloond” met een kort gesprek en een token.

N.B. Van te voren was aan patiënte de doelstelling uitgelegd, ongeveer als volgt: „We vinden dat je je niet zo leuk gedraagt t.o.v. andere mensen, we willen je helpen anders te worden. Dat doen we op de volgende manier. . .”

(Stap 2) De eisen die aan patiënte gesteld werden, geraakten geleidelijk aan op een complexer of hoger niveau. In eerste instantie waren deze gericht op het bewerkstelligen van enige zelfverzorging, maar geleidelijk aan kwam het onderhoud van de kamer erbij, inclusief allerlei taken die door onderwijs, arbeids- en bezigheidstherapie konden worden verstrekt.

(Stap 3) Sociale bekrachtiging werd op een gegeven moment vervangen door tokens, die op het eind der dag ingewisseld konden worden voor persoonlijk aantrekkelijke goederen of gebeurtenissen. Het continu bekrachtigingsschema maakte plaats voor een regelmatig en tenslotte een onregelmatig intermitterend bekrachtigingsschema.

(Stap 4) Eerst had patiënte alleen contact met de therapeuten in haar kamer. Geleidelijk

aan werd dit zowel qua aktieradius als ook qua verscheidenheid aan „kontaktpersonen” uitgebreid. Als afsluiting van de behandeling volgde een periode waarin patiënte volledig bepaalde wat zij zou gaan doen (afgezien van vaste therapieën e.d.), de systematisch geplande bekrachtiging bleef achterwege. Eveneens werd in deze periode de eindassess- ment van het probleemgedrag ondernomen.

(6) *Probleemassessment:*

- n = aantal malen probleemgedrag gesommeerd over 15 observatiekwartieren per dag
 t = tijd in dagen
 x = voor behandeling
 o = na behandeling

(7) *Procesassessment:*

n = aantal malen probleem, resp. aangepast gedrag over 28 kontakten per dag
 t = tijd in weken
 — = probleemgedrag
 ---- = aangepast gedrag

(8) *Effektaassessment:*

s = GOCC-score
 i = GOCC-item
 x = vóór behandeling
 o = na behandeling

PO: niet testbaar (zie verzameltabel, bijlage 4)

(9) *Resultaten:*

- Probleemassessment: Afname van 6,5 naar 1,0 als gemiddelde van 15 observatiekwartieren per dag, genomen over een week ($\pm 80\%$).
- Procesassessment: afname probleemgedrag gerealiseerd in ca. 7 weken relatief isolement. Aangepast gedrag nam toe.
- Effektaassessment: afname van meer dan één puntsscore op de items 7, 10 en 11 (resp. opdringerig gedrag, slordigheid, niet coöperatief).

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♀, 20 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 3 jaar en 9 maanden
- duur coma: 2 maanden
- stamcontusio
- gedragsproblemen volgens GOCC, geheugen- en concentratiestoornissen, intelligentie onder het gemiddelde.

(2) *Probleemgedrag:* patiënte zou vroeger kleptomanie vertoond hebben. In het centrum werd deze kleptomanie geleidelijk aan meer manifest. Tegelijkertijd hiermee presenteerde zich op de GOCC niet-coöperatief gedrag. De moeilijkheid hierbij was dat (de frekwentie of intensiteit van) het kleptomane gedrag uiteraard niet zo eenvoudig vast te stellen was. Patiënte had direct in de gaten als ze geobserveerd werd en verdween dan. Het was wel (enigszins) mogelijk de frekwentie van het niet-coöperatieve gedrag vast te stellen. Geteld werd het aantal malen dat een verzoek of opdracht werd geweigerd.

(3) *Doelgedrag:*

- (a) Afname van niet-coöperatief gedrag, toename van akseptatie en uitvoering van opdrachten.
- (b) Ten aanzien van het kleptomane gedrag was het moeilijk het doelgedrag meetbaar vast te stellen. Als mogelijk doelgedrag werd geformuleerd het „onbelangrijk gaan vinden” van de objecten waarvan werd aangenomen dat patiënte deze veelvuldig bij andere patiënten wegnam. Dit waren voornamelijk sigaretten, snoep en koffie.

(4) *Behandelingsplan:* Aangezien het kleptomane gedrag volgens allerlei mededelingen vrij grote vormen aannam, was het niet goed mogelijk patiënte vrij te laten rondlopen. Met toestemming van haar ouders werd patiënte onder relatief isolement gesteld.

- (a) Het niet-coöperatief gedrag werd in het behandelingsplan betrokken doordat ieder half uur een medewerker de kamer binnen ging. Patiënte kreeg dan een nieuwe opdracht waarvan de moeilijkheidsgraad geleidelijk aan werd verhoogd. Indien deze opdracht zonder commentaar werd uitgevoerd, dan gold langer sociaal contact als bekrachtiging. Later zou dit vervangen worden door tokens, waarvoor patiënte bepaalde genoegens of privileges kon „kopen”. Bij niet-coöperatief gedrag werd de kamer direct verlaten.

- (b) Het onbelangrijk gaan vinden van snoep, sigaretten, koffie werd getracht te realiseren door deze goederen in werkelijk ongelimiteerde hoeveelheid in de kamer aanwezig te doen zijn. Er werd echter wel van patiënte verwacht, dat ze op een lijst zou aangeven hoeveel zij van de desbetreffende artikelen geconsumeerd had. Deze consumptie werd (buiten de kamer van patiënte) eveneens bijgehouden door de verpleging. Indien het aantal door patiënte aangegeven artikelen overeenkwam met het aantal dat door de verpleging werd genoteerd, dan betekende dit voor patiënte extra sociale bekrachtiging en/of tokens. Gehoopt werd dat hierdoor de patiënte op den duur de consumptieartikelen op zich wat minder belangrijk zou gaan vinden en meer waarde zou gaan hechten aan „eerlijk” gedrag, dat werd bekrachtigd.

(5) *Uitvoering:* Het niet-coöperatieve gedrag verdween vrijwel onmiddellijk. Moeilijkheden werden echter ondervonden in de juiste vermelding van de geconsumeerde artikelen. Het getal dat patiënte aangaf bleek steeds ver onder het getal te liggen dat de verpleging had aangegeven. In verband met gekonstateerde geheugenstoornissen was het niet duidelijk in hoeverre dit verschil mede bepaald werd door deze defekten. Er bleek een duidelijke afname te constateren in de hoeveelheid snoepgebruik, echter de consumptie van sigaretten en koffie ging gewoon verder. Tegelijkertijd manifesteerde zich onder medewerkers protest tegen zogenaamd manipuleren van mensen, hersenspoeling en dehumanisatie. Dit werd extra geaksentueerd doordat patiënte op verzoek van een therapeut een opstel had gemaakt, waarin met name concepten als „eenzaamheid”, „opsluiting” e.d. naar voren bleken te komen. Aangezien het niet-coöperatieve gedrag was afgenomen en men zich

geleidelijk aan ging afvragen of de kleptomanie destijds wel inderdaad aanwezig was geweest, was er weinig reden om het zo zwaar beladen relatieve isolement nog langer te laten voortduren. Patiënte werd derhalve abrupt wederom bewegingsvrijheid teruggegeven. Dit betekende echter dat de frekwente bemoeienis met haar ook teneinde was, er werd geen of nauwelijks meer sociale bekrachtiging gegeven en snoep, sigaretten en koffie waren niet meer ongelimiteerd toegankelijk. Opnieuw manifesteerde zich diverse probleemgedragingen (zie effectassessment in verzameltabel, bijlage 4). Verwijzingen naar psychiatrische centra werden wel overwogen, maar bleken - vermoedelijk door haar dubbele handicap - niet te realiseren.

(9) *Resultaten:*

(a) Probleemassessment: werd vanwege abrupte beëindiging van het programma niet gerealiseerd.

(b) Procesassessment: Afname van niet-coöperatief gedrag binnen één week. Wegens onvoldoende definitie van en controle op „kleptomaangedrag” is hierover geen evaluatie mogelijk.

(c) Effectassessment: (zie verzameltabel, bijlage 4): Heropleving van probleemgedrag in dezelfde en andere vormen.

Algemeen: totaal echec.

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♂, 15 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 3½ maand
- duur coma: 5½ week
- stamcontusio en hemiplegie rechts
- redelijke intelligentie, enige geheugenstoornissen, maar voornamelijk concentratiestoornissen. Behoorlijke gedragsproblematiek volgens GOCC.

(2) *Probleemgedrag:* Na herhaalde GOCC-observatie bleek de meest hoge score (en subjectief meest hinderlijke gedrag) het zgn. „kleven” te zijn. D.w.z. frekwent aandacht vragen „autoriteiten aanklappen” om vragen te stellen waarbij dan nogal veel moeite werd ondervonden om het onderhoud af te breken.

Dit probleemgedrag was tamelijk eenvoudig te objectiveren en te kwantificeren. Gedurende het eerste kwartier van ieder uur werd gezorgd dat een observator zich in de buurt van patiënt bevond, waarbij deze naging hoe frekwent patiënt het woord richtte tot een personeelslid. Deze observatie werd gedurende 5 dagen vóór en na de behandeling uitgevoerd (15 observatiekwartieren per dag).

(3) *Doelgedrag:* Afname van „vragen stellend gedrag aan autoriteit” en toename van de tijd waarin geen vragen gesteld worden. Nadere specificatie: patiënt moet in staat zijn vraagstellend gedrag 3 uur na te laten.

(4) *Behandeling:* Poging tot beïnvloeding van het „kleefgedrag” op basis van kontraktmanagement. Deze patiënt R-3 werd dus niet onder relatief isolement gesteld, maar wel bijzonder nauwlettend geobserveerd. Met de patiënt werd afgesproken dat hij aan het eind van ieder uur 5 minuten de gelegenheid kreeg tot vragen stellen. Was hij het overige deel van het uur in staat geweest aan het werk te blijven zonder informatie te stellen, dan werd dit bekrachtigd met een token. Bij een bepaald aantal kon aan het eind der week inruiling plaats vinden voor een meer specifieke bekrachtiging. Het personeel van het behandelings-team negeerde het kleefgedrag tijdens de afgesproken „niet-vraag-periode” door gewoon door te lopen (ook dit was aan patiënt megedeeld). Tijdens de 5 minuten vraagperiode mocht het behandelings-team antwoord geven, maar in elk geval kreeg patiënt na 55 succesvolle minuten zijn token en een compliment. De niet-vraag-periode zou in vier niveaus omhoog gebracht worden tot het doelgedrag van 3 uren was bereikt. Gesprekken met patiënten vielen uiteraard buiten het criterium.

(5) *Uitvoering:* Tijdens de behandeling werden geen problemen ondervonden. Patiënt kon overal vrij rondlopen. Er werd konsekvent genegeerd en bekrachtigd. Duur van de behandeling: 4 weken. Per dag werd patiënt gedurende zijn therapie-uren (5 uur per dag) geobserveerd.

(6) Probleemassessment:

n = aantal malen probleemgedrag (kleven) gesommeerd over 15 observatiekwartieren (per dag)
 t = tijd in dagen
 x = vóór behandeling
 o = na behandeling

(7) Procesassessment:

t = tijd in weken
 n = aantal probleemgedrag (x) gesommeerd over 5 uren observatie per dag
 x = vragen gesteld in „verboden” periode
 o = niveau „stille” periode
 sp = stille periode in uren

(8) *Effektassessment:*

x = voor behandeling
 o = na behandeling
 s = PO-score

(9) *Resultaten:*

(a) Probleemgedrag: afname van 13,6 maal aandacht vragen aan „autoriteiten” (verpleegkundigen, therapeuten e.d.) als gemiddelde over 15 observatiekwartieren per dag naar 2,0 ($\pm 85\%$).

(b) Procesassessment: doelgedrag gerealiseerd in 4 weken.

(c) Effektassessment:

GOCC: afname van één puntscore op de items 5, 7, 12 en 16 (resp. onzelfstandigheid, zich opdringend gedrag, onrustig ontremd gedrag en ongemotiveerdheid).

PO: afname van > één puntscore op geheugen (recall auditief en visueel) en concentratie (tempo, regelmaat en fouten).

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♂, 3 jaar en 7 maanden
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 6 weken
- duur coma: 6 weken
- stamcontusio
- psychologisch onderzoek: gemiddelde intelligentie, geen uitgesproken geheugenstoornissen, enigszins verminderde concentratie. GOCC: enige gedragsbelemmeringen.

(2) *Probleemgedrag:* Signalering van probleemgedrag vond ad hoc plaats door ouders, diverse therapeuten en verpleegkundigen. Het bestond uit weglopen van patiënt tijdens wandelingen buiten het therapiegebouw en het ouderlijk huis. Dit leverde uiteraard aanzienlijke problemen op, aangezien patiënt geen aandacht besteedde aan het verkeer. Het probleemgedrag werd door ouders en therapeuten continu bekrachtigd aangezien deze bij dit weglopen patiënt eerst probeerden te roepen en hem vervolgens achterna liepen. Voor patiënt werd het een aantrekkelijk spelletje, echter met niet te onderschatten gevaren. *Objektivering van probleemgedrag:* Het aantal malen dat patiënt wegliep en niet reageerde op „kom terug” gesteld over een vol uur wandelen met patiënt. Dit werd vóór en na de behandeling vastgesteld.

(3) *Doelgedrag:* Afname van „wegloop-gedrag” en toename van „terugkom-gedrag” na opdracht hiertoe.

(4) *Behandelingsplan:*

Fase 1: Een uur wandelen per dag, waarbij patiënt in een soort tuigje liep. Patiënt mocht vrij rondlopen maar als de afstand tot de begeleider te groot werd (meer dan 10 meter) werd „kom terug” geroepen. Er werd gekeken of dat gebeurde en zo niet, dan werd patiënt teruggehaald. Indien patiënt na de opdracht terugkwam, ontving hij sociale bekrachtiging en een snoepje. Fase 1 voltrok zich in de buurt van het revalidatiecentrum en duurde ongeveer één week.

Fase 2: Een uur wandelen per dag, waarbij tuigje ontbrak. Als patiënt zich meer dan 10 meter uit de buurt van begeleidster bevond werd éénmaal „kom terug” geroepen. Deed hij dit dan volgde bekrachtiging. Deed hij dit niet, dan ging de therapeut weg en keek niet meer naar patiënt om. Therapeut liep naar binnen en bleef vanuit, niet voor patiënt zichtbare, plek naar patiënt kijken. Duur fase 2 ca. 3 weken.

Fase 3: Een uur wandelen in het weekend thuis, zonder tuigje echter in gevaarlose rustige omgeving. Bij weglopen reageerden de ouders overeenkomstig de therapeuten in fase 2 (twee weekenden en wel het voorlaatste en het laatste weekend van fase 2).

Fase 4: Identiek aan fase 3 echter in wat drukker omgeving.

Fase 5: Afbouw d.m.v. intermitterende bekrachtiging.

N.B. De ouders werden in hun activiteiten begeleid door een non-professional, die als model voor de ouders fungeerde en op de hoogte was van de gedragstherapeutische principes.

(5) *Uitvoering:* De fasen werden volgens plan afgewerkt. Er traden geen buitensporige moeilijkheden op. De overdracht naar de thuissituatie was één der eerste pogingen om te werken met een non-professional. Dat bleek succesvol.

(6) *Probleemassessment:*

(7) *Procesassessment:*

Werd niet uitgevoerd echter de fasen konden in de geplande volgorde en tijdsduur worden afgewerkt.

(8) *Effektassessment:*

i = GOCC-item
 s = GOCC-score
 x = vóór behandeling
 o = na behandeling

PO: geen voor- of achteruitgang in psychologisch onderzoek (zie verzameltabel, bijlage 4)

(9) *Resultaten:*

- (a) Probleemassessment: Afname van probleemgedrag van gem. 2,6 naar 0 (100%)
- (b) Procesassessment: Doelgedrag binnen voorgenomen tijd gerealiseerd.
- (c) Effektassessment: Geen afnames van éénpuntsscore waarneembaar.
 Enige vermindering op GOCC-items 2, 7, 11, 12 en 14.
 Enige toename op GOCC-items 4 en 5.

(1) *Patiëntgegevens:*

- σ , 12 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 4 maanden en 24 dagen
- duur coma: 4 maanden
- contusio cerebri
- psychologisch onderzoek: intelligentie onder het gemiddelde, ernstige geheugenstoornissen en concentratiestoornissen. Op meer GOCC-observatie-items hoge scores.

(2) *Probleemgedrag:* Ad hoc signalering. Er werden met name vanuit de verpleegkundige sektor diverse gedragsproblemen gesignaleerd zoals: bemoeizucht, agressiviteit, inactiviteit, niet coöperatief, bemoeit zich storend met personen, stompen en slaan van andere kinderen. GOCC-observatie (zie effectassessment) ondersteunde deze gegevens.

Uit deze variëteit aan probleemgedragingen werd „hinderlijk” gedrag geselecteerd, gedefinieerd als: (a). Het aantal malen per dag, geobserveerd ieder eerste kwartier van elk uur, dat patiënt zich met woorden richt tegen personen die met iets bezig zijn met het doel dit te verstoren. (b). Het aantal malen dat patiënt met anderen begint te vechten wederom geobserveerd over 15 observatiekwartieren per dag.

(3) *Doelgedrag:* Afname van „hinderlijk gedrag” zoals gedefinieerd. Toename van (x): Het zich niet bemoeien met twee personen, maar (zelfstandig) alleen verder door spelen of lopen. (y): Aantal malen dat patiënt zich, zonder te vechten, bezighoudt met leeftijdsgenoten.

(4) *Behandelingsplan:* Aangezien patiënt de oudste was op een kinderafdeling en hierdoor o.a. moest aanzien dat de meeste aandacht naar jongere kinderen uitging, werd gemeend dat gemis aan aandacht mede een rol zou kunnen spelen in zijn gedrag. Vanuit de veronderstelling dat het hinderlijke gedrag een middel was om meer aandacht te krijgen werd hij na één observatieweek overgeplaatst naar een afdeling voor volwassenen, waar aan een ieder ongeveer evenveel aandacht wordt besteed.

Na een acclimatisatieperiode van 2 weken zou een nieuwe observatie komen.

(5) *Uitvoering:* Deze vond plaats zoals in behandelplan genoemd: 1 week probleem observatie (frekwentie) – 2 weken op volwassen afdeling – 1 week probleemfrekwentie observatie op volwassenafdeling.

(6) *Probleemassessment:*

- n = aantal malen probleemgedrag over 15 observatiekwartieren per dag
 t = tijd in dagen
 x = vóór overplaatsing
 o = na overplaatsing

(7) *Procesassessment:*

Niet uitgevoerd. Dit werd als tamelijk overbodig gezien, daar het (voorlopige) plan alleen bestond uit overplaatsing naar een andere afdeling d.w.z. in concreto het wegnemen van de veronderstelde diskriminatieve stimulus.

(8) *Effektassessment:*

i = GOCC-item

s = GOCC-score

x = voor behandeling

o = na behandeling

PO geen veranderingen (zie verzameltabel, bijlage 4)

(9) *Resultaten:*

(a) Probleemassessment: Na overplaatsing nam probleemgedrag af tot 0 (100%)

(b) Procesassessment: doelgedrag niet gecontroleerd. Er werd gelet op het probleemgedrag en *niet* op de toename van ander (incompatibel gedrag). Een en ander is niet verwonderlijk aangezien men in een setting als een revalidatiecentrum al blij is wanneer alles een beetje rustig en soepel verloopt.

(c) Effektassessment: Afname van éénpuntscore op 7 en 13 (resp. opdringerig en agressief gedrag).

Algemeen: Afname van probleemgedrag na wegname van de veronderstelde diskriminatieve stimulus. Of hierdoor meer sociaal gedrag gestimuleerd of aangeleerd is kunnen worden, werd niet nagegaan.

(1) *Patiëntgegevens:*

- ♂, 52 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: onbekend
- duur coma: onbekend
- contusio cerebri
- op 3 criteria der GOCC vrij hoge scores. Psychologisch onderzoek: gemiddelde intelligentie, nauwelijks geheugen- en concentratiestoornissen.

(2) *Probleemgedrag:* Een der revalidatiedoeleinden voor deze patiënte was het leren lopen met een „vierpoot”. Tijdens de training toonde patiënte de neiging om te vallen, waarmee zij steeds tijdige opvang van de fysiotherapeut stimuleerde. Fysiotherapeutisch werd patiënte echter wel in staat geacht dit lopen met vierpoot te realiseren.

Ook op de gangen en in het dagverblijf manifesteerde zich hetzelfde gedrag. Patiënte liet zich dan tegen de muur aanvallen – zo was althans de opvatting – en de betreffende verpleegkundige haastte zich om haar op te vangen. Als probleemgedrag werd op advies der fysiotherapie geselecteerd „het aantal opvangpassen naar links, rechts en achter” dat patiënte uitvoerde teneinde haar balans weer te verkrijgen over een afstand van 250 meter (heen en terug).

Gedurende een week vóór en na de behandeling werd ieder eerste kwartier van elk uur dit aantal opvangstappen vastgesteld.

(3) *Doelgedrag:* Het kunnen lopen van 250 meter heen en terug zonder opvangstappen.

(4) *Behandelpplan:* Het negeren van de valneigingen, zonder pogingen te ondernemen om patiënte op te vangen en bovendien zelfs zonder enige notitie van de aarzelende opvangpassen. Daarentegen zou getracht worden het normale lopen regelmatig met belangstelling en waarderende woorden te bekrachtigen. Als twee parallel lopende programma's werden ontworpen:

a. fysiotherapie: looptraining gedurende 14 dagen, iedere dag 2×10 min. In deze 10 minuten zou patiënte de afstand van 250 meter moeten afleggen zowel heen als terug. De fysiotherapeut zou hierbij naast haar lopen, maar niet ingrijpen bij valneiging daarentegen wel het aantal opvangpassen tellen.

b. Verpleegkunde: gedurende dezelfde 14 dagen zou eenmaal in ieder half uur gekeken worden of patiënte zich verplaatste. Gedurende 10 minuten zou de verpleegkundige naast of in de buurt van patiënte gaan lopen. Zij zou op geen enkele wijze reageren op valneigingen, maar haar daarentegen wel bemoedigen als patiënte zich minstens 20 meter zonder valneigingen had voortbewogen. Ook door haar werd het aantal opvangpassen gescoord.

(5) *Uitvoering:* Bij verpleging manifesteerde zich de eerste dagen een sterke toename van valneigingen. Het was uitermate moeilijk niet te reageren op de verwijten, het steunen en klagen van patiënte. Van werkelijk vallen was echter nimmer sprake. De grafiek toonde een duidelijke afname na enkele dagen. Fysiotherapie begon 4 dagen nadat de verpleging was begonnen. Hier toonde zich geen toename van valneigingen, maar een gestage afname tot uiting komend in vermindering van het aantal opvangpassen. Na 2 weken was de behandeling voltooid.

(6) Probleemassessment:

n = aantal opvangstappen, geobserveerd over 15 observatiekwartieren per dag en wel over een lengte van ca. 250 meter

N.B. Patiënte werd in deze observatiekwartieren slechts gemiddeld $4 \times$ lopende aangetroffen

t = tijd in dagen

x = vóór behandeling

o = na behandeling

n
↑

(7) Procesassessment:

t = tijd in dagen

n = aantal opvangstappen

x = aantal opvangstappen per 10 observatieminuten, gemiddeld per dag over ± 250 meter geobserveerd door verpleging

Δ = aantal opvangstappen per 10 observatieminuten gemiddeld per dag over 250 meter, geobserveerd door fysiotherapie

(8) *Effektassessment:*

i = GOCC-item

s = GOCC-score

x = vóór behandeling

o = na behandeling

PO geen verandering (zie verzameltabel, bijlage 4)

(9) *Resultaten:*

(a) Probleemassessment: Afname probleemgedrag van gemiddeld 27,6 naar 0 opvangstappen, vastgesteld over 4 observatiekwartieren per dag, waarbij patiënte ongeveer 250 m liep met vierpoot (afname van 100 %).

(b) Procesassessment: Doelgedrag gerealiseerd. Na 15 dagen werden vrijwel geen opvangstappen geconstateerd over 10 minuten observatie, waarbij patiënte dus 250 meter (bij benadering) aflegde.

(c) Effektassessment: Afname van 1 puntsscore of meer bij de items 2, 5 en 7 (resp. angstig gedrag, onzelfstandigheid, zich opdringend aan omgeving). De gehele GOCC is tamelijk normaal (dus „aangepast”) te noemen.

- (1) *Patiëntgegevens:*
 - ♀, 16 jaren
 - tijd trauma tot opname in centrum: 3½ maand
 - duur coma: 1 week
 - contusio cerebri, hemiplegie rechts en partiële afasie
 - psychologisch onderzoek: geheugenstoornissen. GOCC; enkele gedragsbelemmeringen
- (2) *Probleemgedrag:* Opvallende criteria volgen GOCC: slordigheid en ongemotiveerdheid. Vooral de slordigheid zou voor verpleging een tamelijk probleemgedrag genoemd kunnen worden. Echter het was met name een opgave tot objectivering van dit probleemgedrag te komen. Er konden alleen enkele vage criteria verzameld worden als: „laat kleren overal slingeren, trekt haar kleren maar half aan” e.d. Bovendien werd deze slordigheid niet direct als „revalidatiebelemmerend” ervaren. Toch bestond er behoefte aan gedragsmodificatie in deze; omschrijving en kwantificering van probleemgedrag werden echter niet uitgewerkt.
- (3) *Doelgedrag:* Afname van slordigheid, gedefinieerd als „het niet meer laten slingeren van allerlei artikelen”.
- (4) *Behandelingsplan:* Alle artikelen, die patiënte niet op de juiste plaats zou neerleggen, werden door de verpleging weggeborgen. Zij kon deze artikelen echter „terug verdienen” door haar bed en kamer op te ruimen.
- (5) *Uitvoering:* Exacte definiëring en assessmentuitvoering van het probleemgedrag werden nagelaten.
- (6) *Probleemassessment:* Niet gerealiseerd. Men kan slechts afgaan op subjectieve beweringen.
- (7) *Procesassessment:* Geen duidelijk gefaseerd plan, gericht op onduidelijk probleemgedrag, onbekende bekrachtiging enz. enz. Duur: bij benadering 3 weken.
- (8) *Effektassessment:* Zie verzameltabel, bijlage 4. Geen vooruitgang op GOCC en PO.
- (9) *Resultaten:* Geen
Vermoedelijke oorzaken:
 - 1e. Geen duidelijke definitie en kwantificering van probleemgedrag.
 - 2e. Geen duidelijke doelstelling, mede doordat het probleemgedrag niet als „revalidatiebelemmerend” werd ervaren.
 - 3e. De afwezigheid van een systematische planning en uitvoering.

3.3.6. Bespreking der resultaten

De behandeling van niet contusio cerebri patiënten had wat betreft de behandelingsstrategie betrekking op:

- a. De Vorming van nieuw gedrag, 2 patiënten (2 V)
- b. Het doen Toenemen van reeds bestaand gedrag, 3 patiënten (3 T)
- c. Reduktie van excessief gedrag, 7 patiënten (7 R)

Het aantal (12) patiënten is beperkt.

Aan de voorwaarden voortvloeiend uit het principe van experimentele-versus controlegroep ter statistische toetsing kan niet voldaan worden.

Pogingen hiertoe zijn ondernomen, maar het bleek dat in het algemeen „probleempatiënten” te snel ontslagen werden om daaruit een controlegroep te kunnen vormen.

Eveneens was het gezien de algemeen ethische doelstelling van het behandelingsproces niet mogelijk een A-B-A-design volgens de N = 1 methode te realiseren. Wellicht voldoet de benaming A-B-C-A-design.

A-konditie: Observatie gedurende ca. 4 weken d.m.v. GOCC, bepaling van het probleemgedrag en de frekwentie daarvan en het psychologisch onderzoek. In deze periode werd getracht behandelingspogingen door individuele werkers te voorkomen. Men kan aannemen dat in deze periode een intermitterende bekrachtigingsprocedure werd gehanteerd, zowel van gewenst als ongewenst gedrag.

B-konditie: Deze bestond uit selectieve bekrachtiging van nieuw te vormen gedrag en extinktie van probleemgedrag. Bij alle gedragsbehandelingen werden deze beide modifikatietechnieken gepraktiseerd, zij het met verschil in de mate van extinktie. Het sterkst werd deze extinktie toegepast bij de reductie van gedragsbelemmeringen, welke immers eerst moesten worden genegeerd om „plaats te krijgen” voor het optreden van adequaat gedrag, dat dan konsekwent moest worden bekrachtigd. De gehele procedure bij de gedragsreductie was ook een aangelegenheid die min of meer 24 uur per etmaal moest worden volgehouden.

Bij de gedragsvorming en gedragstoename lag het aksent vooral op de selectieve bekrachtiging, waarbij ongewenst, „te kort schietend” gedrag niet werd bekrachtigd. De procedure strekt zich ook niet uit tot een „kontinue” behandeling, maar werd alleen uitgevoerd op regelmatige therapiesessies. Bij alle modifikaties werd doorlopend een konsekwent bekrachtigings- en extinktieschema toegepast.

C-konditie: Overgang van kontinue bekrachtiging van gewenst gedrag en extinktie van niet-gewenst gedrag naar intermitterende bekrachtiging van gewenst gedrag en blijvende kontinue extinktie van ongewenst gedrag.

A-konditie: Observatie gedurende 2 weken d.m.v. GOCC, bepaling van de frekwentie van het probleemgedrag en afsluitend psychologisch onderzoek. Voorzover er bekrachtiging werd gegeven voor het gewenste gedrag was dit op intermitterende basis. Er wordt verondersteld dat bekrachtiging van het eventueel optredend ongewenste gedrag in deze periode eveneens optrad op intermitterende basis.

Het enige verschil met het A-B-A-design is dus de introductie van de C-konditie, waarbij a.h.w. „voorzorgen” werden getroffen dat het gewenste gedrag zou blijven voortduren, zonder optreden van ongewenst gedrag. Ter verdere bespreking der resultaten wordt derhalve uitgegaan van de volgende overwegingen:

- 1e. Het A-B-C-A-design was aanwezig bij gedragsreductie, gedragsvorming en de toename van gedrag (resp. de R-V- en T-patiëntengroep).
- 2e. Bij alle modifikatieprocedures werd gebruik gemaakt van extinktie en selectieve bekrachtiging.

Op grond van deze overwegingen zijn de drie subgroepen, totaal 12 patiënten, als één groep beschouwd ter statistische bewerking.

3.3.6.1. Rekenkundige bewerking der resultaten

Een overzicht van de verkregen resultaten kan als volgt worden weergegeven (zie eventueel bijlage 4).

(a) Probleemassessment:

- D.m.v. nieuwe gedragsvormingsprocedure: afname van probleemgedrag bij 2 van de 2 V-patiënten.
- D.m.v. gedragstoenameprocedure: afname van probleemgedrag bij 3 van de 3 T-patiënten.
- D.m.v. gedragsreductieprocedure: afname van probleemgedrag bij 5 van de 7 R-patiënten.

De percentages van de afneming van probleemgedrag zijn als volgt:

V 1: 94 % V 2: 100 %

T 1: 60 %; T 2: 60 %; T 3: 100 %

R 1: 80 %; R 2: geen eind probleemassessment uitgevoerd; R 3: 85 %; R 4: 100 %; R 5: 100 %; R 6: 100 %; R 7: mislukte behandeling.

Algemeen: Vermindering van probleemgedrag bij 10 van de 12 patiënten met een gemiddelde afname bij de succesvolle patiënten van circa 85 % vanaf de beginwaarde.

(b) Procesassessment.

De gemiddelde observatietijd per patiënt bedroeg vóór de behandeling 4 weken en na de behandeling 2 weken. De totale observatietijd bedroeg gemiddeld per patiënt 6 weken.

De gemiddelde behandelingsduur bij de succesvolle patiënten bedroeg 6 weken. Dit betekent dus dat aan een succesvol behandelde patiënt gemiddeld 12 weken observatie en behandeling werd besteed.

(c) Effectassessment.

Psychologisch onderzoek: geen afname van PO-scores (dus geen verbetering) bij 11 patiënten. Alleen patiënt R 3 toont na afloop van de poging tot reductie van het „vragenstellend gedrag” een duidelijke toename op de concentratietests.

Een verklaring voor de afwezigheid van verbetering bij de overige patiënten zou kunnen bestaan uit de overweging dat de behandelingsprocedure niet expliciet gericht was op de verbetering van de prestaties, zoals deze diagnostisch werden bepaald.

GOCC: Alle patiënten op één na tonen een verbetering der GOCC-scores bij vergelijking vóór en na de behandeling. patiënt R 2 toont een toename, d.w.z. een verhoging van gedragsbelemmeringen van +5,0 puntscores. De gemiddelde verbetering op de GOCC is voor de overige 11 patiënten 6,2 puntscores. Deze gemiddelde verbetering is het grootst bij de 3 T patiënten nl. 11,5; bij de 6 R patiënten (behalve R 2 dus) is deze 4,4; bij de 2 V patiënten 3,8 puntscores.

3.3.6.2. Statistische bewerking der resultaten.

(zie bijlage 4)

Hoewel er geen statistische bewerking over een experimentele therapiegroep en een controle-, niet-therapiegroep, mogelijk was lenen de scores der patiënten vóór en na de behandeling zich wel voor statistische toetsing. Het zijn met name de GOCC-scores van de effectassessment, die voor zulk een toetsing in aanmerking komen.

Deze scores zijn – zoals dit ook bij de beoordelaarsbetrouwbaarheid gebeurde – aan een aantal voorbereidingen onderworpen.

Deze voorbereiding bestaan uit enerzijds sommatie der GOCC-scores over de patiënt per GOCC-item apart, anderzijds sommatie der GOCC-score over de GOCC-items per patiënt apart.

In verband met de verschillende gedragsdeviaties en de daar op betrekking hebbende modifikatieprocedures is onderscheid gemaakt in drie verzamelingen:

- Patiënten met gedragstekorten: de Patiënten V 1, V 2, T 1, T 2 en T 3.
- Patiënten met gedragsexcessen: De patiënten R 1 t/m R 7.
- Alle patiënten met gedragsdeviaties tesamen: de patiënten V 1, V 2, T 1, T 2, T 3, R 1 t/m R 7.

De algemene verwachting, reeds vanuit de rekenkundige bewerking is, dat de GOCC-scores afnemen na de behandeling. Het is hierbij echter de vraag of het verschil vóór en na de behandeling significant is en zo ja, onder welke voorbereiding der scores en voor welke patiëntenverzameling. De volgende nul-hypothesen werden geformuleerd.

- H_0-T_1 : Er bestaat geen verschil in de gemiddelden der [GOCC-scores] vóór en na de behandeling
- voor de patiëntenverzameling met gedragstekorten
 - indien deze [GOCC-scores] tot stand zijn gekomen door sommatie der GOCC-scores over de patiënten met gedragstekorten per GOCC-item apart.
- H_0-E_1 : Er bestaat geen verschil in de gemiddelden der [GOCC-scores] vóór en na de behandeling
- voor de patiëntenverzameling met gedragsexcessen
 - indien deze [GOCC-scores] tot stand zijn gekomen door sommatie der GOCC-scores over de patiënten met gedragsexcessen per GOCC-item apart.
- H_0-D_1 : Er bestaat geen verschil in de gemiddelden der [GOCC-scores] vóór en na de behandeling
- voor de patiëntenverzameling met gedragsdeviaties (d.w.z. gedragstekorten en gedragsexcessen)
 - indien deze [GOCC-scores] tot stand gekomen zijn door sommatie der GOCC-scores over de patiënten met gedragsdeviaties per GOCC-item apart.
- H_0-T_2 : Er bestaat geen verschil in de gemiddelden der [GOCC-scores] vóór en na de behandeling
- voor de patiëntenverzameling met gedragstekorten
 - indien deze [GOCC-scores] tot stand zijn gekomen door sommatie der GOCC-scores over alle GOCC-items per patiënt met gedragstekorten.

- H_0-E_2 : Er bestaat geen verschil in de gemiddelden der [GOCC-scores] vóór en na de behandeling
- voor de patiëntenverzameling met gedragsexcessen
 - indien deze [GOCC-scores] tot stand zijn gekomen door sommatie der GOCC-scores over alle GOCC-items per patiënt met gedragsexcessen.
- H_0-D_2 : Er bestaat geen verschil in de gemiddelden der [GOCC-scores] vóór en na de behandeling
- voor de patiëntenverzameling met gedragsdeviaties
 - indien deze [GOCC-scores] tot stand zijn gekomen door sommatie der GOCC-scores over alle GOCC-items per patiënt met gedragsdeviaties.

Toetsing van deze nulhypothese zal plaats vinden aan de hand van de t-toets voor het geval van een gepaarde steekproef (vóór en na de behandeling) (Spitz 1968 p 308).

Verwerping der nulhypothese zal plaatsvinden indien de aldus berekende toetsingsgrootte significant is bij $\alpha = 0,01$ en een éézijdige overschrijdskans.

Ter verduidelijking van de toetsing zijn per nulhypothese de scores na voorbereidingen per patiëntenverzameling alsmede met de verkregen resultaten in bijlage 5 samengevoegd. (De kritieke grenzen zijn betrokken van Pearson c.s. 1956.)

Uit bijlage 5 blijkt dat 4 van de 6 nulhypotheseën kunnen worden verworpen.

Onder akseptatie van een significantieniveau van $\alpha = 0,01$ eenzijdig getoetst geldt:

- 1e. Voor alle verschillende patiëntenverzamelingen is er een significant verschil wat betreft gemiddelden der [GOCC-scores] indien deze [GOCC-scores] tot stand zijn gekomen door sommatie der oorspronkelijke GOCC-scores per GOCC-item.
- 2e. Voor de patiëntenverzameling met deviant gedrag is er een significant verschil wat betreft de gemiddelden der [GOCC-scores] indien deze [GOCC-scores] tot stand zijn gekomen door sommatie der oorspronkelijke GOCC-scores over alle 17 GOCC-items per patiënt,

De nulhypotheseën H_0-T_2 en H_0-E_2 kunnen niet worden verworpen, aangezien aan het gestelde significantieniveau $\alpha = 0,01$ niet wordt voldaan. Dit wordt onder meer veroorzaakt, doordat het aantal patiënten binnen de desbetreffende verzamelingen te klein is om aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Resumerend kan men tot de konklusie komen dat bij vergelijking der [GOCC-scores] vóór en na de behandeling volgens gedragstherapeutische principes van extinktie en selektieve bekrachtiging bij de in deze studie beschouwde patiëntengroep een significante afname van deze [GOCC-scores] kan worden gekonstateerd.

3.3.7. Modifikatie van gedragsdeviaties bij patiënten die buiten de kategorie contusio cerebri vallen

Naast de behandeling van, in de vorige paragrafen (3.3.4., 3.3.5. en 3.3.6.) genoemde patiënten met contusio cerebri, werd eveneens getracht bij patiënten buiten deze kategorie gedrag te modifiseren. Hoewel deze modifikaties buiten de opzet en uitvoering van deze studie vallen, zullen zij toch kort casuïstisch worden samengevat.

Patiënt V-3

- ♀, 34 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 9½ jaar
- duur coma: één dag
- hersentumor
- patiënte was vóór de gedragsvorming gedurende ca. 6 maanden in geheugen- en concentratietraining. De resultaten hiervan waren zeer bevredigend. Het probleemgedrag bestond uit het onvermogen boodschappen te doen door geheugen-, oriëntatiestoornissen en gebrek aan voldoende zekerheid. Het doelgedrag, boodschappen kunnen doen in verschillende winkels en plaatsen met behulp van plattegrond, werd in 6 weken gerealiseerd. Sterke afname, dus verbetering van verhoogde GOCC-scores.

Patiënt T-4

- ♂, 10 jaar
- tijd trauma tot opname in revalidatiecentrum: 9 jaar
- duur coma: onbekend (niet aanwezig)
- post natale asfyxie bij praematuur
- PO: geheugen- en concentratiestoornissen, laag intelligentieniveau
- GOCC: sterk verhoogde scores

Het probleemgedrag: het gedrag bestaande uit diverse handelingen als aankleden lopen e.d. werd wel uitgevoerd, echter het bleef zeer traag, hetgeen niet volledig verklaard kon worden door een motorische stoornis. Het doelgedrag, gedefinieerd als de toename van het tempo bij diverse handelingen werd in 12 weken gerealiseerd. Er bleek hiernaast een sterke afname, dus verbetering, der GOCC-scores.

Patiënt R-8

- ♂, 35 jaar
- tijd trauma tot opname in revalidatiecentrum: (geen trauma)
- duur coma: niet aanwezig
- „konversiehysterie” volgens MMPI
- PO: geen geheugen- of concentratiestoornissen, goed intelligentieniveau
- GOCC: sterk verhoogde scores op „klaaggedrag”.

Probleemgedrag werd gedefinieerd als het aantal malen klagen tegenover medepatiënten en personeelsleden per observatiekwartier genomen over een gehele week.

Doelgedrag: interactie met patiënten en personeelsleden zonder dat dit klaaggedrag optrad. Resultaat: de behandeling moest worden afgebroken wegens gebrek aan voldoende bekrachtigende kondities voor het „niet-klaag”-gedrag en vanwege voortgaande intermitterende bekrachtiging van het probleemgedrag.

Patient R-9

- ♀, 58 jaar
- tijd trauma tot opname: ca. 3 jaar
- duur coma: onbekend
- hersenbloeding
- PO: geheugen- en spraakstoornissen, goed intelligentieniveau
- GOCC-scores: vooral verhoogd op „klaaggedrag”.

Probleemgedrag: Dit werd in eerste instantie volledig overeenkomstig het GOCC-item „klagen” gedefinieerd. In een wat later stadium moesten een overvloed aan „paranoïde” uitspraken aan het probleemgedrag toegevoegd worden.

Doelgedrag: Afname van klagen en paranoïde uitspraken en toename van „normale” gesprekken over hobby's, interesses en werkzaamheden.

Resultaat: Sterke toename der GOCC-scores, m.a.w. verhoging van het klagen en de paranoïde uitspraken. Over de mogelijke oorzaken hiervan kan slechts retrospectief worden gesproken. Enerzijds bestond de indruk dat tijdens de behandelingsperiode alleen extinktie werd toegepast en de uitdrukkelijke noodzakelijke bekrachtiging voor gewenst gedrag totaal ontbrak. Anderzijds speelden allerlei niet controleerbare zaken een grote rol.

Patient R-10

- ♂, 19 jaar
- tijd trauma tot opname: geen trauma
- duur coma: geen coma
- diplegia spastica t.g.v. partus praematurus
- PO: minder goede geheugenfunctie, traag tempo, slechte concentratie, intelligentieniveau was zwak-begaafd
- GOCC: verhoogde scores op: klagen, niet-coöperatief gedrag en sterke motorische- en verbale agressie

Als probleemgedrag werd geselecteerd: klagen en agressiviteit in motorische en verbale zin.

Doelgedrag: afname van klagen en agressiviteit, toename van coöperatief gedrag.

Resultaten: Volledige afname van het probleemgedrag. Het gestelde doelgedrag werd in 10 weken gerealiseerd. Zeer sterke afname – dus verbetering – der GOCC-scores.

Patient R-11

- ♀, 21 jaar
- tijd trauma tot opname revalidatiecentrum: 8 maanden
- duur coma: 3 weken
- slikpneumonie met cardio-respiratoire stilstand en cerebrale hypoxie.

Geen uitgesproken motorische beperkingen, hoge reflexen, extra pyramidale hypertone atactische gang

- PO: niet testbaar

- GOCC: zeer aanzienlijke gedragsbelemmeringen

Probleemgedrag: apathie, zeer onzelfstandig, motorisch-agressief gedrag.

Doelgedrag: afname van motorisch-agressief gedrag en toename van zelfstandigheid.

Resultaten: Na ca. 3 maanden was het doelgedrag gerealiseerd, echter er ontstond een toenemende verbale agressiviteit en het afdwingen van bekrachtiging. In verband met te lange duur der behandeling werd deze gestaakt.

Resumerend: V-3: succesvol; T-4: succesvol; R-8: niet succesvol; R-9: totaal echec; R-10: zeer succesvol; R-11: niet succesvol, m.a.w. 50 % succesvol en 50 % falen der behandeling.

3.3.8 Samenvatting

In de periode 1973-1976 werden patiënten met contusio cerebri en met een verscheidenheid aan gedragstekorten en gedragsbelemmeringen behandeld volgens gedragstherapeutische methoden. Het betrof hier patiënten met een totale afwezigheid aan gewenst gedrag (2), patiënten waarbij het gewenste gedrag wel aanwezig was, maar in onvoldoende intensiteit (3) en patiënten waarbij sprake was van gedrag dat nieuwe gedragsvorming blokkeerde (7).

Als gedragstherapeutische methodieken werden gebruikt: extinktie en selectieve bekrachtiging, waarbij het aksent dat op extinktie gelegd werd per patiënt per probleemgedrag varieerde.

Gegeven de realiteitsgrenzen gesteld door de praktijk van behandeling in een klinische setting kon de empirische verifikatie alleen plaatsvinden d.m.v. het A-B-C-A-design, waarbij in de A-konditie de observatie van het probleemgedrag zonder behandeling plaatsvond, in de B-konditie de behandeling werd gerealiseerd en in de C-konditie een overgang plaatsvond van een continu naar een intermitterend bekrachtigingsschema.

Onder handhaving van dit onderzoeks- en behandelingsdesign konden d.m.v. probleemassessment, procesassessment en effectassessment de volgende resultaten worden gesignaleerd:

- 1e. Afname van probleemgedrag bij 10 van de 12 patiënten. De gemiddelde afname bedroeg per patiënt 85 % van het aanvankelijke probleemgedrag.
- 2e. De gemiddelde observatieduur bedroeg vóór en na de behandeling resp. 4 en 2 weken per patiënt. De gemiddelde behandelingsduur bedroeg ca. 6 weken per patiënt.
- 3e. Het psychologisch onderzoek bestaande uit intelligentiebepaling, concentratiemetingen en geheugenonderzoek toonde bij 11 van de 12 patiënten geen duidelijke verbeteringen.
- 4e. Daarentegen werd wel een verbetering der GOCC-scores na de behandeling geconstateerd.
- 5e. Indien als effectkriterium deze GOCC-scores genomen worden, kan onder hantering van het A-B-C-A-design de nulhypothese: „Er is geen verschil in effectkriteria vóór en na de behandeling” worden verworpen.

3.4. Evaluatie van de modifikatieprocedure ter gedragsbehoud onder toenemende stimuluscomplexiteit

3.4.1. Inleiding

Wanneer een van de levensverrichtingen van de mens verstoord is, wordt in de diagnostiek t.b.v. de revalidatie in het algemeen en in de (psycho-) diagnostiek van psychologische syndromen in het bijzonder, gesproken over lichamelijke resp. psychische funktiestoornissen. Vooralsnog zullen in deze studie dergelijke stoornissen in gedragstermen worden aangegeven en wel als gedragstekorten in respons op specifieke teststimuli. Onder deze gedragstekorten wordt hier met name verstaan een inadekwate, een onvolledige respons op teststimuli gepresenteerd bij het geheugen- en concentratie-onderzoek, welke niet kan worden toegeschreven aan een motorische handicap.

De scores van betreffende patiënt lagen m.a.w. ver onder de normen inzake gemiddelde prestaties bij gestandaardiseerde en op de Nederlandse bevolking genormeerde psychologische tests wat betreft geheugen en aandachtsaspecten.

Bij de konstatering van deze tekorten werd een modifikatiestrategie ondernomen die hoofdzakelijk berustte op het al eerder genoemde „fading”-principe. Daartoe werden trainingsprogramma's zo ontworpen en gekoncretiseerd dat de modifikatie van deze gedragstekorten gestandaardiseerd kon worden uitgevoerd. Ook bij deze gedragsmodifikatie werd een meervoudige assessmentprocedure gehanteerd ten einde vóór, tijdens en na de training het effect en verloop van deze training per individuele patiënt te kunnen nagaan.

Aan de voorwaarde van at random samengestelde steekproeven kon niet worden voldaan. Wel was het mogelijk een controlegroep samen te stellen die naar relevant geachte criteria gematched was met de experimentele groep. Het effect van training versus niet-training kon zodoende aan de hand van een aantal hypothesen worden getoetst.

Deze paragraaf geeft verslag van assessmentprocedure, modifikatiestrategie, de samenstelling der experimentele- en controlegroep, en van de kondities welke toepasbaar waren voor deze groeperingen. In een afsluitende subparagraaf zullen de resultaten van training versus niet-training worden besproken.

3.4.2. Assessment en modifikatie

De assessmentprocedure en modifikatiestrategie kwamen onder 2.3.4.3. reeds in het kort aan de orde. Hier zal wat meer op deze onderdelen worden ingegaan waarbij

de behandelingsvolgorde gelijk zal zijn aan die welke bij gedragsvorming en gedragsreductie werd gehanteerd.

(1) *Effektassessment.*

Voor de vaststelling van het behandelings- c.q. trainingseffect werd ook bij de onderhavige groep patiënten gebruik gemaakt van de Gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC) en het Psychologisch Onderzoek (PO). De GOCC werd vóór de behandeling twee-, maar ook vaak driemaal afgenomen. Voor het PO werden tests geselecteerd welke genormeerd waren op de Nederlandse populatie maar bovendien identiek waren aan tests die door Guilford binnen zijn „Structure of Intellect” zijn opgenomen (zie Guilford c.s. 1971). Het PO vond vóór de behandeling in de regel plaats tussen de 4e en de 7e week na opname. Dit bestond uit:

a. Geheugenonderzoek; korte termijn (d.w.z. reproductie na 5 seconden voor zgn. „units”. Het begrip „units” werd ontleend aan de terminologie van Guilford: „Relatively segregated or circumscribed items or „chunks” having „thing”character. May be close to Gestalt-psychology’ figure on ground” (Guilford 1971 p. 20).

De geheugentests werden afgenomen binnen de visuele en auditieve modaliteit waarbij het geheugen getoetst werd op de kenmerken van recognitie en recall. Wat betreft recognitie werd de capaciteit van inprenting en retentie bepaald d.m.v. het herkennen van vooraf gepresenteerde stimuli uit verscheidene tegelijkertijd aangeboden stimuli.

Wat betreft de recall werd deze geheugencapaciteit nagegaan d.m.v. de reproductie van een aantal stimuli onafhankelijk van de volgorde van de presentatie.

De „inhoud” der stimuli was in de visuele modaliteit „figuraal” en in de auditieve modaliteit „semantisch”. Ook deze termen werden ontleend aan Guilford „Figural (F) Pertaining to information in concrete form as perceived or as recalled in the form of images” en „Semantic (M) Pertaining to information in the form of conceptions or mental constructs to which words are often applied, hence most notable in verbal thinking and verbal communication”. (Guilford 1971 p. 20).

Het geheugenonderzoek bestond aldus uit: korte termijn - units:

a-1: Recognitie - visueel - figuraal

a-2: Recognitie - auditief - semantisch

a-3: Recall - visueel - figuraal

a-4: Recall - auditief - semantisch

b. Ter bepaling van het concentratie-aspekt werd, zoals onder 2.2.2.1. gesteld, de zogenaamde Bourdon-Wiersma-test genomen. (zie Boeke P.E. 1962)

Deze concentratiemeting werd uitsluitend in de visuele modaliteit uitgevoerd. c. Naast geheugen- en concentratieonderzoek werd het intelligentieniveau bepaald. Aangezien IQ-scores van verschillende tests nogal kunnen verschillen en niet iedere intelligentietest bij motorisch gehandicapten (vooral i.v.m. subtests waar het tempo een rol speelt) afgenomen kan worden, werden steeds twee intelligentietests genomen waarbij de betreffende handicap geen beperkend effect had. Als criterium voor het intelligentieniveau gold steeds het gemiddelde van twee tests. Ter bepaling van het intelligentieniveau werd, rekening houdend met de handicap, een selectie gedaan uit WAIS-verbaal, WAIS-performance, volledige GIT, subtests van de GIT, volledige SON, subtests van de SON, de Raven Progressive Matrices, WISC-verbaal, WISC-

performance. Bij grote diskrepantie tussen twee geselecteerde tests (meer dan 20 IQ-punten) werd overgegaan tot een tweede combinatie van andere tests of subtests teneinde na te gaan in hoeverre het verschil in resultaten ook door deze combinatie werd bevestigd.

Na de berekening der scores werden zowel bij de intelligentie - als bij de geheugen- en concentratietests, de ruwe scores eerst in decielen omgezet en vervolgens in zgn. „punt-scores”. Door de omzetting in een schaal lopende van 1 tot 5 werden de bevindingen van het psychologisch onderzoek beter vergelijkbaar met die van de GOCC (zie 2.2.2.2.). Tenslotte zij nog vermeld dat de effectassessment (GOCC en PO) tijdens en na de behandeling om de drie maanden met een speling van ± 14 dagen werd uitgevoerd.

(2) *Vaststelling van probleemgedrag*

Wat betreft gedragstekorten onder toenemende stimuluscomplexiteit werd het probleemgedrag als volgt gedefinieerd: Hoewel binnen een specifieke situatie (het psychologisch onderzoek) bij een eenvoudige stimulusconfiguratie wel wordt gereageerd met een adequate geheugen- of concentratierespons, treedt dit gedrag niet of minder feilloos op indien deze configuratie meer complex wordt.

Het probleemgedrag dat voor modifikatie in aanmerking werd genomen had alleen betrekking op gekonstateerde geheugen- en/of concentratiekorten.

Van probleemgedrag was sprake indien een patiënt met een IQ-puntscore < 4 op een der geheugen- en/of concentratietests een punt-score behaalde > 3 . Alleen de patiënten die aan deze criteria voldeden, kwamen voor geheugentraining in aanmerking.

(3) *Doelgedrag*

Behoud van adequate geheugen- en/of concentratierespons onder toenemende stimuluscomplexiteit.

(4) *Behandelingsplan*

Voordat het geheugenbehandelingsprogramma in detail wordt beschreven dienen een aantal algemene lijnen ter verduidelijking te zijn vermeld.

a. De training vond plaats in de zgn. „korte termijn” - en „lange termijn” - vorm. De „korte termijn”-training impliceerde dat na aanbieding van een aantal stimuli (die qua inhoud systematisch werden gevarieerd) de reproductie na 5 seconden moest optreden.

b. Het materiaal behoeft voor de „lange termijn”-training geen verandering te ondergaan. De periode tussen presentatie en reproductie werd stapsgewijs vergroot van 5 seconden bij het „korte termijn” naar resp. 1 - 3 - 5 - 7 - 10 minuten bij het „lange termijn”-geheugen.

c. Bij de trainingen in de auditieve modaliteit werd naast de semantische inhoud der stimuli bestaande uit zinvolle woorden en woordcombinaties eveneens gebruik gemaakt van zgn. nonsens-woorden.

Deze nonsens-woorden kunnen volgens Guilford gerubriceerd worden als „symbolisch”: „Pertaining to information in the form of denotative signs having no significance in and of themselves, such as letters, numbers, musical notations, codes and words (as ordered letter combinations)” (Guilford 1971 p. 20).

d. Bij de reproductie in „recall” vorm behoeft de patiënt de gepresenteerde stimuli niet noodzakelijk in dezelfde volgorde als bij de presentatie te reproduceren.

De uitbreiding van het geheugentrainingsprogramma met het zgn. „seriegeheugen”, waarbij deze volgorde wel vereist werd, betekende eveneens geen noemenswaardige verandering in het materiaal. Volgens Guilford valt deze geheugenprestatie echter onder een totaal aparte categorie n.l. „systems”: „Organized or structured aggregates of items of information, complexes of interrelated or interacting parts” (Guilford 1971 p. 20)

e. Bovenstaande uitbreidingen betekenen dus geen of geen noemenswaardige aanvullingen van het trainingsmateriaal. Voor het psychologisch onderzoek impliceerde dit echter dat er aanzienlijke testvoorzieningen getroffen moesten worden teneinde ook deze aspecten te kunnen meten. Deze voorzieningen konden slechts geleidelijk aan gerealiseerd worden, waardoor niet alle patiënten met de nieuw gekonstrueerde tests onderzocht werden. Voor de overzichtelijkheid zijn derhalve deze onderzoeks-procedures niet in het verslag betrokken, aangezien anders geen onderlinge vergelijking der testresultaten mogelijk was geweest.

f. Teneinde bij de training een toenemende complexiteit aan stimuli binnen de diverse onderdelen te realiseren, werden een aantal moeilijkheidsgraden geselecteerd. Als moeilijkheidsgraden werd bijvoorbeeld bij units, recognitie (auditief en visueel) gesteld: de herkenning van 2 stimulusconfiguraties uit 6 stimulusconfiguraties, 3 uit 9, 4 uit 12, 5 uit 15, en 6 uit 18. (2-6 / 3-9 / 4-12 / 5-15 / 6-18) Verwerking van bovenstaande algemen lijnen leidde tot het navolgende trainingsprogramma:

Visuele modaliteit:

Fase 1: units-recognitie - figuraal (korte en lange termijn)

Moeilijkheidsgraad: 2-6 / 3-9 / 4-12 / 5-15 / 6-18.

Fase 2: units-recognitie-semantic (geregistreerd) (korte en lange termijn).

Moeilijkheidsgraad: 2(1)-6(1) d.w.z. twee éénlettergrepige woorden herkennen uit 6 éénlettergrepige woorden; 2(2)-6(2); 3(1)-9(1); 3(2)-9(2); 2(3)-6(3); 4(1)-12(1); 4(2)-12(2); 3(3)-9(3); 5(1)-15(1); 5(2)-15(2); 4(3)-12(3); 6(1)-18(1); 6(2)-18(2); 5(3)-15(3).

Fase 3. Units-recall-semantic (korte en lange termijn).

Moeilijkheidsgraad: 2(1); d.w.z. reproductie van twee éénlettergrepige woorden, enz.; 2(2); 3(1); 3(2); 2(3); 4(1); 4(2); 3(3); 5(1); 5(2); 4(3); 6(1); 6(2); 5(3).

Fase 4. System-recall-figuraal (korte en lange termijn).

Moeilijkheidsgraad: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 figuren in volgorde.

Fase 5. System-recall-semantic (geregistreerd) (korte en lange termijn)

Moeilijkheidsgraad: 2(1); 2(2); 3(1); 3(2); 2(3); 4(1); 4(2); 3(3); 5(1); 5(2); 4(3); 6(1); 6(2); 5(3).

Auditieve modaliteit:

Fase 1. Units-recognitie-semantic (korte en lange termijn)

Moeilijkheidsgraad: 2(1)-6(1); 2(2)-6(2); 3(1)-9(1); 3(2)-9(2); 2(3)-6(3); 4(1)-12(1); 4(2)-12(2); 3(3)-9(3); 5(1)-15(1); 5(2)-15(2); 4(3)-12(3); 6(1)-18(1); 6(2)-18(2); 5(3)-15(3).

Fase 2. Units-recall-semantic (korte en lange termijn)

Moeilijkheidsgraad: 2(1); 2(2); 3(1); 3(2); 2(3); 4(1); 4(2); 3(3); 5(1); 5(2); 4(3); 6(1); 6(2); 5(3).

Fase 3: Units-recall-symbolisch (korte en lange termijn)

Moeilijkheidsgraad: 2(1); 3(1); 2(2); 4(1); 3(2); 5(1); 4(2); 6(1); 5(2).

Fase 4. System-recall-semantic (korte en lange termijn)

Moeilijkheidsgraad: 2(1); 2(2); 3(1); 3(2); 2(3); 4(1); 4(2); 3(3); 5(1); 5(2); 4(3); 6(1); 6(2); 5(3).

Fase 5. System-recall-symbolisch (korte en lange termijn)

Moeilijkheidsgraad: 2(1); 3(1); 2(2); 4(1); 3(2); 5(1); 4(2); 6(1); 5(2).

Bij de training werd getracht de visuele en auditieve modaliteit parallel met elkaar te realiseren waarbij de volgorde van fase 1 tot 5 werd gehanteerd.

Patiënten die naast de geheugentekorten, op de Bourdon-Wiersma-test een puntscore hoger dan drie toonden, kwamen in aanmerking voor concentratietraining.

Bij iedere oefening werd het tempo, de regelmaat en het aantal fouten geregistreerd. Het aantal fouten bleek bij iedere patiënt en bij iedere trainingseenheid zeer gering te zijn. Derhalve werd met name gelet op het verhogen van tempo en bewerkstelligen van regelmaat bij onderstaande oefeningen, die tevens een toename aan moeilijkheidsgraad representeren:

1. Twee-letter-diskriminatie O-Q; V-W; M-N etc waarbij in een horizontale rij van letters aangegeven moest worden of één der letters voorkwam of niet.

2. Drie-letter-diskriminatie.

3. Eenvoudige optelsommen.

4. Vergelijken van cijferkombinaties (bv. 548765 - 547765) eveneens in horizontale zinnen gepresenteerd.

5. Combinaties van bovenstaande.

(5) *Behandelingsuitvoering*

Van belang hierbij waren de volgende aspecten:

a. Relatie-opbouw met de patiënt. Hiertoe werd het doel en de werkwijze van het programma volledig met de patiënt besproken. De therapeut zette zich er met name duidelijk voor in een samenwerkingsrelatie en een stimulerende situatie te creëren.

b. Bekrachtigende kondities:

-1- Vaststellen van streeflijn: door therapeut werd aan patiënt gevraagd naar zijn schatting omtrent iedere volgende prestatie. Indien patiënt hiertoe niet in staat was, werd door de therapeut zelf een streefniveau aangegeven. Hierbij werd ervoor gezorgd, dat het eerste streefpunt ruim binnen de geschatte mogelijkheden van patiënt lag.

-2- Na iedere prestatie werd direkt informatie gegeven omtrent de resultaten wat betreft het aantal goede prestaties; mislukkingen werden niet genoemd.

-3- Bij hiervoor gevoelige personen werd bij het bereiken van het streefpunt bekrachtiging in de vorm van „tokens” gegeven. Deze tokens op zich boden dan weer de mogelijkheid tot een uitgebreide variatie in bekrachtiging, doordat de patiënt deze kon inruilen voor een door hem begeerd artikel of privilege.

-4- Daarnaast werden aan vrijwel alle personen de resultaten grafisch getoond. Deze grafische weergave der resultaten bleek bij een meerderheid der patiënten op zich reeds een goede bekrachtiger te zijn. De combinatie van een in de grafiek aangeboden streeflijn en de bereikte resultaten gaf direkte en adequate feedback omtrent de stand van zaken.

c. Processassessment.

De resultaten per sessie werden weergegeven in een blokdiagram. Horizontaal werden de oefeningen uitgezet. Per blokdiagram waren dit vijf verschillende oefeningen van dezelfde moeilijkheidsgraad. Vertikaal werden de aanbiedingen uitgezet die nodig waren om tot 100% goede reproductie te komen (maximaal 5 aanbiedingen). Indien na 5 aanbiedingen nog geen 100% reproductie bereikt was dan werd dit aangegeven met een vertikaal pijltje in het bovenste hokje. Bovendien werd in de kleine hokjes bij iedere trial het aantal juiste responsies genoteerd. Zie ter verduidelijking de volgende figuur.

Fig. 2 Voorbeeld van een blokdiagram.

a = aanbieding (1-5)

o = oefeningen (1-5)

Voorbeeld:

Recognitie van 2(2) uit 6(2)

M = gemiddelde

„hier $(-) + 1 + 1 + 1 + 2) : 5 = 1,0$ ”

Teneinde tot een procesassessment te komen werd het gemiddelde berekend van de juiste responsen in de eerste aanbieding over 5 oefeningen van dezelfde moeilijkheidsgraad (zie voorbeeld bij M)

Deze gemiddelden werden ingevuld op de procesassessmentgrafiek waarbij horizontaal de datum en vertikaal de scores en de moeilijkheidsgraad werden uitgezet. Zie onderstaande figuur.

Fig. 3 Voorbeeld van procesassessment

m = moeilijkheidsgraad

s = score in de moeilijkheidsgraad

t = tijd in dagen

De procesassessmentgrafiek diende ter feedback aan de patiënt en ter voortgangsevaluatie van de behandeling.

d. Basislijn, stijging in moeilijkheidsgraad en eindlijn.

Tenslotte zij vermeld dat ten aanzien van bovenstaande criteria vaste afspraken werden gemaakt.

Basislijn: de moeilijkheidsgraad waarbij na 3 oefeningen in een blokdiagram voor het eerst één maal een herhaling optrad. Bij iedere moeilijkheidsgraad werd dus gezien of patiënt drie verschillende oefeningen zonder foutieve reproductie beheerste. Indien deze prestatie werd geleverd, werd overgegaan naar een volgende moeilijkheidsgraad. Bij falen binnen een bepaalde moeilijkheidsgraad gaf deze moeilijkheidsgraad de basislijn voor training aan. Score binnen de moeilijkheidsgraad was wederom het gemiddelde van de onderste blokjes in het blokdiagram.

Overgang naar volgende moeilijkheidsgraad: Indien de patiënt in de training 5 oefeningen van gelijke moeilijkheidsgraad in maximaal 7 herhalingen (waarbij de vertikale score in het blokdiagram maximaal 2 mag zijn) voor 100 % kan reproduceren.

Eindlijn: Na het doorlopen van een aantal moeilijkheidsgraden trad na enige tijd een „stabilisatie” van prestaties op. Indien deze stabilisatie 5 dagen voortduurde, werd aangenomen dat het maximale niveau voor de patiënt bereikt was.

6. *Probleemassessment.*

Eventuele toe- of afname van het probleemgedrag zoals gedefinieerd onder punt (2), werd vastgesteld door de scores op concentratie- en geheugentests, > 3 punt-scores, vóór de behandeling te sommeren en te vergelijken met de somscores op dezelfde tests na de behandeling. Het verschil werd uitgedrukt in percentages van de beginwaarde. (zie 3.4.4.)

7. *Procesassessment.*

Per trainingseenheid werd één procesassessmentgrafiek per patiënt samengesteld. Per patiënt ontstonden derhalve bij een volledig trainingsprogramma 10 van deze grafieken.

Deze zijn wat betreft hun omvang en aantal te groot om in dit verslag weer te geven. Er werd getracht in voorgaande figuur een indruk hieromtrent weer te geven.

8. *Effektassessment.*

De behandelingsduur was gemiddeld 5 à 6 maanden. Om vergelijkbare scores te verkrijgen werden zowel GOCC als PO om de 2 à 3 maanden gescoord, resp. afgenomen.

9. *Resultaten:*

Hiervoor wordt verwezen naar de verzamelstaat (bijlage 6) waarin de vermelde getallen de scores weergeven voor en na de ± 6 maanden durende behandelingsprogramma's.

3.4.3. Samenstelling en kondities van experimentele en controlegroep

Vergelijking van experimentele met controlegroep brengt het volgende commentaar (zie tabel 8 en 9):

- 1e: Het aantal mannelijke en vrouwelijke patiënten is in beide groepen gelijk.
- 2e: De gemiddelde leeftijd bij mannen is in beide groepen gelijk; de vrouwelijke patiënten zijn in de experimentele groep gemiddeld $4\frac{1}{2}$ jaar jonger dan in de controlegroep. De gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen tezamen is in de experimentele groep 3 jaar jonger in vergelijking met de controlegroep.
- 3e: De tijd tussen trauma en opname is bij de mannen in de experimentele groep ongeveer één jaar langer in vergelijking tot de controlegroep. Bij de vrouwelijke patiënten is dit juist omgekeerd, namelijk ca. 4 maanden korter. De tijdsperiode

verschilt voor beide groepen tesamen 8 maanden, d.w.z. de patiënten uit de experimentele groep werden 8 maanden later na het trauma opgenomen dan die uit de controlegroep.

4. De gemiddelde comaduur was bij de mannelijke experimentele groep langer (5 etmalen), bij de vrouwelijke experimentele groep korter (30 etmalen) in vergelijking met de controlegroep. Voor beide groepen tesamen geldt dat de experimentele groep een kortere comaduur had (7 etmalen) in vergelijking met de controlegroep.
5. De samenstelling wat betreft het type contusio is voor experimentele en controlegroep bij benadering gelijk.
6. De intelligentieniveaus zijn eveneens bij benadering gelijk te noemen.
7. De geheugen-, concentratie- en gekombineerde stoornissen zijn eveneens gelijk verdeeld in experimentele en controlegroep.

Tabel 8 Experimentele /groep

	Mannen N = 8			Vrouwen N = 4			Mannen + Vrouwen					
	M	Range	Md	M	Range	Md	M	Range	Md			
Leeftijd (in jaren)	24,6	15-39	22,5	18,8	16-22	18,5	22,7	15-39	21,5			
Tijd trauma-opname (maanden)	19,1	2-60	6,5	23,8	4-45	23,0	20,7	2-60	6,5			
Duur coma (etmalen)	40,4	1-135	25,0	29,5	7-60	25,5	36,8	1-135	25,5			
Type contusio												
contusio cerebri		3			1			4				
contusio + hemiplegie rechts					1			1				
contusio + hemiplegie links		2			1			3				
stamcontusio		1			1			2				
stamcontusio + hemipl. rechts		1						1				
stamcontusio + hemipl. links		1						1				
Intelligentieniveau	80-90 1	90-100 2	100-110 5	>110	80-90 2	90-100 1	100-110 1	>110	80-90 2	90-100 2	100-110 2	>110 6
Geheugenstoornis		7			4			11				
Concentratiestoornis		5			3			8				
Geheugen + conc. stoornis		4			3			7				

Tabel 9|Controle groep

	Mannen N = 8			Vrouwen N = 4			Mannen en Vrouwen					
	M	Range	Md	M	Range	Md	M	Range	Md			
Leeftijd (in jaren)	24,5	16-33	25,0	28,3	20-36	28,5	25,8	16-36	25,5			
Tijd trauma-opname (maanden)	5,3	0,5-14	3,0	27,5	3-84	11,5	12,7	0,5-84	3,5			
Duur coma (etmalen)	35,5	7- 135	24,5	60,3	30-120	45,5	43,8	7- 135	30,0			
Type contusio												
Contusio cerebri	4			2			6					
contusio + hemiplegie rechts	1						1					
contusio + hemiplegie links	1			1			2					
stamcontusio	2						2					
stamcontusio + hemipl.rechts				1			1					
stamcontusio + hemipl.links												
Intelligentieniveau	80-90	90-100	100-110	> 110	80-90	90-100	100-110	> 110	80-90	90-100	100-110	> 110
	1		4	3	2		1	1	3	0	5	4
Geheugenstoornis	8			4			12					
Concentratiestoornis	6			1			7					
Geheugen + conc. stoornis	6			1			7					

Indien de mannelijke en vrouwelijke deelgroepen tesamen genomen worden, dan zijn de experimentele en controlegroep redelijk gematched naar gemiddelde leeftijd, type contusio, intelligentie en gedragskortoren.

Tijdens observatie der GOCC, het PO én de hierboven beschreven modifikatie werden de betreffende patiënten in therapie genomen door de diverse revalidatiedisciplines. De invloed van medikatie werd niet in dit onderzoek betrokken. De betreffende medikatie werd overigens aan deze patiënten niet voorgeschreven met het oog op verbetering van geheugen en concentratie. Zowel behandelend geneesheer als medikatie wisselen per patiënt en per periode. Het was derhalve niet goed mogelijk om de medikatie voor iedere patiënt volgens een vaststaand onderling vergelijkbaar systeem te registreren.

De kondities van de controlegroep zouden idealiter gelijk moeten zijn aan de kondities van de experimentele groep met uitzondering van de modifikatie ter gedragsbehoud onder toenemende stimuluscomplexiteit. Dit kon slechts ten dele gerealiseerd worden vanwege de volgende redenen:

- 1e. Wisseling van therapeuten, therapieën en medicijnen per patiënt en per periode voor patiënten in de experimentele groep. Het was niet mogelijk deze parameters gematched te krijgen met de controlegroep.
- 2e. Verbetering van de fysieke conditie resulteerde, vooral in de beginperiode van deze studie, in een vrij spoedig ontslag. De overtuiging dat ook psychische funktiestoornissen voor revalidatie in aanmerking komen, won slechts zeer langzaam terrein.
- 3e. Zowel om ethische als om pragmatische redenen was het niet mogelijk om bij patiënten die voor bovengenoemde modifikatie in aanmerking kwamen ter samenstelling van een controlegroep, deze trainingen op een latere datum te geven.
- 4e. Indien een patiënt geselecteerd was als controlepatiënt dan bleef zijn verblijf in hoge mate bepaald door het fysieke herstel. De vereiste verblijfsduur van een dergelijke konrolepersoon kon dan ook op tamelijk onvoorspelbare momenten afgebroken worden.

De controlegroep kon dus slechts samengesteld worden uit patiënten met „funktiestoornissen”, die hier echter niet voor in behandeling konden komen en waarbij de verblijfsduur niet bepaald werd door de fysiek-medische revalidatie.

Vooraf dit laatste criterium verschaft de doorslag in die zin dat uiteindelijk besloten werd controlepatiënten te selekteren uit de groep personen met funktiestoornissen, waarvan dankzij fysiek herstel het ontslag aanstaande was.

De controlegroep werd samengesteld volgens onderstaande criteria:

- a. Bij ontslag van iedere patiënt werd d.m.v. psychologisch onderzoek nagegaan of hij geheugen- en/of concentratiestoornissen toonde.
- b. Indien dit zo was werd het observatieteam verzocht de GOCC te scoren m.b.t. deze patiënt.
- c. Na 5 à 6 maanden werd betreffende patiënt weer opgeroepen voor een herhaald psychologisch onderzoek.
- d. De patiënt moest voldoen aan de matchingcriteria ten aanzien van de experimentele groep.
- e. Gedurende zijn verblijf thuis mocht patiënt geen school hebben bezocht of andere vormen van leren hebben ondernomen.
- f. De GOCC werd bij het herhalingsonderzoek, 6 maanden na ontslag, (volgens de synthetische beoordeling) afgenomen door de psychologisch assistenten op de afdeling psychologie.

Op deze wijze werden in feite twee kondities vergeleken.

Experimenteel: Functietraining, allerlei revalidatietherapieën en medikamenten bij verblijf in het revalidatiecentrum.

Kontrole: Geen functietraining, geen revalidatietherapieën, wel enige medikatie, bij verblijf in het thuismilieu.

De kondities ter vergelijking van experimentele en controlegroep waren binnen de termijn en situatie waarin dit onderzoek werd ondernomen niet verder te optimaliseren.

3.4.4. Vergelijking van training versus geen trainingkondities

3.4.4.1. Formulering der hypothesen

Voor statistische bewerking werd gebruik gemaakt van:

1. Effektoassessment: de GOCC- en PO-scores van de experimentele en controlegroep, vóór en na de experimentele, resp. controleperiode.
2. Probleemassessment: De probleemscores gedefinieerd als PO-score > 3 van de experimentele en controlegroep, vóór en na de experimentele, resp. controleperiode.

Voor de GOCC, PO-scores en PO > 3 scores werd eenzelfde „voorbewerking” gebruikt als genoemd werd onder 3.2.3.2.

Deze voorbewerkingen bestaan uit:

- a. Sommatie der GOCC-scores over alle patiënten per ieder GOCC-kriterium apart:
 $\Sigma_1^{12} \text{ pat [GOCC-sc]}$
- b. Sommatie der GOCC-scores over alle GOCC-kriteria per patiënt apart
 $\Sigma_1^{17} \text{ GOCC [GOCCsc]}$
- c. Sommatie der PO-scores over alle patiënten per PO-kriterium apart $\Sigma_1^{12} [\text{POsc}]$
- d. Sommatie der PO-scores over alle PO-kriteria per patiënt apart $\Sigma_1^8 \text{ PO [POsc]}$
- e. Sommatie der PO-scores > 3 over alle PO-kriteria per patiënt apart.
 $\Sigma_1^8 \text{ PO [PO} > 3 \text{ sc]}$

N.B. Sommatie der PO-scores > 3 over alle PO-kriteria per PO-kriterium werd niet uitgevoerd aangezien het betreffende probleemgedrag niet konsekvent bij ieder PO-kriterium optreedt, zoals blijkt uit de verzameltabel. (bijlage 6)

De betreffende rekenkundige bewerking der GOCC-scores wordt gerechtvaardigd, doordat de GOCC ontworpen is als een intervalschaal (zie 3.2.3.1.).

De rekenkundige bewerking der PO-scores is alleen dan gerechtvaardigd voorzover het om globale vergelijking van gelijke groepen van scores gaat. Ieder PO-kriterium is immers een gegeven apart en derhalve moeilijk als schaal te interpreteren. Bij nauwkeuriger bewerking zullen de PO-scores derhalve apart gezien worden.

A. Vergelijkbaarheid van de groepen

Voordat een uitgebreide toetsing zinvol is, dient gezien te worden in hoeverre experimentele en controlegroep vóór de proefperiode (dit is experimentele resp. controleperiode) vergelijkbaar zijn.

Dat wil in dit geval zeggen dat de interesse in feite uitgaat naar het niet verwerpen van de nulhypothese. Deze nulhypothese dient dan geformuleerd te worden in de bewoordingen dat bij vergelijking van experimentele en controlegroep er *geen* verschillen zijn in de verkregen scores. In een dergelijk geval dient α extreem hoog te zijn. Het is hierbij gebruikelijk een significantieniveau van $\alpha = 0,25$ te nemen. Hier werd een $\alpha = 0,50$ met tweezijdige overschrijdingskansen voor de toetsing toegepast.

Ho-A1: Experimentele en controlegroep verschillen niet vóór de proefperiode in gemiddelden der Σ_1^{12} pat [GOCC] scores.

Ho-A2: Experimentele en controlegroep verschillen niet vóór de proefperiode in gemiddelden der Σ_1^{17} GOCC [GOCC] scores.

Ho-A3: Experimentele en controlegroep verschillen niet vóór de proefperiode in gemiddelden der Σ_1^{12} pat [PO] scores.

Ho-A4: Experimentele en controlegroep verschillen niet vóór de proefperiode in gemiddelden der Σ_1^8 PO [PO] scores.

Ho-A5: Experimentele en controlegroep verschillen niet vóór de proefperiode in gemiddelden der Σ_1^{18} PO [PO ≥ 3] scores.

Toetsing der nulhypothese Ho-A1 t/m Ho-A5 zal plaats vinden middels de t-toets inzake één variabele en twee steekproeven. (Spitz 1968, p. 326).

Verwerping der nulhypothese zal plaatsvinden indien de aldus berekende toetsingsgrootheid t , significant is bij $\alpha = 0,5$ volgens een tweezijdige overschrijdingskans.

(Kritieke grenzen worden ontleend aan Lindquist 1953, p. 38)

B. Vergelijking der scores vóór en na de proefperiode

Indien aanvaarding van een of meer nulhypotheseën akseptabel blijkt, is verdere toetsing zinvol en zal worden nagegaan in hoeverre er enig verschil is in scores bij de experimentele groep vóór en na de modifikatie, respectievelijk bij de controlegroep vóór en na de controleperiode.

Deze berekeningen zullen dan opnieuw uitgevoerd worden onder gebruikmaking van eerder genoemde „voorbewerkingen” der scores.

De volgende hypothesen zullen worden getoetst.

Ho-B1: In de experimentele groep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^{12} pat. [GOCC] scores vóór en na de modifikatie.

Ho-B2: in de experimentele groep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^{17} GOCC [GOCC] scores vóór en na de modifikatie.

Ho-B3: In de experimentele groep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^{12} pat. [PO] scores vóór en na de modifikatie.

Ho-B4: In de experimentele groep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^8 PO [PO] scores vóór en na de modifikatie.

Ho-B5: In controlegroep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^{12} pat. [GOCC] scores vóór en na de controleperiode.

Ho-B6: In de controlegroep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^{17} GOCC [GOCC] scores vóór en na de controleperiode.

Ho-B7: In de controlegroep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^{12} pat. [PO] scores vóór en na de controleperiode.

Ho-B8: In de controlegroep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^8 PO [PO] scores vóór en na de controleperiode.

Ho-B9: In de experimentele groep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ_1^8 PO [PO ≥ 3] scores vóór en na de modifikatie.

Ho-B10: In de controlegroep bestaat geen verschil in de gemiddelden der Σ^*_i PO [PO ≥ 3 scores] vóór en na de controleperiode.

Toetsing der nulhypothese Ho-B1 t/m Ho-B10 zal plaats vinden middels de t-toets voor één variabele en twee steekproeven paarsgewijs gematched. (afhankelijke steekproeven Spitz 1968 p. 308)

Verwerping der nulhypothese zal plaats vinden indien de aldus berekende toetsingsgrootheid „t” significant is bij $\alpha = 0,01$ volgens een tweezijdige overschrijdingskans.

(Kritieke grenzen worden ontleend aan Pearson c.s. 1956)

C. Toetsing van aparte criteria

Indien blijkt dat er bij een (of meer) van onder B genoemde toetsingsprocedures verwerping van nulhypothese kan optreden zal er nagegaan worden in hoeverre er bij *aparte* PO- of GOCC-kriteria significante verschillen worden gevonden. Dit impliceert dat de PO- en de GOCC-scores in een dergelijk geval geen „voorbewerking” ondergaan zoals bij alle overige tot nu toe genoemde toetsingsprocedures.

Deze procedure lijkt voor Ho-B9 en Ho-B10 niet goed mogelijk aangezien de PO-kriteria waarop de Σ^*_i PO [PO ≥ 3] scores betrekking hebben gevarieerd zijn (zie verzameltabel). Een toetsing voor ieder PO-kriterium apart wordt derhalve hierbij niet uitgevoerd.

Ter toetsing van de verschillen per aparte criteria werd uitgegaan van de volgende nulhypothese.

Ho-C1: In de experimentele groep bestaat geen verschil in de gemiddelden van GOCC-scores vóór en na de modifikatie indien deze per GOCC-kriterium apart worden gezien.

Ho-C2: In de experimentele groep bestaat geen verschil in de gemiddelden der PO-scores vóór en na de modifikatie, indien deze per kriterium apart worden gezien.

Ho-C3: In de controlegroep bestaat geen verschil in de gemiddelden der GOCC-scores vóór en na de controleperiode indien deze per GOCC-kriterium apart worden gezien.

Ho-C4: In de controlegroep bestaat geen verschil in de gemiddelden der PO-scores vóór en na de controleperiode indien deze per PO-kriterium apart worden gezien.

Toetsing der nulhypothese Ho-C1 t/m Ho-C4 zal plaats vinden door middel van de t-toets voor paarsgewijze matching (Spitz 1968, p. 308).

Aangezien door toetsing van de hypothesen onder B genoemd, de richting van de overschrijdingskans bekend wordt, zal bij de toetsing der C-hypothesen volstaan worden met een toetsing naar een eenzijdige overschrijdingskans.

Verwerping der nulhypothese zal plaatsvinden indien de toetsingsgrootheid significant is bij $\alpha = 0,01$ éézijdig.

3.4.4.2. Toetsing der hypothesen

Ter nadere verduidelijking van de toetsing der nulhypothese worden de hiervoor gebruikte „voorbewerkte” getallen en de resultaten per toetsing in bijlage 7

weergegeven. Alle hierin voorkomende getallen zijn de resultaten van de voorbewerking der cijfers uit de verzameltabellen (Bijlage 6) met uitzondering van de tabellen voor de C-hypothesen waarbij geen voorbewerking werd toegepast. Het significantieniveau werd, evenals de kritieke grenzen, vermeld. Over het algemeen wordt in de sociale wetenschappen $\alpha = 0,05$ gehanteerd, als zijnde voldoende voor toetsing der hypothesen. Aangezien uit de berekeningen bleek dat $\alpha = 0,01$ een alleszins haalbaar niveau was, werd dit laatste criterium gekozen.

3.4.5. Bespreking der resultaten

Probleemassessment (Zie bijlagen 6 en 7)

Vanuit de verzameltabel bijlage 6 kan een globale indruk verkregen worden omtrent de afname van het probleemgedrag bij experimentele en controlegroep in procenten uitgedrukt. Als probleemgedrag werd gedefinieerd iedere score op een geheugen- en concentratietest van het psychologisch onderzoek welke groter was dan 3.0 punt-scores.

Gaande van patiënt 1 naar 12 blijkt bij de experimentele groep een afname van probleemgedrag in procenten van respectievelijk: 7, 35, 45, 66, 83, 0, 88, 100, 80, 71, 31, 50. Gemiddeld 48,5 %.

Bij de controlegroep blijkt in dezelfde volgorde een afname in procenten van 13, - 11, 40, - 27, - 25, - 13, 35, - 25, - 50, 32, 11, 38. Gemiddeld 10%. („min”scores duiden op een toename van probleemgedrag.).

Globaal blijkt er bij de experimentele groep een ca. $5 \times$ zo grote afname van probleemgedrag in vergelijking tot de controlegroep. Het verschil tussen de probleemgedragscores van experimentele en controlegroep vóór en na de behandelings-resp. controleperiode komt eveneens tot uiting bij de statistische verwerking der resultaten (bijlage 7). Nadat gebleken is dat de Ho-A hypothesen met verhoogd significantieniveau niet verworpen kunnen worden dus bij akseptatie van vergelijkbaarheid van experimentele en controlegroep, bleek dat de Ho-B9 hypothese kan worden verworpen. Dit impliceert akseptatie dat bij de experimentele groep de PO-scores, > 3 , significant verschilden op de tijdstippen vóór en na de behandelingsperiode. De Ho-B10 hypothese kan echter niet worden verworpen. Met andere woorden: het probleemgedrag verschilt bij de controlegroep niet significant indien men de scores vóór en na de controleperiode van 6 maanden vergelijkt.

Procesassessment

De procesassessment was bedoeld als voortgangsevaluatie van de gehele behandeling en ter feedback aan de patiënt en therapeut.

Zij levert ten aanzien van een statistische bewerking der resultaten geen extra informatie.

Hier wordt dan ook volstaan met de vermelding dat bij de 12 experimentele patiënten de totale modifikatiepoging in 6 maanden niet volledig was beëindigd. Iedere patiënt toonde een verschillend tempo in het doorlopen van de training. Soms leek de visuele resp. de auditieve modaliteit sterker „aangetaast”. Dan weer bleek de recognitie-resp. de recall-training sneller te verlopen. Een aantal patiënten hadden zowel geheugen- als concentratietraining maar er waren eveneens patiënten die slechts een der beide programma's hadden te doorlopen. Bovendien werd ook, juist bij deze langduriger behandelingen, de storende invloed ondervonden van ziektes, vakanties en personeelwisselingen. Al deze en andere factoren maken onderlinge vergelijking inzake de duur van de behandeling en de doorlopen fasen niet goed mogelijk. In het algemeen echter hadden alle patiënten na genoemde 6 maanden de

geheugentraining beëindigd voor korte termijn, terwijl eveneens de concentratieoefeningen konden worden afgesloten.

Effektassessment (Zie bijlage 7)

De statistische toetsing had met name betrekking op de effektassessment.

- A- Hypothesentoetsing bracht als resultaat dat experimentele en controlegroep voor de behandeling resp. controleperiode vergelijkbaar waren.
- B- hypothesentoetsing bracht een zeer significant verschil naar voren tussen de scores van het psychologisch onderzoek bij de experimentele groep vóór en na de behandeling. Dit verschil trad op, indien de PO-scores gesommeerd werden over de patiënten, maar eveneens indien de PO-scores gesommeerd werden over de PO-kriteria zelf, per patiënt. De GOCC-scores tonen onder geen enkele voorwaarde een significant verschil hetgeen geïnterpreteerd kan worden als het afwezig zijn van enige invloed van de betreffende training op gedragsexcessen. Deze interpretatie moet echter met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden aangezien alle GOCC-kriteria over het algemeen een betrekkelijke geringe score toonden voor alle groepen en kondities. Het genoemde verschil inzake PO-scores trad niet op bij de controlegroep. De sommatie van PO-scores over de PO-kriteria per patiënt wettigt echter niet de uitspraak dat ieder PO-kriterium voor het gekonstateerde verschil in gelijke mate mede aansprakelijk is. Deze sommatie op zich is trouwens op deze wijze alleen psychometrisch verantwoord, indien de resultaten slechts op beperkte wijze gebruikt worden, bijvoorbeeld ter verkrijging van een algemeen beeld, zoals bij de toetsing der B-hypothesen. Voor verdergaande konklusies dienen de scores per criterium apart gezien worden.
- C- hypothesentoetsing doet een uitspraak omtrent verdergaande konklusies. Drie van de getoetste zeven hypothesen kunnen onder handhaving van de gestelde criteria niet verworpen worden.
Verwerping van de nulhypothese kon (onder soms zeer hoge significantieniveaus) optreden voor Ho-C2 de criteria RoV, RaV, T en R.
Met andere woorden visuele-geheugentests (recognitie en recall) en de temporen regelmaat-kriteria van de concentratietraining leveren de hoogste bijdrage in het verschil in testcores bij de experimentele groep vergeleken vóór en na de behandeling.

3.4.6. Samenvatting

Ter evaluatie van de modifikantie procedure tot gedragsbehoud onder toenemende stimuluscomplexiteit werden een experimentele en controlegroep met elkaar vergeleken.

De groepen waren gematched naar zogenaamde „patiëntengegevens” (als leeftijd, duur coma, tijd trauma tot opname, type contusio), IQ, geheugen en concentratiedefecten.

De experimentele groep werd aan het begin en het eind van de trainingperiode gescoord volgens de Gedragsobservatieschaal Contusio Cerebri (GOCC) en het psychologisch onderzoek (PO). De training duurde ca. 6 maanden en bestond uit de presentatie van „geheugenstimuli” en/of „concentratiestimuli” in toenemende complexiteit. De respons op deze presentatie werd per sessie geëvalueerd.

De daaruit verkregen gegevens fungeerden behalve als voortgangsevaluatie van de behandeling, als procesbegeleiding ter feedback aan de patiënt en therapeut.

De controlegroep werd samengesteld uit patiënten welke bij het ontslag geheugen- en/of concentratiedefecten toonden. Beëindiging van fysieke revalidatie betekende voor patiënten uit de controlegroep, althans ten tijde van deze studie, eveneens beëindiging van het verblijf in het centrum.

Hoewel dit standpunt geleidelijkaan werd achterhaald, bracht deze positie met zich mee dat alleen op deze wijze een redelijk akseptabele controlegroep kon worden gevormd, die echter niet als gerandomiseerd mag worden beschouwd. Na verloop van ca. 6 maanden na ontslag werden de patiënten uit deze controlegroep opgeroepen ter evaluatie van genoemde defekten.

Statistische bewerking van de GOCC- en PO-scores van experimentele en controlegroep van zowel vóór als na de behandelings resp. controleperiode, leidde tot de volgende bevindingen:

- 1e. De experimentele en controlegroep zijn vóór de behandeling wat betreft de GOCC- en PO-scores vergelijkbaar
- 2e. De experimentele groep als totaliteit gezien toont na de behandeling geen verbetering in GOCC-scores echter wel een duidelijke verbetering der PO-scores
- 3e. De controlegroep als totaliteit gezien toont na de controleperiode geen verbetering in GOCC- en PO-scores
- 4e. De PO-kriteria, getoetst bij de experimentele groep, tonen een significant verschil (vóór en na de behandeling) bij de visuele geheugen tests en bij het tempo en regelmaataspect der concentratietests. De overige PO-kriteria tonen eveneens een verschil indien de scores vóór en na de behandeling worden vergeleken. Dit verschil is echter niet significant.

Op grond van deze bevindingen kan men konkluderen dat het in deze studie gepresenteerde onderzoek inzake het behoud van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit bevredigende resultaten opleverde en perspectieven opent voor verdere research.

Bij twee groepen patiënten met contusio cerebri die wat betreft probleemgedrag en psychologische funktiestoornissen vergelijkbaar geacht kunnen worden, lijkt een geheugen- en concentratietraining effect te sorteren. De groep waarop deze training gedurende 6 maanden werd toegepast toont in vergelijking met de niet getrainde groep betere prestaties op geheugen- en concentratietests.

In hoeverre deze verbeterde prestaties ook tot uiting zullen komen in gedrag buiten de trainings- en testsituatie zal door voortgaande research moeten worden aangetoond.

HOOFDSTUK 4

HERORIENTATIE

4.1. Assessment

4.1.1. Inleiding

In hoofdstuk 3 werd de uitvoering van modifikatietechnieken getoetst. Deze toetsing kon in verband met de beperkte controle slechts betrekking hebben op de modifikatie van enkele gedragstekorten en excessieve gedragingen. Na de signalering van diverse hiaten in de assessment en de gebleken problemen bij de empirische toetsing zal nu bezien worden in hoeverre aanvullende literatuur andere of betere richtlijnen heeft te bieden.

De twee volgende vragen dienen hierbij als leidraad:

- A. Is het mogelijk een verbetering te realiseren in assessmentprocedures? Hierbij wordt gedacht aan de eerder gesignaleerde lacunes, het benutten van verscheidene situaties welke informatie zouden kunnen opleveren en het streven naar met name een systematische exploratie aan de hand van een valide taxonomie.
- B. Is het mogelijk een verbetering te brengen, in de tot nu toe toegepaste modifikatieprocedures? Kan modifikatie van gedragsdeviaties ook gerealiseerd worden in verschillende milieus?

Bij de weergave van deze publikaties zijn de volgende punten van belang:

- 1e. De specifieke literatuurgegevens betreffende *contusio cerebri* bleken slechts zeer beperkt aanwezig. Derhalve werd het te exploreren literatuurgebied uitgebreid tot cerebrale stoornissen met als deelgebieden: *contusio cerebri*, linker-hemisfeerstoornissen, rechter-hemisfeerstoornissen, de combinatie van linker- en rechter-hemisfeerstoornissen, de „minimal brain damage” in relatie tot leerstoornissen, cerebrale palsy, en mentaal geretardeerden.

Het criterium voor deze samenstelling is dat alle genoemde patiëntengroepen gedragstekorten en gedragsstoornissen tonen tengevolge van een veronderstelde cerebrale aandoening. Het referentiekader hierbij was primair gedragspsychologisch en wel toegespitst op assessment en modifikatiemogelijkheden onafhankelijk van het feit of het defect het gevolg is van aangeboren of verworven aandoening. Het samen nemen van een dergelijke populatie met een ogenschijnlijk zo gevarieerd beeld wordt door diverse auteurs onder zekere voorwaarden aanvaard geacht. Zo rechtvaardigt Rosinski zijn studie van een nog meer heterogene „severely disabled” patiëntengroep bestaande uit o.a. hemiplegieën, epileptici en amputatiepatiënten, als volgt: „I am using the term disabled to allude a client's level of functional impairment not his disability category e.g. paraplegic, amputee, epileptic. This category includes multiply handicapped persons usually manifesting a high degree of intellectual impairment because of organic damage who have problems with sensory input/output. Most of these clients would fall into the severe to moderate range of mental retardation as defined in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM II 313-314) and have corresponding verbal, social and performance deficiencies” (Rosinski 1975 p.302)

- 2e. De publikaties worden gerubriceerd volgens de in hoofdstuk 2 voorgestelde indeling naar „situatie”, waarin de gedragsdeviaties werden vastgesteld en naar de „aard” van deze gedragsdeviaties zelf. Dat wil zeggen:

a. Naar situatie:

Premorbide situatie (situatie vóór opname).

Klinische testsituatie (gestandaardiseerde situatie).

Klinische observatiesituatie

Nabehandelingssituatie (overgangssituatie van kliniek naar ontslag)

Thuisituatie (ook wel „nazorg” genoemd)

b. Het onderscheid naar gedragsdeviaties bleef gehandhaafd:

Gedragstekorten en Gedragsbelemmeringen.

Teneinde een indruk te geven van de frekwentie van voorkomen der artikelen per deelgebied wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Tabel 10: Overzicht literatuur per deelgebied uit Rehabilitation Abstracts 1973-1976.

Assessment/gedragstekort

situatie	alg.	LH/RH	LH + RH	MBD	CP	MR	Tot.
premorbide	3						3
klinisch test	18	5/0	9	39	13	1	85
klinisch obs.	8	3/1	2	3	3	4	23
nabehandeling	3		1		3	2	9
thuis							
totalen	32	8/1	12	42	19	7	120

Assessment/gedragsbelemmering

situatie	alg.	LH/RH	LH + RH	MBD	CP	MR	tot.
premorbide			1				1
klinisch test							
klinisch obs.	4	2/1	3	7	1	3	21
nabehandeling							
thuis							
totalen	4	2/1	4	7	1	3	22

Kodes:

alg = algemeen, d.w.z. onder alle categorieën te plaatsen

LH = linker-hemisfeerstoornis

RH = rechter-hemisfeerstoornis

LH + RH = zowel toepasbaar op linker- als rechter-hemisfeerstoornis

MBD = minimal brain damage

CP = cerebral palsy

MR = mental retardation

Voor eenzelfde overzicht inzake modifikatie wordt verwezen naar 4.2.1.

Uit voorafgaande literatuurtabel blijkt:

1e Het merendeel der beschikbare literatuur heeft betrekking op de assessment van gedragstekorten in klinische test- en klinische observatiesituaties.

2e. Slechts een klein aantal heeft betrekking op de assessment van gedragsbelemmeringen in de klinische observatiesituatie.

3e. De overige deelgebieden komen in de literatuur nauwelijks voor.

Niet alle publikaties zullen in deze rapportage worden opgenomen. Slechts die artikelen welke een duidelijke eigen en toepasbare strategie tonen en aansluiting bieden tot het in deze studie voorgestelde leertheoretisch denkkader zullen worden gepresenteerd en van enig kommentaar worden voorzien.

4.1.2. Assessment van gedragtekorten in de premorbide situatie.

Tijdens het revalidatieproces zal het beeld van het nog aanwezige gedrag en het nieuw aan te leren gedrag langzaam duidelijker worden. Het is van belang om na te gaan welke gedragsveranderingen de patiënt moet gaan leren en op welke wijze dit het best kan worden gerealiseerd.

Volgens Fordyce (1971-1) zal iedere handicap meebrengen dat bepaalde gedragsaspecten van de patiënt gekenmerkt zullen gaan worden door lage frekwentie, lage sterkte en lage waarde. Naarmate het vroegere gedrag meer lijkt op datgene wat hem na de handicap nog resteert, des te minder groot is de aanpassing die vereist wordt, des te minder is de kans op gedrag van lage frekwentie, sterkte en waarde en des te kleiner is de kans op gedrag dat nieuwe gedragsvorming tegengaat.

Het is daarom van belang om voor diverse situaties in het verleden (rekreatie, vrijetijdsbesteding, school, studie, werk) na te gaan:

- 1e. welk gedrag patiënt in al deze situaties regelmatig uitvoerde.
- 2e. welk gedrag patiënt niet of zelden ten uitvoer bracht.
- 3e. welk gedrag door patiënt in de toekomst moet worden gerealiseerd.
- 4e. hoever dit nieuwe gedrag „verwijderd” ligt van het oorspronkelijke gedrag vóór de handicap wat betreft frekwentie, intensiteit en waardering.
- 5e. welke bekrachtigers er nodig zijn om het opnieuw aanleren van gewenst doelgedrag mogelijk te maken.

De manier om bekrachtigers te vinden kan bestaan uit observatie van het gedrag van de patiënt in de kliniek, bij het psychologisch onderzoek of indirect door observatie en navraag bij familieleden.

Fordyce (1971-1. p. 183) wijst erop dat er bovendien aanvullende informatie verkregen moet worden van vroegere modellen (ouders en vroegere vrienden) om gedragstekorten c.q. mogelijke blokkeringen bij gedragsvorming en bekrachtigende kondities vast te stellen. Persoonlijkheid en wijze van zelfexpressie zijn – aldus Fordyce – geleerd door een combinatie van invloeden van (a) consequenties vanuit de omgeving, waarin het gedrag optrad, en (b) van het sociaal imitatieleren. Veel van het gedrag van ouders en vrienden zal in het gedragsrepertoire van de patiënt opgenomen zijn, maar ook zullen zij bepaalde gedragingen van de patiënt bekrachtigd hebben. De keuze van hobby's, werk, boeken etc. van ouders en vrienden van patiënt zal datgene reflecteren wat zij bekrachtigend vinden voor zichzelf. Als er redelijk contact heeft bestaan tussen patiënt en zijn modellen, kan men aannemen, dat het gedrag van de patiënt veel van het gedrag of de stijl van de modellen zal reflecteren. Het verdient derhalve aanbeveling de vrijetijdsbesteding en het werk van degenen, die als achtergrond van de patiënt hebben gefungeerd mede in het vooronderzoek van de behandeling te betrekken.

Er is een systeem nodig om de informatie van patiënt en modellen te organiseren en te synthetiseren. De methode die Fordyce daartoe presenteert laat vrijetijdsactiviteiten en beroepsactiviteiten in drie klassen uiteenvallen:

- 1e. Symbool-gecentreerde activiteiten betrokken op ideeën, conceptgebruik, getallen en woordgebruik.
Vrijetijdsvoorbeelden: lezen, gokspelen, politieke discussies e.d.
Beroepsvoorbeelden: boekhouden, administratief werk, computerprogrammering.
- 2e. Motorisch manipulatief gecentreerde activiteiten betreffende de interesse en vaardigheid in de manipulatie van objecten en fysieke bewegingen.
Vrijetijdsvoorbeelden: atletiek, tuinieren, activiteiten op het platteland.
Beroepsvoorbeelden: fysieke arbeid, werken met gereedschap en machines.

- 3e. Interpersoonlijk gecentreerde activiteiten betreffende belangstelling en vaardigheid in allerlei sociale kontakten en werkzaamheden.

Vrijtijdsvoorbeelden: visites afleggen, club-bezoek, kaarten e.d.

Beroepsvoorbeelden: verkoper, onderwijzer, counselor, receptionist.

Het organiseren van informatie over patiënt en zijn modellen in termen van relatieve beklemtoning van deze categorieën zal – aldus Fordyce – voor het behandelings-team bruikbare gegevens leveren.

In concreto betekent dit dat vóór, maar vooral ook tijdens de opname van patiënt, zowel van hemzelf als van zijn modellen gegevens moeten worden verzameld van frekwentie van voorkomen, intensiteit en waardering van alle bovengenoemde activiteiten.

Uiteraard moet een dergelijk systeem verder worden uitgewerkt, maar het lijkt in principe mogelijkheden te bieden voor het verkrijgen van informatie inzake gedragstekorten en bekrachtigende kondities. In hoofdstuk 5 zullen deze ideeën nader worden uitgewerkt tot een werkmodel.

4.1.3. Assessment van gedragstekorten in de klinische testsituatie

4.1.3.1. Probleemstelling

Het onderzoek van gedrag in de testsituatie leidt er vrij snel toe gekonstateerde gedragstekorten te relateren aan hypothetische konstrukties die afhankelijk van het desbetreffende referentiekader „functies”, „systemen”, „operaties”, „leervoorwaarden” e.d. genoemd worden. Men komt echter voorlopig niet veel verder dan hypothetische konstrukties. Dit wordt door Ross als volgt omschreven:

„The moment the psychologist departs from a description of the observable stimulus respons events, and draws inferences about mediating processes, he is dealing with hypothetical constructs which are no more than explanatory devices, adressed to how a patient's central nervous system might operate. These hypothetical constructs however, based as they are on correlations between input and output, permit inferences about functions and not about structure. We know far too little about the anatomical basis of these functions to permit generalizations from for example disturbed integration to the presence of braindamage” (Ross 1966)

Deze bescheiden gedachtengang geeft aanleiding tot de volgende overwegingen:

- 1e. Kan men uitgaande van leertheorie met name vanuit het operante paradigma verantwoord en vruchtbaar gaan werken met deze hypothetische konstrukties onder negatie van het anatomisch substraat?
- 2e. Indien het antwoord bevestigend is, kan men dan een keuze doen uit de diverse hypothetische konstrukties? Hierbij zal een belangrijk criterium moeten zijn in hoeverre het mogelijk is om vanuit het gekozen systeem een praktische diagnostiek op te bouwen.
- 3e. Dit laatste leidt tot de vraag: Is het noodzakelijk binnen het eenmaal gekozen konstruktie-model nog aanvullingen te verrichten? Moeten er binnen dit model nog keuzen gemaakt worden? Zijn de hypothetische konstrukties vanuit het model voldoende operationeel gedefinieerd en instrumenteel realiseerbaar?
- 4e. Is het mogelijk vanuit de diagnostiek rond defekten in hypothetische konstrukties van psychisch functioneren, defekten te signaleren waarop een werkbare modifikatiestrategie toepasbaar is, die toch blijft uitgaan van de manipulaties volgens operante principes?

Dit zijn slechts enkele vragen, die men automatisch gepresenteerd krijgt, indien men de euvele moed heeft de Black Box binnen te gaan. Er zijn er meer denkbaar.

In het onderstaande zal getracht worden op de 1e, 2e en 3e vraag antwoord te geven. De vierde overweging lijkt meer thuis te horen in die paragraaf (4.2.) waar de modificaties aan de orde komen.

Vraag 1. Kan men vanuit het operante leermodel zich verantwoord bezig houden met de hypothetische konstrukties?

Ullman en Krasner (1969 p. 573-585) stellen dat hersenstoornissen behoren tot onderzoek en behandeling vanuit het ziektemodel waarbij men zich dan heeft af te vragen in hoeverre het hier voorgestelde operante model enige inbreng heeft bij assessment en modificatie hiervan.

Uit de contacten met Fordyce W.E. kwam zijn visie inzake funtierestauratie en-assenment duidelijk naar voren: „I don't think of our restoring a patient memory functioning! I think of it as restoring his recall of how to do such and such a task. In the context of braindamage, memory for example is not in my opinion a general trait or function. If you help a patient to get better at one kind of memory task, that improved skill is not likely to generalize to other memory tasks, unless those other tasks are virtually identical to the one about which you trained him. Therefore „functional restauration” consists of identifying functions or tasks to be performed and then setting up precision teaching programs to help them master those tasks”. Diller L. reageerde in deze als volgt: „Your approach based on the combination of behavior modification, skill training and functional restauration is realistic. Behavior modification in itself is often insufficient in the care of brain damaged people”.

De weinig Nederlandse onderzoekers die zich met dit gebied enigermate bezig-houden waren, althans in 1976, niet veel verder dan enkele globale ideeën inzake diagnostiek, therapie of programmaformulering zonder overigens een duidelijke basis, inzake methodieken ten behoeve van fundamentele research. Deelman was reeds in 1970 de mening toegedaan dat gedragstherapie in combinatie met neuropsychologie een ideale aanpak zou kunnen vormen voor de behandeling van hersenstoornissen. Een verdere specificatie wordt hierbij echter niet gegeven. „Het fraaiste zou een integratie van neuropsychologische en gedragstherapeutische inzichten zijn” (Deelman 1970 p. 30)

Ook Schuerman komt in 1975 niet veel verder dan tamelijk globale konklusies: „Er bestaat een dringende noodzaak tot uitbreiding van de revalidatiediagnostiek. Indien een volledig in kaart brengen der funkties volgens een cybernetisch model niet mogelijk blijkt, zal het wellicht toch goed dienst kunnen doen als referentie-frame. Voorlopig lijkt echter een fragmentarische aanpak het enige haalbare (. . .). Inzake therapeutische interventies kan gesteld worden dat kontrakt-management en in het algemeen gedragstherapeutische benadering volgens het operante paradigma duidelijke mogelijkheden bieden in de revalidatie” (Schuerman 1975 – 2 pg. 227-251).

Diamant (1976) als een der weinigen in Nederland die trachten gestoorde „funkties” bij psychiatriepatiënten te diagnosticeren en te revalideren stelt: „We zijn wel met Schuerman van mening, dat het cybernetisch model en de leertheorie waardevolle bijdragen kunnen leveren tot de funktiediagnostiek en funktietraining”.

Zoals uit bovenstaande citaten blijkt, zijn er zowel voor- als tegenstanders t.a.v. de mogelijke toepassingen van het operante model te signaleren. Het standpunt dat hier ingenomen wordt is, dat de leertheorie en met name het operante model, wel degelijk mogelijkheden biedt, mits het nog nader te bepalen hypothetische konstruktie-model leidt tot in de praktijk toepasbare operante technieken, met name wat betreft de te presenteren stimuli, o.a. inzake hun aard, inhoud en volgorde van presenteren. Door

deze manipulaties dient het hypothetische model in zijn totaliteit getoetst en eventueel herzien te worden.

Vraag 2. Is het mogelijk tot een keuze te komen inzake het model resp. inzake de hypothetische konstrukties binnen dit model?

Yates (1976) heeft getracht een overzicht samen te stellen van de bijdragen van psychologen in de diagnostiek van hersenstoornissen. Hij komt tot de konklusie dat in de jaren 1960-1964 meer dan 700 referenties te vinden zijn, die betrekking hebben op het psychologisch onderzoek van de effecten van hersenbeschadiging bij kinderen en volwassenen.

Indien men een gemiddelde van 200 per jaar aanneemt, dan zijn er, extrapolierend tot 1976, ca. 2000 publikaties bijgekomen. Ook hier rijst de vraag waar te beginnen en hoe het kaf van het koren te scheiden.

Diller (1971 - p. 1) spreekt in dit verband dan ook over „sensory cognitive and motor performance cover many fields of inquire. They are in themselves interdisciplinary fields in a state of flux being swept along in the present information explosion!” Hij besluit echter (p. 26) „The translation of the traditional neurological and psychological concepts into information processing systems is just around the corner”.

Hieruit spreekt toch een zekere hoop, zij het dat deze gerealiseerd moet worden door een „informatieverwerkend systeem”.

Diamant (1975) komt eveneens op een informatieverwerkend systeem uit: „In order to come further in the behavior analysis of the underlying brain functioning a more systematic approach is needed based on the general information theory”.

Yates (1970) geeft aan hoe een informatieverwerkend systeem van invloed kan zijn op een adequate feedback en als zodanig bekrachtigend kan werken op een bepaald gedrag.

Van der Linden (1975 p. 614) stelt in zijn artikel over de diagnostiek van leerstoornissen bij kinderen: „De vergelijking met een cybernetisch model dringt zich aan ons op”.

Fordyce (1971 p. 190 e.v.) „The most likely functional consequence of braindamage is reduction of learning efficiency. Functional impairment in learning resulting from braindamage may occur at any of a number of points in the cyclus of mental processes going into learning”. Hij noemt achtereenvolgens: „difficulties in receiving and processing information, in assimilating or retaining that information, in association it with previously acquired information or in retrieving it as effective memory to influence subsequent behavior” (...). „These difficulties in exercising quality control on their own behavior seem to be related to deficits in processing informational feedback from their own behavior or in maintaining alertness” (p. 192)

Schroots (1972-1 p. 334): Verlaat men een ogenblik het idee dat gedrag direkt te vertalen zou zijn in neuro-anatomische strukturen, dan stuit men direkt op een benadering welke in de experimentele psychologie zeer vruchtbaar is gebleken, nl. het CZS opgevat als een Information Processing System”.

Snelbecker (1974): „This study is one of a series in which operant research equipment and techniques combined with information theory findings are used in an experimental analysis of human information processing of auditory stimuli.”

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn, dat althans een aantal auteurs perspektief zien in „een informatieverwerkend systeem”. Met het noemen van deze welluidende betiteling is echter nog geen oplossing geboden. Dit blijkt pas mogelijk indien binnen dit systeem een aantal operaties genoemd kunnen worden, die een goede

inhoudsvaliditeit bezitten, redelijk testbaar zijn en aansluiting bieden voor gedragsvorming geïndiceerd vanuit de testsituatie.

Pas dan kan met recht gesproken worden van „functies” en eventueel „functie-restauratie”.

Hierdoor wordt in feite de derde probleemstelling onder de aandacht gebracht.

Vraag 3: Zijn de in het model genoemde hypothetische konstrukties voldoende operationeel gedefinieerd zodat instrumentele realisering mogelijk is?”

Deze laatste vraag zal in de navolgende paragrafen worden behandeld. Uit de literatuur inzake assessment van gedragstekorten in de testsituatie werden twee „lijnen” geselecteerd. De auteurs in deze zijn afkomstig uit verschillende disciplines, nl. de neuropsychologie (Mark H. J.) en de cognitiepsychologie (Guilford). Meer dan anderen gaan zij gedetailleerd in op hun hypothetische konstrukties en dragen zij empirische toetsing aan. Dat wil niet zeggen dat de bijdragen van andere scholen minder waardevol zijn. Men denke bijvoorbeeld aan Luria (1966) „grand old man” van de Russische neuropsychologie, revalidatiepsycholoog van het eerste uur en Reitan (1966, 1968, 1969) met de ontwikkeling van de Hallstead-Reitan neuropsychologische testbatterij, die vanuit het prediktie-uitgangspunt (testuitslag-hersenstoornis) onovertroffen mag heten. Ook de publikaties vanuit de orthopedagogische hoek, zoals Dumont (1973), Kephart (1971), Cruickshank (1972) en vele anderen kunnen in dit kader genoemd worden. Het zijn alle pogingen een antwoord te vinden op dezelfde problematiek nl. een poging tot overzichtelijkheid in diagnostiek.

Niet alle auteurs kunnen binnen deze studie behandeld worden. Overigens dient hier uitdrukkelijk en vooraf gesteld te worden, dat ook de theorieën van Mark en Guilford niet uitputtend vermeld kunnen worden, hetgeen wellicht in zeker opzicht afbreuk doet aan hun totale gedachtengang.

Vanuit de gestelde noodzaak tot en interesse in operationele definitie en instrumentele realisering zullen de ideeën van Mark en Guilford slechts weergegeven worden voorzover deze betrekking hebben op de konkretisering van de onderdelen van het informatieverwerkende proces:

Input- Hypothetische konstrukties in de Black Box-Output.

Wat de overige auteurs betreft: Bij alle genoemde theoretici treft men denkbeelden aan, die de ideeën van Mark en Guilford partieel ondersteunen.

Binnen het kader van deze studie, die niet meer pretendeert dan het signaleren van een beperkt aantal der mogelijke benaderingen, is de behandeling van andere stromingen eigenlijk niet goed mogelijk.

4.1.3.2. De neuropsychologische benadering van Mark

Een belangrijke reden voor het geringe sukses dat men bij de psychodiagnostiek van leerstoornissen geboekt heeft, is – aldus Schroots (1974 p. 8) – het feit dat men het CZS vaak met een te simpel „input- black box- output-model” benaderd heeft en dientengevolge de geweldige complexiteit van kommunikatiekanalen (modaliteiten) en systemen (functies binnen elk kanaal, die tesamen het informatieverwerkend systeem vormen, de zgn. black box), ernstig heeft onderschat. Men liep te argeloos voorbij aan het feit dat een specifieke leerstoornis door een verscheidenheid aan disfuncties in het informatieverwerkende systeem veroorzaakt kan worden. Aksepteert men eenmaal dat de hersenen het meest complexe orgaan vormen en dientengevolge een informatieverwerkend systeem als model hiervan, eveneens zeer complex van aard moet zijn, dan zal men op zoek gaan naar een theorie of model, welke recht doet aan deze complexiteit”.

Luria (1966) bepleit, als voorloper, het onderscheid en de bestudering van een drietal „hoofdsystemen”.

a. De regulering en stabilisatie van het energie-niveau (arousal). Concepten als „inhibitie-zwakte” en „excitatie” lijken hierin te kunnen passen (zie o.a. Ansink 1974).

b. Het functionele systeem dat betrekking heeft op de regulering van de aandacht.

c. Het systeem dat zorgt voor de analyse, codering en opslag van de informatie.

Deze uitgangspunten van Luria zijn zeer verhelderend. De reden waarom Luria minder dan Mark en Guilford in deze studie zal worden betrokken, wordt gevormd door het feit dat Luria bezig is met de ontwikkeling van *nieuwe* onderzoeksinstrumenten, terwijl Mark en Guilford uitgaan van bestaande en derhalve beschikbare tests. Bovendien ligt bij Luria het aksent op het substraat d.w.z. op de anatomie en de fysiologie van het CZS. Bij Mark en Guilford daarentegen op het *gedrag*, hetgeen derhalve betere aanknopingspunten biedt voor het therapeutisch handelen. Om dit laatste is het in de diagnostiek tenslotte begonnen.

In deze studie wordt mede door de gedachtengang van Luria, Mark en Guilford het standpunt ingenomen dat er ter nadere bestudering der informatieverwerking minimaal twee „indelingen” denkbaar zijn.

1e. De indeling, die betrekking heeft op gedrags*regulatie*: het tot gedrag komen, gedragsstabilisatie, gedragsafremming, maar ook gedragskontinuering en gedragstempo.

2e. De indeling die betrekking heeft op de *organisatie*, de analyse de codering en opslag van de gedragsinformatie.

Aangezien noch Mark noch Guilford zich, voorzover bekend, uitputtend bezig houden met de gedragsregulatie en Luria met zijn nieuwe testontwikkeling niet gereed is, dient deze taxonomie verder te worden afgewacht.

In het onderstaande valt derhalve het aksent op de *organisatie* van informatie.

Henry Mark's leertheorie richt zich met name op deze organisatie en doet volledig recht aan de complexiteit (Mark 1962) zoals hierna volgend zal worden aangetoond. Voor het „lerende” organisme, d.w.z. voor het leergedrag postuleert Mark een aantal noodzakelijke leervoorwaarden, welke hij „operaties” noemt. Onder operatie verstaat Mark de aktiviteit van de zenuwcellen, die in zijn simpele vorm bestaat uit het met elkaar in verband brengen van afzonderlijke informatie-eenheden. De mate nu waarin deze verbanden tot stand kunnen worden gebracht, dus het aantal en de snelheid van relatievorming, zou het leervermogen van het organisme bepalen. Afhankelijk van de plaats van het organisme op de phylogenetische ladder en/of het ontwikkelingsstadium, waarin het zich bevindt, zijn ingewikkelder en snellere operaties mogelijk. Mark onderscheidt de volgende operaties:

1e. Het tot aktiviteit komen van het organisme (het eerste indelingsprincipe)

2e. De mogelijkheid om nieuwe informatie te organiseren inzake uitwendige omgeving, alsook omtrent eigen handelen.

3e. Het vermogen om georganiseerde informatie te gebruiken bij het zoeken naar „antwoorden” op deze stimuli, vragen of problemen welke door de omgeving gesteld worden of binnen het organisme rijzen.

4e. Het in staat zijn tot het verzamelen, resp. het herinneren van antwoorden en oplossingen t.a.v. onder punt 3 genoemde probleemstellingen.

5e. Het vermogen beschikbare informatie (over eigen omgeving of eigen functioneren) te gebruiken tijdens een proces waarbij nieuwe combinaties beschikbare informatie uitgevonden worden of beschikbaar komen.

Het voordeel van een dergelijke hiërarchie is dat zeer snel gecontroleerd zou kunnen worden of een bepaald systeem naar behoren functioneert. Men toetst daartoe door middel van een zgn. gedragstest, het systeem in een bepaald kanaal en op een bepaald niveau. Treft men daarbij een disfunctie aan dan kiest men een lager niveau. Als het getoetste systeem goed functioneert zouden – aldus Mark – alle hiërarchisch voorafgaande systemen eveneens goed functioneren. Indien met de theorie tegenstrijdige resultaten gevonden worden is herziening van de hiërarchie noodzakelijk. Wat dat betreft vormen de testresultaten tevens een controle op de validiteit van de betreffende hiërarchie. Bij het menselijk organisme kan men een groot aantal receptor-effektor-systemen of combinaties daarvan onderscheiden. Binnen ieder receptor-effektor-systeem, door Mark aangeduid met de term „kanaal” functioneert het eerder beschreven controlesysteem (van 34 systemen in relatie met 34 neurofysiologische operaties).

De informatie-input wordt volgens Mark gekenmerkt door de modaliteit en de context.

Modaliteiten zijn: auditief, visueel, kinestetisch, tactiel enz. In termen van Mark is de context in een ontogenetische hiërarchische volgorde te onderscheiden in „picture language”, „gesture language”, „spoken language”, „recorded language” en „mathematical language”. Er zou in principe rekening mee moeten worden gehouden dat in een bepaalde modaliteit verschillende context „soorten” kunnen worden gepresenteerd. Er is bijvoorbeeld sprake van „visueel picture” – language, „visueel gesture” – language en „visueel recorded” – language, e.d.

De output wordt door Mark onderscheiden naar Gross-Motor, Fine Motor en Speech Motor responsies.

De combinatie input-modaliteit, input-context en output vormt dan een communicatiekanaal. Mark onderscheidt op deze wijze 24 kanalen waarbij hij overigens wel aangeeft dat het ene kanaal belangrijker is dan het andere.

De verzameling van kanalen en systemen binnen deze kanalen wordt door Mark aangeduid met de term gedragsklassifikatieschema.

Naast de mogelijkheid tot gedetailleerde operationalisatie van zijn theorie kunnen aan Mark's gedragsklassifikatie drie belangrijke aspecten worden onderkend.

- a. Een eindige verzameling van stoornissen.
- b. Iedere stoornis uit deze verzameling kan beschreven worden in termen van de theorie zelf.
- c. Door Mark werd een tijdschaal toegevoegd die aangeeft wanneer een bepaald systeem in chronologische volgorde tot ontwikkeling komt. Wanneer een kind van bepaalde leeftijd deze ontwikkeling niet toont, zou van een leerstoornis sprake kunnen zijn.

Wanneer men de eerste publikaties van Mark (1962) vergelijkt met zijn latere (1969) en tenslotte met zijn lezingen voor TNO (Schroots 1972) dan blijkt dat in de loop der jaren het aantal systemen aanzienlijk werd gereduceerd en geleidelijk aan meer en meer een terminologie werd gebruikt die aan de psychologie is ontleend i.p.v. aan de informatica. Ook het aantal belangrijke kanalen blijkt gereduceerd te zijn.

Vraagt men zich af wat in de loop der tijd van de theorie van Mark is overgebleven, dan blijkt dat bij hemzelf de belangrijkste elementen hebben stand gehouden.

- 1e. De aanwezigheid van systemen, hiërarchisch geordend, wat betreft hun ontogenese, alsook wat betreft hun bijdrage aan operaties tot uiting komende in het gedrag.
- 2e. De aanwezigheid van de hiërarchische systeemstructuur in ieder kanaal zowel unimodaal als bimodaal.

- 3e. Een pogen tot onderscheid maken in de context van de input alsook in de context naar output.

4.1.3.3. De cognitief-psychologische benadering van Guilford

Mark lijkt zich voornamelijk bezig te houden met de disfuncties van jonge kinderen tot circa 4-5 jaar. Ongeveer tot het niveau waarop het kind toe is aan drie-woord-zinnen. Voor inzicht in de cognitieve functies zoals deze worden aangetroffen bij de volwassenen biedt het werk van Guilford meer perspectief. Zijn langdurige en intensieve faktoranalytische bewerking van honderden psychologische onderzoeksmethoden leverde gedegen grondmateriaal voor de konstruktie van een taxonomie van cognitieve functies.

In zijn „Analysis of Intelligence” (1971) bracht hij met Hoepfner de bevindingen van deze 20 jaar research (1949-1969) tesamen. Hier zullen daarvan speciaal zijn taxonomie van psychische functies ter sprake komen.

Guilford baseert zich op een groot aantal psychologische tests. Door middel van faktoranalytische bewerking komt hij tot een rubricering van deze tests. De populatie waarop zijn gegevens betrekking hebben, is overigens moeilijk vergelijkbaar met die van Mark. De populatie die Guilford gebruikt bestaat namelijk merendeels uit volwassenen met een intelligentie boven het gemiddelde die niet gestoord zijn in de „psychische functies”. Mark gaat uit van kinderen met leerstoornissen.

Evenals Mark lijkt Guilford het organisme, de black box, op te vatten als een informatieverwerkend systeem, dat voor deze informatieverwerking een aantal *operaties* ter beschikking heeft. Een belangrijk verschil tussen Mark en Guilford is echter dat bij het konstruktie-model van Mark diverse hiërarchieën gepostuleerd worden, terwijl Guilford daarentegen zijn model hiërarchieloos d.w.z. morfologisch presenteert.

De term „operation” wordt door Guilford gedefinieerd als „Major kinds of intellectual activities or processes; things that the organism does in the *processing of information*, information being defined as „that which the organism discriminates”.

Door Guilford worden 5 *operaties* onderscheiden:

- 1e. Cognition (C): „Immediate discovery, awareness, rediscovery or recognition of information in its various forms; comprehension or understanding.”
- 2e. Memory (M): „Fixation of newly gained information in storage”
- 3e. Divergent Production (D): „Generation of logical *alternatives* from given information where the emphasis is upon variety, quantity and relevance of output from the same source”.
- 4e. Convergent Production (N): „Generation of logical *conclusions* from given information where the emphasis is upon achieving unique or conventionally best outcomes”.
- 5e. Evaluation (E): „Comparison of items of information in terms of variables and making judgements concerning criterion satisfaction”.

Guilford onderscheidt naast „Operation” een zestal „*Products*”

Onder „Products” verstaat Guilford: „Basic forms that information takes in the organism's processing of it”

- 1e. Units (U): „Relatively segregated or circumscribed items or „chunks” of information having „thing” character. May be close to Gestalt psychology's „figure on a ground”.

- 2e. Relations (R): „Connections between items of information based upon variables or points of contact that apply to them. Relational connections are more definable than implicational connections”.
- 3e. Implications (I) „Circumstantial connections between items of information, as by virtue of contiguity, or any condition that promotes „Belongingness”.
- 4e. Systems (S): „Organized or structured aggregates of items of information complexes of interrelated or interacting parts”.
- 5e. Classes (C): „Conceptions underlying sets of items of information grouped by virtue of their common properties”.
- 6e. Transformations (T): „Changes of various kinds (redefinitions, shifts, transitions, or modifications) in existing information.”

Zowel Guilford als Mark geven aan dat verschillende zintuigmodaliteiten in acht moeten worden genomen, zoals visuele, auditieve, kinesthetische en eventueel ook combinaties daarvan (Guilford p. 20; Mark zie 4.1.3.2)

Een dimensie die Guilford verder toevoegt is de „Content” der stimuli en wel onderverdeeld in:

- 1e. Figural (F): „Pertaining to information in concrete form as perceived or as recalled in the form of images”.
- 2e. Symbolic (S): „Pertaining to information in the form of denotative signs having no significance in and of themselves: such as letters, numbers, musical notations, codes and words (as ordered letter combinations)”.
- 3e. Semantic (M) „Pertaining to information in the form of conceptions or mental constructs to which words are often applied, hence most notable in verbal thinking and verbal communication”.
- 4e. Behavioral (B): „Pertaining to information essentially nonfigural and nonverbal, involved in human interactions, where the attitudes, needs desires, moods, intention, perception, thoughts etc. of others and ourselves are involved.

De visie van Guilford wordt weergegeven in de „structure of intellect” (zie onderstaand figuur).

fig. 5. *The structure of intellect - naar Guilford.*

4.1.3.4. Ontwikkelingspsychologische benaderingen

Uit de veelheid van informatie betreffende neuropsychologische en cognitief psychologische konstruktie modellen werden in het voorgaande twee auteurs geselecteerd waarbij als criterium gold de poging tot invulling, operationalisatie en instrumentele realisering van de hypothetische konstrukties in de black box. Hoewel een benadering vanuit ontwikkelingspsychologische zijde zeker de moeite waard is, leek deze voor de onderhavige studie iets minder relevant. De interesse in deze studie gaat uit naar een momentane toestand van een volwassen patiënt met cerebrale stoornissen. Het is hierbij de vraag in hoeverre een ontogenetische ontwikkeling bij assessment en modifikatie van belang is. (Voorzover een ontogenese, hoe plausible dan ook, op dit moment reeds ondersteund wordt door een hecht empirisch fundament)

Ontwikkelingspsychologische en orthopedagogische publikaties getuigen weliswaar van een rijkdom aan denkbeelden, maar aan een konkretisering van een „taxonomie” naar hypothetische konstrukties overeenkomstig Mark of Guilford, lijkt nog geen gestalte te zijn gegeven. (voor zover bekend hier) Niettemin wordt er door een groot aantal ontwikkelingspsychologen en orthopedagogen in hun praktische benaderingswijze (van bijvoorbeeld het leergestoorde kind) gewerkt onder ogenschijnlijk impliciete aanname van een reeds empirisch ondersteunde „funktietaxonomie”.

De hiërarchie naar ontwikkeling zoals door Dumont (1973) weergegeven (bewegen, verinnerlijkt bewegen, gesproken taal, geschreven taal, mathematische taal) doet zeer sterk aan de indeling van Mark denken. Hoewel een dergelijke analogie (vermoedelijk ontleend aan Osgood) tussen Dumont en Mark uitermate stimulerend werkt, is de daaropvolgende serie in zijn boek gepresenteerde tests enigszins pover te noemen. Hierin representeert zich op geen enkele wijze een diagnostiek naar gelaagdheid of hiërarchie, terwijl ook de door Mark zo beklemtoonde kanaal-specificiteit ontbreekt.

Onder de inspiratie van o.a. Piaget, Osgood en vele anderen wordt door logopedisten voorlopig gesproken over o.a. evokatie, imitatie en prediktie (zie o.a. Dumont 1973); door speltherapeuten van bewegingsspel, konstruktiespel en fantasiespel (persoonlijke mededeling); door fysiotherapeuten inzake het opdoen van bewegingservaring, bewuste bewegingservaring en stabilisatie van de beweging. (zie Kugel 1976 en Koolen 1974). Eveneens wordt onder hantering van dit soort en andere begrippen veelvuldig een hiërarchie in ontogenese als bewezen geacht. Hoewel al deze concepten (en waarschijnlijk meer) uitermate zinvol kunnen zijn, zou een empirisch wetenschappelijke ondersteuning van deze ideeën gewenst zijn. Aangezien deze ondersteuning vooralsnog tamelijk onzeker lijkt te zijn, wordt van een verdere bespreking afgezien.

4.1.3.5. Overzicht.

Zoals eerder werd opgemerkt is het binnen het kader van deze studie onmogelijk om alle stromingen te behandelen. Volstaan werd met de „lijnen” welke niet slechts qua theoretische konstruktie maar eveneens wat betreft konkrete realisering in de vorm van een funktietaxonomie, enige betekenis leken te hebben. Hoewel het systeem van Mark wel degelijk perspektief schijnt te bieden moet gezegd worden dat zijn denkbeelden tamelijk speculatief zijn. Met name de veronderstellingen inzake een hiërarchische structuur en ontwikkeling (naar ortogenese) worden op welhaast intuïtieve wijze als „bewezen” gepresenteerd. De gebruikte terminologie in zijn literatuur is op diverse punten tamelijk onduidelijk en vaag te noemen. De praktisch te realiseren diagnostiek lijkt niet eenvoudig uit te voeren en dit is des te meer

belangrijk, indien men de eis stelt dat vanuit deze diagnostiek mogelijkheden voor therapietoepassing moeten voortkomen.

De konstruktie van Guilford wordt gefundeerd door een circa 20-jarige research, hetgeen niet van Mark gezegd kan worden. Daarentegen „beweegt” Guilford zich op (louter) cognitief „niveau”, terwijl Mark eveneens pretendeert de sensomotorische koppeling binnen zijn konstruktie-model een plaats te kunnen geven. Een tekort in de benadering van Guilford is het feit dat hij zich, in tegenstelling tot Mark, niet occupeer met een onderscheid naar tests in de diverse modaliteiten en responsmogelijkheden. Het onderscheid naar „kanaalspecificiteit” lijkt bij het onderzoek naar cerebrale stoornissen een tamelijk reëel uitgangspunt te moeten zijn. Tenslotte wijst Guilford iedere hiërarchische gelaagdheid af en zijn zijn tests dusdanig ontwikkeld dat interkorrelatie grotendeels afwezig is.

Resumerend kan gesteld worden dat de ter beschikking staande informatie geen uitzicht biedt voor het opzetten van een goed gefundeerde taxonomie. Dit is des te meer klemmend, aangezien de revalidatie van cerebraal gestoorden niet kan wachten op een empirisch getoetste benadering. Een eventueel te konkretiseren taxonomie zal dus opnieuw gekenmerkt worden door grote onzekerheden. Niettemin zal in hoofdstuk 5 een poging gedaan worden met de ter beschikking staande gegevens een voorlopige taxonomie op te stellen. Een eventueel te konkretiseren taxonomie zal gepaard dienen te gaan met zeer omvangrijke en gedegen researchactiviteiten.

4.1.4. Assessment van gedragstekorten in de klinische observatiesituatie

4.1.4.1. Probleemstelling

In 2.3.2.1. werd reeds een omschrijving gegeven van het hier geïntroduceerde begrip „klinische observatiesituatie” en wel als een soort intermediair tussen de „test-situatie” en de „nabehandelingssituatie” met als doel een betere prediktie van het gedrag. In allerlei situaties ook buiten de testsituatie zijn d.m.v. gedragsobservatie diverse gedragstekorten te signaleren, die niet noodzakelijk behoeven te korreleren met gedragstekorten in de testsituatie. Deze signalering van gedragstekorten zijn meestal een signalering-per-toevalligheid, dat wil zeggen zonder systematische screening. Teneinde een eventuele modifikatiepoging meer gestructureerd te kunnen realiseren werd overwogen een systematische observatie te introduceren. Aangezien de tot nu toe vervaardigde observatieschalen betrekking hadden op andere populaties en bovendien op een beperkt gedragsarsenaal, werd naar andere mogelijkheden gezocht.

Het observeren van gedrag met het voorbijzien van zowel de hypothetische konstrukties in de black box, als ook van de relatie met het anatomisch substraat sluit uitdrukkelijk aan bij het operante model. Ook Fordyce toont zich een aanhanger van direkte observatie en modifikatie van gedragstekorten, met voorbijgaan van de hypothetische konstrukties. Des te meer merkwaardig is het dat Fordyce (zie 4.1.3.1. en 1971 - 1 p. 190) zich desondanks toch ook uitlaat in termen ontleend aan een cybernetisch model. Dit dualisme wordt bij verscheidene auteurs aangetroffen, waardoor het probleem blijft bestaan vanuit welke positie men in de praktijk der revalidatie dient te kiezen. Zo te zien zijn er drie mogelijkheden: Het aksent valt volledig op de black box en de daarin veronderstelde systemen; men richt zich alleen op de gedragsobservatie onder voorbijgaan van interveniërende variabelen; men doet zowel het één als het ander.

Kiest men, gezien de onzekerheid der hypothetische konstrukties en mogelijk in verband met de irrelevantie hiervan, voor beperking tot gedragsobservatie, dan zal

men toch moeten zoeken naar een of ander observatiesysteem. Signalering ad hoc blijft immers onbevredigend. Het alternatief is te streven naar een structuur of overzicht wat betreft de soorten gedragingen, die men wil observeren en de wijze waarop dit gaat gebeuren. Wellicht zal het eveneens mogelijk of zelfs noodzakelijk zijn te zoeken naar een opbouw of hiërarchie van gedragingen naar complexiteit. Dit lijkt een algemeen ethologisch probleem te zijn. Een extra moeilijkheid hierbij is dat de bestaande literatuur weinig informatie levert over de opzet van een dergelijk systeem, zodat men geheel moet drijven op eigen creativiteit.

Kiest men er voor in de assessment voorzichtigheidshalve zowel tests als observeerbaar gedrag in de niet-testsituatie te laten meetellen, dat staat men eveneens voor een moeilijk dilemma. Men kan beide gegevens los van elkaar hanteren en zet dan ook bij gebleken gedragstekorten vanuit de testsituatie en observatiesituatie allerlei modifikaties, onafhankelijk van elkaar op. Men gaat er dan vanuit dat de twee uitgangspunten afkomstig zijn uit twee verschillende systemen, die niet noodzakelijk met elkaar in verband hoeven staan. Het alternatief voor eerstgenoemde keuze bestaat uit een poging om toch weer aansluiting te zoeken tussen beide systemen. Een eerste aansluiting lijkt te bestaan uit het zoeken naar korrelaties en/of generalisaties tussen beide methoden van onderzoek en modifikatie. Een andere aansluiting kan gezocht worden in het „afstemmen” van beide onderzoekssystemen en modifikatiestrategieën op elkaar. De opgave die dan onvermijdelijk wordt is om aan te geven, waar de assessment van hypothetische konstrukties (systeem- of funktieassessment) overgaat in gedragsobservatie en waar men bezig is met „funktierestauratie” danwel „gedragsvorming”

De gerezen vragen kunnen samengevat worden onder de volgende probleemstellingen:

- 1e. Is het mogelijk om een keuze te doen tussen: alleen gedragsobservatie of gedragsobservatie en psychologisch (test)onderzoek?
- 2e. Indien beide systemen relevant lijken, moet men deze dan afzonderlijk bezien of in relatie tot elkaar? Hoe liggen de korrelatieve verbanden tussen (test)onderzoekbevindingen en gedragsobservaties?
- 3e. Bestaat er enige informatie inzake structuur of opbouw van de gedragsobservatie?
- 4e. Indien beide systemen in acht genomen moeten worden is het dan duidelijk waar het ene systeem „overgaat” in het andere of is een dergelijke grens niet te trekken?

Probleemstelling 1. De keuze tussen alleen gedragsobservatie danwel de combinatie van gedragsobservatie en assessment van hypothetische konstrukties.

In de literatuur wordt dit keuzeprobleem op verschillende wijzen en op verschillende gebieden gesignaleerd. Als voorbeelden van door diverse onderzoekers/auteurs in deze gemaakte keuze zijn te noemen:

Feschbach C.S. (1974) „Two alternative models for identifying Kindergarten age children with a high risk of becoming reading failures are compared. One model places primary emphasis on psychometric test procedures assessing linguistic and perceptual – motor skills related to reading readiness. The alternative strategy is based upon the kindergarten teacher's evaluations of child's skills and behavior . . .”

Diller L. (1976): „Two basic paradigms are currently popular (1) Shaping a behavior which is inadequate in a real life situation e.g. Goodkin speeded up the performance of a patient who moved slowly in a wheelchair. (2) Improving performance in a test situation e.g. Zane and Goldman trained a patient to pass the face-hand test.

Both approaches have their limitations . . . In the case of shaping real life behaviors in brain damaged people, generalization may be limited. The patient may speed up in the hospital corridor, but not in a different setting. The same can be said about performances in testsituations (. . .)".

Poor C. c.s. (1975): „ . . . there are differences of opinion among professional evaluators as to which approach, or approaches, are the most meritorious. The four principle approaches are (a) Mental testing (b) Work sampling (c) Situational analysis (d) Job try-outs". (Dit citaat is afkomstig uit een artikel dat probeert aan te geven hoe arbeidsmogelijkheden beoordeeld kunnen worden, (a) is analoog aan de „testsituatie", (b) komt overeen met de „klinische situatie". (c) lijkt een overgang naar de werksituatie, de nabehandelingssituatie (d) is duidelijk de werksituatie).

Dumont (1973 p. 244): „Lezen en rekenen zijn geen ontwikkelingspsychologische produkten, dat kan niet genoeg herhaald worden, maar vaardigheden, die het kind moet verwerven op grond van ontwikkelingsvoorwaarden, die dat mogelijk maken. Daarbij is het zich ontwikkelende en lerende kind afhankelijk van de didaktische aanbieding (. . .). Didaktiek is het aanbieden van de leerstof, rekening houdend met het al dan niet vervuld zijn van de leervoorwaarden in het kind". Hier wordt dus een onderscheid gemaakt in twee „systemen" nl. *leervoorwaarden* als resultaat van ontwikkeling en *vaardigheden* als resultaat van een goede didaktische aanbieding. Gunzberg (1973 p. 26): „Te veel wordt nog een onmiddellijk verband gelegd tussen een te laag IQ en een onvoldoende sociale aanpassing bij zwakzinningen". p. 33: „Een vergelijking van leeftijdgenoten met ongeveer dezelfde intelligentie-uitslagen vestigt de aandacht op verschillen in sociale aanpassing (. . .) een verschil van enkele IQ-punten kan zeker niet als reden gelden; ervaring, rijping, onderwijs en opvoeding zijn de belangrijkste aspecten.

p.75: „ . . . verstandelijke achterstand is slechts in een enkel geval verantwoordelijk voor het gebrek aan elementaire sociale vaardigheden".

Uit bovenstaande literatuurvoorbeelden kan minstens de konklusie getrokken worden, dat het aanbeveling verdient zowel tests, alsook gedragsobservatie in de assessmentprocedures te betrekken.

Probleemstelling 2: Welke gegevens zijn er voorhanden wat betreft het verband tussen de twee modellen.

Feshbach c.s. (1974) vindt in zijn studie over leesgestoorde kinderen korrelaties die variëren van .46 tot .52, tussen enerzijds tests als WPPSI, Otis, de Hirsch en anderzijds gedragsobservaties volgens de Student Rating Scale en Kohn Social Competence Scale. De psychologische tests v.s. criterium „leesprestatie" en gedragsobservatieschalen v.s. „leesprestatie" vergelijkend konkludeert hij: „For the present we are encouraged by the finding that a Kindergarten teacher's rating can predict first grade reading achievement at least as efficiently as a psychometric battery that has been designed for this purpose".

De interkorrelatie tussen tests en gedragsobservatie als ook de korrelatie testkriterium en observatiekriterium zijn volgens Feshbach bevredigend.

Diller (1970) vergelijkt prestaties op de „Digit Cancellation Task", met het aantal ongelukken, dat patiënten met rechter- en linker-hemisfeerstoornis vertonen in hun vaardigheid bij het omgaan met hun rolstoelen. Bij deze tests worden tijd en aantal korrekte pogingen gemeten. De linker-hemisfeergestoorden variëren t.o.v. de „normalen" in nauwkeurigheid. De rechter-hemisfeergestoorden zijn nauwkeuriger, maar langzamer op deze test dan linker-hemisfeergestoorden ($p < .01$).

Het aantal ongelukken staat in relatie met de mate van nauwkeurigheid en niet met de tijd ($p < .01$). M.a.w. linker-hemisfeergestoorden, die laag scoorden op de test

hebben meer ongelukken bij het zich verplaatsen naar en het rijden in een rolstoel. Gunzberg (1973 p. 190 e.v.) vergelijkt in een goed gecontroleerd onderzoek twee groepen zwakbegaafden met eenzelfde intelligentieniveau, kalenderleeftijd en sociaal niveau. Intelligentie werd bepaald door de Terman-Merrill-schaal en het sociale niveau door de Vineland-schaal. De experimentele groep kreeg training in allerlei vaardigheden als winkelen, gebruik van openbaar vervoer, boodschappen doen etc. Na afloop van de training bleek het intelligentieniveau niet veranderd, echter de score op de Vineland was voor de experimentele groep significant hoger dan voor de controlegroep. ($p < .01$ niveau).

Palker (1972) komt tot een enigszins andere konklusie als Gunzberg (p. 35) „Results indicate that hyperactive children have an intellectual (lower WISC IQ's) as well as behavioral handicap (scores on school achievement) but that they do learn schoolwork at the rate normal for their level of intelligence.”

Loney (1972), Reed (1967) en Larsen (1973) komen uit hun onderzoeken eveneens tot de konklusie dat, althans bij de door hen onderzochte populatie van leesgestoorde kinderen, een lage intelligentie niet of nauwelijks korreleert met leesprestaties.

De konklusie kan voorlopig zijn, dat een intelligentieonderzoek niet noodzakelijk hoeft te korreleren met sociale vaardigheden of leesvaardigheden, maar dat er gezien Feschbach's resultaten misschien betere tests bestaan, die dat wel doen.

Aangezien via literatuuronderzoek (Rehabilitation Abstracts 1973-1976) voorshands geen andere studies werden gevonden, blijft de probleemstelling inzake de relatie testgedrag – gedragsobservatie voorlopig onopgelost. Rond de probleemstelling „structuur der observatieschalen” blijken meer gegevens voorhanden waarop in de hierna volgende sub-paragraaf zal worden ingegaan.

4.1.4.2. Samenstelling van enkele gedragsobservatieschalen

Teneinde probleemstelling 3 nader te bestuderen zal nagegaan worden of er observatieschalen bestaan, welke gericht zijn op het gedrag van cerebraal gestoorde patiënten en of het mogelijk is hierin enige structuur of systematiek te ontdekken. In het navolgende zullen enkele informaties hieromtrent worden gepresenteerd.

Fordyce (persoonlijke mededeling) blijkt zich in zijn gedragsmetingen te richten op: gedragsverandering, beroepsprestaties, sociale vaardigheden, vrijetijdsbesteding en zelfverzorging.

Zijn doelstellingen en ideeën lijken voor een deel overeenkomstig te zijn aan de gedachtengang, die in deze studie wordt verwoord.

Het geheel is in een researchstadium.

Diller (persoonlijke mededeling) onderscheidt op zijn beurt drie globale hoofdgebieden, nl.: Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), sociaal gedrag, beroepsprestaties. Iedere hoofdgebied lijkt onderverdeeld te zijn. Het geheel is in researchstadium. In de reeds eerder genoemde studie van Feshbach c.s. (1974) werden potentiële leergestoorde kinderen geobserveerd m.b.v. de Student Rating Scale en de Kohn Social Competence Scale. Eerstgenoemde schaal bevat items, die betrekking hebben op het cognitieve, affectieve en sociale functioneren van het kind in de klas. Laatstgenoemde observatieschaal heeft twee subschalen betreffende respectievelijk sociaal en emotioneel functioneren. De publikatie van Feschbach geeft geen verdere informatie omtrent de samenstelling der schalen.

Rosinsky (1975) verschaft uitgebreidere informatie inzake een instrument dat door hem gebruikt werd ter bepaling of een patiënt geschikt zou zijn voor plaatsing in een beschutte werkplaats. De gedragsgebieden welke hij hanteert hebben niet slechts

betrekking op het kunnen omgaan met gereedschap e.d., maar ook op gedragsvoorwaarden voor plaatsing in een werkplaats. Rosinsky onderscheidt in de uiteindelijk konstruktie van zijn CELE (Controlling Environmental Laboratory Evaluation): cognitieve, psychomotorische, en affectieve aspecten en verder een categorie „andere gedragsmogelijkheden”.

Wehman (1975) en Rosinsky (1975) dwingen a.h.w. tot een uitspraak inzake terminologie en positiebepaling. Beide auteurs betrekken in hun observatiesysteem, gedrag, dat vereist wordt om in de toekomst op een (beschutte) werkplaats arbeid te kunnen verrichten. De observaties worden bij beide auteurs uitgevoerd in een „voorstation”. dat voorafgaat aan een eventuele plaatsing. De soorten gedragstekorten die door beiden genoemd worden, werden echter in deze studie eveneens gekonstateerd in de klinische situatie bijvoorbeeld het dagverblijf, de gangen, op arbeidstherapie etc.

Om der wille van de overzichtelijkheid en efficiëntie in werkwijze wordt hier het standpunt ingenomen, dat het geven van speciale cursussen (metaalbewerken, autogeen lassen, administratieve cursussen e.d.) beoordeeld en gegeven moeten worden in de „nabehandelingfase”. In de klinische fase dient het aksent te liggen op observatie en modifikatie van gedrag, dat voor het volgen van een dergelijke cursus een *voorwaarde* is. Volgens deze visie behoort bijvoorbeeld „het leren klokkijken”, „het omgaan met geld”, „gebruik kunnen maken van publiek vervoer” in een mogelijk wat meer te controleren situatie, de klinische fase te geschieden. Dit soort vaardigheden worden niet slechts gezien als voorwaarden voor werkaanpassing, maar integendeel en meer omvattend, als voorwaarden om de gehele complexe leefruimte in fysiek en cultureel opzicht te kunnen hanteren.

Aangezien ook het merendeel der gedragsobservaties van Wehman en Rosinsky op laatstgenoemde „vaardigheden” betrekking hebben, worden beide auteurs hier onder de „klinische situatie” behandeld.

Wehman (1975) is de eerste, die naast het noemen van een aantal observatiegebieden een mogelijke hiërarchie persenteert.

Hij noemt zijn observatieschaal „Curriculum for Social Skills in Vocational Setting”. (De schaal heeft betrekking op mentaal geretardeerden.) Hij meent dat een dergelijke schaal aan drie voorwaarden moet voldoen:

„(1) Provide behavioral objectives as training goals, (2) provide an approximate sequence or direction in which skills should be trained and (3) provide a basis for periodic evaluation and accountability”.

Zijn hiërarchie bestaat uit vier niveaus van toenemende complexiteit (zie ook figuur 6).

- 1e Personal Care level, which is made-up of selected self-help skills.
- 2e. Primary Interaction Level, a level encompassing certain remedial communication skills.
- 3e. Job and Community Survival Level, made-up of critical survival skills necessary to exist in the job.
- 4e. Advanced Interaction Level, this level deals with the more subtle and sophisticated forms of human interaction, i.e. trust, cooperation.”

Enige belangrijke opmerkingen van Wehman zijn de volgende:

- a. „Skills are described *behaviorally* rather than as constructs.
- b. An easy-to-hard learning sequence is established; that is, it is presumed that learning takes place more readily at the lower stages of the model.
- c. Where appropriate, skills in the curriculum are broken into subcomponents and discussed”.

Ook Wehman stelt dus, conform het standpunt ingenomen in deze studie (zie

2.2.3.1.), dat in een observatieschaal „vaardigheden” meer functioneel te beschrijven zijn in gedragstermen dan in termen van konstrukties. Voorts onderstreept hij de waarde van successieve approximatie en het opdelen van een taak in componenten, hetgeen opnieuw de aandacht vestigt op de bekende leertheoretische principes.

Fig. 6

Hierarchische opbouw van het „Curriculum for Social Skills in Vocational Settings” volgens Wehman.

Gunzberg (1974) onderscheidt in zijn Progress Assessment Chart (PAC) een groter aantal observatiegebieden en deelgebieden dan voorgaande auteurs.

De samenstelling der PAC is gekenmerkt door:

- 1e. Differentiatie naar diverse leeftijdsgroepen van mentaal geretardeerden nl.: P-PAC 0-7 jaar, PAC-1 vanaf 6-16 jaar, PAC-1a een aanvulling van PAC-1 met name gericht op sociale ontwikkeling, PAC-2 volwassenen.
De M/PAC-1 is een versie van de PAC-1 bestemd voor de evaluatie van mongoloïde kinderen van 6-16 jaar.
- 2e. Voor iedere leeftijdsgroep wordt het te observeren gedrag onderverdeeld in „gebieden” nl. zelfstandigheid, communicatie, socialisatie en bezigheden.
- 3e. De „gebieden” worden elk weer onderverdeeld in „deelgebieden”, waarvan de terminologie per leeftijdsgroep enigszins varieert. Globaal worden de volgende deelgebieden onderscheiden:
Zelfstandigheid: eten en tafelmanieren, wassen en hygiëne, aankleden, zorg voor kleding, bewegen, gezondheidszorg.

Kommunikatie: taalverwerving, rekenen en geldhantering, tijd en maten onderscheiden, schrijven, lezen.

Socialisatie: winkelen, omgangsvormen, huishouden, omgaan met geld, sociaal bewustzijn en initiatief.

Bezigheden: handvaardigheid, vrijetijdsbesteding, behendigheid en nauwkeurigheid, snelheid, stiptheid.

- 4e. Ieder deelgebied bestaat uit een aantal observatie-items, waarbij de wijze van afname en het criterium voor scoring redelijk nauwkeurig worden aangegeven.

Een aantal hiërarchieën zijn hierbij ingebouwd:

A. Een globale hiërarchie in leeftijdsgroepen.

B. Een meer gedifferentieerde opbouw van deelgebieden bij de hogere leeftijden.

C. Een toename van moeilijkheidsgraad bij ieder deelgebied.

De scoringsgegevens worden uiteindelijk gegroepeerd in een cirkel, ingedeeld in 4 kwadranten (de hoofdgebieden). Ieder kwadrant is ingedeeld in 2-5 sectoren (de deelgebieden). Iedere sektor betaamt uit een aantal vakjes, die vanuit het middelpunt in concentrische cirkels geplaatst zijn. Deze vakjes zijn genummerd volgens de volgorde der observatie-items, waarbij de meer gemakkelijke itemvakjes dicht bij het middelpunt liggen en de moeilijkere items meer naar buiten zijn geplaatst.

Ter verduidelijking wordt verwezen naar de volgende figuur. Een goede behandeling van het observatiesysteem van Gunzberg zou vele bladzijden vergen. Voor een nauwkeuriger bestudering moet derhalve verwezen worden naar de literatuur. In vergelijking met de overige genoemde auteurs lijkt Gunzbergs observatiesysteem het meest gedifferentieerd.

Fig 7: Gunzbergs observatie/rapportage-systeem

Resumerend leidt een analyse van diverse observatieschaalkonstrukties tot de volgende conclusies:

1e. In de schaalkonstrukties worden onderling verschillende observatiegebieden onderscheiden. Deze zijn voor zover vergelijkbaar in onderstaande tabel weergegeven.

TABEL 11

Fordyce	Diller	Rosinsky	Wehman	Gunzberg
gedragsverandering				
beroepsprestaties	beroepsprestaties		Job Survival	
sociale vaardigheden	sociaal gedrag	affectie	Pr. en Sec. Interaktie	Socialisatie
vrijtijdsbesteding				Bezigheden
	A.D.L.		Personal Care	Zelfstandigheid
		Cognitieve Vaardigheid		kommunikatie

2e. Er is bij sommige auteurs sprake van de onderverdeling van observatiegebieden in deelgebieden. De Progress Assessment Chart van Gunzberg is hierbij het meest genuanceerd.

3e. Alleen Wehman spreekt zich expliciet uit inzake een voorkeur voor een *hiërarchie* in observatiegebieden. Bij Gunzberg is deze hiërarchie aanwezig in de differentiatie naar leeftijdsgroep en in de volgorde der „moeilijkheid” van de items in de deelobservatiegebieden.

4e. Bij Rosinsky is niet duidelijk sprake van een gekonstrueerde observatieschaal. Hij doet een beroep op bestaande (deel)schalen. Bij Fordyce en Diller zijn de schalen nog in een researchstadium.

5e. In feite biedt alleen de PAC van Gunzberg een overzichtelijk gestructureerd observatie-netwerk.

4.1.4.3. Aansluiting tussen test en gedragsobservatieschaal

Voorgaande informatie werd ontleend aan publikaties welke werden aangetroffen in de Rehabilitation Abstracts 1973-1976 en vanuit informatie uit diverse toonaangevende centra in de USA.

Indien deze verzameling van gegevens representatief is voor de stand van zaken inzake de gedragsobservatie t.b.v. revalidatiepatiënten en meer in het bijzonder de cerebraal gestoorde onder hen, dan levert deze situatie weinig op om op voort te bouwen. Er bestaat eigenlijk geen schaal, die rekening houdt met de gesignaleerde diversiteit aan gedragstekorten en de specifieke criteria inzake observatie en gedragscorening ten behoeve van deze patiëntenkategorie. Hoewel er in diverse centra aan systematische gedragsobservatie gedacht en gewerkt wordt, heeft dit

vooral nog geen voldoende gefundeerde toepasbare resultaten opgeleverd. Zelfs Fordyce en Diller, die toch in deze als „koplopers” beschouwd kunnen worden, zijn niet veel verder dan een researchstadium, hetgeen overigens veel verder is dan enig onderzoeker of revalidatiecentrum in Nederland.

De huidige stand van zaken maakt een poging gedragstekorten in de testsituatie te relateren aan gedragstekorten, gebleken uit observatie, tot ontwikkelingswerk op een achter gebleven gebied van de gezondheidszorg. Hiermee wordt niet primair bedoeld eventuele berekening van korrelaties, die trouwens eveneens schaars zijn, maar het oplossen van probleemstelling 4: „Waar gaat het ene model in het andere over”, dan wel, „bestaat er een analogie tussen het conceptual frame work „testprestatie versus gedragsobservatie” naar gepresenteerde stimulusconfiguraties en responssoorten. Een dergelijke analogie zou immers aanzienlijk bijdragen tot overzichtelijkheid en systematiek in de wijze van assessment. Het zou wenselijk zijn, door middel van factoranalyse, empirisch na te gaan of, en zo ja, hoe de verschillende meetsystemen samenhangen. Het zou dan zelfs kunnen blijken dat één der systemen gemist kan worden, namelijk indien het andere systeem een gedragstekort net zo goed meet en beter aansluit op een modifikatiestrategie. De enige persoon, die hieromtrent een boodschap lijkt te hebben is Diller, wiens publikatie (winter 1976) de meest recente in de lijst is.

Diller begint met de vier langzamerhand overbekende probleemstellingen te signaleren.

„(1) Wat is het probleem van de patiënt? (2) Hoe en wat tracht men te diagnosticeren? (3) Wat omvat de behandeling? (4) Is deze behandeling effectief?” Vervolgens gaat hij over tot de presentatie van zijn assessmentprocedure, die weergegeven wordt in onderstaande figuur, tabel en begeleidende tekst.

Fig. 8

A model for Remediation of Perceptual / Cognitive Problems in Brain Damaged People (naar Diller)

Dit model lijkt samengesteld te zijn uit de volgende elementen: (1) Vaststelling van de defekte vaardigheid. (2) Vaststellen van een taak of test, die de vaardigheid representeert. Deze test moet geanalyseerd worden in (3) stimuluseigenschappen en (4) responseeigenschappen. Zowel vaardigheid als test moeten gerelateerd worden

aan (5) activiteiten van het dagelijks leven (6) andere taken (7) neurologische verbanden. (8) Tenslotte wordt er een training uitgevoerd (welke, is hierbij niet duidelijk).

Tabel 12

Factors which have been varied in Training Brain Damaged People		
Stimulus Characteristics		
1. Speed of presentation 2. Singly or simultaneously 3. Density or context 4. Orientation 5. Locus in space 6. Load	7. Type materials 8. Sensory modalities 9. Sensory context 10. Three v.s. two dimensions 11. Anchoring 12. Concrete v.s. Abstract	13. Options for responding 14. Size 15. Color 16. Relationship to other stimuli 17. Familiarity 18. Interest 19. Moving v.s. Still
Respons Characteristics		
1. Speed 2. Duration 3. Feedback 4. Type Error-Omission/Commission	5. Rate 6. Initiation 7. Nature of the Error	

„We can illustrate our model by its application to a concrete instance.

- (1) The problem of spatial neglect associated with damage to the right hemisphere.
- (2) An excellent task for eliciting problems of spatial neglect is visual cancellation which requires an active search of the environment.
- (3) Visual cancellation can utilize a variety of stimuli (letters, numbers words, pictures, shapes) which can be distributed on the right and, or left-side of the page and which may also differ in how densely they are placed (...).
- (4) It is sensitive to errors of omission as well as commission. It shows what part of the page elicits more errors. Finally performance can be timed.
- (5) Performance on visual cancellation is correlated with a number of features in activities of daily living, including accidents, difficulties in reading and learning to transfer from a wheelchair to a regular chair and back (...).
- (6) Respons to visual-cancellations also has a number of neurological correlates among them are damage to the right as opposed to the left hemisphere and the presence of visual field defects”.
- (7) Training (wordt niet genoemd).

Toegepast op een van de konkrete vaardigheden waarvoor Dillers werkmodel is ontworpen, blijkt de volgende procedure te worden gevolgd (nummering is identiek aan bovenstaande volgorde).

- (1) (2) Bij die patiënten, waarbij via neurologisch onderzoek o.a. is aangetoond, dat de patiënt hemianopsie heeft, gaat men over tot assessment in de klinische testsituatie.
- (3) (4) Hierbij gebruikt men een aantal instrumenten onder variatie van stimulus inhouden en limit testing, waarvan bekend is dat deze hemianopsie kunnen diagnosticeren, en onderzoekt de respons.

- (5) (6) Er wordt gekeken in hoeverre ook observeerbaar gedrag in andere situaties wordt beïnvloed. (Indien men zulks zonder meer onderneemt, dan is er sprake van korrelatie op basis van „face validity” en meer niet.)
- (7) Er wordt (nogmaals) onderzocht wat de gevolgen zijn op neurologische basis.
- (8) De invalshoeken voor therapie zijn niet duidelijk.

Deze werkwijze behoeft het volgende kommentaar:

1e. De verwachte aansluiting tussen test en gedragsobservatie komt hier enigszins aan de orde.

2e. Van een *systematische* screening met behulp van psychologische tests, danwel van gedragsobservatie is echter geen sprake. Het lijkt wat op een benadering in de vorm van de „single case study” (zie Shapiro 1966), waarbij t.b.v. de individuele patiënt een individuele assessment en therapieprogramma wordt opgezet.

Deze benadering van Shapiro is efficiënt gebleken in de situatie waarin een beperkt aantal symptomen via de individuele patiënt-therapeut relatie moet worden gemodificeerd.

In deze studie wordt voorsnog beoogd, dat er dankzij een systematische assessment d.m.v. tests en/of gedragsobservatie een modifikatie mogelijk is, die gerealiseerd wordt door een multidisciplinaire aanpak.

De aanpak van Diller is van niet te onderschatten waarde en komt in hoofdstuk V opnieuw ter sprake. Zij is vrijwel analoog aan de benaderingswijze die in deze studie wordt voorgestaan..

4.1.5. Assessment van gedragstekorten in de nabehandelingssituatie

Terugkeer vanuit de kliniek naar huis stelt de patiënt min of meer definitief voor bepaalde taken, bezigheden of activiteiten. Het woord „taak” wordt hier verkozen, enerzijds om niet direkt te belanden in de arbeidssfeer, maar anderzijds omdat de patiënt toch een verantwoorde taak voor zichzelf en zijn omgeving zal willen nastreven. Het wordt hoe langer hoe duidelijker, dat revalidatie niet slechts gericht dient te zijn op het weer kunnen vervullen van een bepaald beroep en eveneens dat zuiver fysieke revalidatie slechts één, hoewel belangrijk, onderdeel is van het totale revalidatieproces. Hawryluk (1974) spreekt zich wat dit betreft zeer duidelijk uit: „Rehabilitation increasingly has become to mean more than placing a disabled client back in a job and adapting him to a work environment, laudable as this accomplishment may be (. . .). Disabilities are also changing. More and more clients are receiving services because of psychological, psychiatric, character or behavior disorders and proportionately fewer are being referred for physiological causes. Rehabilitation for these types of disability by its nature has to be broadly oriented and not solely concerned with occupational preparations”.

Met het groeiend besef dat de doelstelling van de revalidatie niet bepaald dient te zijn door arbeidshervatting en fysiek herstel, wordt het expliciteren van andere, nieuwe doelstellingen des te meer urgent. De hierna volgende publikaties leveren hiertoe een bijdrage:

Hawryluk (1974) ontwikkelde een instrument bestaande uit 5 dimensies:

- (1) Hours per week gainfully occupied (also included are hours per week spent as a student at school or in a training program).
- (2) Weekly earnings (gross wage and salary income).

- (3) Work status (the relative value of the clients status in comparison with a range of statuses clients frequently hold before, during and after their rehabilitation experience).
- (4) Economic dependency (Support funds received from either public or private sources).
- (5) Psychological well being (Responses to a 10 item self percept instrument).

Scherzer A. L. (1973) onderzocht kinderen met cerebral palsy na een intensief therapieprogramma wat betreft hun plaatsing op school; prestaties op het gebied van onderwijs en sociale ontwikkeling. (Hoewel dit hier met het oog op assessment misschien minder relevant is, kwam Scherzer tot de konklusie dat een hoge sociale status, stabiliteit in de familie en goede medische begeleiding een belangrijke bijdrage leverden in de ontwikkeling wat betreft bovengenoemde dimensie.)

Er van uitgaande dat revalidatie is: „Coping with a disability, a sliding scale of goals”, ziet Trieschmann (1974) als achtereenvolgende doelstellingen:

- (1) „Prevention of medical complications and utilization of ADL-mobility skills (2) Maintenance of a stable living environment (3) Productivity”. Toelichting: (ad. 1) „These behaviors are appropriate whether he resides at home or in an institute” (ad. 2) „If he lives alone he must be able to deal with the world to maintain his residence and physical needs. If he lives at home, his family interactions should not be disruptive to the extent that they interfere with his functioning” (ad. 3) „Productivity may entail vocational endeavours, education, social interactions and avocational pursuits”.

Mede op grond der uitspraken van deskundigen als Hawryluk, Scherzer en Trieschmann laten zich de revalidatiedoelstellingen in de situatie waarin patiënt voorbereid wordt op een hernieuwde konfrontatie met de maatschappij als volgt omschrijven:

- 1e. Het kunnen onderhouden van gedrag dat de patiënt tijdens het verblijf in het centrum heeft geleerd, d.w.z. het gebruiken van medicijnen, rolstoel, prothesen e.d. in die zin dat de patiënt tot op aanzienlijke hoogte tot zelfverzorging in staat is.
- 2e. Het kunnen onderhouden van sociaal contact. (Zowel Hawryluk, Scherzer als Trieschmann schijnen dit aspect als zeer belangrijk te ervaren).
- 3e. Het kunnen ondernemen van activiteiten welke betrekking kunnen hebben op (a) arbeid (b) hobby's (c) onderwijs. De aansluiting met Trieschmann lijkt duidelijk: na ontslag heeft de cliënt tot „taak” gedrag te ontwikkelen of te continueren dat gericht is op zelfverzorging, sociaal contact en „productiviteit”. Het is de opgave der revalidatie hem hier op voor te bereiden én na te gaan in hoeverre dit wordt gerealiseerd.

4.1.6. Assessment van gedragstekorten in de thuissituatie

Dit gebied wordt als „pro memorie” genoemd. Er is nauwelijks of geen literatuur beschikbaar hetgeen op zichzelf een teken aan de wand is voor de evaluatie en toepassing van de nazorg.

Als „taakgedrag” werd genoemd: zelfverzorging, sociaal contact, produktiviteit. De basis voor het onderhouden van dit taakgedrag dient gelegd te worden in het revalidatiecentrum, echter de revalidatie eindigt niet op het moment van ontslag, maar gaat verder als de persoon de opnieuw aangeleerde activiteiten inderdaad effectueert en continueert vanaf zijn rentree in zijn eigen leefwereld. Hoewel een en

ander niet in het ziekenfondspakket is inbegrepen, dient de revalidatie met name oog te hebben voor de omgeving, waarin de revalidant na ontslag terecht komt, de doeleinden die de persoon wenst te ontwikkelen en de vaardigheden die hiervoor vereist zijn. Alle inspanning tijdens het klinisch revalidatieproces is *zinloos*, als de patiënt thuis gekomen terug valt in revalidatie-inadekwaat gedrag: bijvoorbeeld het niet gebruiken van prothesen, het niet toekomen aan sociaal gedrag, het niet verder ontwikkelen van zichzelf in de zin van arbeid, hobby's of onderwijs. Om deze zinloze inspanning van het revalidatieteam te voorkomen dient juist *extra* aandacht besteed te worden aan de „beklijving” van nieuw aangeleerd gedrag in de thuissituatie.

„One of the major reasons for failure” – aldus Trieschmann (1974) – “is the lack of attention to what the person will *do* after discharge. Living with a disability is difficult, frustrating, often painful and sometimes humiliating. Unless an individual receives some rewards and satisfaction in life, he will not perform all the activities necessary to prevent medical complications. Mobility and ADL skills entail hard work and will be practiced inconsistently unless they meet the persons needs. These needs can be defined as some reward, some satisfaction (. . .)” Het sleutelwoord voor het onderhouden van revalidatie-adekwaat gedrag is leertheoretisch bezien uiteraard „reinforcement”.

De ondersteuning van „revalidatie-adekwaat gedrag” zal in de volgende paragraaf (4.1.7.) aan de orde komen. De beoordeling of het in de kliniek aangeleerde gedrag inderdaad wordt uitgeoefend in de thuissituatie, is wel degelijk mogelijk en wel aan de hand van de gegevens uit klinische en nabehandelingssituaties. Dankzij uitgebreide en systematische assessment krijgt men de beschikking over cruciale check points ter evaluatie van het gedrag van de patiënt in zijn thuissituatie.

4.1.7. Assessment van gedragsbelemmeringen

4.1.7.1. Probleemstelling

In hoofdstuk 2 werd na een exploratief onderzoek vastgesteld dat een meerderheid aan pogingen tot gedragsvorming bij de patiënt met contusio cerebri mislukte door revalidatiebelemmerend gedrag. Deze blokkeringen zijn niet alleen te signaleren in hun belemmerend effect op fysiotherapie, arbeidstherapie, logopedie, maar ook werd dit gedrag als hinderlijk ervaren door de verpleging en door andere patiënten, in hun dagelijkse omgang met elkaar. De patiënt was niet langer „hanteerbaar” en „verdween naar elders”, tenzij er een poging kon worden ondernomen om dit storende gedrag te elimineren of te reduceren. Van deze pogingen werd in hoofdstuk 3 verslag gegeven. De GOCC ontwikkelde n.a.v. patiëntenstatussen van ontslagen patiënten met contusio cerebri, was bedoeld om deze gedragsbelemmeringen bij de patiënten met contusio cerebri te signaleren. De vraag is echter of deze schaal voldoende voorziet in de observatie van deze patiëntenkategorie, d.w.z. worden alle deviante gedragingen hierdoor gesignaleerd. Bovendien werd het zoekveld allengs uitgebreid tot gedragsdeviaties op basis van cerebrale stoornissen zowel van congenitale als van traumatologische oorsprong. Indien een dergelijke uitbreiding reëel is dan moeten de diverse patiënten gediagnosticeerd volgens medische criteria een soortgelijke problematiek presenteren.

Hiernaast dient te worden nagegaan of er in de literatuur reeds observatieschalen aanwezig zijn, die gericht zijn op de konstatering van „probleemgedrag” optredende bij de patiëntengroep, die als cerebraal gestoord kan worden aangemerkt.

4.1.7.2. Gedragsaspecten ter observatie

In de beschikbare literatuur bleek geen specifieke observatieschaal inzake probleemgedrag bij cerebraal gestoorde voorhanden. Wel konden er een redelijk aantal gedragsobservatieaspecten voor diverse patiëntenpopulaties vanuit enkele publikaties worden opgespoord. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van observatie-items ten aanzien van gedragsdeviaties per auteur. Hierbij werden de persoonlijke coderingen van de auteur zoveel mogelijk gehandhaafd. In de eerste kolom werden de GOCC-items opgenomen, zodat vergelijking hiermee mogelijk wordt.

Tabel 13 Overzicht observatie-items uit diverse bronnen inzake gedragsbelemmeringen

Gedragsdeviatie bij patiënt	Bronvermelding													tot.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
Huilen	x	x	x	x		x			x	x	x		8	
Angstig	x	x	x	x			x	x	x		x		8	
Neerslachtig/depressief		x						x					3	
Klagen	x							x					2	
Onzelfstandig	x												1	
Zich afzonderen	x					x	x		x	x	x	x	7	
Opdringerig	x												1	
Dwangmatig	x			x			x			x	x	x	6	
Euphorie	x		x	x		x			x	x			6	
Slordig	x				x					x			3	
Niet-coöperatief	x						x						2	
Onrustig/ontremd	x	x	x	x	x			x		x			7	
Prikkelbaar/agressief	x	x		x	x			x		x	x		7	
Dominerend	x								x				2	
Inactief/traag	x			x			x	x					4	
Ongemotiveerd	x												1	
Gebrek aan zelfkritiek	x												1	
Praten over schuld en bestraffing		x											1	
Uit willen praten		x											1	
Impulsief			x						x				2	
Verandering in persoonlijkheid						x		x					2	
Stemmingsstoornissen							x						1	
Fobieën								x					1	
Koppigheid									x				1	
Morbide konfabulaties									x				1	
Totalen:	17	7	5	7	3	4	6	8	8	7	5	2		

1. GOCC-samenstelling.

2. Ibbotson (1975): Algemene Fysieke handicap, opmerking over CVA.

3. Mordock (1971): Minimal Cerebral Dysfunction.

4. Cohn (1961): Lees- en schrijfgestoorde kinderen.

5. Craft (1974): Kinderen met hersentraumata.

6. Thornson (1974): Volwassenen met hersentrauma-contusio.

7. Hogg (1974): Autisme, kinderen.

8. Mitchell (1971): Hersenbeschadiging, volwassenen.

9. Linden, v.d. (1975): Kinderen met minimal braindysfunction.
10. Dumont (1973): Kinderen met leerstoornissen.
11. Bijou c.s. (1969): Kinderen met hydrocephalus.
12. Haring c.s. (1971): Mentaal geretardeerde kinderen.

Uit deze tabel blijkt:

- 1e. Volwassenen en kinderen welke verschillend gediagnosticeerd werden, lijken vanuit het referentiekader inzake gedragsbelemmeringen gelijkelijk te beoordelen te zijn.
(Uiteraard werden door de diverse auteurs nog meer aspecten genoemd. Deze behoorden echter tot de categorie „gedragstekorten” zoals in deze studie gedefinieerd. Zij werden derhalve in deze tabel niet opgenomen.)
- 2e. De GOCC (als schaal) heeft t.o.v. alle andere verzamelingen een veelvoud aan observatie-items.
- 3e. De meerderheid der observatie-items van iedere auteur worden eveneens in de GOCC aangetroffen.
- 4e. Vier GOCC-observatie-items worden niet aangetroffen bij de genoemde auteurs nl.: onzelfstandigheid, opdringerigheid, ongemotiveerdheid en gebrek aan zelfkritiek.

4.1.8. Samenvatting

In het voorgaande werd een overzicht gegeven van de literatuurinformatie inzake de assessment van gedragstekorten en gedragsbelemmeringen. In eerste instantie werd uitgegaan van literatuur welke verband hield met de patiëntenpopulatie van deze studie, nl. patiënten met contusio cerebri. Aangezien het aantal bronnen betreffende deze categorie patiënten vanuit gedragspsychologisch uitgangspunt zeer beperkt bleek, werd het zoekveld verruimd tot dat van patiënten met cerebrale stoornissen van zowel congenitaal als traumatologische aard. Als ingang tot de literatuurgegevens bleef het thema gedragstekorten en gedragsbelemmeringen hierbij gehandhaafd. Het op deze wijze verruimde terrein leverde een tamelijk verwarrende hoeveelheid literatuur op.

De resultaten van deze heroriëntatie kunnen als volgt worden samengevat:

A. Gedragstekorten:

- 1e. Het verdient aanbeveling om ter begeleiding van de gedragsvorming in de klinische situatie rekening te houden met mogelijke premorbide gedragstekorten. Enkele richtlijnen voor het verzamelen van dergelijke gegevens werden verstrekt.
- 2e. De assessment van gedragstekorten in de klinische setting dient volgens twee procedures te geschieden, namelijk zowel door de assessment van „testgedrag” als door „gedragsobservatie”. De relatie tussen beide modellen werd tot nu toe onvoldoende onderzocht via statistische toetsing met behulp van correlatieberekeningen.
- 3e. Twee assessmentsystemen, namelijk die van Guilford en Mark, werden ten behoeve van de klinische testsituatie gepresenteerd. Het bleek niet mogelijk uit deze systemen een valide taxonomie van psychische functiestoornissen ten behoeve van de patiënt met cerebrale stoornissen te destilleren. Een eventueel in de toekomst te realiseren taxonomie zal rekening moeten houden met vrij omvangrijke researchactiviteiten.

- 4e. Voor de toepassing van de assessment volgens de tweede procedure, de gedragsobservatie, werden diverse schalen vergeleken. Enerzijds bleek dat deze merendeels nog in researchstadium verkeren, terwijl anderzijds nauwelijks aansluiting bij de revalidatie-populatie werd gevonden. De Progress Assessment Chart (PAC) van Gunzberg bood in deze het meeste perspectief.
- 5e. De assessment van gedragstekorten in de nabehandelingssituatie dient gericht te zijn op de mogelijkheden, die de patiënt heeft, zgn. „levenstaken” na ontslag naar behoren te kunnen verrichten. Als mogelijke „taken” werden genoemd zelfverzorging, sociale contacten en produktiviteit in de zin van hobby's, studie of arbeid.

B. Gedragsbelemmeringen.

De observatie-items van een aantal auteurs werden met elkaar en met de GOCC vergeleken. Uit deze vergelijking bleek dat de GOCC wat betreft de algemene „dekking” van het probleemgedrag bij de patiënten met contusio cerebri en bij cerebraal gestoorden relatief de grootste volledigheid toont.

4.2. Modifikatie

4.2.1. Inleiding

De hierna volgende beschrijving van modifikatieprocedures beoogt een inventarisatie te presenteren van mogelijke strategieën, die vanuit de literatuur naar voren komen en tevens aansluiting bieden aan het operante leermodel. Evenals bij de assessment is deze inventarisatie gebaseerd op publikaties inzake gedragsdeviaties op basis van organisch cerebrale aandoeningen van congenitale en traumatologische aard.

Een overzicht van de frekwentieverdeling der publikaties per ziektebeeld wordt gegeven in de onderstaande tabel.

TABEL 14 Overzicht literatuur per deelgebied uit Rehabilitation Abstracts 1973-1976 (kodes zie 4.1.1.)

Modifikatie/gedragstekorten

situatie:	Alg.	LH/RH	LH + RH	MBD	CP	MR	Tot.
preklinisch							
klinisch test	6	10/0	2	13	1	2	34
klinisch obs.	10	6/1	4	10	7	30	67
nabehandeling	4					5	9
thuis-werk-school	11		3	6	1	6	27
totalen	31	16/1	9	29	9	43	137

Modifikatie/ge gedragsbelemmeringen

situatie:	Alg.	LH/RH	LH + RH	MBD	CP	MR	Tot.
preklinisch							
klinisch test							
klinisch obs.	7	4/0	2	11	3	5	32
nabehandeling	4	1/0	3	7	2	2	19
thuis-werk-school							
totalen	11	5/0	5	18	5	7	51

4.2.2. Modifikatie van gedragstekorten uit de premorbide situatie

Naast het gedrag dat een persoon door ziekte of trauma heeft verworven kan zijn gedrag vóór opname in een revalidatiecentrum mede beïnvloed zijn door ervaringen in de behandelings-verzorgingssituatie tussen trauma c.q. uitbreking van de ziekte en de opname in dit centrum.

Het zal bekend zijn dat in een algemeen ziekenhuis door de daar aanwezige medische specialisten, arbeids/ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen diverse activiteiten ondernomen worden ter reductie van gedragstekorten, resp. de vorming van nieuw gedrag. Een van de doeleinden van deze studie is aan te geven dat de vorming van nieuw gedrag, met name doordat het aksent op het opnieuw leren valt (en de daarmee samenhangende complexiteit), een uitgesproken specialisme representeert waarin dan revalidatiegeneeskunde, -psychologie en -techniek participeren. In het algemeen ziekenhuis lijkt voorshands nog niet voldoende besef aanwezig omtrent de reikwijdte en toepassing van leerwetten, terwijl over het opzetten van een revalidatie-leerproces en de moeizame uitvoering hiervan het eerste woord aldaar nog uitgesproken dient te worden.

Terecht waarschuwt De Ruyter (1974 p. 92) dan ook voor de toepassing van de revalidatie in ziekenhuizen: „Te vaak wordt nog beweerd dat de revalidatie een onderdeel is van de curatieve geneeskunde. Nog steeds wordt verdedigd dat de gehele revalidatie thuis hoort in het pakket voorzieningen van het algemeen ziekenhuis, terwijl men voorbij ziet aan de zeer belangrijke verschillen tussen deze ziekenhuizen en revalidatiecentra”.

Uiteraard zijn er ziektebeelden denkbaar waar de hier naar voren gebrachte problematiek niet of nauwelijks een rol speelt. Bij die patiënten echter waar het opnieuw leren van gedrag (voor patiënt en thuismilieu) met de reeds meermalen genoemde voorwaarden inzake geringe frekwentie, intensiteit, lage waarde, aversie-beleving etc. etc. naar voren komen, is een speciale benadering gewenst. Deze kan alleen uitgevoerd worden door een multidisciplinair team, dat gesteund door eenzelfde grondgedachte, eenzelfde leerstrategie weet te hanteren.

Ondertussen blijft het algemeen ziekenhuis het eerste en belangrijkste ontvangststation voor o.a. de traumapatiënt. Hier zullen de handelingen verricht moeten worden die noodzakelijk zijn om een crisissituatie in eerste aanzet te hanteren. Informatie omtrent deze handelingen heeft zeer grote waarde m.b.t. assessment en modifikatie in het revalidatiecentrum. Het lijkt derhalve wel van belang, dat het algemeen ziekenhuis in de eerste diagnostiek en behandeling zou kunnen anticiperen op de criteria die in het revalidatie-leerproces relevant worden geacht.

4.2.3. Modifikatie van gedragstekorten vanuit klinische testsituatie

4.2.3.1. Probleemstelling

Teneinde gedragsmodifikatie te kunnen controleren, toetsen, corrigeren etc. moet vanuit empirisch standpunt iets wezenlijks ingebouwd worden, namelijk begeleiden-de assessmentprocedures, die bestaan uit meting vooraf, minstens één meting tijdens de gedragsmodifikatie en een meting na afloop. Het woord meting wordt hier bedoeld als de meting m.b.v. een geijkt instrument, ter uitsluiting van subjectieve (voor)oordelen.

Indien men vanuit deze invalshoek, de bril van het empirische kriticisme opzet, dan kunnen de volgende vragen gesteld worden.

1. Hebben de vele trainingen, therapieën, begeleidingen, ondersteuning, die ter

verbetering van gedragstekorten in de testsituatie ondernomen worden inderdaad sukses en worden er pogingen tot objectieve evaluatie ondernomen?

2. Bestaat er een mogelijkheid om een overzicht te krijgen inzake de vele vormen van trainingen? Is er een logisch indelingsprincipe denkbaar uitgaande van een theoretische of praktische invalshoek, dat bij voorkeur uitgaat van, rekening houdt met, of aansluit op een voorafgaande assessment?
3. Tenslotte: Is het haalbaar een koers te bepalen welke uitgaat van een duidelijke assessment, modifikatiepogingen konsekwent toepast en een mogelijkheid tot empirische toetsing toelaat?

4.2.3.2. Het effect van funktietrainingen

Zowel in Nederland alsook in het buitenland zijn er vrijwel geen objectieve evaluerende onderzoeken uitgevoerd over het effect van de verschillende methoden en over de indicaties voor toepassing ervan. Strikt genomen is de mogelijkheid voor de verbetering van gedragstekorten, gekonstateerd in de klinische testsituatie, niet aangetoond.

Ten aanzien van herstel van zgn. „funkties” (de hypothetische konstrukties van de black box) zijn er, gezien vanuit neuropsychologisch standpunt, volgens Deelman (1970 - 1 p. 27), twee uiteenlopende meningen:

- A. „Wanneer er een hersencel vernietigd is, dan resulteert dit in een onherstelbaar defekt.
- B. Wanneer er een hersencel vernietigd is, dan resulteert dit in een herstelbaar defekt, dat namelijk kan worden gekompenseerd of worden opgeheven.”

Volgens Deelman (1970-1 p.27) zijn er tegen het therapeutische nihilisme enige bedenkingen aan te voeren:

- 1e. „Er kunnen „funktiestoornissen” optreden (bijv. bij afasie) zonder dat er hersencellen vernietigd zijn. De cellen kunnen ook tijdelijk niet in staat zijn hun normale funktie te verrichten.
- 2e. Wanneer een bepaalde funktie uitvalt, dan is het niet gezegd dat alle cellen van het gebied dat die funktie verzorgt, uitgeschakeld zijn.
- 3e. De hersencellen kunnen ook door zich elders afspelende processen geïrriteerd of pathologisch beïnvloed worden.
- 4e. Spontaan herstel lijkt soms reeds na korte tijd mogelijk.”

Deze overwegingen samen laten, aldus Deelman, nogal wat ruimte voor herstelmogelijkheden.

Deze hoopgevende gedachtengang wordt, zoals eerder aangegeven, ondersteund of begeleid door een veelheid en variëteit aan trainingsprogramma's die op een diversiteit aan defekten wordt losgelaten. Of de funktietrainingsprogramma's werken is voorlopig onzeker.

Dumont (1973 p.187): „De overtuiging dat de programma's helpen is vooral op klinische observatie gefundeerd. Wetenschappelijke bewijsvoering is hierbij nog een wens”.

Sarno (1970-1): „Does speech therapy help aphasics? There is an element of natural recovery present but proper therapy at the time helps more. Most of the studies reporting gain in this field are based on retrospective reports and are subjective in nature. Among these techniques that have been used are drug therapy, group-therapy, social therapy and role playing”.

Sarno c.s. (1970 -2): „Controversy exists on the benefits of an auditory stimulation

versus a structured instructional approach. There is no hard evidence for either. There is evidence that psychosocial factors have little consequences for the learning process in aphasics”.

Cohen c.s. (1970): „Physical therapy techniques have not yet undergone systematic comparison (. . .) the published evidence does not support the enthusiastic claims that have been made for it. The current wave of physical therapy derived from the growth of interest in neuropsychology has given rise to considerable controversy. Many of the methodological problems of psychotherapy appear in physical therapy as well”.

Diller (1971 p.13): „There are still many problems with regard to ADL scaling that should be briefly noted (a) What items are selected and how are they grouped? Studies range from single-items scales to scales with over 100 items. (b) How are items to be scored? (c) How are the data to be treated, different treatments of the same data yield markedly different results (. . .)”

Deelman (1970 -2 p.648): „Naar mijn mening is het een uitzichtloze situatie voor de solitaire onderzoeker. Een *interdisciplinair* team evenwel, zal stellig in staat moeten zijn een begin te maken met een objectieve evaluatie van op zijn minst een enkele variant van de afasiebehandeling”.

Door de citering van deze twee Nederlandse en vier buitenlandse publikaties is de gehele aangelegenheid natuurlijk niet afgehandeld. De voorlopige indruk uit de betreffende literatuur is, dat er onvoldoende aandacht – tot nu toe – besteed werd aan de evaluatie van trainingen en dat het niet mogelijk is op basis van deze informatie een uitspraak ten gunste of ten nadele van deze activiteiten te formuleren.

4.2.3.3. Indeling naar theoretische uitgangspunten

Na bovengenoemde onzekere toestand inzake het effect van funktietrainingen, zoal aanwezig, lijkt het toch van belang enigszins te weten welke training voor welke patiënt (syndroom, symptoom etc.) van belang wordt geacht. Een eerste vraag hierbij is in hoeverre bepaalde theoretische verklaringsmodellen een indicatie verstrekken voor het uitvoeren van een duidelijk omschreven handelingssekwentie, waarbij dan gehoopt wordt op herstel van een defekt.

M.a.w. een theorie zal ter hypothesetoetsing gebruik maken van een bepaalde verzameling van tests, vervolgens zal een bepaald resultaat aanleiding geven tot een geïndiceerde training. Dit lijkt althans plausibel. Op de genoemde handelingssekwentie „theorie-test-therapie” bij bepaalde scholen zal hier exemplarisch worden ingegaan.

De Subcorticale Sensorische Integratie (Ayres 1974) is gebaseerd op de gedachte dat leerproblemen het gevolg zijn van inadekwate sensorische integratie op subcorticaal niveau. Bij de daaruit door Ayres afgeleide assessmentprocedures ligt het aksent op o.a. visuele waarneming, taktiele waarneming, kinesthetische waarneming, het taktiele bewegen, kinesthetische bewegingen en de integratie van het waarnemen en bewegen naar diverse modaliteiten en responsies. De op deze onderzoeken aansluitende therapie bestaat uit het stimuleren van die gebieden waarin tekorten werden vertoond, waarbij het aksent vooral lijkt te liggen op de taktiele en vestibulaire stimulatie in toenemende moeilijkheidsgraden.

De theorie der Phylogenetic Recapitulation (Doman c.s. 1960) ook wel theorie der optimale neurologische organisatie genoemd, gaat er van uit dat: (1) De neurologische organisatie van het individu een herhaling is van de fylogenese, de ontwikkeling

die de mens als soort gedurende de evolutie heeft doorgemaakt. (2) De laatste ontwikkelingsstap die de mens van het dier doet verschillen staat in verband met een specifieke specialisatie van de hersenschors (taalcentra). (3) Deze specialisatie treedt op doordat en nadat de hersenen georganiseerd worden in een dominante en subdominante hemisfeer. Optimale neurologische organisatie is de organisatie der hersenen in een strikt dominante en subdominante hemisfeer. Het is niet duidelijk of Doman en Delacato een eigen testserie ontwikkeld hebben. Als dit zo is dan lijken deze tests o.a. gericht te moeten zijn op dominantiebepaling van oog, oor, voet en hand. Therapie is gericht op het verkrijgen van unilaterale dominantie (dus of links of rechts) en kruisdominantie moet vermeden worden. De praktische oefeningen bestaan uit o.a. rollen, schuiven, kruip oefeningen, hetgeen lijkt op passieve oefeningen waarbij de bewegingen die men laat uitvoeren geleidelijk moeilijker worden.

In het zgn. „Frostig programma” (Frostig 1968) wordt ervan uitgegaan dat het succes van het kind in de beheersing van allerlei taken afhangt van zijn perceptuele ontwikkeling, waarbij de visuele perceptie het belangrijkste is. Frostig beklemtoont ook het belang van de sensomotorische fase zoals beschreven door Piaget en ze erkent de waarde van Ayres in de verschaffing van kinesthetische, tactiele en visuele stimuli, maar ze waarschuwt tegen bewegingsopvoeding, als deze tot basis van al de andere ontwikkelingen wordt gemaakt. Eigen testontwikkeling is aanwezig. Deze is gericht op de bekende Gestalt-principes als figuur-achtergrond, vormkonstantie, maar toch ook op visueel-motorische coördinatie of oog-hand coördinatie. De training is gericht op het aanbieden van stimuli overeenkomstig de testseries in opklimmende moeilijkheidsgraden al of niet in de vorm van spelletjes.

Het Kephart programma „Step by step” (Kephart 1971 en 1973) gaat ervan uit dat men bij de bestudering van de ontwikkeling twee scholen in hun gedachtengangen moet combineren. De eerste lijn is de zgn. normatieve benadering waarin men het opgroeiende kind geleidelijk meer en meer gekompliceerde taken ziet verrichten. Het accumuleert vaardigheden en vermogens en zijn voortgang volgt een langzaam stijgende curve. De tweede benadering gaat uit van Piaget, die stelt dat de ontwikkeling ontstaat via een serie van stadia die essentieel andere methoden kenmerken in de verwerking van informatie. Kephart suggereert dat het leren optreedt door eerst volgens de normatieve weg een hoeveelheid vaardigheden en vermogens te accumuleren tot een voldoende kwantiteit aan informatie is opgeslagen. Op dit punt ontstaat een totaal nieuw patroon en het leren toont een sprongsgewijze mutatie naar een nieuw stadium. Op deze wijze wordt ontwikkeling gezien als een serie „step by step”-processen. Als een proces wordt overgeslagen gaat het kind nieuwe problemen oplossen met oude methoden van informatieverwerking. Kephart heeft een eigen testontwikkeling en observatieschaal met name gericht op sensomotorische prestaties (evenwichtsbalk, springen, identificatie van lichaamsdelen, imitatie van bewegingen, maar ook het kunnen uitvoeren van spelletjes, ritmische oefeningen etc. etc.) (Zie Kephart c.s. 1973). De training is gericht op input, (perception) and output (motor ability) en de feedback tussen deze twee activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei oefeningen die overeenkomst vertonen met de prestaties die ook in de test geleverd moeten worden.

Voor nadere informatie over varianten van deze „theorie-test-training”-cycli kan o.a. verwezen worden naar Dumont (1973) als een van de overzichtswerken.

Van belang wordt toch op een gegeven moment de vraag, wat al deze ideeën en

programma's te bieden hebben naast uitgebreide publikaties van de auteur, kritieken van de vele opponenten, allerlei verschillende tests en trainingen en weinig empirisch onderzoek wat dan ook nog eens een keer wordt weerlegd.

Het lijkt niet eenvoudig om een overzicht van allerlei gemeenschappelijke punten hier weer te geven. Een poging hiertoe zou als volgt kunnen luiden:

a. De meeste „theorie-test-programma“-cycli in de literatuur hebben betrekking op leergestoorde kinderen (of welke andere omschrijving hiervoor ook gebruikt mag worden).

b. De theorieën proberen meestal aansluiting te zoeken bij een gepostuleerde neurologische ontwikkeling. Hierbij wordt dan gesuggereerd dat er tijdens de ontwikkeling „iets” niet goed is gegaan. Er is een bepaalde laag of niveau of anatomisch deel niet volgroeid. Het heeft geen aansluiting gevonden bij andere parallele ontwikkeling etc. De meeste theorieën oriënteren zich op de sensorische, op de motorische of op de sensomotorische ontwikkelingsachterstand. Andere theorieën stellen daarentegen dat er toch nog „iets meer” of „iets later” optreedt bijv. de taalontwikkeling. Vaak wordt dan toch wel genoemd, dat eer er een goede taalontwikkeling kan plaatsvinden eerst de daaraan voorafgaande groei of ontwikkelingsprocessen goed moeten zijn verlopen.

c. Sommige theoretici hebben tests ontwikkeld waarvan wordt aangenomen dat deze aansluiten op de theorie. Ze zijn er dus op gericht om tekorten te meten die, bij een eventuele leerachterstand, door de theorie worden gesuggereerd. Bij andere theoretici is het wat moeilijker om deze relatie tussen theorie en diagnostiek te leggen. Er wordt dan eenvoudigweg een aantal tests gepresenteerd waarbij het niet duidelijk is waarom juist deze test en geen andere wordt gebruikt. De psychometrische eigenschappen van de tests worden vaak niet genoemd. Een volgorde of taxonomie van tests werd in geen enkele publikatie duidelijk aangetroffen. Naast de tests bestaan ook een groot aantal opdrachten die door de therapeut en patiënt of alleen door de patiënt moeten worden uitgevoerd.

d. De therapieën lijken soms aan te sluiten bij de tests, echter in een groot aantal gevallen staat merkwaardigerwijs de training reeds bij voorbaat vast. Het is een pakket van activiteiten dat door de patiënt moet worden uitgevoerd, waarbij men zich kan afvragen waarom er eigenlijk een moeizame testprocedure werd ondernomen. Zie bv. Zaad (1975 p.20); „Vooraf moet gezegd worden dat de pedagogische en orthodidaktische strategie ons inziens niet ontstaat uit een logische deductie van de psychologische diagnose. Veeleer zien we de strategie als het plan dat reeds ter beschikking staande orthopedagogische methoden tot één (?) effectief (?) geheel maakt, veelal met binnen dat plan zelf ontstane nieuwe orthopedagogische orthodidaktische methoden” (Zaad schijnt reeds aan te nemen dat dit de enige juiste weg is, waarvan reeds lang werd aangetoond dat ze effectief zijn zou).

Sarno (1970): „There is a tendency to apply a given technique without regard to the degree of impairment” or even assessment of the impairment” (uit deze opmerkingen van Sarno spreekt toch wel enige ongerustheid omtrent de gang van zaken). De trainingen lijken in een beperkt aantal gevallen wel aan te sluiten bij de theorie. Bijv. Als het aksent der theorie op de sensomotorische ontwikkelingsstoornis valt dan worden allerlei bewegingsoefeningen gedaan. Valt dit aksent der theorie op de visuele sensoriek (Frostig) dan ziet men hoofdzakelijk training in de visuele perceptie, met een waarschuwing van Frostig zich niet al te zeer bezig te houden met de motoriek.

e. De inhoud der oefeningen bestaat uit passief bewegen (therapeut beweegt patiënten), verrijken van de omgeving (omgeving wordt meer gedifferentieerd)

aktief bewegen (zingen, spelletjes), het geven van opdrachten die een toenemende mate van complexiteit vertonen. Vaak en erg vaag bestond er de indruk dat vele oefeningen vanuit verschillende theoretische visies elkaar overlappen. Hierbij wordt het theoretisch uitgangspunt wel enigszins irrelevant.

Bij geen enkele, tot nu toe bestudeerde, publikatie was duidelijk sprake van een evaluatie in de zin van herhaalde, tussentijdse diagnostiek m.b.v. parallel tests.

Hoewel er nog meer opmerkingen geplaatst kunnen worden, lijkt het op dit moment nuttig om te bezien of er nog andere invalshoeken bestaan.

4.2.3.4. Indeling naar praktische uitgangspunten

In de vorige sub-paragraaf werden allerlei activiteiten (schijnbaar)gedetermineerd door de theoretische vooronderstellingen inzake de relatie „hersenen-gedrag”. Een theorie leidde in de gunstige gevallen tot een test en na gebleken tekorten op de test werden er therapeutische activiteiten uitgevoerd die overeenkomst vertoonden (direkt of indirekt) met de testopgaven. Een effectevaluatie in de vorm van her-testen werd nimmer aangetroffen. Vanuit praktisch standpunt geldt zeker nu de zeer reële vraag „wat doet men nu precies” ongeacht de theorie of misschien zelfs ondanks de theorie.

Het operante model is a.h.w. a-theoretisch d.w.z. het ziet theorievorming als minder relevant en richt zich dus niet op de theorievorming inzake „hersenen-gedrag” maar op het waarneembare gedrag. Blijkt in het waarneembaar gedrag een deviatie dan presenteert dit model een aantal technieken tot gedragsmodifikatie. Deze technieken werden met name genoemd in 2.3.3.

Het theoretisch en a-theoretisch uitgangspunt kunnen symboolsgewijs als volgt met elkaar vergeleken worden:

Uitgangspunt theorie:

$O \rightarrow S_1 \rightarrow R_1$ vervolgens $S_2 \rightarrow R_2$

Over de black box wordt een theorie gevormd; deze geeft bij de testsituatie aanleiding tot het gebruik van bepaalde stimuli (S_1), waarbij gekeken wordt of het gedrag (R_1) meer of minder adequaat is. Bij de therapie wordt een enigszins andere stimuluskonfiguratie gepresenteerd (S_2) waarbij S_2 overigens direkt of indirekt S_1 benadert. Vervolgens wordt getracht bij S_2 een adequate respons te doen optreden (R_2)

Uitgangspunt operant model:

$S_1 \rightarrow R_1$ vervolgens $S_x \rightarrow R_y \rightarrow K \rightarrow C$

Vanuit een nog nader te bepalen presentatie van stimuli wordt bezien of de daaruit voortvloeiende respons adequaat is. In de therapie kan onder systematische variatie van stimuluskonditie (S_x) gekeken worden of de optredende respons (R_y) adequaat is. Vervolgens wordt volgens vastgestelde bekrachtigingsschema's de juiste respons versterkt. Het operante model legt dus, meer dan bij de „theoretische modellen”, het aksent op systematische presentatie van stimuli en op de controle van bekrachtiging en kontingenties. Over het algemeen worden in de trainingprogramma's bij „leergestoorte kinderen” voorwaarden als goedkeuring e.d. wel genoemd, maar niet systematisch gehanteerd.

De presentatie van stimuli tijdens test- en trainingsituatie is hierbij een probleem apart. Indien volgens een nauwkeurig vastgestelde volgorde de diverse mogelijkheden aan stimuluskombinaties zijn gepresenteerd dan zal bij een gekonstateerd tekort in de respons volgens de methode van „limit testing” moeten worden

nagegaan welke methodiek er geschikt is om responsverbetering te doen optreden. Limit testing is de techniek, waarbij men onder systematische variatie van stimuluskondities tracht na te gaan in hoeverre een vereiste respons verbetert. (zie hoofdstuk 5 inzake limit testing).

Bovenstaande overweging gaat er nog steeds vanuit, dat herstelmogelijkheden aanwezig zijn. Zoals eerder gesteld, zijn er naast herstel van defekten alternatieven (o.a. compensatie van defekten) denkbaar.

Voor er op de diverse methodieken binnen het operante model ingegaan wordt, moet aandacht besteed worden aan bovengenoemde alternatieven.

Deelman (1970-1 p.29 en 30) vergelijkt twee vormen van training:

- 1e. Het trachten te herstellen van de functie als zodanig, zodat patiënt weer op dezelfde wijze funktioneert als vóór het defect. Hiertoe rekent hij alle mogelijke vormen van aktiveren of stimuleren (zoals deze o.a. naar voren komen bij de trainingsprocedures voor het leergestoorde kind).
- 2e. Het laten verlopen van de functie langs kwalitatief andere weg: het reorganiseren als therapeutische mogelijkheid die vooral door Luria zou worden geëyzigd. Deelman stelt verder: „Wanneer wij nagaan wat er aktueel gebeurt bij de behandeling dan wordt het echter erg moeilijk om allerlei methoden duidelijk van elkaar te blijven onderscheiden. Om dat te kunnen doen moet men *precies* weten wat zich allemaal bij een bepaalde behandeling afspeelt”. Deze laatste uitspraak sluit volledig aan bij de mening die hier gepresenteerd wordt: Men komt er niet achter wat er precies gebeurt, aangezien de *handelingen* nergens duidelijk geëxpliciteerd worden.

Diller (1971 p.25) onderscheidt in vergelijking met Deelman drie modellen nl. „ability model, process model and the engineering model”.

- „1e. The Ability model suggests that abilities can be taught by beginning at the level of competence of the individual and gradually increasing the tasks demands. There are several variations of abilities models. One includes an enrichment material model that argues in favor of some type of stimulation approach. The basic idea is that atypical behavior is due in part to an absence of proper experience or as a result of environmental deprivation or neurological impairment.
- 2e. The process model argues that lack of competence is not a function of lack of experience and that competence does not arise from repetition enrichment or even reinforcement. Competence may arise by changing the nature of the task demands
- 3e. The engineering model suggests that the development of prosthetic devices, prosthetic environments and aids are helpfull.”

Aan de hand van de twee bovenvermelde auteurs werd het volgende indelingsprincipe gekozen:

- 1e. Gedragsrestauratie m.b.v. operante technieken.

Nadat door middel van limit testing (zie Hoofdstuk 5) nagegaan is welke techniek bij de patiënt de grootste kans heeft, wordt een keuze gemaakt uit de volgende procedures:

- a. Toename van gedrag in frekwentie en in intensiteit d.m.v. selectieve reinforcement.
- b. Handhaving van gedrag bij toenemende complexiteit der stimuluskondities d.m.v. fading.

c. Shaping van gedrag indien er totaal geen respons of onvolledige respons volgt bij een teststimulus. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van „verbal cues, modeling, prompting, sukseessieve approximatie, backward chaining e.d.” Al deze technieken zijn er dus op gericht „functie” herstel te realiseren. Zij zullen in het navolgende met enkele literatuurvoorbeelden worden toegelicht.

2e. Gedragskompensatie.

Indien blijkt dat bovengenoemde technieken wel in staat zijn het gewenste gedrag te realiseren onder introductie van bepaalde kondities dan wordt getracht deze ondersteunende konditie geleidelijk aan te verminderen. Als deze fadingsprocedure mislukt dan is de patiënt aangewezen op handhaving van de faciliterende kondities. Aangezien het niet mogelijk zal zijn dat een begeleider voortdurend de kondities zo arrangeert dat er facilitatie optreedt, zullen er hulpmiddelen moeten worden ingebouwd. Dit kan geschieden d.m.v. „gedragsprothesen”.

3e. Gedragsreorganisatie.

Indien gedragsmodifikatie en -kompensatie niet voldoende mogelijkheden bieden wordt overgegaan tot een wat meer ingrijpende activiteit „de gedragsreorganisatie”. Voorzover bekend is deze benadering nimmer in Nederland en zeer zelden in het buitenland toegepast.

Niettemin verdient zij de aandacht.

Voorbeelden uit de literatuur ter verduidelijking:

1. Gedragsrestauratie m.b.v. operante technieken.

1a. Toename van intensiteit en frekwentie van gedrag onder ondersteuning van selectieve reinforcement.

Hiervan is vaak sprake als de patiënt een prestatie moet leveren waarbij de moeilijkheidsgraad bij benadering gelijk blijft. Een bepaalde prestatie wordt te weinig uitgevoerd of niet intensief genoeg. Deze prestatie is op zich wel goed, maar moet toenemen.

De principes van regelmatig voortgaande herhalingen in combinaties met selectieve bekrachtiging komen naar voren bij de traditionele logopedische behandeling, perceptietraining e.d., zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt.

– Leche (1974 p. 347) „Constant *repetition* and *reinforcement* help to reestablish the language patterns.”

– Underwood (1974 p. 343) „perception is largely an acquired skill and should be treated by providing the opportunity for the patient to re-learn through *repeating experience* which he may have forgotten”.

– Sarno (1970 p. 50): „one of the first steps in treating a patient with global aphasia according to a traditional approach is to present him with a group of pictures of common objects. While the therapist names the pictured objects, the patient is directed to point to the picture named (. . .)”

– Savage (1971 p. 41) „The patients are seated at the table with the therapist opposite them. One item is taken from the box with the right hand and held out sideways. Ask the patient to look at the object and name it (. . .) Continue until the patient *becomes quicker* at eye movements”.

1b. Handhaving van gedrag onder toenemende complexiteit der stimuluskonditie d.m.v. fading.

De „fadingprocedure” is hierbij vaak impliciet ingebouwd. Het principe is dat het gedrag wel beheerst wordt in situatie of stimuluskonditie A, maar nog niet in situatie

D, die complexer is of waarin de steun die in A aanwezig is ontbreekt. Via A, B en C, die geleidelijk qua stimuluskonditie verschillen wordt D bereikt.

Het bekende voorbeeld uit de gedragstherapie is de leerling die wel bepaalde prestaties verricht indien de moeder aanwezig is, en niet indien leraar en leerlingen aanwezig zijn. Fading behelst hier het geleidelijk aan verwijderen van de faciliterende kondities en vervangen door minder faciliterende, maar gewenste kondities.

- Indien een patiënt een bepaald gedrag beheerst in een stille omgeving, dan is de stilte, het geordend zijn van de ruimte een faciliterende konditie. Het geleidelijk aan brengen van patiënt in een meer stimulusrijke of meer complexe stimuluskonditie betekent verlies van ondersteuning onder (hopelijk) behoud van gedrag.

- Men kan iedereen leren bepaalde (zonderlinge) woordparenkombinaties te onthouden door bv. visualisering van de combinaties. Dit kan zelfs een „tweede natuur” worden, hetgeen dan gaat lijken op een „prothese”. Naarmate echter de stimuli complexer worden of minder gemakkelijk te visualiseren, wordt het gebruik maken van deze „steun” moeilijker. Het geleidelijk aan „afbouwen” van deze steun, hulpmiddel of ezelsbrug, die iedere patiënt tracht te vinden bij geheugentrainingen e.d. valt per definitie onder fading.

In principe vallen alle „verrijkingsprocedures” en „stimulatietrainingen met toenemende moeilijkheidsgraad” die genoemd werden bij therapieën voor leerstoorden onder fading.

- Gibson c.s. (1955) „Two point discrimination may be effected by a few hours training so that the distance after four weeks, may change from 30 m.m. to 5 m.m.”

- Kaales (1971 p. 32) „Once a *relationship* of confidence and trust is established the patient visits the occupational therapy department for tea. The first visit is always short. If he cannot tolerate the different environment and the noise, we have tea in a quiet room. On subsequent visits mental and physical activity are *gradually increased* and he is *encouraged* to mix with other patients (. . .) The patient is *praised* for achievement and if he fails after a second attempt the activity is simplified”. (Hier ziet men dus duidelijk drie essentiële elementen: (1) het leggen van een goede relatie, teneinde te realiseren dat de arbeidstherapeute een „reinforcing agent” wordt. (2) het geleidelijk verhogen van de moeilijkheidsgraad onder behoud van „theegedrag” en (3) het toedienen van de bekrachtiging).

- Holland (1974 p.542) „Then the experimenter initially performed the respons and subsequently *faded out* relevant cues until the subject was able to perform the specific action on command”. (Dit lijkt een combinatie van modeling en fading.)

- Hogg (1974) „Funktierestauratie wordt geprobeerd d.m.v. stimulatie onder verhoging van intensiteit en van affectief contact. Eerst moet het kind de therapeut gewaarworden. Bij het hyperactieve kind, dat steeds heen en weer loopt, zorgt de therapeut dat het tegen haar aanrent. Bij het hypoactieve kind gaat de therapeut naast het kind zitten en raakt het aan. Naarmate de gewaarwording toeneemt worden er meer stimuli aangeboden.”

Inzake een der weinige Nederlandse publikaties, die vermoedelijk eveneens op deze plaats genoemd moet worden, kan verwezen worden naar Saan c.s. (1973).

1c. Shaping van gedrag bij volledige of gedeeltelijke afwezigheid van een respons. Bij deze methodiek is de limit testing een vereiste. Er zijn uiteraard meer mogelijkheden om deze procedure te hanteren. Men kan uitgaan van de hypothese dat een ontwikkeling volgens een zekere volgorde zal ontstaan en dan met deze rangorde rekening houden in de aan te bieden stimuli (zie Sarno c.s. 1970). Men kan een taak zoals Ozer (1974) in componenten onderverdelen of de modaliteit van de input variëren. Men kan ingrijpende veranderingen in de omgeving trachten te

realiseren (licht, donker) of bewust gaan manoeuvreren met het aantal afleidende stimuli. Er bestaat op dit moment nog geen frame work van mogelijke variaties hoewel Mark (1969) er zich wel op schijnt te beroepen. De techniek der limit testing wordt uitgebreider besproken onder 5.1.2.3. Het principe zal hierbij altijd bestaan uit het (systematisch) uitproberen van veranderingen in stimuluskondities, het nagaan of de patiënt een taak onder een bepaalde konditie wel beheerst, geleidelijke overgangen van kondities. (licht-donker, meer taakcomponenten invoeren) en tenslotte bezien hoever de patiënt in het uitvoeren van de taak kan komen. Het residu aan gedragstekorten bepaalt de prothese. De principes der shaping, zoals reeds meer malen genoemd, lijken volledig te beantwoorden aan het principe dat door Diller werd geformuleerd in zijn „proces-approach”: „Competence may arise by changing the nature of the task demands” (1971 p. 25)

Ter illustratie van limit testing en diverse vormen van shapingsprocedures werden de volgende publikaties geselecteerd.

– Sarno c.s. (1970) lijkt zich bewust te zijn van de noodzaak tot succesieve approximatie. „Language recovery: In the analysis of these assumptions it became clear to us that in order to use a programmed approach it would be necessary to revise our traditional approach. It was apparent that pre-verbal skills such as imitation and visual recognition had to be mastered before auditory comprehension and speech could be introduced (...) Language recovery was viewed as a continuum or hierarchy of skills: imitations, visual recognition, auditory comprehension and finally speech. After determining the *sequence* of modalities for the programmed curriculum it was necessary to *grade skills* within each modality (...). The number of steps in each program varied according to the complexity of the task (...). (Hier wordt dus uitgegaan van een conceptual frame work, dat een volgorde in kanaalsystemen aangeeft en een onderverderdeling in taakcomponenten).

– Yoder c.s. (1974) geeft een voorbeeld van modeling: „It has been only a recent trend to examine the effects of modeling on the acquisition of abstract cognitive respons patterns (...) adding verbalizations to *overt behavioral modeling cues* is one way to increase the number and salience of cues”.

– Rosenthal c.s. (1972) noemt eveneens het faciliterend effect van modeling. „Concept acquisition of children is facilitated by observation of a *model* performing the task prior to the subject performance”

– Leche (1974) „The programmed instruction approach views language rehabilitations as an educative process and applies operant conditioning techniques drawn from learning theory and principles from psycholinguistic analyses to guide the content and order of the presentation of the linguistic taught”

– Reissenweber (1953 p. 27) „Performance with block designs may sometimes be appreciably improved when such factors as the angle of display, position of the materials are understood (...) *Variations* in training are necessarily dependent upon capabilities of individual patients”.

– Ben Yishay c.s. (1970) „To cross-validate previously reported findings which suggest that improvement in block design performance of left hemiplegics as a *function of cueing* is lawfull and quantifiable (...). The uniformly high correlations between competence and cues which were obtained for all three groups (left and right hemiplegics and normals) are clearly in line with previous findings. Furthermore the data suggest that these relationships apply in normal and brain injured individuals.

– Schubert (1969) „What we are in effect suggesting is that the diagnostic process be viewed as a learning one (...). Because of these considerations the *order* of tests was not uniform (...). The child was *helped* toward the solution of these problems

according to a standardized procedure which was aimed to direct his conscious attention upon *his* mode of work (limit testing).

– Silver c.s. (1969) „Sequin emphasized the importance of isolating and stimulating single modalities in a manner inkeeping with the present information-processing theory”.

– Diller (1967 p. 14): „Goldstein and Schurer (1941) and Luria (1961) have advocated varying conditions of stimulus presentation for the purpose of assessment. Such variations could be used also for treatment”.

Verscheidene trainingsprogramma's blijken impliciet gebruik te maken van een combinatie van diverse operante technieken. Een representatief voorbeeld van een dergelijke combinatie – ongeacht de theorie – is de behandelingswijze van Holland.

– Holland c.s. (1974 p. 592) „Throughout the program the patient was seated at a table with the program cards and tokens facing him. Following each command he was given 10 seconds to point to the correct answer. If he responded correctly then the tester said „good” „fine” or „that's right” (selectieve reinforcement). If he still failed to respond the experimenter demonstrated the correct answer (modeling) (. . .). If the subject was asked „show me green” from an array of green, red and blue and he selected blue he heard „No you show me blue, show me green” (verbal cues) (. . .). The the experimenter initially performed the response (modeling) and subsequently faded out relevant cues until the subject was able to perform the specified action on command (fading)”.

2. Gedragskompensatie.

Met name het gedragsrestauratie-model waarbij nagegaan wordt onder welke condities een gedrag in de testsituatie wel tot stand kan komen (shaping e.d.) levert informatie op inzake mogelijke hulpmiddelen. Hoewel prothesen alleen of hoofdzakelijk bekend zijn ter compensatie van een gedragstekort tengevolge van zintuiglijke of lichamelijke defekten is het ook denkbaar dat deze ontworpen kunnen worden voor de meer psychische systemen.

Aan deze „psycho-prothesen” is behoefte, indien – overigens na een moeizame procedure – vastgestelde faciliterende condities niet meer door fading kunnen worden weggenomen.

Indien men bijvoorbeeld een patiënt tijdens geheugentraining leert dat het gebruik maken van allerlei rangschikkingen en visualizeringen van het materiaal tot betere geheugenprestaties voert, dan is hij gaandeweg in staat met deze hulpmiddelen meer materiaal te onthouden. Op zichzelf is dit te zien als het stap voor stap bereiken van een doel d.m.v. een hulpmiddel, zonder dat dit hoeft te betekenen dat de geheugen„functie” op zich verbeterd is. Dit kan pas nagegaan worden indien de persoon een geheugenprestatie levert zonder van deze methode gebruik te maken. Indien dit afbouwen langzaam verloopt, kan van fading gesproken worden. Blijkt echter dat de persoon bij voortduring gebruik moet maken van de aangeleerde methode dan is er een hulpmiddel ontstaan dat blijvend moet worden „te hulp” geroepen. Aangezien het hierbij gaat om de verbetering van gedrag als een reactie op teststimuli waarbij verondersteld wordt „hypothetische constructies” te modifieren, wordt deze vorm van prothese hier behandeld. Er zijn – zoals zal blijken – andere vormen van hulpmiddelen mogelijk die meer complexe gedragstekorten in de klinische observatiesituatie compenseren. (zie 4.2.4.2).

Toepassing van „psycho-prothesen” ter compensatie van tekorten in specifieke hypothetische constructies zijn tamelijk schaars. Slechts enkele literatuurvoorbeelden kunnen worden genoemd.

Diller (1971 p.25) „The formulations of the brain injured child as having problems due to figure ground is based on the idea that the ground interferes with the figure and the way to correct the situation was to minimize the distraction”.

Aan de hand van het volgende voorbeeld kan het hier geïntroduceerde onderscheid tussen „restauratie, compensatie en reorganisatie” geïllustreerd worden:

Deelman (1970 p.29) „Sommige leesstoornissen ontstaan door visuele moeilijkheden. Deze patiënten zien de letters wel duidelijk, maar kunnen ze toch niet goed identificeren. Het is mogelijk om door gebruik te maken van taktiele stimuli deze patiënten met hun leesproblemen te helpen. Er worden letters gebruikt met een ruw oppervlak dat afsteekt tegen de gladde achtergrond. De patiënt leert dan lezen door de letters te betasten”.

Het is hier de opvatting dat deze informatie door limit testing werd ontdekt. Het proces van het leren lezen d.m.v. taktiele indrukken kan geplaatst worden onder het verschaffen van een hulpmiddel. Indien door oefening gaandeweg de taktiele prikkels een steeds geringer rol gaan spelen, kan men ook van fading spreken. Blijven deze vormen van letters vereist als „ondersteuning”, dan is hier sprake van een prothese en wordt het compensatiemodel van kracht. Gaan echter de taktiele indrukken het gehele leerproces beheersen (zoals bij blinden) dan is sprake van reorganisatie.

3e. Reorganisatie van gedrag.

Het cerebrum hoeft niet altijd op dezelfde wijze bij een handeling betrokken te zijn. Men kan niet van een gefixeerde bijdrage spreken. De konsekwentie hiervan is dat, wanneer door een cerebrale stoornis een bepaalde prestatie niet meer kan worden geleverd, men kan proberen die prestatie langs kwalitatief andere weg tot stand te laten komen.

Reorganisatie kan ook spontaan verlopen. Een voorbeeld hiervan zijn ademhalingsstoornissen. Wanneer door een trauma een gedeelte van de muskulatuur niet goed meer funktioneerde worden bepaalde spiergroepen bij de ademhaling betrokken die daar normaal geen rol bij spelen.

In Rusland legt men op dit reorganisatieprincipe de meeste nadruk. Het aksent ligt hierbij echter op de vorming van meer *complex samengesteld gedrag* niet specifiek op de reorganisatie van „funktiestoornissen” zoals hier bedoeld. Derhalve wordt voor de behandeling der publikaties verwezen naar modifikatie van gedragstekorten in de klinische observatiesituatie (4.2.4.2.)

4.2.4. Modifikatie van gedragstekorten vanuit de klinische observatiesituatie

4.2.4.1. Probleemstelling

De modifikatiepogingen van gedragstekorten vanuit de testsituatie hadden alle betrekking op *relatief enkelvoudig gedrag*: het verbeteren van een respons op een specifieke teststimulus. Bij de konstatering van gedragstekort in een observatiesituatie heeft men doorgaans te maken met een *complex samengesteld gedrag* waarvan de gepresenteerde stimuli niettemin qua inhoud en modaliteit overeenkomst tonen met de stimuli in de testsituatie.

De inventarisatie van modifikatiepogingen voortkomende uit de testassessment trachtte vanuit theoretisch en praktisch standpunt een overzicht te presenteren. Het ligt dus voor de hand om een dergelijke poging eveneens te ondernemen bij de gedragsmodifikatie vanuit de observatie in de kliniek. Het is een betrekkelijk vereenvoudigde zaak om reeds hier vast te stellen, dat er, althans in de geraadpleegde

literatuur, geen duidelijk omschreven principes konden worden gevonden, anders dan de principes der operante konditionering.

Anderzijds blijkt de hoeveelheid publikaties waarin melding gemaakt wordt van operante toepassingen in de revalidatie zo omvangrijk dat het moeilijk is een overzichtelijke indeling te geven. De reden hiervan is dat diverse methodieken meestal niet apart maar in combinatie door diverse disciplines worden toegepast, waarbij men overigens zelden blijkt geeft van bekendheid met en hantering van leerwetten.

Toch zal getracht worden om ook hier de indeling te volgen, die bij de „funktietrainingen” gezien vanuit het operante model, werd gevolgd:

1. Gedragsrestauratie.

- a. Toename van gedrag d.m.v. selectieve reinforcement
- b. Handhaving van gedrag onder toenemende stimuluscomplexiteit
- c. Shaping

2. Gedragskompensatie.

3. Gedragsreorganisatie.

Bij literatuurinventarisatie worden voor het eerste ook tamelijk frekwent empirische studies aangetroffen. Het empirisch design is hierbij het A-B-A-principe d.w.z. (A) Konstatering van uitgangswaarde (B) Het introduceren van een onafhankelijke variabele welke gekontrolleerd gemanipuleerd wordt en waarbij het effect gemeten wordt. (A) Eliminatie van de variabele om te zien of de uitgangswaarde weer terugkeert. Indien zulks gebeurt, wordt verandering in de afhankelijke variabele toegeschreven aan manipulatie van de onafhankelijke variabele.

4.2.4.2. Gedragskorrektie naar methodiek

Aangezien de principes bij de gedragskorrektie dezelfde zijn als bij de funktietraining zal hier volstaan worden met een ordening van literatuurvoorbeelden naar aard van de methodiek met zonodig toelichtend commentaar.

1. Gedragsrestauratie.

1a. Toename van gedrag d.m.v. selectieve reinforcement.

Meyerson c.s. (1967) geven hun training in typevaardigheid als volgt weer: „Typing skill was increased in an eighteen year old boy with traumatic quadriplegia. Before the behavior modification program, the patient did not persist in the job of typing. He frequently sought the therapist's attention and was reinforced for this by obtaining it. The behavior modification program consisted of placing him in a quiet room for typing, *ignoring* his demands for attention and reinforcing him for thirty minutes of typing. The reinforcement was five minutes of conversation on a topic, that interested him. As the program progressed he was required to type a certain number of lines to be reinforced (. . .). After twelve sessions his rate increased from five to twelve lines in thirty minutes and errors decreased from three per line to one every other line” (reduktie van excessief gedrag d.m.v. extinktie en toename van gewenst gedrag door selectieve reinforcement).

Hogg C. (1974 p. 62): Inzake toename van sociaal gedrag „Operant conditioning was aimed at *eliciting* the respons patterns or attitudes indispensable for social interaction and teaching appropriate behavior. The program involved *reinforcement to increase* the probability of the desired responses” (toename van sociaal gedrag d.m.v. selectieve bekrachtiging).

Betreffende de training van spreekvaardigheid bericht Goodkin (1966): „Mrs. S., who following a CVA had suffered a speech disturbance of 3 years duration. The patient used many words, but she tended to shift very quickly from one topic to

another and spoke quite inappropriately in terms of questions asked of her. Receiving all sorts of stimulus questions such as „Tell me about this room; what are some of the things you see in the room; tell me about your clothes; describe the clothes you are wearing” and responding 2 min. this patient was reinforced verbally and with a blue poker chip for each 15 sec. period which included some material relevant to the questions. She was told that she was off the topic and received a red chip after each 15 sec. period, that failed to include any relevant material. In fewer than 15 sessions Mrs. S. had shown a marked progress in relevant responses to the stimulus questions.

Walker c.s. (1968) inzake de training van „aandacht” vermeldt: „Attending behavior had been trained frequently in retarded persons and emotionally disturbed children. The general procedure followed is *reinforcement* of each period of eye contact with the experimenter (. . .). Initially, *verbal prompting* might be required but could be *faded* as interaction, becomes the discriminative stimulus for looking at the person being talked to”.

1b. Handhaving van gedrag onder toenemende complexiteit der stimulussituatie of afname van steun.

Bij elk modifikatieprogramma is het de doelstelling zo ver te komen dat de persoon het gedrag, dat eerst d.m.v. reinforcement en shapingsprocedures werd verkregen, gaat vertonen zonder deze en andere ondersteuning. Sommige programma's leggen iets meer het aksent op deze fading dan andere.

Harris (1974): „A new approach to treatment of children with athetoid cerebral palsy has been developed using electronic sensory aids to improve kinesthetic monitoring of the head and the limbs (. . .). The children are automatically *reinforced* for using signals to establish control during postural and movement activities (. . .). The use of these substitutes of course raises the question of whether the child taught to control his movements using electronic sensory aids can maintain his improved function *without them* subsequently. The answer is probably „Yes, but *you've got to explicitly provide for the transition* in the training program”. That is the child must be slowly *weaned* from dependence on the devices after he has learned to function well using them”. (Harris volgt derhalve het schema van aanleren van gedrag door feedback als positieve reinforcement, daarna wordt het aksent op fading-out gelegd).

Ten aanzien van de korrektie van eetgedrag bericht Fingado's c.s. (1970): „The patient, a five year old severely retarded hydrocephalic child has developed many eating problems as a result of his condition. He did not feed himself, did not take liquids from a glass and refused to eat any place other than a special child's eating table. Thus the main focus of the behavior modification program was the establishment of appropriate eating skills (. . .). The nurse began by leading Steve's hand and partially filled spoon to his mouth (prompting). She gradually *faded out* her assistance initially removing her hand just before the spoon reached his mouth and finally removing her hand as he drew his spoon from the dish. All prompts were subsequently *withdrawn*. Training Steve to drink from a glass involved a similar *fading* procedure. Because a glass was aversive to Steve the nurse began by presenting chocolate pudding in the glass. Steve was initially permitted to use a spoon to eat the pudding. The spoon was removed after he had learned to hold the glass and thus he had to bring the glass to his mouth in order to consume the pudding. The pudding was gradually thinned with more and more milk until he was drinking milk without assistance. After three weeks Steve's major eating problems has been removed”.

Een volgend voorbeeld in Garber's studie over de behandeling van „kwijlgedrag”: Garber (1971): „Little research has been applied to the modification of deviant responses secondary to known physical involvement. The present study was concerned with the elimination of drooling behavior in a cerebral palsied adolescent. R. M. is a 14 year old male with choreoathetotic cerebral palsy and right hemiparesis. His speech is dysarthric, characterized by excessive nasality and omissions, distortions and substitutions of consonant and vowel sounds. Constant drooling appears to be consequent to the oral paresis (. . .). A behavior modification program to reduce drooling was executed during speech therapy for articulatory disorders (. . .). The first was to instruct R. M. to swallow prior to the initiation of each verbal utterance. Because of this tendency to drool during sentence production the speech therapist would raise his hand in order to *prompt* R. M. to perform the swallowing act. After several sessions the boy was able to remember this pattern and the prompt was *eliminated* (fading). The second way was verbal *praise* for swallowing (. . .) after some period also this action was *eliminated*. The third way was to give R. M. pennies at the appropriate time. Only the penny reward system was used throughout the entire speech therapy program”.

1c. Shaping procedures.

Het akcent op de shapingsprocedures in hun diverse vormen lijkt te liggen in de volgende studies:

Hogg. C. (1974): „Reinforcement therapy has been divided into three phases: (1) the occupational therapist tries to gain eye to eye contact so that automatic rapport is established and the child can follow verbal directions (succ. appr. tot verbal cues), step by step rituals and gestures are eliminated (fading); (2) the second phase involves giving and receiving body contact, execution of simple tasks, recognition of spatial concepts of the face and body and physical features of the class-room. Speech is also reinforced or any attempts to verbalize; (3) The third phase is a combination of the simple behaviors of the other phases into more complex patterns. Speech is particularly encouraged with initiation coming from the child, not the therapist (fading van model). In this way the child experiences mastery (selfreinforcement) resulting from successful control and prediction of the environment. This lessens anxiety and increases the ability to learn”.

Kolderie (1971): „A three year eight month old boy who seldom engaged in physical activity but who was not physically handicapped was conditioned to play on a large climbing-frame to engage in other forms of physical activity. The experimenters *shaped* the behavior by using reinforcers when the boy came near the frame. Verbal approval, smiling and physical contact were used as reinforcers. After nine days of continuous reinforcement, the contingencies were *reversed* and climbing-frame-behavior dropped nearly to zero. The author concluded that the behavior modification program was responsible for the increase in physical activity”. (A-B-A design)

Wehman (1975): „Proper selection of clothing is another personal care skill that may have to be trained (. . .). Proper selection of clothing can be subdivided into several related clothing steps and assessed in the following way: shoes on correct feet; fine motor-dressing skills completed; shirt tucked in pants etc”.

2. Gedragkompensatie d.m.v. prothesenmodel.

Fordyce (persoonlijke mededeling) verhaalt inzake de behandeling van een patiënt met geheugenstoornissen: D.m.v. succesieve approximatie werd een „geheugengedrag” ontwikkeld: polshorloge met belmechanisme afstellen – op tijdstip loopt

wekker af – hand in broekzak – notitieboek pakken en kijken waar men naar toe moet – wekker opnieuw afstellen op volgend uur – notitieboek in zak – opdracht uitvoeren. Fading lukte niet helemaal, patiënt bleek ieder uur het notitieboekje nodig te blijven hebben. Wat dat betreft is een zakagenda langzamerhand een even normaal hulpmiddel ter gedragsbepaling als een bril. Hier wordt gemeend dat deze vorm van prothese onder „gedragsvorming” valt en niet zozeer onder „functie-restauratie”, aangezien het hier gaat om het onthouden of aanleren van een handelingssekwentie van complex gedrag. Het volgende voorbeeld illustreert dit eveneens.

Gassel c.s. (1963): „Patients with homonymous hemianopia can by paying attention make better use of residual vision in the „blind” side. Some of the patients were no more aware of their blind half-fields than most of us are of our blind spot. They *compensate* as we do by *learned* eye movements or head movements”.

Ten aanzien van de interaktietraining delen De Villiers c.s. (1974) mee: „A strict-training procedure was used to advance language in two language-deficient children. A „particle language” consisting of English words printed on magnetic particles placed on magnetic board, was used to map the interaction between subject and experimenter, which led to food reinforcement. The area of this interaction was expanded to include the comprehension and production of simple commands, description and question”. Aangezien het artikel niet vermeldt dat dit instrument op een gegeven moment overbodig werd, wordt aangenomen dat dit als permanente prothese tot communicatie werd gebruikt. Dergelijke interactie- of communicatie prothesen worden in Nederland reeds enige tijd toegepast (zie Van Mierlo 1976).

3. Reorganisatie van gedrag.

Bij literatuuronderzoek werden slechts beperkte aantallen publikaties gevonden, die voorbeelden gaven van gedragsreorganisatie van complex samengesteld gedrag.

Deelman (1970-1 p. 30) noemt enkele voorbeelden: „Patiënten die erg traag en schuifelend lopen en soms in het geheel niet meer vooruitkomen worden behandeld door het „automatisch lopen” te reorganiseren tot een cognitief geleide vorm van lopen. De patiënten moeten hun voeten steeds zetten op strepen, die op de vloer zijn aangebracht. Van lopen wordt zodoende een visueel gecontroleerde handeling gemaakt, die op een andere wijze verloopt dan vóór de behandeling”.

Een ander voorbeeld van reorganisatie is de werkwijze van Farnham – Diggory (1967): „Brain injured children cannot complete a task when presented in sentence form but can when asked to enact it”.

Prins (1975 p. 208) geeft een samenvatting van de therapie van Luria. Hij onderscheidt een viertal principes. „a. De reorganisatie van het functionele systeem als geheel door gebruikmaking van de nog intacte schakels van het systeem. b. Uitgebreide programmering van de te reorganiseren activiteit met behulp van een reeks externe hulpmiddelen. c. Via korrekte feedback moet de patiënt uiteindelijk leren om eventuele foute impulsen a.h.w. vooraf te onderdrukken. d. Simplifikatie van de te verrichten activiteiten door deze zoveel mogelijk onbewust te maken via inkorporatie in grotendeels automatische handelingssekwenties”.

Over het algemeen lijkt de aanpak van Luria een boeiend uitgangspunt. Vanuit praktisch (operant) referentiekader lijken er toch allerlei elementen als shaping, gebruik van hulpmiddelen e.d. door elkaar gebruikt te worden. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Dit geldt eveneens en in het algemeen t.a.v. de restauratie van hypothetische konstrukties gekonstateerd in de testsituatie. Uiteindelijk zal toch een synthese tussen de theoretische- en a-theoretische denkwijzen moeten worden

verworpen of nagestreefd. Binnen het kader van deze studie kan hiertoe slechts een aanzet worden gevormd.

In dit overzicht werd bewust naar beperking gestreefd. Het aantal publikaties, vooral wat betreft de toepassingen van de shapingsmethodiek is bij de vorming van complex samengesteld gedrag aanzienlijk groter dan hier kon worden vermeld.

Er lijkt echter te zijn aangetoond, dat de indelingsprincipes, zoals gebruikt bij de vorming van gedragstekorten, gekonstateerd in de testsituatie, eveneens toepasbaar zijn op die gedragstekorten, welke d.m.v. observatie worden vastgesteld.

Gedragsrestauratie, gedragskompensatie en gedragsorganisatie, gesteund door leerprincipes vanuit het operante paradigma lijken toepasbaar op het aanleren van „enkelvoudig” en „samengesteld” gedrag.

4.2.5. Modifikatie van gedragstekorten in de nabehandelingssituatie

Als revalidatiedoelstellingen inzake de situatie na ontslag zijn in 4.1.5. vastgesteld:

1. Het onderhouden van „revalidatie-adekwaat gedrag” (medicijngebruik, gebruik van rolstoel, prothesen) in die zin, dat de patiënt in staat wordt gebracht tot zelfverzorging in de thuis-, werk- of schoolsituatie.
2. Mogelijkheden tot het onderhouden van sociale kontakten.
3. Mogelijkheden tot produktiviteit, waarbij dit niet slechts verstaan dient te worden als „waarde op de arbeidsmarkt”, maar eveneens of veel meer als „zelfrealisering”.

In de klinische situatie wordt zoveel mogelijk als doelstelling het eerste punt algemeen gerealiseerd. Voor zover dit niet het geval is, zal daar natuurlijk ook nog in de nabehandelingssituatie aandacht aan besteed dienen te worden.

In de nabehandelingssituatie ligt derhalve het aksent op: Het voorbereiden van de patiënt op de thuissituatie in combinatie met het onderhouden van goede sociale kontakten en het veilig stellen van zelfverzorgende activiteiten. Over het algemeen is er moeilijk een exacte grens te trekken tussen klinische en nabehandelingssituatie. Deze grens zal per centrum verschillen.

De vraag waar het in dit verband om gaat is, of de leerprincipes vanuit het operante model enige bijdrage in dit „voortgezet leren” kunnen leveren. Heystek (1975) adstrueert deze gedachte aan een aantal voor zichzelf sprekende voorbeelden, waarbij zij zich voornamelijk oriënteert op shapingsprocedures. „Als een patiënt op de afdeling Arbeidstherapie activiteiten wil uitvoeren, dan kan dat gebeuren door middel van verbale opdracht, imitatietechniek, prompting, fading, successieve approximatie”. Zij bevindt zich bij het uiten van deze mening in gezelschap van meer auteurs, die in het onderstaande in het kort zullen worden genoemd. Hierbij wordt niet opnieuw stil gestaan bij een bespreking van de verscheidenheid der technieken. Zoals uit 4.2.4. naar voren kwam, worden de diverse methoden vaak in combinatie met elkaar gebruikt en er is soms uit een publikatie niet overduidelijk te distilleren welke methode er nu precies gebruikt werd. Een en ander impliceert niet dat bij de aktuele toepassing hiervan verwarring moet bestaan. Bij het opzetten van een programma zal wel degelijk met diversiteit in techniek, presentatie en opbouw moeten worden rekening gehouden.

Hierna volgend zullen toepassingen van gedragstherapeutische technieken voor dit voortgezette leerproces onderverdeeld worden volgens genoemde onderscheiding: Arbeid, Onderwijs, Hobby, Sociaal kontakt. In tegenstelling tot de revalidatie bij cerebraal gestoorde patiënten wordt bij de mentaal geretardeerde personen veel meer en steeds vaker gebruik gemaakt van gedragstherapeutische technieken.

Onderstaande publikaties gelden slechts als voorbeelden.

Arbeid

Gold (1972) onderzoekt de stimulusfactoren die een rol spelen bij de training van mentaal geretardeerde volwassenen bij een „Complex Assembly Task” waarbij hij tot de konklusie komt dat de wijze van stimuluspresentatie een rol speelt in snelheid van leren en niveau waartoe de getrainde kan worden opgeleid.

Gold (1973-1). Vervolgens toont Gold aan dat mentaal geretardeerden tijdens hun opleiding in staat zijn tot verwerving, transfer en retentie van tamelijk complexe motorische taken zoals samenstelling van een fietsrem e.d.

Gold (1973-2). Tenslotte konkludeert Gold dat er een grote diskrepantie bestaat in datgene wat mentaal geretardeerden doen vergeleken met datgene waartoe zij – dankzij een goede leermethodiek – in staat blijken.

Daniel (1973) beschrijft de invloed van het gebruik van „token reinforcement” toegepast bij mentaal geretardeerden op vier gedragsgebieden: aanwezigheid op het werk, nauwkeurigheid bij het werk, kwaliteit en kwantiteit, sociale responsiviteit.

Hobby's

Winkelstein c.s. (1973) beschrijven een cursus voor de training in zgn. „kunstzinnige vaardigheden” bij mentaal geretardeerde kinderen.

Katz (1974) beklemtoont de waarde van het instellen van een trainingsprogramma, waarbij aan mentaal geretardeerden via modeling en andere operante principes geleerd zou moeten worden hoe zij hun vrije tijd zouden kunnen doorbrengen.

Sociale vaardigheden

Keil c.s. (1973) attenderen erop hoezeer het van belang is wanneer een mentaal gehandicapte ook (opnieuw) leert een sollicitatiegesprek te voeren. Hij presenteert een gedragsmodifikatieprogramma, waarbij aan de hand van „social learning”-procedures, dit gedrag gevormd wordt.

Wehman (1975) stelde een programma samen, waarmee aan gehandicapten geleerd wordt om in een toekomstige werksetting tot sociaal gedrag te komen en dit te onderhouden.

Bij sociale vaardigheden is het niet alleen van belang om te kunnen omgaan met andere mensen, maar eveneens om te kunnen diskrimineren in de mate en de wijze van persoonlijk contact. Perske c.s. (1973) geven aan dat het over het algemeen zeer moeilijk is (en niet alleen voor de gehandicapte) om te leren, wie er te vertrouwen is. Ze beklemtonen echter dat het met name voor de gehandicapte van belang is om in vertrouwen om te kunnen gaan met verkopers, taxichauffeurs en andere leden van de gemeenschap.

Onderwijs

Resnick c.s. (1973) ontwikkelden een introductiecursus voor de verrichtingen van mathematische operaties waarbij leertheoretische principes een belangrijke rol spelen.

Edmonson (1974) stelt dat probleemoplossend gedrag en planning, belangrijke cognitieve vaardigheden zouden zijn die als uiteindelijke voorwaarden gelden voor persoonlijke onafhankelijkheid.

Ross c.s. (1973) voerden twee experimenten uit die pretendeerden probleemoplossend gedrag en „planning skills” in emotioneel, mentaal geretardeerde kinderen te trainen d.m.v. het simuleren van situaties (social learning). Het doel van het programma is hierbij: het laten luisteren naar en het begrijpen van datgene waar het

omgaat bij de probleemstelling, het aanleren van de gewoonte een probleem in onderdelen te verdelen, die de moeite waard zijn om op te lossen, de waarneming dat vele problemen verschillende oplossingen hebben.

Ross c.s. (1974) presenteren een effectief trainingsprogramma ter modifikatie van probleemoplossend gedrag t.b.v. mentaal getardeerden.

Het nabehandelingsgebied vormt tesamen met de overige genoemde gebieden in assessment en modifikatie een groot terrein. Elk gebied en deelgebied zijn nog niet volledig geëxploreerde terreinen, die zeer waarschijnlijk aansluiting bij elkaar moeten en kunnen vinden, indien men in staat is met eenzelfde kompas deze onderzoeksreis door verscheidene personen te laten ondernemen.

Dit kompas is, althans volgens het standpunt dat hier wordt ingenomen, de leertheorie uitmondend in het operante paradigma.

4.2.6. Modifikatie van gedragstekorten in de thuissituatie

Vanuit het perspectief van de klassieke en operante leertheorieën mag het een wonder heten, dat welke patiënt dan ook door therapie in zijn funktioneren verbeterd. De voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de generalisatie van gedragsveranderingen van de therapeutische situatie naar de situatie in het alledaagse leven, zijn volgens deze theorieën niet altijd aanwezig. Dit geldt niet alleen bij psychotherapie, maar ook bij gedragsmodifikaties zoals die in revalidatiecentra worden nagestreefd. De therapeut is in het algemeen niet in staat om de reacties „buiten de therapiesituatie” te kontroleren. Ook al is een patiënt in staat om tijdens de therapiesituatie adequaat te reageren, dan nog kan de niet-therapie-omgeving voorzover zij gedrag niet ondersteunt, niet goedkeurt of bestraft alle werk en inspanning ongedaan maken. Hierbij moet dan nog toegevoegd worden, dat de therapiesituatie over het algemeen zo totaal verschillend is van datgene wat de patiënt ontmoet in zijn „eigen wereld”, dat er weinig transfer of overdracht verwacht mag worden. De twee situaties „therapie” versus „niet therapie” bevatten zelfs grote discrepanties: veel van het gedrag van de therapeut is gericht op het vergroten van het verschil tussen gedrag in therapie en niet-therapiesituatie. In de psychotherapie wordt de patiënt aangemoedigd om vrijuit te praten, hetgeen daarbuiten veelal wordt afgeleerd. Voor iedere goede prestatie wordt de patiënt ondersteund, terwijl deze ondersteuning meestal ontbreken in de situaties van het dagelijkse leven.

Inadekwat gedrag wordt opzettelijk geëxtingeerd terwijl daar in de maatschappij veelal juist uitdrukkelijk op wordt ingegaan. Met weinig mogelijkheden om de reinforcementkonsekwenties en -kontingenties te hanteren buiten de therapie en met weinig overeenkomst tussen therapie en niet-therapiesituatie kan men zich afvragen hoe het mogelijk geacht wordt dat er zoiets als generalisatie optreedt. De impliciete veronderstelling is, dat als de omgeving van de patiënt vóór de therapie aversief reageerde, deze dit na de therapie plotseling niet meer doet en dat als de patiënt zich anders gaat gedragen, dit automatisch door de omgeving geaksepteerd en bekrachtigd wordt.

Sukses in therapie is dan tot op zeer grote hoogte afhankelijk van de welwillendheid en tolerantie van de omgeving en mogelijk is dit een van de redenen, waardoor het overall-effect van psychotherapie zo slecht aantoonbaar blijkt.

De therapeut en ook de persoon die zich op gedragsmodifikatie richt, moet in staat zijn om méér te doen dan alleen het bewerkstelligen van gedragsverandering in de therapiesetting, de klinische of nabehandelingssituatie. Langzaam groeit het besef dat het noodzakelijk is om een gedrag dat een begin van verandering toont verder te ondersteunen.

Dit is alleen mogelijk indien de therapeut het totale milieu kan controleren, hetgeen ondenkbaar is, of – en dat lijkt een meer reële propositie – als de therapeut in staat is om in de omgeving van de patiënt de voor deze patiënt relevante personen (reinforcing agents) zodanig te instrueren m.b.t. het geven of onthouden van bekrachtiging dat hierdoor de gedragsmodifikatie in het eigen milieu wordt gekontinueerd. Deze „significant others” dienen vooral gezocht te worden bij familieleden, leraren, werkgevers, vrienden etc.

Een andere voorwaarde is, zoals gesteld, dat de generalisatie van therapie naar niet-therapiemilieu geleidelijk verloopt. Dit lijkt mogelijk door de uiterlijke verschijningsvorm van de therapie-omgeving heel langzaam om te buigen naar de thuissituatie.

Bij de reductie van excessief gedrag werd dit (zie Hoofdstuk 3) gerealiseerd door geleidelijke deelname van familieleden aan het modifikatieproces, door de patiënt eerst te isoleren en daarna de toegankelijke omgeving te vergroten etc. In de revalidatie in zijn totaal, die zich tot nu toe slechts hoofdzakelijk occupeerde met nieuwe „fysieke” gedragsvorming, zit deze geleidelijkheid a.h.w. ingebouwd in de diverse oefensituaties, klinische, nabehandelingssituatie en thuismilieu.

Hoewel bovenstaande overwegingen vooral betrekking hebben op de gedragsmodifikatie van excessief deviant gedrag, gelden zij ook voor de ondersteuning van gedrag dat in de kliniek opnieuw aangeleerd werd. Het probleem hierbij is de opgave om ouders, leraren, werkgevers zover te krijgen, dat ze bereid en in staat zijn mee te doen aan een proces dat ook in de kliniek niet tot de meest eenvoudige opgaven behoort. Dat de realisering hiervan wel degelijk tot de mogelijkheden behoort, moge blijken uit enkele publikaties die hieronder worden genoemd. De indeling naar thuis, school en werksituatie werd hierbij gehanteerd.

Thuissituatie

Clement (1971) gaat in zijn artikel eerst in op de vele voordelen die verbonden zijn aan het trainen van ouders tot gedragstherapeuten. Een van de voordelen is dat de begeleiding 24 uur per etmaal zou kunnen duren. Deze zgn. mediatie-therapievorm vergroot in belangrijke mate de aktieradius van de behandeling in vergelijking tot de traditionele therapieën. Dit geldt niet alleen wat betreft de tijd, maar ook wat betreft aantal en intensiteit van konditionerende factoren. Het belang van het maken van een gedragsanalyse wordt gesteld en de ouders moeten er in opgeleid worden om gedrag te analyseren in de aspecten die in deze studie voortdurend naar voren kwamen: excessief gedrag, gedragstekorten en het onderhouden van gewenst gedrag. Clement stelt dat er drie doeleinden zijn, die ook door ouders kunnen worden nagestreefd:

- a. „To reduce the behavioral excesses
- b. To increase the frequency of desirable behavior which occur at low rates prior to intervention
- c. Maintain and strengthen the behavioral assets.”

Graziano (1975) is ervan overtuigd dat gestoorde kinderen nieuw complex sociaal aangepast gedrag geleerd kan worden. Indien hiermee begonnen zou worden in het centrum, dan zouden „non-professionals” getraind als gedragstherapeutische medehelpers, nieuwe gedragsvorming verder voort kunnen zetten. Ook bepleit hij dat er systematische gedragsmodifikatieprogramma's voor groepen opgezet zouden moeten worden in buurtcentra, waarbij ouders samen met non-professionals modifikatieprocedures realiseren.

Fingado (1970) reeds eerder genoemd bij de gedragsvorming in de klinische situatie,

presenteert drie cases waarbij ouders geleerd wordt via videobanden, hoe ze de behandeling die uitgevoerd werd in de kliniek, thuis moeten voortzetten.

De gevallen hebben betrekking op het aanleren van eetgedrag, het toenemen van spreken bij een autistisch kind en het aanleren van een geretardeerde jongen om te reageren als hij bij de naam werd geroepen. Fingado stelt dat deze ogenschijnlijk tamelijk „simpele” gedragingen eerst aangeleerd moeten worden door een opname van 30 dagen in een kliniek, die daartoe speciaal werd gestructureerd.

Bragg (1975) beschrijft een onderzoek naar gedragsvorming bij kinderen met cerebraal palsy, die geleerd werden thuis in een betere houding te zitten. Het ging er hierbij vooral om, na te gaan in hoeverre er generalisatie optrad van kliniek naar thuissituatie door voortzetting van bekrachtigingsprocedures. Bij 4 van de 6 kinderen leidde dit tot goed resultaat.

Schoolsituatie

Mc Kenzie c.s. (1970) behandelt een programma waarin onderwijzers in het gewone lagere onderwijs geleerd worden hoe ze in hun klas om moeten gaan met cerebraal gestoorde jongeren. Het lijkt misschien enigszins merkwaardig, maar het is een realiteit: „Forty-Sixty percent of handicapped children” – aldus Mc Kenzie – „are projected as not receiving adequate special education services. A reasonable assumption is that a sizable proportion of these children are being educated in regular classes.” In zijn publikatie noemt Mc Kenzie slechts 3 van de 47 succesvolle – zoals hij stelt – toepassingen van gedragstherapie. Hierbij wordt reductie van excessief gedrag (destruktie, interrupties, agressie e.d.) en toename van te weinig gedrag (te weinig aandacht, weinig korrekte rekenprestaties) behandeld. Al deze behandelingen werden gerealiseerd door lagere-schoolonderwijzers, die eerst onderwezen werden in de principes van gedragstherapie, waarna zij onderwijzers die niet getraind waren in de leertheorie begeleiden.

D'Annunzio c.s. (1974) adstrueert in feite de waarde van limit testing. Hij begint met het signaleren van twee methoden, die tot nu toe werden toegepast, welke hij minder bevredigend vindt (1) „Intensification of activities in an effort to compensate for the children's deficiencies (2) a wide range of remedial procedures (. . .). Neither approach appears to have been successful, as both tend to be too amorphous and to neglect the learners *specific* inadequacies. The present study was made to determine the efficacy of an approach which stresses differential diagnosis, a description of each child abilities and deficits for learning, followed by prescriptive remedial procedures”. In zijn assessment noemt D'Annunzio methoden, die overeenkomst vertonen met datgene wat in deze studie onder limit testing wordt verstaan: „Careful screening of the way the child responds to the presentation of *specific stimuli to specific modalities* will allow clinical inferences to be made about the child's operational strength and weakness”.

Waar D'Annunzio zich meer schijnt te richten op gespecialiseerd onderwijs richten Ozer c.s. (1974-2) zich weer evenals Mc Kenzie op voorzieningen in het gewone lager onderwijs „(. . .) Many children who are having difficulty, learning in the regular classroom. The goal is to help the teacher respond more effectively to the variety of needs within the classroom”. Het programma dat Ozer presenteert bestaat uit drie strategieën, waarbij limit testing herkend wordt en modifikaties die aansluiten op indicaties vanuit deze limit testing. De wijze van modifikaties verdisconteert kennis van leertheorie:

- (1) The first strategy is that of segmenting a task across time.
- (2) Using different combinations of modalities of input.
- (3) Limiting the numbers of stimuli.

Arbeid

Wat de werksituatie betreft levert de bestudeerde literatuurverzameling slechts weinig publikaties op inzake de toepassing van leertheoretische principes bij cerebraal gestoorde patiënten. Opvallend is eveneens, dat voorzover er hieromtrent publikaties zijn verschenen, deze betrekking hebben op toepassingen in de zwakzinnigenzorg.

Zimmerman (1969) vestigt de aandacht op de waarde van bekrachtigende kondities indien getracht wordt de „produktiviteit” van mentaal geretardeerden in een beschutte werkplaats te verhogen.

Tate c.s. (1976) bevestigt de mogelijkheid om ook zwak begaafde personen vrij complexe taken te doen uitvoeren, indien men voldoende acht slaat op leertheoretische principes.

Bovenstaande vermelding van literatuurgegevens moest wederom beknopt zijn. Ook hier was het de intentie aan te tonen dat hulpverleners in thuis-, school-, of werksituatie die qua aard of mentaliteit weinig rekening kunnen houden (of willen houden) met systematische ondersteuning van gedrag, deze mogelijkheden toch in principe zouden kunnen gebruiken. Dat deze mogelijkheden uitdrukkelijk en noodzakelijk moeten worden aangewend voor de „beklijving” van nieuw aangeleerd gedrag, werd reeds verschillende malen met klem naar voren gebracht.

M.a.w. de zogenaamde „nazorg” verdient bijzondere aandacht.

4.2.7. Modifikatie van gedragsbelemmeringen

4.2.7.1. Probleemstelling

Hoewel dit in hoofdstuk 3 niet expliciet werd genoemd, bestonden er diverse omstandigheden waardoor met name de reductie van excessief ongewenst gedrag als een bijzonder moeilijke opgave werd ervaren. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan.

Gedragstherapeutische behandelingsprogramma's ter reductie van excessief ongewenst gedrag bleken alleen opgezet en voltooid te kunnen worden, wanneer komplicerende factoren een minimale rol speelden. Echter ook dan moest bij voortduring bijgestuurd, gekorrigeerd en gecontroleerd worden. Zelfs onder gunstige omstandigheden bleek nog vaak ondanks bijsturen de gehele procedure niet of moeizaam te lopen. Het is dan ook de vraag of voor sommige categorieën patiënten ter gedragsreductie geen bijzondere maatregelen genomen moeten worden. Om dit na te gaan werd opnieuw gezocht naar literatuur waar met name „probleemgedrag” bij cerebraal gestoorde d.m.v. gedragstherapeutische principes werd behandeld.

4.2.7.2. Reductie van excessiefgedrag in de diverse situaties

Thuisituatie

De mogelijkheden ter reductie van excessiefgedrag in de thuisituatie zijn uiteraard afhankelijk, enerzijds van het soort patiënten en hun probleemgedrag, en anderzijds van de mogelijkheden in de thuisituatie wat betreft huisgenoten en omstandigheden.

Volgens Geller (1972) is de belangrijkste opgave bij het gebruik maken van ouders als mediator van gedragstherapie, hun de bekrachtiging van deviant gedrag te leren stoppen en in de plaats daarvan in te gaan op aangepast gedrag. Geller heeft getracht het gedrag van kinderen te veranderen wat betreft dwangmatig herhalingsgedrag

zoals het verplaatsen van voorwerpen, wrijven van plekken op vloeren en muren, voor- en achterwaarts schommelen, maar ook inzake agressief gedrag als het slaan van jongere broertjes, ernstige driftbuien en pogingen tot zelfbeschadiging. Bij het leren van het gebruik van gedragstherapie aan ouders als non-professionals bleken de volgende moeilijkheden voor te komen, aldus Geller:

- (1) „Having the parents define objectively the behavior under study,
- (2) identifying what constitutes reinforcement for their child,
- (3) providing the reinforcement as soon as the appropriate behavior occurs,
- (4) stop paying attention if the child behaves in a disruptive way,
- (5) in general: hesitance on the part of the parents to use operant techniques”.

Deze moeilijkheden konden echter worden overwonnen, doordat de bereikte gedragsverbetering van het kind de ouders in hun nieuwe aanpak versterkten. Desondanks bleek, dat als de belangrijkste problemen waren opgelost, de geneigdheid der ouders om de gebruikte technieken te blijven hanteren, verminderde. Dit betekent in feite dat de procedure vroegtijdig werd gestopt of niet meer konsekwent werd toegepast. Er bleken regelmatige bekrachtigingen nodig voor de ouders om deze te motiveren met de begonnen technieken voort te gaan en bijvoorbeeld een systematische afbouw van continue naar intermitterende bekrachtiging te realiseren.

Naast Geller berichten Wiltz (1973), Philage (1975) en Koekkoek (1977) goede resultaten inzake de betrekking van ouders als mediator in de gedragstherapie.

Wiltz (1973) geeft aan dat het bij ernstige gevallen van excessief ongewenst gedrag noodzakelijk is, ter observatie van gedragsinteracties als ook ter instructie van de huisgenoten, het gehele gezin gedurende enkele weken in een speciaal centrum op te nemen.

Betreffende de behandeling van perceptueel disfunctionerende kinderen biedt Philage (1975) nieuwe perspectieven door een combinatie van gedrags- en Gestalttherapeutische principes met gebruikmaking van de ouders als mediators. De enige publikatie welke in dit verband specifiek betrekking heeft op de revalidatie van cerebraal gestoorde kinderen, is afkomstig van Koekkoek (1977). Hierin vermeldt hij de begeleiding van twee patiënten met cerebrale stoornissen in de leeftijd van 4 en 14 jaar, onder gebruikmaking van een hiertoe speciaal opgeleide assistent-gedragstherapeut. De begeleiding vond plaats in het thuismilieu door middel van de ouders als mediator onder supervisie van deze gedragstherapeut. De behandeling duurde 2 maanden en had betrekking op de bekliving van gedrag, dat de patiënten eerst in het revalidatiecentrum hadden aangeleerd (zij werden eveneens in deze studie, hoofdstuk 3 naar voren gebracht). Koekkoek signaleert – naast een bevredigend resultaat – onder meer het belang van modeling, gedragsvoorschriften, konsekwente uitvoering van extinktie en bekrachtiging en het geven van informatie inzake gedragstherapeutische principes aan de ouders. Hij beklemtoont de noodzaak tot wijziging van de tot nu toe geldende opvattingen inzake de „nazorg”.

Schoolsituatie

Als een der probleemgedragingen, welke voor „reduktie” in aanmerking komen, wordt bij herhaling hyperactiviteit van schoolgaande kinderen vermeld.

Bower (1975) geeft eerst een overzicht van de methodieken welke tot nu toe ter reduktie werden aangewend. Vervolgens vestigt hij de aandacht op de aanhangers van de reinforcementtheorie. Door zich te beperken tot de hantering van overt gedrag zouden – aldus Bower – een groot aantal onderzoekers de waarde van gedragsmodifikatie hebben aangetoond. Door middel van omgevingsmanipulatie-

technieken blijkt o.a. gebruik van psychofarmaca te kunnen worden voorkomen. Als gebruikte methoden zijn te vermelden:

- a. Vermijding van afleidende stimuli.
- b. Verhoging van de stimuluswaarde van het leermateriaal.
- c. Het gebruik maken van rustig lerende leeftijdsgenoten als model.
- d. Negatie van hyperactief gedrag en aandacht bij rustig gedrag.

Cull (1974 p.108) beschrijft de behandeling van een tweetal jongens, die in gezelschap van elkaar zeer grote onrust wisten te creëren, maar die, indien zij niet met elkaar optrokken, de rust zelve waren. Het probleem was echter dat zij altijd met elkaar optrokken. De begeleiding bestond uit de konsekvente bekrachtiging (d.m.v. aandacht), indien de jongens apart of met andere kinderen speelden en de onthouding van aandacht, indien zij met elkaar optrokken. Binnen drie dagen – aldus Cull – speelden de beide jongens slechts 15% van de totale observatietijd met elkaar en 75% met andere kinderen. Het daarop uitgevoerde A-B-A en A-B-A-B-design ondersteunde de waarden van de leerprincipes. Van belang is het om hierbij op te merken dat er twee leerkrachten nodig waren voor een konstante begeleiding, hetgeen een voorwaarde is die niet eenvoudig te realiseren valt in de traditionele schoolsituatie.

Allen c.s. (1970) beschrijven een casus van het meisje Eleanor, 5 jaar oud, die geen schoolvorderingen zou maken en waarbij het meest opvallende was, dat zij zich nooit met andere kinderen bemoeide en altijd alleen speelde. Bij observatie van de klas viel op dat de algemene teneur gekenschetst kon worden als autoritair, weinig vrij spel met frekwente reprimandes.

Het kind werd geplaatst in een „Behavior Modificationclass (!)”, met als programma:

- (1) „No adult reinforcement when she was playing alone.
- (2) She would receive adult reinforcement when she was interacting with other children with or without verbal accompaniment.
- (3) She would receive additional adult attention when she was verbalizing”.

Allen geeft in deze studie aan hoe gewenst gedrag i.c. sociaal contact door middel van bovenstaand programma kan toenemen, maar eveneens weer afneemt en omslaat in apathie en isolement indien de betreffende leerkracht na terugplaatsing uit de gedragsmodificatieklas, niet kan worden „ingetraind”.

Van belang lijkt te konstaten:

- (a) Het bestaan van een speciale klas gericht op gedragsmodificatie.
- (b) De gedragsbelemmering (apathisch gedrag) werd gereduceerd door onthouding van reinforcement voor dit gedrag.
- (c) Verbaal en interactie gedrag bleken wel degelijk in het gedragsrepertoir aanwezig echter zij traden alleen infrekwent op.
- (d) Toename van incompatibel gedrag werd gerealiseerd door bekrachtiging hiervan.
- (e) Het A-B-A-B-design werd uitgevoerd.
- (f) Het afwezig zijn van adequate voortzetting resp. de poging tot beklijving van het aangeleerde gewenste gedrag leidt tot terugval in het probleemgedrag.

Kliniek

Uit voorgaande citering van publikaties lijkt duidelijk te zijn dat de reductie van excessief ongewenst gedrag in thuis- en schoolmilieu – zij het door bijzondere voorzieningen – in principe tot de mogelijkheden behoort. De ervaringen inzake de uitvoeringen van gedragsreductie in Hoensbroek geven enerzijds de informatie dat reductie van probleemgedrag in een klinische setting tot de mogelijkheden behoort,

anderzijds vestigen zij de aandacht op de noodzaak tot het treffen van speciale voorzieningen. Een andere uitermate belangrijke gedachtengang in deze studie is de overweging dat eerst eventueel excessief gedrag moet worden gereduceerd, voordat nieuwe gedragsvorming mogelijk wordt. Vanuit deze achtergrond kunnen de volgende probleemstellingen t.a.v. de literatuurinformatie worden gesteld:

- (1) Wordt in de literatuur de volgorde van reductie van probleemgedrag en vervolgens de vorming van nieuw gedrag eveneens gesignaleerd?
- (2) Zijn er voor deze reductie speciale voorzieningen in de kliniek noodzakelijk?
- (3) Is er iets bekend omtrent een eventuele noodzaak tot voorselectie van patiënten (-groepen), die hiervoor al dan niet in aanmerking komen?

Hoewel de literatuurverzameling niet omvangrijk genoemd mag worden, konden toch een aantal auteurs worden gevonden die omtrent deze probleemstellingen een (deel)antwoord lijken te verstrekken.

In een uitgebreide studie vestigt West (1975) er allereerst de aandacht op, dat er talrijke pogingen werden ondernomen teneinde, hetzij excessief gedrag te reduceren, hetzij toename van gedrag te realiseren, hetzij een specifieke leerstoornis te trainen. In zijn kritiek stelt West dat nimmer of zelden werd getracht deze drie aspecten tesamen in één behandelingsprogramma te vervatten. Het door West gepresenteerde programma houdt een poging in deze drievoudige aanpak gestalte te geven.

„Phase 1: Reducing student's disruptive behavior in a group contingency situation. Phase 2: To increase student attention to and participation in the class activities by offering membership in a status group for attending and participating.

Phase 3: Was directed toward improving the home-work aspect of the academic competence of the students by paying wages for home-work completed.

(N.B.): The procedures were implemented by personal employed by the learning disabilities school”.

Hoewel dit vrij omvangrijke gedragsmodificatieprogramma werd gerealiseerd in een niet-klinische setting toont het een grote overeenkomst met de programma-uitvoering zoals in deze studie wordt voorgestaan.

Enkele herkenningpunten zijn hierbij:

- (a) Voordat er met het aanleren van nieuw gedrag begonnen kan worden, wordt reductie van excessief ongewent gedrag ondernomen.
- (b) Nadat deze reductie van excessief gedrag is gerealiseerd wordt aandacht besteed aan de vorming van nieuw gedrag en de verdere voortzetting resp. beklijving van dit gedrag in de thuissituatie.
- (c) Onder alle drie de kondities wordt gebruik gemaakt van „bekrachtiging”.
- (d) Een speciale setting is vereist.

Leibowitz c.s. (1974) presenteert een studie waarbij eveneens het aksent valt op het aanleren van nieuw gedrag *nadat* een grote variëteit aan storend gedrag was gereduceerd of geëlimineerd. De gedragsmodificatie werd uitgevoerd op een 5-jarig meisje met een Cattell IQ van 41, dat niet in staat was zichzelf te voeden en daardoor reeds jaren op zeer moeizame wijze gevoed moest worden met speciaal voedsel. Pogingen om een variëteit in het voedsel te brengen, alsmede haar te leren tot het zelfstandig nuttigen van de maaltijd te komen, resulteerden in ernstige gedragsproblemen (gillen, schoppen, slaan, handbijten, zelfdestruktief gedrag etc.).

De procedure bestond uit een combinatie van reductie van probleemgedrag en successieve approximatie: „During session 1, the psychologist placed the spoon near S's face. When resistance was encountered, such as screaming etc. the psychologist praised S and withdrew the spoon, *but only when the screaming ceased*. Severe head-banging and screaming resulted in time-outs until S was quiet, but the spoon remained near S's face. In 23 minutes the psychologist was able to move the spoon

gradually closer and closer to S's mouth, until S licked and finally accepted the ice cream (. . .). When ice cream was accepted, the same procedure was used for three sessions with small quantities of two other foods. However these small quantities of food were placed toward the back of the spoon while the ice cream was placed at the tip of each spoonful. In addition, each spoonful accepted resulted in ice cream on a one to one basis, that is continuous reinforcement".

Van sessie 5-14 nam een arbeidstherapeut met gedragstherapie-ervaring de procedure over. Zij had van te voren d.m.v. een „one way screen" alle voorgaande activiteiten waargenomen (modeling) en voerde in dezelfde kamer dezelfde procedure uit. De psycholoog bleef wel in de buurt. Een en ander was bedoeld om generalisatie naar een ander persoon te realiseren. Van sessie 15-37 nam de arbeidstherapeut de leiding geheel over. De voedingssessies vonden nu driemaal per dag plaats en bovendien in andere kamers. Tenslotte nam een arbeidstherapeut zonder gedragstherapie-ervaring de gehele procedure over.

Tijdens elke sessie werd opnieuw optredend agressief gedrag genegeerd of bestraft (time-out), elke toenadering tot de gewenste eetrespons werd beloond. Daarna werd op soortgelijke wijze klee- en wasgedrag gevormd.

Alabiso (1973) presenteert een uitgebreid verzameld artikel waarin researchgegevens worden genoemd inzake reduceren van hyperactiviteit. Eerst worden allerlei therapieën behandeld als chemotherapie en speciale onderwijstrainingen. Vervolgens wordt gedragsmodifikatie aan de orde gesteld, waarbij van uitgegaan wordt dat „aandachtig bezig zijn" gezien kan worden als „inkompatibel met hyperactiviteit". Tenslotte wordt de reductie van hyperactiviteit behandeld. Dit wordt gerealiseerd door het enerzijds onthouden van positieve reinforcements aan hyperactief gedrag, anderzijds door het toedienen van bekrachtiging aan het geleidelijk vergroten van „attention span". Het aksent bij deze studie ligt op de positieve bekrachtiging van de aandacht en minder op de extinktie procedures. De te leveren prestaties worden langs de weg der suksessieve approximatie geleidelijk aan groter gemaakt.

Speciale „settings"

In het voorgaande werden verscheidene malen studies genoemd, waarbysprake was van bijzonder uitvoerige maatregelen, gedragsmodifikatieklassen e.d. Het lijkt de moeite waard aandacht te besteden aan de eventuele aanwezigheid van speciale teams, klinieken e.d., die zich ten doel gesteld hebben zich alleen of hoofdzakelijk te richten op de hier genoemde reductie van extreem ongewenst gedrag.

Uit ervaringen met excessief gedrag bij kinderen, zoals driftbuien, destruktief gedrag, huilen etc. blijken diverse onderzoekers als Allen (1972) en Cull c.s. (1974) tot de konklusie te komen, dat er inderdaad speciale settings nodig zijn, wil men effectief dit gedrag kunnen modifieren.

Het is hierbij opvallend, dat de desbetreffende studies steeds gepresenteerd worden als „the case of . . . ", alsof de behandeling een waar „projekt" zou zijn geweest. Dit nu is ook de indruk, die bij de behandelingen in Hoensbroek steeds weer gewekt werd: De modifikatie van werkelijk storend gedrag is een veelomvattende langdurige aangelegenheid, die de naam projekt wel degelijk verdient.

Allen (1972): „*The case of Julie*":

„Julie was 4 years old, an unusually small child for her age though there were no untoward medical signs except that of arrested hydrocephalus during early infancy. Developmentally she exhibited poor large motor skills and infantile speech patterns. In addition she displayed an extensive repertoire of inappropriate and maladaptive

behaviors toward children and adults. With children her most conspicuous responses were avoidance or attack. With adults she was totally noncompliant. She screamed „no” to any request, any insistence by an adult (parent or teacher) provoked a full-fledged tantrum in which she threw herself face down on the floor, kicking and screaming hysterically (...). Two members of the *Experimental Education Unit* (EEU) in the Child Development and Mental Retardation Center preschool staff observed Julie and they agreed to enroll her in a preschool-class at the EEU.

Procedure: Six days of baseline data were collected on several criteria. During one sixty minute observation period: physical attack 68% of the time; throwing and dumping 74%; disruptive behavior 48%; amount of time not engaged in purposeful activities 88%; amount verbalizing to peers 6%; cooperative interplay 30%; amount of time spent alone 77%:

phase 1: time out for physical attacks (...)

phase 2: activity decision required (...)

phase 3: time out for throwing and dumping (...)

phase 4: structuring cooperative play (...)."

Iedere fase op zich bestaat uit een voortdurend samenspel tussen verscheidene groepsleiders gedurende enkele weken. De studie besluit met: „This study, as well as several others in progress seem to indicate that children with severe problem behaviors are not likely to improve *without specific behavior management intervention in special institutes*".

Cull c.s. (1974 p.110-116): Een andere studie is „*The case of Townsend*". (disruptive, aggressive, retarded, tantrum behavior etc.)

„This child was 4½ years old, when he was transferred from a Head start classroom to a *Behavior Modification* class. This study demonstrates with great specificity the *many* and *varied* contingency arrangements required for this type of child – a child who is all too frequently „written off” or relegated at a very early age to institutional care for predelinquents. On Townsend's eleventh day in the new classroom a first step in behavior modification was initiated. All tantrums regardless of duration or intensity were to be ignored, that is put on extinction. *Absolute* disregard of the tantrum, no matter how severe it might become, had to be thoroughly agreed upon among the teachers in as much as there are data, which indicate that when tantrums are put on extinction, extremes of tantrum behavior may temporarily ensue. Townsend's first tantrum under the nonattending contingency lasted twenty-seven minutes (average duration of previous tantrums had been five minutes) becoming progressively more severe. *The classroom was cleared of all children and adults* when it became obvious that the tantrum was going to be lengthy. The children were taken to the play ground by a teacher and a non-professional, while the other teacher was stationed immediately outside the classroom-door. When Townsend quieted, the teacher opened the door to ask in a matter of fact voice if he was ready to go to the play ground. Before the teacher had a chance to speak, Townsend recommenced his tantrums. The teacher stepped back outside to wait for another period of calm (...). Each time the episodes were shorter (six, three and one minute respectively). Finally the teacher was able to suggest going out of doors. This she did in a thoroughly neutral fashion (...). On the second day of tantrum intervention there was one tantrum of 15 minutes with two-minute follow-up tantrums. On the third day there was one mild four minute tantrum. No further tantrum occurred.

Deze twee studies vestigen de aandacht op extreem probleemgedrag (in diverse vormen) *bij kinderen*.

Men kan zich voorstellen welke moeilijkheden er ontstaan als een dergelijk programma bij een cerebraal gestoorde *volwassene* met excessief gedrag in een revalidatiecentrum moet worden gerealiseerd. Alle patiënten op een zaal zouden op cruciale momenten in de therapie moeten meewerken ten behoeve van één persoon, die juist door zijn gedragsstoornissen niet tot de meest sympathieke behoort. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor vele personeelsleden, die ieder op hun eigen wijze bij de verzorging van een bijzondere groep patiënten betrokken zijn. De patiënten zijn geen therapeuten, maar personen die allen in meer of mindere mate door hun handicap medebepaald zijn en eveneens gedragsdeviaties kunnen tonen. Tenslotte kan men zich voorstellen, dat een gedragsmodificatieprogramma (met eventueel 24 uur begeleiding) relatief eenvoudig is bij, en ook makkelijker geaccepteerd wordt door kinderen en hun familie, maar dat dit in verscheidene opzichten totaal anders ligt bij de volwassenen. Het is trouwens zeer opmerkelijk dat de literatuur geen casuïstiek presenteert inzake de behandeling van volwassenen met excessief gedrag.

Resumerend kan gesteld worden, dat uit ervaring en (beperkte) literatuurstudie blijkt, dat alleen na speciale maatregelen getracht kan worden iets aan gedragsmodificatie te doen. Deze noodzakelijke voorzieningen houden in: speciaal opgeleid personeel, een geëigende omgeving, een patiëntselectie en niet te vergeten een ondersteunend thuismilieu.

4.2.8. Samenvatting

In deze paragraaf werd gepoogd een inventarisatie te presenteren inzake de modificatie van gedragstekorten en gedragsbelemmeringen. Het uitgangspunt hierbij was wederom de leertheoretische visie hoewel op sommige punten een welwillend oor geleend werd aan gezichtspunten vanuit andere bron.

- 1e. Het werd van belang geacht dat personen werkzaam in de situatie die voorafgaat aan de revalidatie een open communicatie voeren met het personeel in het revalidatiecentrum. Nogmaals werd beklemtoond dat revalidatie een leerproces is dat alleen maar efficiënt te realiseren valt door een hierop georiënteerd team.
- 2e. Bij de modificatie van gedragstekorten, gekonstateerd in een klinische test-situatie, zijn twee principieel verschillende uitgangspunten te signaleren:
 - a. Men gaat uit van een theorie inzake de relatie tussen hersenen en gedrag, er wordt een testprocedure ontwikkeld en er volgt een training waarbij de trainingsstimuli direct of indirect overeenkomst vertonen met de teststimuli. Het principe der training lijkt terug te voeren op stimulering, verrijking of „weer naar boven brengen“.
 - b. Vanuit praktische overwegingen kan men zich ook afvragen wat de actuele behandelingsactiviteiten zijn, ongeacht de theorie „hersenen – gedrag“. Wanneer men dit praktisch uitgangspunt hanteert, blijken de bestaande trainingsprocedures te herleiden tot drietal directe pogingen gedrag te modificeren, nl. gedragsrestauratie (herstel van gedragstekorten), gedragscompensatie (d.m.v. prothesen) en gedragsreorganisatie (het ontwikkelen van een kwalitatief ander gedrag om tot eenzelfde resultaat te komen).
- 3e. Ter modificatie van gedragstekorten gekonstateerd via gedragsobservatie werden, althans in de literatuur, alleen operante konditioneringstechnieken aangetroffen.
- 4e. Inzake voortzetting van de revalidatie in de nabehandelingssituatie werden literatuurstudies gepresenteerd, die alle gebruik maken van de leertheoretische

principes teneinde een der revalidatiedoeleinden nl. „produktiviteit” te ondersteunen of te realiseren. Produktiviteit dient in deze opgevat te worden als een mogelijkheid om een bevredigende taak voor zichzelf en/of gemeenschap te realiseren d.m.v. arbeid, hobby, studie en sociaal contact.

5. De literatuurstudie gericht op de behandeling in de thuissituaties wees erop dat het ook in deze milieus wel degelijk mogelijk is om nieuwe gedragsvorming te realiseren of, indien deze reeds enigszins aanwezig was, verder te ondersteunen.
6. Tenslotte is de belangrijkste bevinding, dat extreem ongewenst gedrag dat gedragsvorming belemmert, niet of nauwelijks gereduceerd of geëlimineerd kan worden in de huidige revalidatiecentra hier te lande. Gegeven de resultaten elders blijkt het echter wel degelijk mogelijk ook excessief gedrag welke vorming van nieuw adequaat gedrag belemmert te reduceren, zij het alleen indien specifieke voorzieningen in de zin van getraind personeel werkzaam in speciale instituten worden getroffen.

HOOFDSTUK 5

NAAR EEN REVALIDATIE-LEERPROCES

5.1. Overwegingen inzake assessment

5.1.1. Inleiding

In hoofdstuk 4 werd literatuur inzake de assessment en modifikatie voor toepassing in de diverse criteriumsituaties behandeld.

Gekoncludeerd werd dat uit deze literatuurstudie enkele lijnen inzake assessment en modifikatie naar voren kwamen, die een steun kunnen bieden voor een (eventueel) te realiseren revalidatie-leerproces. Een revalidatie-leerproces impliceert niet, dat de medisch-verpleegkundige aspecten in waarde en betekenis behoeven in te boeten, maar wel dat minstens evenveel mogelijkheden worden gegeven om in het totaal van revalidatie-activiteiten ook het leren in zijn vele aspecten te betrekken. Dat een persoon leert – het werd reeds vele malen benadrukt – is niet altijd een vanzelfsprekende zaak. In de revalidatie dient expliciete aandacht geschonken te worden aan het optimaliseren van voorwaarden die dit leren mogelijk maken. Het vereist, zoals Fordyce stelt, in eerste instantie een herziening van de revalidatiegedachte, die vermoedelijk reeds zou moeten aanvangen bij de revalidatie-opleidingen.

Een verandering van standpunt of visie van medewerkers aan een instelling is, zoal realiseerbaar, geen eenvoudige zaak. De konkretisering van activiteiten, die voortvloeien uit zulk een veranderde visie is eveneens geen geringe opgave. Hier kan dan ook alleen gewezen worden op een aantal richtlijnen die de literatuur en praktijk verstrekken. In deze eerste paragraaf komen overwegingen inzake de assessment aan de orde. Bij deze presentatie is afgezien van de behandeling per criterium-situatie, aangezien de te behandelen richtlijnen in alle situaties van kracht zijn. Het onderscheid naar gedragstekorten en gedragsbelemmeringen blijft echter wel gehandhaafd.

5.1.2. Assessment van gedragstekorten in de klinische testsituatie

5.1.2.1. Algemene zienswijze

Bij gedragstekorten is een goede assessment de onmisbare basis voor het uitvoeren van handelingen welke gericht zijn op nieuwe gedragsvorming. Zowel in de pre-opname situatie, klinische testsituatie, klinische observatiesituatie, nabehandelingssituatie en thuissituatie moet uitgegaan kunnen worden van een netwerk van items, inzake gedragstekorten. Deze netwerken zullen noodzakelijkerwijs een steekproef zijn uit een universum van items, maar zij zullen toch voldoende representatief moeten zijn om het totaal aan tekorten inzake „gedrag-noodzakelijk-in-de-leefruimte” te kunnen representeren. Een andere voorwaarde hierbij is dat de netwerken niet zo gekompliceerd moeten zijn, dat ze onhanteerbaar worden. Teneinde een totaalbeeld aan gedragstekorten te verkrijgen zou het bovendien de algemene werkbaarheid ten goede komen, indien de diverse netwerken op elkaar aansloten en elkaar aanvulden. Het zou nog prettiger zijn, indien de diverse netwerken aan te beoordelen items elkaar zouden overlappen, d.w.z. één netwerk voor diverse situaties. De voordelen van een dergelijk systeem zijn ontelbaar, echter het is alleen realiseerbaar indien er een begrippenkader gevonden kan worden dat in staat is de diverse eisen van de diverse leefwerelden te dekken. Met andere woorden bij bedoelde assessment gaat het niet slechts om een taxonomie van „functies”, maar een taxonomie van gedragstekorten in de diverse „situaties”. De visie van deze studie is dat een dergelijk begrippenkader uit moet gaan van de vergelijkbaarheid van stimuluskonfiguraties en responsies in de diverse criterium-

situaties. Ter konkretisering van een dergelijke assessment zal een poging ondernomen worden tot nadere precisering van de externe stimulussituatie en vereiste respons. (De „S” en „R” uit de gedragsvergelijking S-O-R-K-C). De algemene zienswijze hierbij is, dat het wellicht mogelijk is om in elke situatie het externe milieu te specificeren naar stimulusinhoud: figuraal, gedragsmatig, symbolisch en semantisch en combinaties hiervan. Hierbij zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de modaliteit(en) waarin de stimuli worden gepresenteerd. De respons zou dan onderverdeeld kunnen worden naar bijvoorbeeld een spraak- en verplaatsingsrespons.

Allereerst zal deze indeling naar stimulus en respons-aspekten ondernomen worden bij de instrumenten, die gebruikt worden in de klinische testsituatie.

Het is opvallend dat deze visie die a.h.w. aangereikt wordt door Mark en Guilford (4.1.3.2. en 4.1.3.3.) wat betreft de klinische testsituatie ook aansluit bij zienswijzen van andere onderzoekers in de onderscheiden criteriumsituaties in deze studie.

In de pre-opname situatie wordt deze visie tendele door Fordyce (4.1.3.1.) gebezigd, wanneer hij suggereert allerlei activiteiten die de patiënt vóór de opname bezigde in te delen naar „symbool, motorisch-manipulatief en interpersoonlijk ge-centreerd”.

In de gedragsobservatieschalen (4.1.4.2.) werden regelmatig onderscheidingen aangetroffen die doen denken aan bovengenoemde indeling. Bijvoorbeeld de indeling van Gunzberg (socialisatie, communicatie) of Rosinsky (cognitieve sectie, affectie) e.d.

Bij de taakobservatie in de nabehandelingssituatie wordt door Poor (1975 p.34) uitgegaan van de analyse van werksituatie naar overeenkomstige „kwaliteiten” in zijn „Work Sample Approach”: „The Work Sample Approach utilizing a sample of work from an actual job to be found in the community. The same material, tools and equipment are used in a different setting”. Het lijkt niet al te geforceerd om ook hier een analyse van gepresenteerde stimuli naar inhoud voor mogelijk te houden. Tenslotte zou nog aangevoerd kunnen worden, dat een testsituatie een gestandaardiseerde steekproef is uit de totaliteit van het leven en dat men poogt vanuit de testsituatie generalisaties naar deze grotere, meer complexe werkelijkheid te ondernemen, m.a.w. er wordt steeds uitgegaan van de mogelijkheid tot generalisatie vanuit gereduceerde stimulussituaties naar meer complexe.

5.1.2.2. Ontwerp van een funktietaxonomie

In het onderstaande zal getracht worden, vanuit de literatuurinformatie, tot een raamwerk inzake een funktietaxonomie te komen. Ondanks vele onzekerheden wordt hierbij uitgegaan van de volgende vooronderstellingen:

- 1e. Het gedrag wordt in iedere situatie en op elk leeftijdsniveau tot stand gebracht door een informatieverwerkend systeem, bestaande uit input zijde, centrale verwerking met feedback controlemogelijkheid en een output zijde.
- 2e. Het centraal informatieverwerkend systeem wordt hierbij twee taken toebedacht nl.: a. Gedragsregulatie d.w.z. het tot gedrag komen, gedragsafremming, gedragstempo, gedragskontinuering e.d. en b. Gedragsorganisatie d.m.v. een aantal hypothetische konstrukties (operaties en produkten naar Guilford).
- 3e. De output d.w.z. de respons op de gepresenteerde stimuli kan onderscheiden worden naar motorisch-sprekende (vocaal en subvocaal) en motorisch-verplaatsend (grof en fijn).
- 4e. De input d.w.z. de gepresenteerde samengesteldheid aan stimuli kan op cognitief niveau onderscheiden worden naar:
 - a. Inhoud (Guilford): figuraal, gedragsmatig, semantisch, symbolisch.

- b. De diverse modaliteiten: auditief, visueel, tactiel, kinesthetisch.
c. Wijze van presentatie (aantal, volgorde, intensiteit e.d.).
- 5e. Een belangrijke, maar onzekere gedachtengang in deze is of het onderscheid naar stimulusinhouden inzake cognitie ook van kracht zou zijn op het „niveau” waar de zgn. sensomotorische koppeling ontstaat. De indruk bestaat, dat er ook op dit niveau sprake zou kunnen zijn van de formatie van „units, relaties, implicaties etc.” Ook kan aangevoerd worden dat de „wereld” waarin het kind zich begeeft gevuld is met fenomenen, die in eerste instantie een figurale indruk zullen geven en dat figuur-grond-differentiatie een vereiste is om tot verdere ontwikkeling in deze te komen. Niettemin past de definitie van Guilford niet geheel voor dit type van stimuli: „Figural, pertaining to information in concrete form as perceived or as recalled in the form of images”.
Voorlopig moet derhalve gekonkludeerd worden dat het althans op dit moment niet mogelijk is de indeling van Guilford op verantwoorde wijze eveneens op het „sensomotorische niveau” toe te passen. Hiervoor is hij in feite ook nooit bedoeld.
- 6e. Door uit te gaan van modaliteit en stimulusinhoud worden de hypothetische niveaus en hiërarchieën buiten beschouwing geplaatst, relatief minder belangrijk, en kunnen onderliggende konstrukties bij het informatieverwerkend proces toch onderzocht worden.
- 7e. Deze onderliggende konstrukties zijn:
a. De operaties: cognition, memory, evaluation, convergent production, divergent production.
b. De produkten: units, relation, implication, system, transformation, classes. (zie Guilford c.s. 1971 pag. 21).
Aangezien er vermoedelijk niet voldoende modaliteitsspecifieke tests bestaan, die iedere operatie-produkt-cel per stimulusinhoud, per responssoort vullen, zal genoegen moeten worden genomen met een benadering.
- 8e. Het lijkt in ieder geval mogelijk om in de klinische *testsituatie* per stimulusinhoud, modaliteit en responstype de aparte operaties te onderzoeken. In de zogenaamde klinische *observatiesituatie* is dit niet goed mogelijk, aangezien door het daar gevraagde complexe samengestelde gedrag de diverse operaties moeilijk te onderscheiden zijn. Bovendien lopen daar stimulusinhouden, modaliteiten, wijzen van presentatie en responstypen te veel door elkaar. Overigens leent zich een goede observatiesituatie beter voor prediktie van gedrag in de complexe werkelijkheid, dan de testsituatie.
- 9e. Deze laatste overweging leidt tot een nieuwe afgrenzing van „functies” en „vaardigheden”.
Functies: Hypothetische konstrukties, ingedeeld volgens de taxonomie van Guilford in specifieke operaties en produkten, per stimulusinhoud, modaliteit, presentatie wijze en responstype.
Functieassessment: De beoordeling van deze hypothetische konstrukties door presentatie van tests, welke volgens Guilford deze konstrukties meten onder systematische variatie van stimulusinhoud, modaliteit, presentatiewijze en verwacht responstype.
Vaardigheden: Handelingssekwenties die samengesteld zijn uit een voorlopig (onbekend) aantal hypothetische konstrukties. Zij zijn als zodanig handelingen, die typisch voortkomen uit de socio-culturele fysieke context en een appél doen op de persoon zelf om zichzelf in zijn leefsituatie te handhaven.
Vaardigheidsobservatie: De beoordeling van het vermogen van een persoon inzake het kunnen beantwoorden aan de eisen die vanuit de leefsituatie aan hem

gesteld worden. Teneinde een aansluiting te kunnen vormen met de functie-assessment dient ook bij deze vaardigheidsbeoordeling zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met stimulusinhoud, modaliteit, presentatiewijze en responstype.

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot een hypothetische taxonomie van functies die in onderstaande tabel worden weergegeven. Aangezien deze tabel een indeling naar niveaus lijkt te suggereren, moet hier nogmaals gesteld worden dat dit zeker niet de bedoeling is. Het is slechts de intentie om in deze studie zoveel mogelijk uit de taxonomie van Guilford te halen. Door een indeling van de tests van Guilford naar kanaalspecificiteit wordt getracht deze „structure of intellect” in de revalidatie te introduceren. Verdergaande research dient, op vermoedelijk vrij lange termijn, na te gaan in hoeverre deze introductie een reële bijdrage gaat leveren in de assessment van gedragstekorten bij cerebraal gestoorde patiënten.

Tabel 15 Taxonomieschema

Stimulus inhoud	Input materiaal		Centrale Verwerking Operaties: C/M/E/N/D Produkt: U/R/I/S/C/T (Zie Guilford 4.1.3.3.)	O R	Voorbeelden van (culturele) mogelijkheden	Uni of Bimodaal
	Mod.	Inh.				
S symbolisch	V	S	Mathematische taalverwerking 1)	Ms	schriftelijke rekenopdracht met gesproken antwoord schriftelijk rekenen hoofdrekenen mondelinge rekenopdr. op papier uitrekenen M-S koppeling M-S koppeling	Bi
	V	S		Mv		Uni
	A	S		Ms		Uni
	A	S		Mv		Bi
	A/V	M-S		Mv		Bi
M ^r semantisch geregistreerd	A/V	M-S		Ms		Bi
	V	M ^r	Geregistreerde taalverwerking 1)	Ms	hardop lezen naschrijven diktee M-M ^r koppeling M-M ^r koppeling	Bi
	V	M ^r		Mv		Uni
	A	M ^s		Mv		Bi
	A/V	M-M ^r		Ms		Bi
	A/V	M-M ^r		Ms		Bi
M ^s semantisch gesproken	V	F	Gesproken taalverwerking 1)	Ms	verhaal uit plaatjes vertellen spreken in cultuurtaal F-M ^s koppeling F-M ^s koppeling	Bi
	A	M ^s		Ms		Uni
	V/A	F/M ^s		Ms		Bi
	V/A	F/M ^s		Mv		Bi
	V/A	F/M ^s		Mv		Bi
F figuraal	V	F	Verinnerlijkte bewegingen	Mv	figurale manipulaties (in gedachten)	Uni
	A	F		Ms		Uni
B behavioral	A	B	Toekennen van inhoud aan bewegingen	Mv	auditiief imiteren visueel imiteren	Uni
	V	B ¹		Ms		Uni

Betekenis:

F = Figuraal

B = Behavioral

M^s = Semantisch spraak

M^r = Semantisch geregistreerd

S = Symbolisch

1) Komt niet voor bij Guilford

A = auditief

V = visueel

Ms = Motorisch-spraak

Mv = Motorisch-verplaatsend

O = Output

R = Respons

5.1.2.3. Van ontwerp naar operationalisering

A. Invulling der cellen in de taxonomie.

Een theoretisch model zal, wil dit praktische waarde krijgen, moeten uitkristalliseren in een geoperationaliseerd frame, bruikbaar voor assessment. Vanuit de denkbeelden van Guilford is een globaal werkframe aan te geven, terwijl zijn praktische testvoorbeelden toepasbaar zijn voor een deel der psychische functiediagnostiek.

Guilfords systeem is echter niet voor alle cellen (C-U, C-R, C-I enz. D-U, D-R enz.) te vullen met genormeerde tests met een enkelvoudige faktorlading, geschikt voor de revalidatiepatiënt, die bijvoorbeeld niet kan schrijven of spreken. Enerzijds hebben vele tests op het onderhavige gebied een meervoudige faktorlading, anderzijds zijn diverse tests met een enkelvoudige faktorlading of weinig bruikbaar of niet genormeerd voor het Nederlandse taalgebied. De tests die Guilford in zijn model presenteert zijn bovendien niet geselecteerd op kanaalspecificiteit. Dit geldt trouwens voor 99 % der verkrijgbare tests, aangezien deze meestal intermodaal (auditief-visueel) moeten worden verwerkt, hetzij qua input, hetzij qua input-output modaliteiten. Tenslotte houdt Guilford geen rekening met de soort motorische respons en dus ook niet met de modaliteit waarin de respons kan worden waargenomen.

Voor de koppeling van twee verschillende stimulusinhouden als bijv. figuraal-semantisch biedt Mark perspectief in zijn „Detection of psycholinguistic disorders” (zie Schroots 1972 pag. 43). Bij deze naspeuring is echter geen sprake meer van tests wat betreft het criterium, normering. Het betreft meer systematische controle van aanwezigheid en functioneren van de verschillende systemen. Door middel van het „sukses-falen” principe wordt namelijk herhaald gekeken of de patiënt een specifieke opdracht aan kan of niet. De gegeven taken blijken eigenlijk alleen cognitief qua „operatie”, waarbij andere operaties onduidelijk blijven. Wel worden alle systemen afgetast binnen het auditief-visuele (bi-modale) kommunikatiekanaal, met zorgvuldige manipulatie van de input. Hoewel onvolledig biedt deze aanzet van Mark een perspectief tot verdere exploratie. Veel moeilijker lijkt het onderzoek te worden bij het niveau „sensomotoriek”. Weliswaar bestaan er enkele tientallen tests, gekontroleerde opdrachten en observatieschalen, maar deze instrumenten zijn niet zondermeer binnen het hier voorgestelde framework te passen. Evenals bij de meeste „cognitieve” tests zijn tests of gekontroleerde opdrachten met een enkelvoudige faktorlading onvoldoende ontwikkeld. Deze studie wil dan ook geen uitspraak doen inzake het onderzoek van zogenaamde sensomotorische koppelingen.

Per stimulusinhoud en per kommunikatiekanaal dient iedere „operatie” apart te worden onderzocht. Daar voorlopig nog niet iedere operatie-produkt-cel per stimulusinhoud en per kanaal gevuld is, kan per stimulusinhoud, per kommunikatiekanaal iedere operatie bij benadering slechts door twee tests worden beoordeeld, d.w.z. 10 onderzoeken per kanaal en stimulusinhoud. Indien op deze wijze alle kommunikatiekanalen zouden kunnen worden onderzocht, betekent dit c.a. 200 onderzoeken in totaal.

Aangezien iedere test, indien hij enigszins adequaat wordt uitgevoerd, minstens 10 minuten zal vergen, betekent dit ca. 4 dagen onafgebroken onderzoek. Dit is uiteraard een ondoenlijke aangelegenheid, zowel voor patiënt als voor onderzoeker, derhalve moet in eerste instantie gewerkt worden met een vrij grove benadering. Deze benadering kan bestaan uit het vaststellen van de stimulussoort waarmee de patiënt de meeste moeite heeft door per kommunikatiekanaal een aantal „gang-

bare" mogelijkheden als rekenen, lezen, diktee etc. na te gaan (zie integratie 5.1.5.). Hierna kan voor één kanaal ten aanzien van de veronderstelde meest gestoorde stimulussoort worden gezien welke operaties het meest zijn aangetast. Een andere mogelijkheid is na te gaan of de cruciale koppelingen (Figuraal-Semantisch), (Semantisch gesproken-Semantisch geschreven) e.d. wel kunnen worden gemaakt. Geleidelijkaan kan zo het onderzoeksfocus worden versmald, waardoor het mogelijk wordt in ca. 2 dagen tot een redelijk beeld te komen van de psychische funktiestoornissen ten gevolge van een cerebrale aandoening.

Een volgend probleem is de limit testing-procedure. Pas indien enige zekerheid is verkregen dat het defekt binnen het taxonomiemodel lokaliseerbaar is en zich bijvoorbeeld niet uitstrekt tot, of doorwerkt op een veelvoud van kommunikatiekanalen, operaties en produkten, kan met limit testing begonnen worden. Dit concept dat in hoofdstuk 4 terloops werd genoemd vergt een nadere uiteenzetting.

B. Limit testing-procedure.

Guilford presenteert in zijn complex systeem uiteindelijk toch een sterk gereduceerd extern milieu. De realiteit is in feite complexer en de test is slechts een gestandaardiseerde situatie waarvan gehoopt wordt, dat er enige overlap bestaat met de realiteit.

De gestandaardiseerde test elimineert elke afwijking van de voorgeschreven testprocedure. Dit vermindert zijn bruikbaarheid, met name voor de revalidatiepatiënt. De revalidatiepatiënten zijn immers zeer gevarieerd in hun resterende gedragsmogelijkheden. Het probleem om ook van de gehoorgestoorde patiënt de intelligentie te bepalen vond hier te lande zijn oplossing door de konstruktie van de „Snijders en Oomen Niet-Verbale Intelligentietest" (SON). Naast de gehoorgestoorde bestaat echter ook nog de motorisch gestoorde patiënt die b.v. zijn hoofd voortdurend laat zakken tijdens het onderzoek, de patiënt met „inhibitiezwakte", die moeilijk langdurig met een taak bezig kan zijn, de afasiepatiënt die „ja" zegt, maar „nee" bedoelt. De mogelijkheden en kombinaties hiervan zijn legio en tevens zeer reëel. Indien men bij dergelijke patiënten op *gekontroleerde wijze* zou mogen afwijken van de standaardregels, b.v. het hoofd opbeuren, bij tempotests geen acht geven op de tijd, regelmatig proberen de aandacht vast te houden enz., dan lijkt men een meer reëel beeld te kunnen krijgen en in elk geval winst te boeken ten aanzien van de assessment, mits men iedere afwijking van de standaardisatie van het onderzoek registreert. Indien men geen rekening houdt met mogelijke faciliterende of bemoeilijkende stimuluskondities, wordt er met de gangbare testprocedure zo'n veelvoud aan lage uitslagen verkregen, dat daarmee onvoldoende indicaties voor benodigde therapie worden verstrekt.

Zowel de praktijk der revalidatie als de „beperkte" van het model-Guilford maken aanvulling van de gebruikelijke assessment met andere methodieken noodzakelijk. Dit additionele aspekt wordt o.a. door Mark, Ozer en Diller gepresenteerd in de „limit testing-procedure". Dit is het systematisch en gecontroleerd variëren van de „wijze" waarop de stimuli gepresenteerd naar inhoud worden aangeboden. In feite wordt de test hierbij als basis voor een leerexperiment gebruikt, waarbij de verschillende experimentele kondities (onafhankelijke variabelen) en stimulusinhoud binnen operatie/produkt (interveniërende variabele) systematisch gevarieerd worden, teneinde te zien hoe de respons (afhankelijke variabele) wordt beïnvloed. Het is een leerexperiment met als doel de score op de diverse tests te verhogen.

Het probleem is hierbij echter dat met name bij de revalidatiepatiënt niet bekend is

waaruit deze limit testing zou moeten bestaan. Uit de literatuur kunnen enige gegevens worden betrokken.

Ozer (1974) noemt deze procedure „process diagnosis” waarbij hij drie criteria onderscheidt, nl. (a) een taak in componenten verdelen (b) de modaliteit van de input variëren (c) afleidende stimuli beperken.

Diller (1976) verschaft vanuit een andere optiek eveneens informatie. De ideeën die Diller verschaft werden onder 4.1.4.3. tabel 12 behandeld en lijken bij te kunnen dragen aan „limit testing”.

Aangezien dus momenteel nog niet duidelijk is welke variaties er zoal mogelijk zijn wat betreft de uitvoeringswijze van limit testing kan bij ieder gedragstekort op een specifieke teststimulus de betreffende taak worden geanalyseerd. Een dergelijke analyse is al wel gedaan wat betreft de uitvoering van de „Block Design Taak” (Reisenweber 1953 en Ben-Yishay 1970). Een andere mogelijkheid is, om volgens een van te voren opgestelde manier de wijze van presentatie systematisch te variëren waarbij o.a. gebruik gemaakt kan worden van de gegevens van Diller en eigen improvisatie en creativiteit. De eerste methode lijkt wetenschappelijk meer verantwoord maar kost tijd en energie. De tweede methode is een „trial and error”-aangelegenheid, waarbij men de kans loopt iets over het hoofd te zien.

Dankzij het leerexperiment worden gegevens verkregen hoe een eventuele modificatiepoging zou kunnen worden opgezet. Indien blijkt dat de patiënt onder bepaalde kondities in reactie op een teststimulus meer adequaat gedrag presenteert dan onder andere kondities, kunnen daaraan duidelijke gegevens worden ontleend voor modificatieplanning.

Ongeacht de methode zal het resultaat van limit testing moeten zijn, informatie inzake het opzetten van trainingsprogramma's, leidend tot gedragsrestauratie, -kompensatie of -reorganisatie.

5.1.3. Assessment van gedragstekorten in de klinische observatiesituatie

Observatie van gedragstekorten dient gericht te zijn op de konstatering of de persoon in staat is om met zijn lichaam, met de ruimte en de tijd waarin hij zich bevindt en met de objecten en subjecten, die hij daarbij ontmoet op „adekwate” wijze om te gaan. Het woord „adekwaat” is voor een deel een waarde-oordeel. In deze studie blijven daarbij de uitgangspunten der leertheorie gehandhaafd. Volgens deze visie heeft de mens twee soorten drijfveren, nl. de aangeboren en aangeleerde drijfveren. Deze aangeboren drijfveren (reductie van honger, dorst, etc.) zijn voor alle mensen gelijk. De aangeleerde drijfveren worden gezien als gekonditioneerd aan de aangeboren drijfveren en zullen per cultuur, subcultuur, groep en persoon verschillend kunnen zijn.

Afhankelijk van het waardepatroon kunnen per cultuur, subcultuur etc. andere drijfveren aangeleerd worden. De reductie van deze aangeleerde drijfveren betekent de ontwikkeling van aangeleerd gedrag. Welk soort gedrag er aangeleerd moet worden, de wijze en het moment waarop dit gedrag moet worden geëffektueerd is tevens cultuur-bepaald. Realiseert de persoon het gedrag op de door de cultuur aangeleerde wijze, moment en plaats, dan volgt positieve (sociale of andere) bekrachtiging. Doet hij dit niet, dan volgt straf (sankties of negatie). Op deze wijze houdt de samenleving zichzelf en het individu hierin zich tot op zekere hoogte in stand. „The good society is one in which all people are positive social reinforcers. The important value is to behave so as to please others and to contribute (as assessed by others) to the general welfare of all men and society”. (Krasner 1969 p. 544). Enerzijds zal een gedragsobservatieschaal dus gedrag beoordelen, waarbij het gaat

om de „adekwate” handhaving van de persoon inzake het (fysiek) voortbestaan. Anderzijds zal de gedragsbeoordeling betrekking hebben op het uitoefenen van gedrag, waarbij adequaatheid ontleend wordt aan de (sub) culturele norm. Deze twee lijken vaak in combinatie voor te komen.

Voorbeeld: De mens wordt op zekere leeftijd geacht zelfstandig voedsel tot zich te kunnen nemen (ter reductie van de aangeboren drijfveren). De wijze waarop dit gebeurt is cultureel bepaald, waarbij het gebruik van mes en vork meestal, maar niet altijd door iedere sociale context gewaardeerd wordt.

Een andere overweging heeft betrekking op de structuur der observatieschaal. Een duidelijk onderscheid tussen de assessment van gedragstekorten d.m.v. psychologische tests versus de assessment van gedragstekorten d.m.v. observatie is, dat eerst genoemde benadering wel hypothetische konstrukties inzake de black box postuleert, laatstgenoemde niet. Het gaat immers om de beoordeling van gedrag van de persoon in zijn leefsituatie, in relatie tot zichzelf, de ruimte, tijd, objecten en subjecten, die de persoon daarin ontmoet. Dit alles gericht op de reductie van aangeboren en aangeleerde drijfveren. Welnu, al hetgeen de persoon in zijn levenssituatie ontmoet is waarneembaar ook zonder vooronderstelling van hypothetische konstrukties: De persoon „beheerst” het gedrag dat vereist wordt wel, niet, of ten dele. De eventuele vraag naar „het waarom” is binnen het operante model minder relevant. Wel relevant blijft de vraag welke aspecten van de uitwendige wereld de persoon wel en niet beheerst en onder welke omstandigheden hij dit wel of niet kan en of de respons meer of minder adequaat is (volgens de eerder genoemde criteria).

Te onderscheiden blijven:

a. Stimulusaspecten: hoe presenteert zich de levenssituatie.

b. Responsaspecten: hoe reageert de persoon op de levenssituatie, hoe lost de persoon „het probleem” van de stimulusconfiguratie op, teneinde zelfhandhaving via de nodige (sociale) bekrachtiging te bereiken.

Het lijkt hierbij evident dat de mens krachtens zijn konstitutie op de zich presenterende levenssituatie alleen waarneembaar kan responderen middels een motorische- en/of een spraakrespons.

Het lijkt eveneens mogelijk om de onderscheidingen welke gehanteerd werden ten aanzien van de stimuli (= inputzijde van de black box) zoals modaliteit en inhoud op hun toepasbaarheid te bezien. Bij gedragsobservatieschalen dringt zich derhalve een analogie op met de konstatering van gedragstekorten in de testsituatie, zij het dat de samengesteldheid der stimuluspresentatie naar modaliteit, inhoud en context waarschijnlijk veel complexer is in de leefruimte dan in de testsituatie.

Een andere analogie tussen de assessment in de testsituatie en die in de „life”-situatie doet zich voor in de gesuggereerde limit testing-procedure van de te verwerken stimulusaspecten.

Resumerend blijkt het van belang na te gaan in hoeverre bij de gedragsobservatie eenzelfde model te hanteren is als bij de psychologische tests.

De poging tot konstruktie van een vaardigheidsobservatieschaal gaat ervan uit, dat het mogelijk moet zijn de diverse opdrachten, taken of eisen wat betreft hun inhoud in te delen naar stimuli. Daarmee is een relatie gegeven met de onder 5.1.2.2. behandelde functie-assesment, zodat het wellicht mogelijk wordt korrelatieberekeningen tussen „functies” en „vaardigheden” uit te voeren.

Bij de vaardigheidsobservatie is het in tegenstelling tot de functie-assesment niet goed mogelijk operaties en produkten apart te onderzoeken.

Ook de limit testing-procedure heeft bij de vaardigheidsobservatie beperkingen.

Wel is het goed mogelijk om een taak in delen te verdelen, een instructie op diverse wijzen te presenteren e.d. Een dergelijke nuancering in limit testing, zoals mogelijk lijkt bij de functie-assessment, valt echter niet te realiseren bij de vaardigheden-observatie. Hiertegenover staat dat de te geven opdrachten een meer directe aansluiting met de realiteit van het dagelijks leven bieden.

In het hiernavolgende concept voor een gedragsobservatiesysteem wordt getracht een aantal elementen te verenigen (zie eveneens 4.1.4.2.).

Tabel 16 Concept Gedrags-observatie-schaal

Hoofdgroep (naar Wehman)	Deelgroep (naar Gunzberg)	Subgroep (naar Gunzberg)
Deelname in groepen (sociale interactie in groepsverband)	Sociaal contact in groep	Kennis van relaties Kennis van sociaal gewaardeerd gedrag
	Vrijtijdsbesteding in groep	Buitenshuis en/of met anderen
	Dinergedrag	In restaurant
Sociale Redzaamheid (zelfhandhaving in de gemeenschap)	Gebruik van publieke diensten	Vervoer/Winkel/Post- en Bankdiensten
	Vrijtijdsbesteding - alleen	Bezigheden binnenshuis
	Hygiëne	Eigen gezondheidsverzorging
	Aktiviteiten huishouding	Voedselbereiding/Reparaties/Reinigen en wassen
	Dimensiehantering (oriëntatie in ruimte en tijd)	Maten/Verschillen/Lichaamsschema/ Plaatsbep. kamer, gebouw, woonomgeving / Tijdhantering
Primaire Interactie (contact met anderen)	Symboolhantering $C = B + F + M' + M' + S$	Rekenen met geld Rekenen met getallen
	Geschreven Semantische Inf. $C = B + F + M' + M'$	Lezen Schrijven
	Primaire Sociaal Contact $C = B + F + M'$	Sociale oriëntatie
	Gesproken Semantische Inf. $C' = B + F + M'$	Expressief Taalgebruik Receptief Taalgebruik
Zelfverzorging (ADL)	Lichaamsverzorging $C = B + F$	Zorg voor kleding Wasbeurt in badkamer of douche Wasbeurt voor toilettafel Kontrolé defaecatie en mictie:
	Eetgedrag $C = B + F$	Eten op kamer Eten in afdelingseetzaal
	Kleedgedrag $C = B + F$	Aankleden/Uitkleden
Motoriek	Motorisch, spraak $C = B$	(afwezig bij Gunzberg)
	Motorisch, verplaatsend	Gekombineerde hand, been en lichaamsbeweging Fijne vinger- of handbeweging Van balans tot lopen

C = stimulusinhoud

B = Behavioral

F = Figuraal

M' = Gesproken semantisch

M' = Geregistreerde semantiek

S = Symbolisch

In tabel 16 zijn de volgende elementen verenigd:

- 1e. De observatieschaal zoals deze gepresenteerd werd door Wehman (1975), wat betreft zijn indeling naar „hoofd observatiegroepen”.
- 2e. De indeling naar Gunzberg (1974) wat betreft zijn onderscheid in deelgroep en subgroepen. (De items van de subgroepen van Gunzberg lijken voor een redelijk deel toepasbaar op de cerebraal gestoorden. Deze zijn niet in de voorafgaande tabel gepresenteerd.)
- 3e. Een poging werd ondernomen om in iedere deelgroep het te beheersen stimulusaspect naar inhoudelijkheid aan te geven.

Ook hierbij lijkt wederom dat er sprake zou moeten zijn van een hiërarchische of niveausgewijze ontwikkeling. Hoewel deze gedachtengang misschien plausibel is, wordt deze hier niet gesuggereerd.

5.1.4. Assessment van gedragstekorten in andere criteriumsituaties

Een doelstelling van deze studie is de ordening van alle beoordelingsinstrumenten volgens één referentiefraam, nl. de analyse naar inhoud der gepresenteerde stimuli. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden een netwerk toe te passen, dat (zij het enigszins gemodificeerd) per situatie telkens weer terugkeert. Het ligt voor de hand na te gaan in hoeverre deze assessment van gedragstekorten ook zou kunnen plaatsvinden in nabehandelings- en thuissituatie.

Diverse publikaties bieden mogelijkheden in die richting, o.a. Poor (1975 p. 34), Rosinski (1975) en de in Nederland verkrijgbare meetinstrumenten als „Afname van handvaardigheidsproeven voor zwakbegaafden” (Beekers 1968). Het lijkt hier niet de plaats om nogmaals op de uitwerking van de algemene visie terug te komen, aangezien de optiek waarmee gedragstekorten kunnen worden gezien voldoende werd behandeld en er ter verduidelijking twee mogelijke toepassingen (in test- en observatiesituatie) werden gepresenteerd. Gedragstekorten zullen zich in verscheidene (kriterium)situaties presenteren in ogenschijnlijk zeer uiteenlopende gedaantes. Ter voortgaande evaluatie, maar ook ter voortgaande modifikatie lijkt het nuttig om per situatie eenzelfde begrippenkader te hanteren of althans te bezien of dit mogelijk is. Analyse naar Input (stimulusinhoud, wijze van presentatie en modaliteit) rekening houdende met de Output (responssoort) lijkt een niet onaantrekkelijke invalshoek te zijn.

5.1.5. Integratie van functies en vaardigheden ter assessment

De huidige stand van wetenschappelijke kennis laat (nog) niet toe dat ogenschijnlijk plausible hypothesen inzake niveaus van ontwikkeling en hiërarchische structuren zonder meer als vaststaand en bewezen worden geaccepteerd. Als in het voorafgaande wellicht een idee hieromtrent naar voren gekomen is, dan is dit het resultaat van de dwingende behoefte een perspectief te ontdekken vanuit het labyrint van functie- en vaardigheidsstoornissen.

Het is denkbaar dat dankzij gedegen onderzoek de reeds lang gehanteerde gedachtengang van niveausgewijze en hiërarchisch gelaaide ontwikkeling wordt bevestigd.

Voorlopig echter heeft men te maken met de patiënt die op diverse tests en beoordeeld langs diverse observatietechnieken een deficiet toont in „test- en

observatiegedrag". Het nomologisch netwerk van Guilford en de gemodificeerde observatieschaal van Gunzberg is slechts een poging meer systematiek in de gehele situatie te brengen, waarbij gehoopt wordt dat beide instrumenten een representatieve steekproef van gedragstekorten zullen vertegenwoordigen in een tweetal criteriumsituaties.

Het lijkt erop alsof test- en observatie-assessment zich vooralsnog als twee onafhankelijke benaderingen zouden moeten ontwikkelen. Vanuit minstens twee bronnen is ondertussen echter bekend dat er pogingen worden ondernomen tests en vaardigheden met elkaar in verband te brengen. De eerste informatie hieromtrent is afkomstig van Diller (1976) (4.1.4.3.), waarbij aangegeven wordt dat bij de assessment van gedragstekorten, tot uiting komende in gestoorde vaardigheden, gezocht wordt naar tests of taken welke geacht worden in relatie te staan met deze vaardigheden. De tweede informatie is afkomstig van Nieuwenhuys (persoonlijke mededeling) waaruit blijkt dat o.a. de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam zeer recentelijk bezig is d.m.v. „multiple regressie“-technieken vaardigheden te relateren aan de tests van Guilford.

Indien deze informaties juist zijn lijkt het mogelijk een tweevoudige assessment (naar functies en vaardigheden) op elkaar af te stemmen.

5.1.6. Assessment van gedragsbelemmeringen

De gedragsbelemmeringen werden in hoofdzaak gekonstateerd onder omstandigheden, waarbij de persoon in interactie was met een ander (therapeut, verpleegkundige, andere patiënt). De daaruit voortgekomen observatieschaal (GOCC) werd derhalve in eerste instantie „interaktiediagnostiek” genoemd en de daaruit voortvloeiende interventies „interaktiemodifikatie. Gekonstateerd werd dat bepaalde patiënten nergens anders aan toe kwamen dan aan het vertonen van een bepaald gedrag, dat zich doorgaans overal en vrijwel de gehele dag manifesteerde. Verondersteld werd dat reductie van dit gedrag in eerste instantie *ruimte* voor therapie en interactiemogelijkheden zou bieden. Het is echter onvoorzichtig, indien men aan een patiënt die bijvoorbeeld agressief of passief is, zonder meer een gebrek aan sociale vaardigheid gaat toeschrijven. Hoewel dit niet is uit te sluiten, is deze konklusie vanuit een „deficiet-model” te eenzijdig en te voorbarig om te dienen tot het ontwerpen van een revalidatieprogramma voor de betreffende patiënt. Het is heel goed mogelijk, dat in het potentiële gedragsrepertoire van de patiënt wel degelijk een goede en vriendelijke omgangsvorm aanwezig is. Door de aanwezigheid van – op dat moment – incompatibel gedrag komt het echter niet naar voren. Eerst na reductie van het gedragsbelemmerend in casu agressief gedrag, kan blijken dat de persoon niet in staat is zich in de interactie op cultureel acceptabele wijze te gedragen. Hij heeft het nooit geleerd of is het „ontleerd” en de opgave wordt dan om parallel aan reductie van agressief gedrag, een nieuw gedrag te gaan vormen nl. sociale vaardigheid. Als blijkt dat na of tijdens de reductie van gedragsbelemmerend gedrag wel degelijk een sociale vaardigheid bij de persoon aanwezig is, kan men overwegen om dit sociale gedrag als incompatibel met het agressieve gedrag te gaan ondersteunen, waardoor gehoopt wordt dat de frekwentie van het agressieve gedrag (door extinktie) afneemt en de frekwentie van het sociale gedrag (door bekrachtiging) toeneemt.

Het is uitermate belangrijk drie denkwijzen duidelijk ten opzichte van elkaar af te grenzen en naast elkaar te stellen:

- 1e. Bij het „excessief model” is sprake van excessief gedrag dat een poging tot nieuwe gedragsvorming in wat voor opzicht dan ook, tegengaat. Het is hierbij

niet vanzelfsprekend, dat het gedrag dat incompatibel is met het excessieve gedrag, niet tot het gedragsrepertoire behoort. Integendeel, men hoopt en verwacht dat het juist wel aanwezig is en gaat dit incompatibele gedrag, indien het zich voordoet, bekrachtigen onder extinktie van de gedragsbelemmering. De agressieve patiënt met goede sociale interactiemogelijkheden kan, zoals in het bovenstaande werd aangegeven, als voorbeeld dienen.

- 2e. Bij het „deficiet-model” is sprake van gedragstekorten die met behulp van de assessment in de klinische testsituatie of klinische observatiesituatie konden worden vastgesteld. Er treden hierbij geen excessieve gedragsbelemmeringen op en men kan overgaan tot nieuwe gedragsvorming volgens de diverse gedragstherapeutische principes. Voor een dergelijke benadering van uit het „deficiet-model” komt de patiënt in aanmerking die bijvoorbeeld rustig en benaderbaar is, maar waarbij gebleken is, dat hij zich in allerlei situaties niet volgens de sociaal-culturele normen kan gedragen of andere gedragstekorten toont.
- 3e. Bij de combinatie van „excessief en deficiet” model is er sprake van excessieve gedragsbelemmeringen en gedragstekorten, welke tot dezelfde gedragscategorie behoren. Als voorbeelden:

De agressieve persoon onderhoudt dit gedrag dankzij een hieraan ontleende bekrachtiging, maar is *tevens* niet in staat in de niet-agressieve perioden sociaal gedrag te stellen. Danwel: het agressieve gedrag wordt in alle situaties onderhouden, aangezien de persoon in kwestie nooit iets anders heeft geleerd. Een dergelijke situatie vereist een tweevoudige opdracht nl. extinktie van excessief gedrag in combinatie met het stapsgewijs aanleren van een nieuw (sociaal)gedrag, hetgeen eventueel als incompatibel met het excessieve gedrag gezien kan worden. In een aantal gevallen zal dit niet goed mogelijk zijn en zal men derhalve naar een ander incompatibel gedrag moeten omzien teneinde reductie van het excessieve gedrag te realiseren. Pas na deze reductie kan dan getracht worden de sociale vaardigheden door middel van modeling en successieve approximatie op te bouwen.

Het zal uit bovenstaande duidelijk zijn dat, indien deze drie denkmodellen niet van elkaar onderscheiden worden, spraakverwarring en ook een inefficiënte vermenging van benaderingswijzen en modifikaties een reëel gevaar gaan betekenen.

Ook een andere terminologische aangelegenheid verdient de aandacht. Onder gedragsbelemmeringen werden die gedragingen verstaan, die nieuwe gedragsvorming tegengaan, belemmeren of blokkeren. Vanuit gedragstherapeutisch en revalidatiestandpunt werd dit gedrag ook wel excessief genoemd. De frekwentie van voorkomen van dit excessieve gedrag dient, teneinde nieuwe gedragsvorming mogelijk te maken, in feite gelijk aan nul te zijn. Ten onrechte neigt men er toe om de term „excessief” gedrag te reserveren voor overmatig actief gedrag, zoals ontremming, agressiviteit, prikkelbaarheid, bewegingsdrang, onrust etc. Hoewel het vreemd aandoet om bijvoorbeeld passiviteit, inertie e.d. excessief te noemen, is dit gerechtvaardigd aangezien dit trage, ongemotiveerde, apathische gedrag continu aanwezig is en dus ongelijk is aan nul, hetgeen vanuit het gedragsvormende standpunt gewenst zou zijn.

Dit excessieve gedrag kan worden getoond door de patiënt, maar eveneens door zijn „tegenspelers” of „medespelers” in het therapeutisch-, thuis- of werkmilieu m.a.w. in de premorbide, klinische, nabehandelings- en thuissituatie. De GOCC was een eerste poging om dit gedrag bij de patiënt vast te stellen. Met opzet wordt hier gesproken over „nieuw-gedrag-belemmerend” en niet van „revalidatie-belemmerend gedrag”. De reden hiervoor is dat het aksent bij de revalidatie, althans in

Nederland, nog voornamelijk valt op de „lichamelijke revalidatie”. Gehoopt wordt dat langzamerhand meer ruimte en aandacht zal ontstaan voor de vorming van een breder gedragsscala.

Het voorkomen van dit excessieve gedrag, dat nieuwe gedragsvorming tegengaat, wordt vanuit leertheoretisch standpunt verklaard door aanwezigheid van externe of interne ongewenste bekrachtigende kondities bij patiënt en/of zijn omgeving of de afwezigheid van voldoende gewenste bekrachtigende kondities. Onder 1.3.5. werden de ongewenste resp. gewenste bekrachtigende kondities onderkend. De presentatie hiervan vond plaats aan de hand van de zogenaamde „revalidatiefasen” namelijk: kriseshantering, assimilatie van de handicap (aversief beleefde revalidatie, rouwproces, premorbide gedrag) het motivatieconcept en de bekliving van handicap-adekwaat gedrag. Bij de behandeling van het excessieve gedrag in deze fasen zal dezelfde volgorde worden gevolgd:

- 1e Krisis. De ervaring van de leefruimte, het lichaam, het denken etc. lijkt gekenmerkt te zijn door onbekendheid, onzekerheid, chaos, pijn. Voorzover er enig gedrag is, zal dit ongericht zijn. De persoon moet weer gaan leven, maar heeft voorlopig slechts de beschikking over een partieel gedragsrepertoire. Zoals het pasgeboren kind moet de patiënt opnieuw leren welk gedrag in zijn wereld mogelijk is, waarde heeft (d.w.z. bekrachtigend voor hemzelf en omgeving) welke doeleinden er zijn etc. Het gedrag lijkt in deze fase gekenmerkt te kunnen zijn door geringe frekwentie of juist zeer hoge frekwentie van persevererende aard. Er is sprake van geen of onvoldoende bekrachtiging voor welk gedrag dan ook.
- 2e Aversief beleefde revalidatie. Als de behandeling door patiënt en/of omgeving geassocieerd wordt met het ondragelijk leven met handicap, of de therapie een pijnlijke aangelegenheid blijkt te zijn, of indien gehoopt herstel slechts gedeeltelijk kan worden gerealiseerd, wordt aversief reageren op de behandeling daardoor versterkt. Reacties hierop kunnen zijn, vermijdingsgedrag (zich onttrekken aan de behandeling), niet meewerken uit gemis aan „motivatie” en/of agressief gedrag, waarmee men zich teweer stelt tegen de als bedreigend ervaren therapeut. Als dit gedrag door thuis- of therapiemilieu wordt ondersteund bijv. door het geven van extra aandacht, kan het lang duren eer er aan vorming van nieuw gedrag begonnen kan worden.
- 3e. Rouwproces. Het besef van de handicap, van het verlies en van het gemis aan toekomstperspectief, kan leiden tot geanticipeerde deprivatie bij patiënt en thuismilieu. Het gemis aan geanticipeerde, zinvolle, levensvullende aangelegenheden kan leiden tot reactiewijzen, welke veelal beschreven worden als depressie en apathie.
- 4e. Tegenwerking door premorbide gedrag. Tijdens de revalidatie moet de patiënt vaak nieuw gedrag aanleren dat strijdig kan zijn met het vroegere gedrag. Het vasthouden aan dit vroegere gedrag, hetzij in gedachten of in de realiteit, gaat nieuwe gedragsvorming tegen, vooral indien het thuismilieu dit ook nog eens ondersteunt of aanmoedigt.
- 5e. Revalidatiegedrag is in eerste instantie veelal niet persé zelfbekrachtigend, hier wordt in het algemeen onvoldoende bij stil gestaan. Bij afwezigheid van bekrachtiging moet de therapeut zelf deze bekrachtigende functie vervullen door de relatie tussen patiënt en therapeut zo te structureren dat de patiënt het op zichzelf niet bekrachtigende gedrag toch uitvoert, om van de therapeut de goedkeuring te verkrijgen. Bij afwezigheid van deze houding bij de therapeut kan opnieuw ontsappings- en/of vermijdingsgedrag in allerlei vormen het resultaat zijn.

Met voorgenoemde bewoordingen lijkt het begrip gedragsbelemmeringen voldoende toegelicht te zijn.

De poging enige informatie omtrent deze gedragsbelemmeringen te verkrijgen werd – zoals eerder gesteld – gekoncretiseerd in de zogenaamde GOCC.

De GOCC werd ten tijde van deze studie slechts gehanteerd in de klinische observatiesituatie. Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre de assessment van excessief gedrag eveneens uitgevoerd kan worden in de premorbide, klinische test- nabehandelings- en thuissituatie. De wijze van informatieverzameling in deze situaties verdient hierbij een bijzondere aandacht, aangezien het niet te verwachten valt dat bijvoorbeeld in de thuissituatie een synthetische beoordeling kan worden gerealiseerd. Het frekwente voorkomen van gedragsexcessen in de premorbide situatie geeft echter informatie over en is mogelijk een duidelijke (contra-)indikatie voor de uitvoering van gedragsmodifikatie in de kliniek. Het werd ook verscheidene malen beklemtoond dat het van belang is om na te gaan, in hoeverre een geslaagde reductie van excessief gedrag in de kliniek inderdaad gekontinueerd wordt in nabehandeling- en thuissituatie.

Het bovenstaande in aanmerking genomen kan gekonkludeerd worden, dat de systematische observatie van excessief gedrag in de kliniek noodzakelijke uitbreiding verdient in andere criteriumsituaties. Pas nadat gegevens hieromtrent verzameld zijn, lijkt het zinvol te bezien in hoeverre voor de diverse situaties een begrippenkader kan ontstaan dat, evenals bij gedragstekorten, voorziet in een continue „over-all“-evaluatie van gedragsdeviaties in alle criteriumsituaties.

5.1.7. Samenvatting

Vanuit praktijkervaringen (hoofdstuk 3) en literatuurstudie (hoofdstuk 4) werd getracht een onderlinge afstemming te bewerkstelligen t.a.v. assessment van gedragstekorten en gedragsbelemmeringen.

1e. Assessment van gedragstekorten in de premorbide, klinische testsituatie, klinische observatiesituatie, nabehandelingssituatie en thuissituatie wint door gebruik te maken van één begrippenkader. Een dergelijk begrippenkader is te funderen op de gepresenteerde stimulusconfiguraties, nader bepaald naar stimulusinhoud, modaliteit en wijze van presentatie.

De begrippen „functie“, „vaardigheden“ en „taken“ werden gerelateerd aan de situaties waarin gedragstekorten in deze konden worden vastgesteld, te weten: de test – observatie – en nabehandelingssituaties.

Voor een taxonomie naar functies en vaardigheden werd een ontwerp gemaakt.

2e. Door middel van „multiple regressie“-technieken is het mogelijk een specifieke vaardigheid te relateren aan een verzameling van Guilford-tests. Hierdoor wordt het eveneens mogelijk een relatie te leggen of te zoeken tussen defekten in gekonstateerde vaardigheden en tekorten in bepaalde hiermee in verband staande testprestaties.

3e. De assessment van gedragsbelemmeringen kan uiteraard gerealiseerd worden door diverse beoordelingsinstrumenten. De tot nu toe gebruikte „gedragsobservatieschaal voor contusio cerebri“ bleek in vergelijking tot andere schalen zeker geen ongunstige positie in te nemen. Van belang werd geacht dat de gedragsbelemmeringen niet slechts in de klinische observatie moesten worden nagegaan, maar dat ook andere criteriumsituaties hiervoor in aanmerking komen. Het lijkt mogelijk om – analoog aan de konstatering van gedragstekorten – een begrippenkader te ontwerpen inzake gedragsbelemmeringen optredende in verscheidene situaties.

5.2. Overwegingen inzake modificaties

5.2.1. Inleiding

Ook wat betreft de modificatie kunnen uit literatuurstudie en praktijkervaringen enkele richtlijnen betrokken worden welke een mogelijk perspectief bieden inzake de behandeling van patiënten met cerebrale stoornissen. De modificatie van gedragstekorten werd in de literatuurstudie tamelijk uitvoerig behandeld. In de praktijksituatie werden geen klemmende problemen geconstateerd. Het is van belang in deze de aandacht te vestigen op een mogelijke integratie tussen funktierestauratie en vaardigheidstraining. Aangezien dit een zeer recente ontwikkeling is, kan hierover slechts exemplarisch enkele voorlopige suggesties worden gedaan. De modificatie van gedragsbelemmeringen kwam vanuit de literatuurgegevens en de praktijksituatie als een moeilijke en vaak zwaar (ethisch) beladen behandeling naar voren. Aangezien de revalidatie vermoedelijk doorlopend gekonfronteerd zal worden met blokkades bij de nieuwe gedragsvorming werd gemeend in het navolgende extra aandacht aan deze problematiek te moeten besteden.

5.2.2. Modificatie van gedragstekorten

In de *literatuurstudie* (4.2.) werd getracht na te gaan welke handelingssekwenties bij het herstel van gedragstekorten te herleiden zijn tot leertheoretische methodieken. Een aantal programma's bleek terug te voeren tot activiteiten welke vanuit het leertheoretisch operante paradigma bekend staan als fading, selectieve bekrachtiging, en shapingsprocedures. In diverse criteriumsituaties werden dezelfde operante handelingssekwenties aangetroffen. Dit bleek het geval in de zgn. klinische testsituatie (4.2.3.4) de klinische observatiesituatie (4.2.4.2), maar ook in de nabehandelings- (4.2.5.) en thuissituatie (4.2.6.) werd de leertheorie en haar toepassingen bij voortduring ontmoet. Het operante paradigma (S-R-K-C) presenteert dus een aantal technieken, die aangewend kunnen worden om gekonstateerd gedragstekort in elke willekeurige situatie op te heffen. Onafhankelijk van een theorie inzake „hersenen-gedrag” blijkt het, gegeven de literatuur, mogelijk gedragstekorten in iedere situatie op te heffen volgens gedragstherapeutische methoden. De moeilijkheid was echter tot nu toe, dat men geen adkwat raster bezat aan input-variabelen om een systematische en representatieve steekproef te trekken uit alle mogelijke gedragstekorten. Een mogelijk raster van te onderzoeken input-variabelen werd in voorgaande paragrafen aangeboden: Voor iedere criteriumsituatie eenzelfde netwerk uitgaande van de gepresenteerde stimulus naar inhoud, modaliteit en presentatiewijze.

De mogelijke eenheid in benadering welke dus aanwezig wordt geacht bij de *assessment* van gedragstekorten, kondigt zich nu eveneens aan bij de *behandeling* van deze gedragstekorten: De gedragsrestauratie, gedragskompensatie en gedragsreorganisatie d.m.v. fading (stimulusfacilitatie-reduktie), selectieve reinforcement (stimulatie met bekrachtiging van adekwat gedrag) en shaping. De mogelijkheden voor deze benadering zijn niet alleen aanwezig bij gedragstekorten als respons op teststimuli, maar eveneens bij observatie in klinische, nabehandelings- en thuissituatie.

Opgave is tot nadere specificatie van gedragstekorten in de nader gespecificeerde situaties te komen. Hierna kan volgens bovenstaande opsomming een poging ondernomen worden tot gedragsrestauratie, -kompensatie, of -reorganisatie.

Uit de *praktijkervaring* kwam zoals hoofdstuk 3 illustreerde eveneens de nodige informatie naar voren.

Er werden alleen pogingen ondernomen tot gedragsrestauratie in de vorm van: 1e. fading (bij gedragstekorten gebleken in de testkriterium situatie). 2e. toename van gedrag (d.m.v. selectieve bekrachtiging van reeds bestaand gedrag ad hoc gekonstateerd d.m.v. observatie) en 3e. shaping van gedrag (d.m.v. successieve approximatatie).

De gedragskompensatie en gedagreorganisatie kwamen bij de voorlopige revalidatiestrategie niet aan de orde. Inzake de gedragsrestauratiepogingen kan gekoncludeerd worden, dat de fadingprocedures bij funktiestoornissen voldoende materiaal opleverden om voor statistische bewerking in aanmerking te komen. De resultaten hiervan werden in hoofdstuk 3 besproken. De pogingen tot toename van gedrag en de vorming van nieuw gedrag waren alle succesvol, echter de aantallen ter behandeling aangeboden patiënten waren helaas te gering voor statistische bewerking.

Diverse malen kwam in de literatuurstudie naar voren, dat in vele behandelingen leertheoretische principes verdiskonteerd zijn. Het blijkt tevens uit de literatuur, dat de fysiotherapeut, onderwijskracht etc. dankbaar gebruik maken van de principes die vanuit de leertheorie worden aangereikt.

De leerpsychologie pretendeert hierbij niet, dat het een fundamentele wijziging zal brengen in alle tot nu toe gehanteerde revalidatiemethoden. Zij presenteert slechts een aanvullende, maar een zeer essentiële bijdrage aan het revalidatie-leerproces. Zij stelt zich hierbij kwetsbaar op, aangezien de methoden die zij aanbiedt dusdanig geformuleerd en geoperationaliseerd zijn dat een toetsing mogelijk wordt. Zij bepleit zelfs een objectieve evaluatie en verschaft tegelijk de realisatie hiervan.

Een dergelijke instelling kan de patiënt, de revalidatie in het algemeen en de individuele medewerker alleen maar ten goede komen.

Het toekomstperspektief wordt echter gezien in de poging tot integratie van funktierestauratie en vaardigheidstraining. Deze ontwikkeling schijnt in Amerika (zie Diller 1976) en in Nederland nog niet of nauwelijks van de grond te zijn gekomen.

Diller lijkt op een door hem niet nader geëxpliciteerde wijze tekorten in vaardigheden in verband te brengen met een taak of tests, die met deze vaardigheid in verband staan.

In Nederland worden pogingen ondernomen d.m.v. „multiple regressie”-technieken na te gaan welke tests van Guilford met een bepaalde vaardigheid korreleren. Er worden echter nergens publikaties aangetroffen inzake systematische gedragsobservatie en/of testprocedures. Kennelijk bevindt men zich hier op een nog te exploreren terrein waarin nog geen koersbepaling en research van enige omvang heeft plaats gevonden. Ideeën omtrent verdere ontwikkelingen moeten dan ook met de grootste omzichtigheid worden gepresenteerd:

Vanuit de ter beschikking staande gegevens en de algemene ontwikkelingslijnen die zich, hoewel vaag, laten bespeuren wordt hier een integratie van zowel funktie- en vaardigheidstraining voorgestaan.

1e. Vanuit de in deze studie gepresenteerde vaardigheidsobservatieschaal lijkt het mogelijk vast te stellen welke gebieden de grootste stoornissen tonen. Na de selectie van één of meer vaardigheidstekorten dient m.b.v. „multiple regressie”-technieken vastgesteld te worden welke tests van Guilford in verband gebracht kunnen worden met deze vaardigheden.

- 2e. Vanuit de in deze studie gepresenteerde taxonomie van functies moet het eveneens mogelijk zijn per stimulusinhoud, per communicatiekanaal de meer defekte „operaties” te lokaliseren. Na deze vaststelling dient omgekeerd een relatie te worden gelegd met hiermee in verband staande mogelijke vaardigheidsdefecten.
- 3e. Vanuit ad. 1 en 2 dient gezocht te worden naar elkaar overlappende defekten tot uiting komende in tests en vaardigheden.
- 4e. Limit testing-procedures, toegespitst op de gelokaliseerde tests en vaardigheden zouden invalshoeken kunnen verschaffen inzake de te realiseren funktierestauratie en vaardigheidstraining.
- 5e. D.m.v. fadingprincipes kan getracht worden verbetering te brengen in testgedrag (funktierestauratie).
- 6e. D.m.v. shapingsprocedures, selektieve bekrachtiging en fading wordt verbetering van meer complexe gedragingen ondernomen (vaardigheidstraining). Zowel funktierestauratie als vaardigheidstraining dienen zich hierbij gemeenschappelijk te richten op het gekonstateerde defekt in functies en vaardigheden.
- 7e. De gehele aanpak dient aan de hand van beginassessment, begeleidende assessment en afsluitende assessment gecoördineerd en bijgestuurd te worden.
- 8e. Deze assessment moet gericht zijn op testonderzoek, gedragsobservatie en neurofysiologische gegevens.

Hierop gebaseerde en nader uit te werken research zou wellicht informatie kunnen verschaffen inzake de – in diverse publikaties zo veelvuldig gepresenteerde – ontwikkelingsniveaus en hiërarchieën. Het spreekt vanzelf dat deze meervoudige, tamelijk complexe aanpak alleen realiseerbaar is door een multidisciplinair team dat uitgaande van eenzelfde grondgedachte de leerprincipes in theorie en praktijk volkomen beheerst. Een pleidooi voor een opzichzelfstaand team, resp. afdeling ligt hierbij voor de hand. Eenzelfde gedachtengang zal ook naar voren komen bij de nu te behandelen „reduktie van gedragsbelemmeringen”.

5.2.3. Modifikatie van gedragsbelemmeringen

5.2.3.1. Terugblik

Uit praktijkervaring en literatuurinformatie blijkt dat men bij de pogingen tot reduktie van excessief gedrag te maken krijgt met de volgende gegevens:

- a. Een methodiek (operante konditionering) waarvan de wetenschappelijke geldigheid enigszins bewezen kan worden geacht voor sommige populaties (meestal in de vorm van $n = 1$ studies volgens het A-B-A-design).
- b. Voordat men operante konditionering kan toepassen op een „nieuwe” populatie dient men eerst de relevante kenmerken van deze populaties in relatie tot de methodiek te kennen. Twee van deze kenmerken zijn konditioneerbaarheid (indien dit een aparte faktor is en meetbaar zou zijn) en de bepaaldheid van dit gedrag door omgevingskontingenties.
- c. Operante konditionering moet uitgevoerd worden door een „instrument”. Dit „instrument” is hier samengesteld uit een aantal elementen nl. een veelvoud aan personen en een veelvoud aan handelingssekwenties, die op een strikt konsekwente wijze over een langdurige periode moeten worden gebezigd. Het instrument is uiterst kwetsbaar, want het falen van één onderdeel binnen de elementen kan mislukking der behandelingsmethode betekenen. Door de complexiteit van het instrument is bovendien moeilijk na te gaan op welk moment en waardoor er iets mis is gegaan.
- d. Het „instrument” is alleen toepasbaar indien bepaalde behandelingsvoorwaar-

den zijn vervuld. Deze voorwaarden hebben betrekking op de indicatiestelling, patiëntselectie en de kennis en bereidheid van velen in het therapie- en niet-therapiemilieu.

e. De uitvoering van operante konditionering kan alleen plaatsvinden in een bepaald „klimaat”. Kenmerken van het klimaat zijn:

- strikte uitvoering van het behandelingsplan ter operante konditionering.
- de mentaliteit van de gedragstechnicus die o.a. bepaald lijkt te zijn door de „mensvisie”, het „geloof” dat deze persoon ondersteunt.
- een financieel-ekonomische basis, die het mogelijk maakt bepaalde voorzieningen te treffen.
- bekrachtigingen voor de gedragstechnicus bij suksessen, maar vooral bij falen van de gedragsbehandeling.

f. Een mogelijkheid tot evaluatie van sukses of falen d.m.v. gekontroleerde A-B-A-B-design, de methode van gepaarde analyse of het gebruik maken van experimentele en kontrolegroep door medewerking van verschillende centra.

5.2.3.2. Beslissingsprocedure

Voordat men met een behandeling begint, dient er een beslissingsprocedure te zijn vastgesteld aan de hand waarvan het mogelijk is te bepalen in welke gevallen men een behandeling begint en tot hoever men deze voortzet op bepaalde cruciale momenten. Teneinde een aanzet te vormen tot het ontstaan van dergelijke beslissingsprocedure wordt in het onderstaande een flow-diagram weergegeven aan de hand waarvan een beslissingsstrategie kan worden opgezet.

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle partners: patiënt, familie en behandelings-team indien patiënt hiermee akkoord gaat volledig omtrent het programma worden geïnformeerd. Het komt dus neer op een kontrakt dat met al deze partijen gesloten gaat worden en voortdurend moet kunnen worden herzien of afgebroken indien een der partijen niet verder wil participeren. Zie fig. 9 op pg. 214 en 215.

Het schema lijkt in grote lijnen toepasbaar te zijn op de operante deconditionering van probleemgedrag (zoals meer keren gedefinieerd) d.m.v. medewerking van patiënt, familie en team. Een belangrijke uitgangsvoorwaarde is hierbij dat *met name* patiënt, familie en team. Een belangrijke uitgangsvoorwaarde is hierbij dat *met name de patiënt* volledig wordt geïnformeerd en participeert in de behandeling.

participeren. Dit probleem deed zich bij herhaling voor bij de verbaal gestoorde patiënt, de konversiehysterie-patiënt of bij die patiënten die gedragsbelemmeringen continueren, tengevolge van bekrachtigende kondities die het „probleem”gedrag aantrekkelijker maken dan het „aangepaste” gedrag. Volgens dit schema komen dergelijke patiënten niet voor behandeling in aanmerking, tenzij het thuismilieu en het behandelings-team bereid en in staat is konditionering te realiseren „buiten de patiënt” om. Dit is echter, zoals de ervaring heeft geleerd, geen eenvoudige aangelegenheid en kan alleen gerealiseerd worden in een volkomen *aparte* afdeling met een *kleine* groep van *gespecialiseerd* personeel.

Indien bijgaand flow-diagram (fig. 9) zou zijn toegepast op de patiënten zoals deze in hoofdstuk 3 vermeld werden, dan zou een aantal patiëntenbehandelingen met de bestaande accommodatie niet gerealiseerd zijn.

Ter illustratie:

a. Vaak was het niet mogelijk het probleemgedrag exact te omschrijven. Voortdurend moest ten gevolge van onvolledige observatie en/of informatie tot herformulering worden overgegaan. Daar de deelnemende personeelsleden per bespreking varieerden was het mogelijk dat een deel bezig was met extinktie van

FIG. 9 BESLISSINGSMODEL

probleemgedrag Y en een ander deel zich nog steeds richtte op probleemgedrag X. b. Het alternatieve, incompatibele gedrag kwam eveneens onvoldoende exact naar voren. Er ontbrak inzicht in diskriminatieve situaties en vaak waren onvoldoende bekrachtigende kondities aanwezig.

c. De medewerking van patiënt was in vele gevallen niet geheel duidelijk. Weliswaar werd de patiënt in vrijwel alle gevallen volledig geïnformeerd, maar het was vaak onzeker in hoeverre deze informatie werkelijk tot de patiënt doordrong.

d. Het thuismilieu werd in alle gevallen volledig geïnformeerd. Het was echter niet altijd duidelijk in hoeverre de familie inderdaad voldoende inzicht en steuniteit opbracht om daadwerkelijk met de behandeling mee te werken en deze thuis voort te zetten.

e. Inzake de konsekventie en consistente werking van het „instrument” bestond grote onduidelijkheid.

Al met al zou onder hantering van voorgaand beslissingsschema een aantal malen niet met behandeling begonnen zijn. Onder druk der omstandigheden, de anticipatie van een onaantrekkelijke toekomst voor de patiënt en thuismilieu werd toch operante konditionering ondernomen. Achteraf gezien was deze behandeling door onduidelijke informatie, onzekerheid inzake de konsekvente toepassing e.d. echter soms bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Hierbij kwam nog dat het gehele behandelingsteam onder extra stress stond door de vele onzekerheden en de kritiek van andere personeelsleden die niet direkt bij de behandeling betrokken waren.

Tracht men het gehele proces van gedragsreduktie objectief te analyseren dan komt men tot de volgende uitspraken:

- 1e. Een der doelstellingen van revalidatie is nieuwe gedragsvorming.
- 2e. Deze nieuwe gedragsvorming kan bij een aantal patiënten belemmerd worden door gedrag dat door bepaalde bekrachtigende kondities zo sterk aanwezig blijft dat nieuwe gedragsvorming niet mogelijk wordt.
- 3e. Dit gedrag, dat nieuwe gedragsvorming tegengaat, kan op zichzelf eveneens als „storend” door patiënt of omgeving worden ervaren.
- 4e. Men kan trachten dit gedrag te reduceren of te elimineren.
- 5e. Indien men eenmaal besluit dat revalidatie ook een taak heeft in reductie van dit storend gedrag, dan impliceert dit een aantal niet te onderschatten activiteiten.

Deze activiteiten worden veelal in revalidatiecentra niet ondernomen en als psychiatrische taken gezien. Vandaar dat revalidatiemedewerkers deze activiteiten koderen als psychiatrische interventie en vervolgens volstaan met verwijzing van de patiënten naar psychiatrische ziekenhuizen. Vanuit leertheoretische visie kan wellicht beter geen onderscheid worden gemaakt tussen patiënten volgens de medisch-specialistische indeling. Een indeling vanuit gedragsgezichtspunt biedt een nieuw referentiekader daar, waar ook uit andere hoofde, de wenselijkheid van herindeling van categorieën patiënten naar huidige specialismen wordt bepleit. Revalidatiecentra kunnen, gesteund door deze herindeling vanuit de leertheorie, pogingen ondernemen deze reductie van gedragsbelemmeringen zelf ter hand te nemen. Indien tot laatstgenoemde keuze wordt overgegaan, betekent dit echter een aanzienlijke verzwaring en een heroriëntatie inzake revalidatie. Deze heroriëntatie kan alleen gerealiseerd worden door een speciaal team op een speciale afdeling of paviljoen. Deze keuze is volgens schrijver dezes de enige en enig juiste keuze. Het is een keuze met een duidelijke konsekventie, nl. het treffen van voorzieningen waardoor uitvoering van gedragsbehandelingsprogramma's mogelijk wordt: Een afdeling waarin leertheoretische principes binnen de revalidatie kunnen worden toegepast en geëvalueerd.

Op de ethische problematiek, verbonden met de toepassing van gedragstherapeutische methoden in de hulpverlening en met name in een gedragstherapeutische afdeling, kan hier niet worden ingegaan. De wetenschappelijke en beroepsethische discussie is gaande sinds de opkomst van deze vorm van therapie. Zij zal zich dienen voort te zetten in samenhang met die van andere geavanceerde therapievormen en wel afgestemd op het normen- en waardesysteem in de hulpverlening in het algemeen. Binnen het bestek van deze studie kan alleen verwezen worden naar, overigens uitstekende, discussies en publikaties hieromtrent. Zie hiervoor o.a. Van Geel (1975), Fokkens (1976) en Krasner (1969).

5.2.4. Samenvatting

Vanuit praktijkervaringen (hoofdstuk 3) en literatuurstudie (hoofdstuk 4) werd getracht een mogelijk toekomstperspectief t.a.v. modifikatie van gedragstekorten en gedragsbelemmeringen te presenteren.

1e. De pogingen om gedragstekorten te herstellen werden in feite ontkoppeld aan de diverse theorievormingen inzake de relatie „hersenen-gedrag”. Nagegaan werd wat er in de praktijksituaties gebeurde wat betreft actuele handelingssekwenties. Deze bleken te herleiden tot:

- a. Gedragsrestauratie
- b. Gedragskompensatie
- c. Gedragsorganisatie

Vanuit leertheoretische perspectief bleek de gedragsrestauratie verwezenlijkt te kunnen worden d.m.v. fading, toename van gedrag d.m.v. selectieve reinforcement en de vorming van nieuw gedrag door diverse shapingsprocedures.

De gedragskompensatie werd verwezenlijkt door diverse „hulpmiddelen”. Ook ter gedragsreorganisatie bleken leertheoretische principes bruikbaar.

2e. Onder voorlopige afwezigheid van een betrouwbare taxonomie van functies en systematische gedragsobservatieschalen lijkt een oplossing gezocht te kunnen worden in een integratie van funktierestauratie en vaardigheidstraining. Zowel de ontwikkeling van genoemde instrumenten alsook een voortgaande coördinatie van modifikatietechnieken behoeven uitgebreide research.

3e. De overwegingen inzake de pogingen tot reductie van gedragsbelemmeringen bij fysiek gehandicapten leidden tot de konklusie dat hierin alleen voorzien kan worden door de formatie van een gedragstherapeutische unit apart van de traditionele revalidatiecentra echter wel uitdrukkelijk gelieerd met een revalidatiecentrum.

5.3. Conceptual frame work

5.3.1. Inleiding

In hoofdstuk 2 werd vermeld dat het vooralsnog niet mogelijk bleek onder de toen geldende stand van kennis en praktijkervaring een theoretisch model t.a.v. een revalidatie-leerproces te ontwikkelen. Er werd derhalve gewerkt met een experimenteel opgezette revalidatiestrategie. Dit experimentele model werd in hoofdstuk 3 op zijn bruikbaarheid getoetst, zodat op deze wijze een redelijke hoeveelheid praktische informatie kon worden vergaard. In hoofdstuk 4 zorgde een literatuurstudie voor de noodzakelijke aanvulling. In de vorige paragrafen werd getracht de aansluiting tussen theorie en praktijk te formuleren.

Het lijkt op dit moment mogelijk vanuit een leertheoretisch referentiekader een theoretisch raamwerk te presenteren waarbinnen de assessment en modifikatie van gedragstekorten en gedragsblokkades in de diverse criteriumsituaties op meer gesystematiseerde wijze zijn te plaatsen. Dit theoretisch raamwerk heeft, indien dit kan worden gerealiseerd, duidelijke praktische konsekventies. Hoewel deze konsekventies niet in detail geanticipeerd kunnen worden zullen wel enige denkbeelden hieromtrent worden gegeven.

Het is tenslotte niet slechts noodzakelijk uit te gaan van theorie en praktijk, maar het is eveneens een eis dat theorieën en werkwijzen worden getoetst. Omtrent research in het algemeen en ook inzake de toepassingen hiervan in de revalidatie vallen enkele gedachten te formuleren.

5.3.2. Praktische realiseringmogelijkheden

5.3.2.1. Poging tot konkretisering van leermodel

Ter konkretisering van een te realiseren revalidatieleerproces kunnen de volgende richtlijnen wellicht als leidraad fungeren.

1. Observatie van gedrag dat het aanleren van nieuw gedrag belemmert

Premorbide situatie (thuismilieu): Gegevens omtrent reeds vroeger bestaand probleemgedrag; mogelijk alternatieve gedragingen; bekrachtigende kondities; informatie inzake „modellen” en modelgedrag.

Klinische observatie: Gedragsobservatie d.m.v. geëigende schalen zoals de GOCC door speciaal hiertoe opgeleide medewerkers.

2. Reduktie van gedragsobstakels

Klinische situatie: Operante deconditionering bij voorkeur d.m.v. kontraktmanagement. Noodzakelijke voorwaarden: adekwate patiëntselectie, medewerking door patiënt en thuismilieu en speciaal hiertoe opgeleide medewerkers, aparte afdeling.

Postopname situatie (thuismilieu): Voorzorgen treffen dat het probleemgedrag niet opnieuw optreedt in thuissituatie door dit milieu eveneens ander gedrag aan te leren wat betreft de interactie met de patiënt. Reeds in de kliniek dienen de nodige maatregelen getroffen te worden ter realisering van een nazorg welke het gedrag van het thuismilieu en van de (ontslagen) patiënt ondersteund volgens gedragstherapeutische principes.

3. Assessment van gedragstekorten

Premorbide situatie (thuismilieu), *klinische testsituatie* en *klinische observatiesituatie*: Het verzamelen van gegevens inzake gedragstekorten volgens analyse van externe stimuluskonfiguraties naar inhoud, modaliteit en presentatiewijze.

Premorbide situatie: Vragenlijst die de interviewer een indruk geeft inzake scholen en werkprestaties in het hanteren van gedragsmatige, figurale, gesproken – semantische, geschreven – semantische en symbolische stimuli.

Klinische testsituatie: Onderzoek naar gedragsregulatie en- organisatie. Hierbij is het onderzoek naar gedragsregulatie nog een te exploreren terrein waarbij de neurologische gegevens zijn aan te vullen met reactie- en aandachtsproeven. Het onderzoek naar gedragsorganisatie kan op cognitief niveau nu reeds grotendeels uitgevoerd worden met kanaalspecifieke tests volgens de principes van Guilford. Inzake de gedragsorganisatie op „sensomotorisch niveau” staan verscheidene psychologische onderzoeksmethoden ter beschikking, ook al is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre deze overeenkomen met de taxonomie van Guilford. Binnen de testsituatie dient eveneens „limit testing” gerealiseerd te worden volgens de in deze studie verschaft (globale) richtlijnen.

Klinische observatiesituatie: Observatie van gedrag volgens gekontroleerde opdrachten. Op het moment dat deze studie wordt geschreven is de ontwikkeling van een dergelijke gedragsobservatieschaal inzake gedragstekorten volgens voornoemde principes gerealiseerd (in de vorm van de zgn. VOS, vaardighedenobservatieschaal). Limit testing-procedures lijken in de klinische observatiesituaties minder genuanceerd uit te voeren dan in de klinische testsituatie.

Integratie van gegevens uit test- en observatiesituatie.

4. Het aanleren van nieuw gedrag

Integratie van funktierestauratie en vaardigheidstraining

Funktierestauratie beoogt het aanleren van gedrag als respons op specifieke stimuli naar aanleiding van tekorten, gebleken tijdens de testkriteriumsituatie. In de testkriteriumsituatie werden deze gedragstekorten vastgesteld aan de hand van systematische exploratie d.m.v. kanaalspecifieke tests volgens het model Guilford. Hiernaast werden gegevens verkregen d.m.v. limit testing.

Het begrip „funkties” werd in 5.1.2.2. gedefinieerd. Funktierestauratie impliceert de poging het gekonstateerde deficit in de „verwerking” van de stimulusconfiguratie (naar inhoud, modaliteit) te verbeteren d.m.v. de leertheoretische principes: fading, toename van gedrag in frekwentie en intensiteit d.m.v. selectieve bekrachtiging en diverse shapingsprocedures.

In de praktijk blijkt nogal eens overlap op te treden tussen de activiteiten van de arbeidstherapeut, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en onderwijskracht. Via afstemming van de activiteiten van de diverse disciplines zal tot een gezamenlijke systematische modifikatie binnen deze funktierestauratie moeten worden gekomen.

Vaardigheidsvorming beoogt het aanleren van gedrag als respons op stimuli n.a.v. tekorten, gebleken in de klinische observatiesituatie.

Bovenstaande overwegingen gelden op dezelfde wijze voor de vaardigheidstraining. Het begrip „vaardigheid” werd eveneens in 5.1.2.2. gedefinieerd. Met het aanleren van nieuw gedrag kan begonnen worden in de funktierestauratie (training in vitro) en dit kan worden voortgezet in de vaardigheidsvorming (in vivo-trainingssituatie). De mogelijkheden voor het variëren der trainingskondities lijken bij de vaardigheidsvorming beperkter, echter de aansluiting met de realiteit is veel direkter. *Een afstemming van funktierestauratie op de vaardigheidsvorming is hierbij essentieel.*

5. Taakassessment en modifikatie

Nabehandelingssituatie: Bij de voorbereiding tot de inschakeling in het arbeidsproces en vrijetijdsbesteding kan gebruik gemaakt worden van de gegevens zoals aangegeven onder 1 t/m 4. Het ligt voor de hand dat de voorbereiding tot de terugkeer in de maatschappij als complexe leefwereld logischerwijs zou kunnen en moeten gebruik maken van deze gegevens. Ter reductie van excessief gedrag, zo belemmerend voor nieuwe gedragsvorming dient de moeizame poging tot aanleren van nieuw gedrag op een systematische wijze te worden voortgezet in dit intermediair tussen kliniek en maatschappij.

6. Gedragsevaluatie

Postopname situatie: Door nauwkeurig voorbereide nazorg dient voorkomen te worden dat wederom probleemgedrag ontstaat en dat nieuwe gedragsvorming ongedaan wordt gemaakt. Terzake geïnstrueerde professionele gedragstherapeuten maar ook non-professionele medehelpers kunnen hierbij, indien althans voldoende gedragstherapeutisch getraind, goede hulpmogelijkheden bieden. Informatie aan hen vanuit het klinisch team gedurende de opname van patiënt is daarvoor uiteraard wel een vereiste. Na ontslag van patiënt dient een speciale deskundige (gedragstherapeut) zich exclusief te kunnen richten op de begeleiding van de nazorg werkers in hun voortgaande ondersteuning van patiënt en thuismilieu gedurende minimaal 6 maanden. Dit laatste verschaft eveneens mogelijkheden voor de zo noodzakelijke follow-up studies.

Voorzover dit uit het voortgaande nog niet duidelijk genoeg naar voren is gekomen

dient iedere interventie begeleid te worden door hetzij probleem-, hetzij proces-, hetzij effectassessment of combinaties hiervan, zoals in hoofdstuk 2 en 3 werd besproken. Bij het gehele revalidatieprogramma van cerebraal gestoorde patiënten zal steeds „het assessment-behandelingscircuit” gevolgd moeten worden.

Onder assessment wordt daarbij verstaan het vaststellen van een uitgangswaarde en een voortgaande meting hetzij tussentijds aan de hand van een modifikatieproces, hetzij aan het eind van (een onderdeel) van het modifikatieproces. Assessment in deze zin wijst dus op een regelmatige meting, die vooruitgang of achteruitgang aangeeft.

Op basis van probleem-, effect- en procesassessment wordt vervolg van dezelfde behandelingsstrategie, wijziging in behandeling of beëindiging hiervan bepaald. Dit assessmentbehandelingscircuit lijkt opgebouwd te zijn uit de volgende momenten:

Na het verzamelen van algemene gegevens d.m.v. observatie, meting, informatie:

- 1e. Specifieke of meer gerichte assessment (Probleem en/of effect).
- 2e. Strategiebepaling aan de hand der assessment in teamoverleg.
- 3e. Uitvoering van strategie onder voortgaande procesassessment.
- 4e. Effect- en/of probleemassessment.
- 5e. a. Bepaling van resultaat van strategie aan de hand van de diverse vormen van assessment, in de vorm van overleg.
b. Verdere strategiebepaling enz. enz.

Aangezien er nogal eens diverse typen behandelingen (herleidbaar tot interventies vanuit ziekte- en leermodel) dwars door elkaar of parallel aan elkaar verlopen, lijkt het nuttig een algemeen beeld te verschaffen inzake de diverse assessment behandelingscircuits, die vanuit het leermodel en ziektemodel kunnen optreden. Dit geeft wellicht mogelijkheden om tot een overzicht te komen inzake een relatief breed beeld der revalidatie-activiteiten.

5.3.2.2. Poging tot integratie van ziekte- en leermodel

In het voorgaande werd een onderscheid gemaakt naar de diverse criteriumsituaties waarin gedragsdeviaties (excessen en tekorten) konden worden vastgesteld. Het lijkt ook mogelijk een indeling te maken naar „fasen” waarin de diverse gedragsmodifikatiepogingen geplaatst kunnen worden. In het onderstaande schema is getracht deze te ordenen waarbij tevens de activiteiten vanuit het ziektemodel zijn geïntegreerd. De algemene en de specifieke assessment alsook de daarbij behorende strategieën zijn inhoudelijk verschillend van elkaar. Het assessmentbehandelingscircuit is bij alle aanwezig.

De fasen waarin getracht wordt tot het aanleren van nieuw gedrag te komen worden in volgend flow-diagram (fig. 10) weergegeven. Voor de verklarende tekst wordt verwezen naar pagina 222.

Dit flow-diagram pretendeert niet meer dan een algemeen overzicht te geven inzake de activiteiten vanuit het ziekte- en het leermodel en uiteraard de diverse wisselwerkingen hiertussen. Het spreekt vanzelf dat in een dergelijk beknopt schema niet de totaliteit van het complexe revalidatie-gebeuren kan worden samengevat. Iedere activiteit, iedere assessment, modifikatie en onderlinge relatiewerking zal op zijn beurt verder moeten worden uitgewerkt. Het geïntegreerde functioneren van ziekte- en leermodel zal aan de praktijk moeten worden getoetst.

FIG. 10 FASEN-OVERZICHT

FASE A GEDRAGSRESTAURATIE

FASE B. GEDRAGSHERORIËNTATIE

FASE C. GEDRAGSBEKLIJVING

A. Herstelfase of gedragsrestauratie

In deze fase is de gedragsassessment en modifikatie gericht op:

- 1e. Vaststelling van gedragsobstakels en de verwijdering hiervan d.m.v. extinktie van probleemgedrag en de bekrachtiging van incompatibel gedrag.
- 2e. Vaststelling van gedragstekorten (vanuit premorbide situatie, testsituatie, klinische observatiesituatie) en het aanleren van nieuw gedrag d.m.v. gedragsvormende technieken.
- 3e. Ondersteunende informatie vanuit medisch-neurologische gegevens t.b.v. gedragsredukatie en het aanleren van nieuw gedrag.

B. Gedragsheroriëntatie: compensatie of reorganisatie

In deze fase wordt vastgesteld welke restdefecten er zullen blijven bestaan, welke hulpmiddelen er moeten worden aangepast, welke medikatie er blijvend zal moeten worden verstrekt en welk gedrag er in diverse opzichten moet ontstaan met of zonder hulpmiddelen. In deze fase dienen de nodige materiële en technische voorzieningen te worden getroffen. Gedragsassessment en -modifikatie zal in deze fase gericht zijn op:

- 1e. Vaststelling van de aard of soort der prothesen, nagaan van eventueel incompatibel prothesegegedrag en de verwijdering hiervan.
- 2e. Vaststelling van de wijze waarop verwerking van het revalidatieprogramma optreedt en mogelijke ondersteuning hiervan d.m.v. medikatie en gedragstherapeutische technieken (cognitieve herstructurering, verwerking van depressies enz.).
- 3e. Vaststelling welke beroeps-, omscholings-, vrijetijdsactiviteiten mogelijk zijn en begeleiding van de eerste aanzet hiertoe in de nabehandelingsfase.

De strategieën zijn derhalve:

- 1e Vestiging van prothesegegedrag en gereorganiseerd gedrag.
- 2e. Het ondersteunen van de assimilatie van de handicap.
- 3e. Begeleiding van taakgedrag.

C. Gedragsbeklijving (nazorg)

In deze fase moet ervoor gezorgd worden dat het nieuwe gedrag dat geleerd werd in fase A en B blijft voortbestaan en dat materiële voorzieningen gebruikt blijven worden.

De gedragsassessment en modifikatie is gericht op:

- 1e. Vaststelling van de gebruikmaking van hulpmiddelen in thuis- en werksituatie en eventuele ondersteuning van dit gebruik.
- 2e. Vaststelling in hoeverre de omscholings-, beroeps-, vrijetijdsactiviteiten worden geëffektueerd. Verdere begeleiding hiervan, indien nodig.

5.3.3. Research in de revalidatie

5.3.3.1. Algemene overwegingen.

„Het invoeren van een nieuwe en hopelijk juiste strategie zal elk centrum, altijd met een welhaast onoplosbaar dilemma konfronteren: Enerzijds verplicht de dagelijkse praktijk patiënten met de ter beschikking staande middelen optimaal te behandelen, anderszijds vraagt wetenschappelijke benadering van de problematiek om grondig onderzoek, voorbereiding van personeel, betere of andere hulpmiddelen om met meer inzicht en een hechter fundament assessment en modifikatie te verbeteren. M.a.w. het onmisbare wetenschappelijke onderzoek komt in konflikt met de direkte

praktische hulpverlening aan patiënten" (Te Riele H.F.W., ongepubliceerde nota). Men krijgt hier de neiging om aarzelend te zeggen: „Was het maar waar"! Was het maar waar, dat er inderdaad gesproken zou kunnen worden van een dergelijk konflikt want in dat geval zou er sprake zijn van gelijke tendenties. Bovenstaande uitspraak terecht waarschuwend bedoeld geeft de realiteit niet volledig weer. De research in psychiatrische centra, ziekenhuizen en revalidatie-instituten (met uitzondering misschien van academische ziekenhuizen) lijdt een kommervol bestaan. Het is een hoge uitzondering indien hier sprake is van enig wetenschappelijk onderzoek om over een mogelijk konflikt tussen research en praktische gezondheidszorg maar niet te spreken. Dit is de realiteit. Geldt deze stand van zaken al inzake biochemische, fysische en medische research in de niet-akademische gezondheidszorgcentra, research vanuit andere modellen zoals bijvoorbeeld psychologische research is nog zeldzamer. Het is zelfs zeer de vraag of deze ooit goed van de grond zal komen in centra die de direkte hulpverlening aan patiënten als een eerste doelstellingen in hun vaandel voeren.

Barendregt (1975) stelt niet voor niets dat de psychologen, andragogen, functiopsychologen en verder alle mensen therapeuten worden. Hij bepleit het belang van research zijnde van grotere importantie dan de therapeutische vloedgolf die momenteel de patiënten lijkt te overspoelen.

Van Dam (1974) krijgt op zijn oproep om vooral research in het ziekenhuis niet te vergeten te horen, dat hij een tamboer-maitre is zonder korps (Benders 1974)

Raven (1966) spreekt over de moeilijke inpasbaarheid van die psychologen die rationeel trachten te werken, in het psychiatrische ziekenhuis.

Vanwaar deze moeizame - of beter - nauwelijks bestaande positie van de psycholoog, die tracht empirisch toetsend te werken in de individuele praktijk danwel in gezondheidszorg-instellingen?

Men kan ten aanzien hiervan slechts enkele opmerkingen maken:

- 1e. Er is onder psychologen nogal eens verschil van mening omtrent welke vorm van wetenschap er toegepast zou moeten worden op psychische fenomenen. De wetenschappelijke cyclus zoals De Groot (1966 p. 29 t/m 36) deze beschrijft zou niet altijd toepasbaar zijn.
- 2e. Niet alle psychologen huldigen het standpunt dat psychologie een wetenschap zou moeten zijn. Men zou minimaal een onderscheid moeten maken tussen „metende, objektiverende psychologie" en de „verstehende psychologie".
- 3e. Naast deze algemene verdeeldheid die het vormen van een meer gecoördineerde pressure group in vele opzichten onmogelijk maakt, bestaat er de indruk dat de mogelijkheden tot het verrichten van onderzoek erg klein zijn. Het moeizaam doorploegen van moeilijke literatuur moet veelal in de vrije tijd geschieden. Het aantal personen (ook niet psychologen) dat eigen vakliteratuur bijhoudt (zonder daaraan gekoppelde research) uit de behoefte om binnen eigen vak op de hoogte te blijven, lijkt niet groot. Research veronderstelt eigenlijk veel meer of beter, iets anders nl. dat men op een beperkt terrein gedurende een korte tijd tot nieuwe gedachtenvorming komt op basis van tamelijk geavanceerde publikaties.

Indien het bijhouden van eigen vakliteratuur door wat voor omstandigheden dan ook niet mogelijk is, dan lijkt een literatuurstudie als basis op voorbereiding tot research een utopie.

- 4e. Niet alleen de mogelijkheden zijn beperkt, maar ook de behoefte tot onderzoek lijkt niet indrukwekkend groot te zijn.

Vanuit leertheoretisch standpunt zou men de vraag kunnen stellen of het bezig zijn met de patiënt, het houden van lezingen, het mogen deelnemen aan

belangrijke stafvergaderingen, besprekingen etc. wellicht een aantrekkelijker bekrachtigingsschema inhoudt dan het eenzaam zitten op de kamer met als enige gesprekspartners een aantal auteurs en een onzekere bekrachtiging over enkele jaren.

- 5e. Een psycholoog die nastreeft in een praktijksituatie zo rationeel mogelijk te werken ondervindt allerlei weerstanden in zijn omgeving: Over het algemeen lijkt men onvoldoende doordrongen van het belang van een optimale opzet van het onderzoek, voorzover men al doordrongen is van de noodzaak tot onderzoek op zich. Naast de eerder genoemde oppositie vanuit alternatieve „psychologieën”, alternatieve „wetenschappen”, allerlei ethische overwegingen inzake het dehumaniserende van een onderzoek krijgt men ook nog eens te maken met de moeilijke samenstelling van experimentele en controlegroepen, de medewerking van het personeel, het konstant houden van een strategie enz. enz., waarbij het uiteindelijk de vraag wordt wat men door al deze alternatieve invloeden en de moeizame konstruktie van een elementair onderzoek, nog wel meent te kunnen meten.
- 6e. Het bepleiten en stimuleren van onderzoek lijkt totaal overbodig in die situaties waar gesteld wordt dat men op „wetenschappelijke” wijze werkt. Nog afgezien van de mogelijkheid dat men aan versleten routine doet is in de (geestelijke) gezondheidszorg met zijn steeds fluctuerende probleemgebieden en steeds vernieuwende methodieken en visies een kritische, objectieve en kwantitatieve evaluatie en hieruit voortvloeiende bijsturing een blijvende noodzaak.

Bovenstaande overwegingen kunnen in dezelfde of andere vorm in diverse publikaties worden aangetroffen. Ze zijn voor een deel herleidbaar tot de algemene gedachtegang dat naast, overigens waardevolle, vernieuwende denkbeelden en praktijktoepassingen plaats geboden moet worden aan een rationele inbreng in een organisatie.

Rationele inbreng in een organisatie kan echter alleen maar enigszins gerealiseerd worden, indien de organisatie als geheel gemotiveerd is voor rationalisatie: dat wil zeggen dat de individuen, die tot de organisatie behoren, allen minstens het belang inzien van meer systematische, op toetsing gerichte, meer produktieve, meer efficiënte, meer rendabele wijze van werken. Het belang inzien is, echter niet voldoende, maar het is wel een begin. Deze inzihtsverandering zal gevolgd moeten worden door een wijze van denken en handelen, waardoor er een gunstig klimaat ontstaat en praktijkvernieuwing, theorievorming en research tot de mogelijkheden gaan behoren.

5.3.3.2. Nabeschouwing

Het tot stand komen van deze studie binnen het Revalidatie Centrum „Hoensbroeck” toont aan dat het in principe wel degelijk mogelijk is in revalidatie instituten het vereiste rationele denk- en werkklimaat te creëren nodig voor de uitvoering van revalidatieresearch. Of deze mogelijkheid in andere revalidatiecentra in den lande bestaat, valt uiteraard iets moeilijker vast te stellen. De belangstelling welke ondervonden werd tijdens de colloquia-serie „cerebrale traumata” 1975/1976, doet echter veronderstellen dat een bereidheid hiertoe zowel bij revalidatie-artsen, -psychologen en paramedisch personeel aanwezig is.

Deze veronderstelling wettigt het standpunt dat het mogelijk moet zijn deze studie in zijn kwetsbaarheid, in vertrouwen ter discussie te stellen.

Vanuit de presentatie der leertheorie en de problematiek aangeboden vanuit de patiënt met confusio cerebri werd de vraag gesteld of leertheoretische principes een antwoord zouden kunnen bieden, dat zou bijdragen tot de oplossing van gedragste-

korten en excessief gedrag. De algemene konklusie van dit betoog is dat dit inderdaad, onder zekere dringende voorwaarden, tot de mogelijkheden behoort. Tegelijkertijd zijn er echter opnieuw vragen gesteld die beantwoord dienen te worden, aler verdere vooruitgang te realiseren is. Voortgaande research zal het mogelijk maken dat de hier geformuleerde ideeën kunnen worden bijgesteld. De relatie tussen theorie en praktijk die alleen in het revalidatiecentrum gelegd kan worden, zal er toe bijdragen dat ideeën inzake assessment en modifikatie ook doorwerken in een beter gekoncretiseerde hulpverlening. Uiteindelijk zullen wellicht hulpverlener en gezondheidszorg, dankzij de erkenning en akseptatie van het leermodel naast het ziektemodel, ervaren dat het wel degelijk mogelijk is om patiënten die tot voorheen als onbehandelbaar werden afgeschreven toch tot op redelijke hoogte te revalideren.

En hier was het uiteindelijk om begonnen.

5.3.4. Samenvatting

In deze paragraaf werd aangegeven welke konsekwenties de realisering van het theoretische framework in praktisch opzicht zou hebben, indien hierbij bovendien leer- en ziektemodel zouden worden geïntegreerd.

Vervolgens werd ingegaan op de moeilijkheden inzake research in een praktisch hulpverlenende setting, waarbij echter toch de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek werd beklemtoond.

De studie besluit met de hoop uit te spreken, dat zowel patiënt, hulpverlener en gezondheidszorg het belang zullen gaan ervaren van de wisselwerking tussen het ziekte- en het leermodel in de revalidatie.

HOOFDSTUK 6

Algemene Samenvattingen

6.1. Summary

This study represents the result of an experience gained in a rehabilitation centre over a period of about 5 years. This experience centered around patients suffering from brain damage, concentrating particularly on those with *contusio cerebri*. In these five years a meeting took place between staff concerned with clinical psychology on the one hand and rehabilitation staff on the other hand. Experts in clinical psychology had to conclude that because of its still short development phase the rehabilitation process suffers from many limitations, but offers at the same time many possibilities. To these possibilities belongs also the development and application of achievements in the field of learning theories. In order to achieve this, one needs an interdisciplinary approach, since one is confronted with the exceptionally multi-faceted task of having to provide an answer or part-answer concerning the treatment of patients with brain contusion.

The development of learning theory concepts with regard to theoretical and working models in the treatment of the brain injured, was set out as follows:

Chapter 1 contains as introduction an overview of the situation which gave rise to the present study. Based on the idea that at least a section of rehabilitation is concerned with „behaviour modification” and consequently with „learning”, this „relearning of behaviour” is seen as one of the vital elements of rehabilitation. In dealing with learning principles as they are applied in the field of rehabilitation, a basic knowledge of learning theory becomes a pre-requisite. Discussed is how different learning paradigms are applied in rehabilitation, though in a concrete situation and on pragmatic grounds preference is given to the operant learning paradigm as explanatory and treatment model. This perspective is used to examine up to what extent the various stages of the rehabilitation process may not only be examined but also explained with the aid of the operant learning paradigm. The first chapter ends with the conclusions which can be drawn from this learning paradigm; conclusions with regard to the practical application of rehabilitative action in general up to and including the so-called „rehabilitation learning model.”

After dealing with the introduction of learning theory in rehabilitation, Chapter 2 turns to the group of patients suffering from brain contusion. An analysis is made as to what extent it is possible to define more precisely the problems of these patients taking a behavioural structure as baseline. On the basis of information regarding the „status”, a decision is made as to what statements are made by team members to describe the behaviour of patients. This content analysis in describing the status leads us to differentiate between:

- A. **Behaviour deficits**, ascertained by means of a standardized test situation, but also with the aid of non-structured behaviour monitoring. This is generally the behaviour to which – seen from the rehabilitation standpoint – the various behaviour training programmes orient themselves. An attempt is made to remove or compensate behaviour deficits.
- B. **Excessive behaviour**, in short called „behavioural obstacles”, which hampers efforts at behaviour modification or behaviour compensation. In general, one has to do here with a type of behaviour which in the long term can lead to a discharge from the rehabilitation centre. In such a case the patient is often considered as incapable of being rehabilitated.

Assessment procedures are developed for both types of behavioural deviations:

1. The combination of a series of psychological examination methods (tests) in order to measure at least part of the different behaviour deficits.
2. The setting up of a temporary assessment scale to show up especially behavioural obstacles: the behaviour monitoring scale in the case of patients with brain contusions, abbreviated to GOCC (GedragsObservatieschaal van Contusio Cerebri).

Also in the case of learning theory one differentiates between excessive behaviour and behaviour deficits, so that theory and practice can be joined together. The distinction between excessive behaviour and behaviour deficits is, thus, backed up not only by theory but also by praxis.

As far as excessive behaviour is concerned, the learning theory offers the method in the form of differential reinforcement aimed at reducing the problem behaviour. As far as behaviour deficits are concerned, the learning theory mentions three methods whose aim it is to achieve a new or improved behaviour repertoire. These are: a selective reinforcement concerning the increase of an already existent behaviour, shaping procedures for forming a totally new behaviour, and fading for maintaining the behaviour while increasing the stimulus complexity.

The common aim of all these procedures is the extinction of inadequate behaviour and the reinforcement of desired behaviour.

The developed assessment procedures and corresponding modification techniques borrowed from the learning theory form together the „temporary rehabilitation strategy“. Although in the present study this temporary rehabilitation strategy refers only to the clinical phase, it must be pointed out that ideally the home environment should definitely play a part in the treatment. In order to achieve an effective integration and a consolidation of the new, acquired or reduced behaviour these strategies, moreover, should not be restricted to the clinical stage, but should be continued and supplemented in the home environment.

The theoretical construction of this multiple approach seems to be applicable not only in the case of patients with brain traumas. There is the possibility that such a theoretical construction could be an effective model in other fields and for other groups of patients in rehabilitation.

The temporary rehabilitation strategy described is a starting point for the development and realisation of different rehabilitation programmes. In order to test these programmes by empirical means, chapter 3 deals first of all with an experimental method for carrying out and evaluating of this rehabilitation strategy. Since we are dealing here with an experimental strategy with possibly far reaching consequences for later developments, special attention must be paid to the assessment. The extinction of excessive behaviour and the build-up of a new behaviour are subjected to a triple assessment:

1. Problem assessment which orients itself to the problem behaviour and the possible increase or decrease thereof, and where the situation prior and after treatment is examined.
2. Result assessment which is formed by means of scores achieved according to the behaviour monitoring scale and the psychological examination compiled, pre- and post-treatment.
3. Process assessment which orients itself to the target behaviour, frequently a behaviour which is incompatible with the problem behaviour; the scores reached are obtained by means of an almost constant monitoring and recording during treatment.

Since an important part of the assessment procedure is based on the COCC, the scale undergoes a statistical analysis in order to ascertain the reliability of evaluations made by different people involved in the case. Based on the results obtained, one can say that as far as the item compilation and the construction of the scale are concerned, the GOCC is quite a reliable measurement instrument as behaviour monitoring scale for the assessment of behaviour deviations in patients with *contusio cerebri*.

The evaluation of behaviour modifications takes its cue mainly from the results obtained by the techniques for the reduction of excessive behaviour, the build-up of new behaviour, and the increase of already existing behaviour. The importance of the testing of these techniques, however, is reduced due to the absence of a control group; in addition, it was not possible to form the experimental group according to the randomisation principle. The problem behaviour consisting of excessive behaviour, non-existent behaviour, and the low intensity of existent behaviour is reduced by a good 85% in treated patients in relation to the initial value. The target behaviour consisting in the reduction of excessive behaviour, the build-up of new behaviour, and the increase in the intensity of existent behaviour is reached by the majority of patients in approximately 6 weeks. The result assessment reveals, with the use of the methods described, no change in the scores according to the psychological examination. In contrast, the GOCC scores reveal a significant improvement when comparing them before and after treatment.

The evaluation of behaviour modifications which orient themselves to the maintenance of behaviours under an increasing stimulus complexity is to be given particular relevance, since in the case of such a strategy it was possible to form an experimental and a control group. However, also in this case it proved impossible to form the experimental and the control group according to the randomisation principle. The problem behaviour of the two groups consists of considerable memory and concentration disturbances which were ascertained by means of the psychological testing procedures compiled. The treatment of the experimental group extended over a period of about 6 months. The treatment itself consisted of stimuli presented in ever increasing complexity. This approach can be traced back to the „fading“ principle of learning theory, in which the gradual reduction of stimulus facilitation plays the main role. The retention of a corresponding memory and/or concentration response under an increasing stimulus complexity could then be attributed to an improvement in memory and/or concentration behaviour during training situations. The control group consisted of patients who displayed unmistakable memory and/or concentration disturbances one month prior to their discharge. This group was called back five months after discharge for a repeat examination. The general conclusion that can be drawn from the examination is that the test performances with regard to memory and concentration showed a considerable improvement due to the training described in this study compared to people who had not been subjected to such training. A reply to the question whether „the memory“ and „the concentration“ are being influenced also in a positive sense outside a test situation requires further examination.

After testing the application of principles of learning theory in the treatment of patients with *contusio cerebri*, Chapter 4 deals with analysis of literature to determine the next steps. Although it was first attempted to limit the collection of information to patients suffering from brain contusion, it soon transpired that there was a paucity of publications which dealt with this category of patients. For this reason the literature analysis was enlarged to cover several categories of patients

with brain damage such as patients with a left or right hemiplegia, a combination of these, minimal brain damage, cerebral palsy patients, and the mentally retarded. Arguments are advanced which justify the inclusion of such mixed groups of patients. The premise is that of a „behaviour therapy type“, and from this perspective approaches and modification possibilities are examined which literature offers patients suffering from behaviour deviations caused by brain damage, independently of whether such a damage is congenital or was acquired at a later stage. The results of this new orientation may be summarized as follows:

1. Several authors underline the necessity of analysing behaviour deficits under different conditions such as the premorbid, clinical, after-care situation, and the home environmental situation. The study of behaviour deficits under clinical conditions should be carried out basically according to two procedures, that is to say by means of standardized test procedures and behaviour monitoring scales. Various models are compared not only in the case of test procedures but also in the case of behaviour monitoring. As far as the clinical test situation is concerned, the „Structure of Intellect of Guilford“ has the greatest support. As far as behaviour monitoring is concerned, the „Progress Assessment Chart of Gunzberg“ seems to offer the more favourable prospectives.
2. In order to obtain an impression of the studies on „behavioural disorders“, the monitoring criteria of several authors are compared with each other and with the behaviour monitoring scale (GOCC) developed for this study. The result was that the GOCC does most justice to the problem behaviour of patients with a contusio cerebri and those with other cerebral damage.
3. Conditioning principles of learning theory and especially operant conditioning principles can be found in a number of publications dealing with efforts to modify behaviour deficits. It can be seen that these principles are used by representatives of different disciplines always under different names and in various combinations.
4. Finally, the most important finding may lie therein that extreme, unwanted behaviour which impedes a behaviour build-up cannot or can hardly be reduced or extinguished in the rehabilitation centres of today. However, based on results from abroad we know that it is quite possible to reduce such excessive behaviour even if only with the use of specially trained staff and in institutions with special facilities.

In Chapter 5 an attempt is made at combining the information extracted from the analysis of literature with the practical experience obtained. If one ignores in the practical situations for the time being the theoretical obstacle with regard to the relation „brain-behaviour“ without, though, failing to orientate oneself to the „input-output“ relation – in expectation of further developments in this field –, it is possible to detect the beginnings of a clearly defined approach to assessment. By attempting to specify more clearly the stimulus situation and the resulting response through behaviour monitoring scales, in combination with standardized test procedures, it is possible to obtain information on complex behaviour and simple behaviour related thereto. This approach opens up the possibility of analysing determined behaviour deficits from two different perspectives co-ordinated with each other. Moreover, this method appears to offer possibilities for badly needed research in this field.

Practical experience and the literature analysis showed that there exists a similar situation with regard to the question of modification. It has been proved that the attempt at balancing behaviour deficits can be separated from the various

theoretical constructions with regard to the relation „brain-behaviour“. In examining what is happening in practice with regard to current action sequences, the latter can be attributed to behaviour reestablishment, behaviour compensation and behaviour reorganization.

The aim of this study is basically the concretisation of the rehabilitation learning process. By a rehabilitation learning process it is meant, in fact, that the medical and paramedical work need not lose its value but that there are just as many possibilities open in order to include also „learning“, with its many aspects, in the comprehensive rehabilitation activities. It must be pointed out at this point that it is not always to be taken for granted that a person learns. Learning is an implicit rehabilitation pre-requisite which makes it necessary to pay particular attention to circumstances promoting the learning of new behaviour. In patients with learning inhibitions the efforts should be concentrated on the reduction of behaviour disturbances. If this cannot or cannot adequately be done in a rehabilitation centre, alternatives to implement these methods should be sought outside the centre. After reducing excessive behaviour an attempt can be undertaken to build up a new behaviour at the rehabilitation centre. The permanent interaction and integration between the so-called „disease model“ and the „learning model“ should and could be given a chance in the rehabilitation learning process. In order to concretize this, particular attention is given in the last part of Chapter 5 to the application of „medical learning models“ in the practice of the rehabilitation centre. A rehabilitation centre lends itself ideally to the amalgamation of theory and practice in this field.

Learning theory and behaviour therapeutic practice supplement and support the conventional work of rehabilitation medicine, and offer, in addition, rehabilitation possibilities to a considerable number of patients suffering from cerebral damage and probably also to those patients suffering from behaviour disorders who up to now were considered unfit for rehabilitation.

The aim of this study was to contribute to developments leading in this direction.

6.2. Zusammenfassung

Diese Studie ist das Ergebnis einer etwa fünfjährigen Erfahrung innerhalb eines Rehabilitationszentrums, in deren Mittelpunkt die Bemühungen um Patienten mit Hirnschädigungen, insbesondere um Patienten mit Hirnquetschungen standen. In diesen fünf Jahren fand eine Begegnung zwischen Mitarbeitern der klinischen Psychologie einerseits und der Rehabilitation andererseits statt. Die Fachleute der klinischen Psychologie mußten dabei feststellen, daß das Rehabilitationsgeschehen wegen seiner noch kurzen Entwicklungsphase nicht nur vielen Einschränkungen unterliegt, sondern auch viele Möglichkeiten bietet. Zu diesen Möglichkeiten gehört die Entwicklung und Anwendung lerntheoretischer Errungenschaften. Dazu ist die Zusammenarbeit vieler Disziplinen erforderlich, die mit der außerordentlich vielschichtigen Aufgabe konfrontiert werden, eine Antwort oder Teilantwort in Bezug auf die Behandlung von Patienten mit einer Hirnquetschung zu geben. Die Entwicklung lerntheoretischer Ideen zu Denk- und Arbeitsmodellen zur Behandlung von Hirngeschädigten wurde wie folgt wiedergegeben:

In Kapitel 1 wird als Einführung eine Übersicht über die Situation, woraus die vorliegende Studie entstehen konnte, gegeben. Aufgrund der Idee, daß wenigstens ein Teil der Rehabilitation „Verhaltensänderung“ und deshalb „Lernen“ beinhaltet, wird dieses „erneutes Lernen von Verhalten“ als einer der wesentlichen Elemente der Rehabilitation betrachtet. Bei der Behandlung von Lerngrundsätzen in ihrer Anwendung im Rehabilitationsbereich werden Grundkenntnisse über die Lerntheorie vorausgesetzt. Dargestellt wird wie verschiedene Lernparadigmen in der Rehabilitation anwendbar sind, aber daß in der konkreten Situation, auch aus pragmatischen Gründen das operante Lernparadigma bevorzugt wird, als Erklärungs- und Behandlungsmodell. Aus dieser Perspektive wird untersucht, inwiefern die verschiedenen Phasen im Rehabilitationsablauf gleichfalls mit Hilfe des operanten Lernparadigmas untersucht und erklärt werden können. Das erste Kapitel wird mit den Schlußfolgerungen, die aus diesem Lernparadigma gezogen werden, beendet; Schlußfolgerungen in Bezug auf die praktischen Anwendungen des rehabilitativen Handelns im allgemeinen bis zum sogenannten „Rehabilitations-Lernmodell“.

Nach der Einführung der Lerntheorie in die Rehabilitation befaßt sich Kapitel 2 mit den Patienten mit einer Hirnquetschung. Es wird untersucht, inwieweit es möglich ist, die Problematik dieser Patientengruppe – ausgehend von einem Verhaltensrahmen – näher zu präzisieren. Aufgrund von Informationen über den „Status“ wird festgestellt, welche Aussagen durch die Teammitglieder gemacht werden, um das Verhalten der Patienten zu beschreiben. Diese Inhaltsanalyse bei der Statusbeschreibung führt zur Unterscheidung in:

- A. **Verhaltensdefizite**, festgestellt in einer standardisierten Testsituation, aber auch mit Hilfe nichtstrukturierter Verhaltensbeobachtungen. Im allgemeinen ist dies das Verhalten, an dem sich – vom rehabilitativen Standpunkt aus gesehen – die verschiedenen Verhaltenstrainingsprogramme orientieren. Es wird versucht, die Verhaltensdefizite auszuräumen oder zu kompensieren.
- B. **Exzessives Verhalten**, das diese Bemühungen zu Verhaltensänderungen oder Verhaltenskompensationen behindert, kurz „Verhaltensbehinderungen“ genannt. Im allgemeinen handelt es sich dabei um jenes Verhalten, das längerfristig zu einer Entlassung aus dem Rehabilitationszentrum führt, wobei der Patient dann oft als nicht rehabilitationsfähig bezeichnet wird.

Für beide Arten von Verhaltensabweichungen werden Bewertungsverfahren entwickelt:

1. Die Zusammenfassung einer Reihe psychologischer Untersuchungsverfahren (Tests), um wenigstens ein Teil der verschiedenen Verhaltensdefizite zu messen.
2. Die Konstruktion einer vorläufigen Bewertungsskala, die vor allem Verhaltensbehinderungen signalisieren soll: die Verhaltensbeobachtungsskala bei Patienten mit Hirnquetschungen, abgekürzt GOCC genannt (= GedragsObservatieschaal van Contusio Cerebri).

Auch in der Lerntheorie wird ein Unterschied zwischen exzessivem Verhalten und Verhaltensdefiziten gemacht, so daß Theorie und Praxis miteinander verbunden werden können. Die Unterscheidung zwischen exzessivem Verhalten und Verhaltensdefiziten wird also sowohl durch die Theorie, als auch durch die Praxis unterstützt.

In Bezug auf das exzessive Verhalten bietet die Lerntheorie die Methodik der differentiellen Verstärkung zur Abschwächung des Problemverhaltens. In Bezug auf Verhaltensdefizite nennt die Lerntheorie drei Methoden, die alle die Verwirklichung eines neuen oder besseren Verhaltensrepertoire zum Ziel haben, und zwar die selektive Verstärkung bezüglich der Zunahme eines bereits vorhandenen Verhaltens, „shapings“-Verfahren zum Aufbau eines grundlegend neuen Verhaltens und „fading“ zur Beibehaltung des Verhaltens unter zunehmender Reizkomplexität.

Allen Verfahren gemeinsam ist die Beseitigung unangemessenen Verhaltens und die Verstärkung des gewünschten Verhaltens.

Die entwickelten Vorgehensweisen und die der Lerntheorie entnommenen entsprechenden Modifikationstechniken bilden zusammen die „vorläufige Rehabilitationsstrategie“. Obwohl sich diese vorläufige Rehabilitationsstrategie in der vorliegenden Studie nur auf die klinische Phase bezieht, muß betont werden, daß im Idealfall die häusliche Umgebung ausdrücklich an der Behandlung teilhaben sollte. Um eine gute Integration und die Konsolidierung des neuen, gelernten oder reduzierten Verhaltens zu erreichen, sollten diese Strategien außerdem nicht auf die klinische Phase beschränkt bleiben, sondern in der häuslichen Umgebung weitergeführt und ergänzt werden.

Die theoretische Konstruktion dieser mehrfachen Vorgehensweise scheint nicht nur für Hirntraumatiker anwendbar. Die Möglichkeit, daß sie Modellwirkung für weitere Bereiche und andere Patientenkreise in der Rehabilitation haben könnte, scheint durchaus gegeben zu sein.

Die dargestellte vorläufige Rehabilitationsstrategie bietet Ansätze zur Entwicklung und Realisierung verschiedener Rehabilitationsprogramme. Um diese Programme empirisch zu erproben, behandelt Kapitel 3 zunächst die experimentelle Methode zur Ausführung und Evaluierung dieser Rehabilitationsstrategie. Da es sich hier um eine experimentelle Strategie mit möglicherweise weitreichenden Konsequenzen für spätere Entwicklungen handelt, ist der Evaluierung besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Sowohl die Reduzierung exzessiven Verhaltens, als auch der Aufbau neuen Verhaltens werden einer dreifachen Bewertung unterzogen:

1. Problembewertung, die sich am Problemverhalten und der eventuellen Zu- oder Abnahme dieses Verhaltens orientiert, wobei die Situation vor und nach der Behandlung untersucht wird.
2. Ergebnissbewertung, die durch die erreichten Punktzahlen nach der entwickelten Verhaltensbeobachtungsskala und die zusammengestellte psychologische Untersuchung gebildet wird, – vor und nach der Behandlung.

3. Prozeßbewertung, die sich am Zielverhalten orientiert, oft jenes Verhalten, das nicht mit dem Problemverhalten kompatibel ist, wobei die erreichten Punktzahlen durch eine nahezu permanente Beobachtung und Registrierung während der Behandlung zustande kommen.

Da ein wichtiger Teil des Bewertungsverfahrens auf der GOCC basiert, wird diese Skala einer statistischen Bearbeitung unterzogen, um die Zuverlässigkeit von Wertungen der verschiedenen Personen zu bestimmen, die mit dieser Aufgabe befaßt sind. Aufgrund der Ergebnisse kann festgestellt werden daß die GOCC als Verhaltensbeobachtungsskala sowohl was die Itemzusammenstellung, als auch die Konstruktion der Skala angeht ein ziemlich zuverlässiges Meßinstrument darstellt, um Verhaltensabweichungen bei Patienten mit Hirnquetschungen zu bewerten. Die Evaluierung der Verhaltensmodifikationen orientiert sich hauptsächlich am Ergebnis der Techniken zur Reduzierung exzessiven Verhaltens, dem Aufbau neuen Verhaltens und der Zunahme bereits vorhandenen Verhaltens. Die Bedeutung der Erprobung dieser Techniken wird durch das Fehlen einer Kontrollgruppe jedoch etwas geschmälert, außerdem konnte die experimentelle Gruppe nicht nach den Randomisierungsprinzipien zusammengestellt werden. Das Problemverhalten, bestehend aus exzessivem Verhalten, nicht vorhandenem Verhalten und der niedrigen Intensität vorhandenen Verhaltens nimmt bei den behandelten Patienten um rund 85% im Verhältnis zum Ausgangswert ab. Das Zielverhalten, bestehend aus der Reduzierung exzessiven Verhaltens, dem Aufbau neuen Verhaltens und der Zunahme der Intensität bestehenden Verhaltens, wird bei der Mehrzahl der Patienten in etwa 6 Wochen erreicht. Die Ergebnisuntersuchung ergibt bei den genannten Methoden keine Änderung der Punktzahlen bei der psychologischen Untersuchung. Die Punktzahlen nach der GOCC zeigen jedoch eine spürbare Verbesserung, wenn man sie vor und nach der Behandlung vergleicht.

Die Evaluierung der Verhaltensmodifikationen, die sich an der Beibehaltung des Verhaltens unter zunehmender Reizkomplexität orientieren, soll besonders dargestellt werden, da es bei dieser Strategie wohl möglich war, eine experimentelle und eine Kontrollgruppe zu bilden. Aber auch in diesem Falle konnte sowohl die experimentelle, als auch die Kontrollgruppe nicht nach den Randomisierungsprinzipien zusammengestellt werden. Das Problemverhalten besteht bei beiden Gruppen aus erheblichen Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, die mit Hilfe der zusammengestellten psychologischen Untersuchungsverfahren festgestellt wurden. Die Behandlungsdauer der experimentellen Gruppe umfaßte etwa 6 Monate. Die Behandlung selbst bestand aus einem Reizangebot in zunehmender Komplexität. Diese Vorgehensweise kann auf das lerntheoretische „fading“-Prinzip zurückgeführt werden, wobei die allmähliche Verringerung der Reaktionsbequemlichkeit die zentrale Rolle spielt. Die Beibehaltung einer entsprechenden Gedächtnis- und/oder Konzentrationsreaktion bei zunehmender Reizkomplexität könnte dann auf eine Verbesserung des Gedächtnis- und/oder Konzentrationsverhaltens während der Trainingssituation zurückgeführt werden. Die Kontrollgruppe bestand aus Patienten, die einen Monat vor der Entlassung deutliche Gedächtnis- und/oder Konzentrationsstörungen zeigten. Diese Gruppe wurde fünf Monate nach der Entlassung zur Wiederholungsuntersuchung einbestellt. Die allgemeine Schlußfolgerung, die aus der Untersuchung gezogen werden kann, lautet: Die Testleistungen bezüglich Gedächtnis und Konzentration durch das in dieser Studie dargestellte Training zeigen eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zu Personen auf, welche diesem Training nicht unterzogen wurden. Eine Antwort auf die Frage ob „das Gedächtnis“ und „die Konzentration“ außerhalb der Untersuchungssituation auch in positivem Sinne beeinflusst werden, erfordert nähere Untersuchungen.

Nach der Erprobung von Anwendungen lerntheoretischer Grundsätze bei der Behandlung von Patienten mit Hirnquetschungen wird in Kapitel 4 über ein Literaturstudium zur Festlegung des weiteren Vorgehens berichtet. Obwohl zunächst versucht wurde, die Informationssammlung auf Patienten mit Hirnquetschungen zu beschränken, ergab sich allmählich, daß Veröffentlichungen über diese Patientenkatgorie äußerst selten waren. Deshalb wurde das Literaturstudium auf mehrere Patientenkatgorien mit Hirnschädigungen ausgedehnt und zwar auf Patienten mit einer Hemiplegie rechts oder links, Kombinationen davon, „minimal brain damage“, Cp-Patienten und geistig Behinderte (Retardierte). Es werden Argumente aufgeführt, die das Zusammennehmen solcher gemischter Patientengruppen rechtfertigen. Die Ausgangsbasis ist dabei „verhaltenstherapeutischer Art“, wobei von dieser Perspektive aus gesehen Vorgehens- und Modifikationsmöglichkeiten untersucht werden, welche die Literatur für Patienten mit Verhaltensabweichungen bietet, die durch eine angenommene Hirnbeschädigung entstanden sind, unabhängig davon ob diese Schädigung angeboren ist oder später erworben wurde. Die Ergebnisse dieser Neuorientierung können wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Mehrere Autoren betonen die Notwendigkeit, Verhaltensdefizite in verschiedenen „Situationen“ wie die prämorbid-klinische-Nachbehandlungssituation und die der häuslichen Umgebung zu untersuchen. Die Untersuchung von Verhaltensdefiziten in der klinischen Situation sollte grundsätzlich nach zwei Verfahren ablaufen und zwar durch standardisierte Testverfahren und Verhaltensbeobachtungsskalen. Sowohl für das Testverfahren, als auch die Verhaltensbeobachtung werden verschiedene Modelle miteinander verglichen. Was die klinische Testsituation angeht findet die „Structure of Intellect von Guilford“ die meiste Unterstützung. Was die Verhaltensbeobachtung angeht scheint die „Progress Assessment Chart von Gunzberg“ die meisten Perspektiven zu bieten.
2. Um einen Eindruck bezüglich der Untersuchungen von „Verhaltensbehinderungen“ zu erhalten, werden die Beobachtungskriterien einer Reihe von Autoren miteinander und mit der in dieser Studie entwickelten Verhaltensbeobachtungsskala (GOCC) verglichen. Dabei stellt sich heraus, daß die GOCC dem Problemverhalten von Patienten mit einer Hirnquetschung und von Patienten mit anderen Hirnbeschädigungen am umfassendsten gerecht wird.
3. Bei einer Vielzahl der Veröffentlichungen können bei den Bemühungen, Verhaltensdefizite zu modifizieren, lerntheoretische und vor allem operante Konditionierungsgrundsätze festgestellt werden. Es stellt sich heraus, daß diese Grundsätze durch die Vertreter verschiedener Disziplinen – immer unter anderen Bezeichnungen und in verschiedenen Kombinationsformen – verwendet werden.
4. Schließlich besteht die vielleicht wesentlichste Erkenntnis darin, daß extremes, unerwünschtes Verhalten, das Verhaltensaufbau behindert, nicht oder kaum in den heutigen Rehabilitationszentren in unserem Lande reduziert oder beseitigt werden kann. Aufgrund der Ergebnisse im Ausland wissen wir jedoch, daß es durchaus möglich ist, auch dieses exzessive Verhalten zu reduzieren, wenn auch nur mit ausgebildeten Fachkräften in speziell eingerichteten Institutionen.

In Kapitel 5 wird versucht die Information, die aus dem Literaturstudium gewonnen wurde, mit den Praxiserfahrungen zu kombinieren. Wenn man in der Praxissituation vorläufig vom theoretischen Hindernis bezüglich der Relation „Gehirn-Verhalten“ absieht, aber sich – in Erwartung weiterer Entwicklungen auf diesem Gebiet – an der „input-output“ Relation orientieren könnte, scheinen Ansätze zu einer ü-

bersichtlichen Vorgehensweise möglich. Durch den Versuch, die Reizsituation und die damit in Zusammenhang stehende Reaktion näher aufzuschlüsseln, anhand von Verhaltensbeobachtungsskalen in der Kombination mit damit in Zusammenhang gebrachten standardisierten Testuntersuchungen, erhält man Informationen über komplex zusammengestelltes und dazu in Beziehung stehendes einfaches Verhalten. Diese Vorgehensweise eröffnet die Möglichkeit festgestellte Verhaltensdefizite aus zwei verschiedenen aufeinander abzustimmenden Perspektiven anzugehen. Außerdem scheint diese Methode Möglichkeiten zur dringend erwünschten Forschung in diesem Bereich zu bieten.

Die Praxiserfahrung und das Literaturstudium hat ergeben, daß man bezüglich der Modifikation eine ähnliche Situation feststellen kann. Der Versuch, Verhaltensdefizite auszugleichen, kann – so hat sich ergeben – von den verschiedenen theoretischen Konstruktionen bezüglich der Relation „Gehirn-Verhalten“ losgelöst werden. Wenn man untersucht, was in der Praxis in Bezug auf die aktuellen Handlungssequenzen geschieht, so sind diese auf Verhaltenswiederherstellung, Verhaltenskompensation und Verhaltensreorganisation zurückzuführen.

Die Zielsetzung dieser Studie ist im Grunde die Konkretisierung des Rehabilitations-Lernprozesses.

Unter einem Rehabilitations-Lernprozeß wird tatsächlich verstanden, daß das medizinische, paramedizinische Handeln nicht an Wert einzubüßen braucht, aber daß genau so viele Möglichkeiten gegeben werden, um auch das „lernen“ mit seinen vielen Aspekten, in die Gesamtheit der rehabilitativen Aktivitäten einzubeziehen. Daß eine Person lernt, es sei an dieser Stelle betont, ist nicht immer eine selbstverständliche Angelegenheit. Lernen ist eine implizite Rehabilitationsvoraussetzung und deshalb ist es notwendig, der Schaffung von Umständen, welche das Lernen neuen Verhaltens ermöglichen, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Bei Patienten, die beim lernen gehemmt sind, sollten sich die Bemühungen zunächst auf die Reduzierung von „Verhaltensbehinderungen“ konzentrieren. Wenn dies nicht oder nicht ausreichend innerhalb des Rehabilitationszentrums erfolgen kann, sollte außerhalb des Zentrums nach Möglichkeiten, die vorliegenden Methoden anzuwenden, gesucht werden. Nach der Reduzierung exzessiven Verhaltens kann dann versucht werden im Rehabilitationszentrum ein neues Verhalten aufzubauen. Die permanente Wechselwirkung und Integration zwischen dem sogenannten „Krankheitsmodell“ und dem „Lernmodell“ sollte und könnte im Rehabilitations-Lernprozeß ihre Chance erhalten. Um dies zu konkretisieren wird im letzten Teil des 5. Kapitels der Anwendung des „medizinischen-Lernmodells“ in der Praxis des Rehabilitationszentrums besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ein Rehabilitationszentrum ist naturgemäß zur Integration von Theorie und Praxis in diesem Bereich prädestiniert.

Eine Ergänzung und Unterstützung des üblichen rehabilitationsmedizinischen Handelns durch Lerntheorie und verhaltenstherapeutische Praxis bietet Rehabilitationsmöglichkeiten für eine erhebliche Zahl von Patienten mit Hirnschädigungen und wahrscheinlich ebenso für andere Patienten mit Verhaltensabweichungen, die bisher als nicht rehabilitationsfähig abgeschrieben wurden.

Es war das Ziel dieser Studie, zu Entwicklungen in diese Richtung beizutragen.

6.3. Résumé.

Cette étude est le résultat d'une expérience d'environ cinq années au sein d'un centre de rééducation, où on s'occupait principalement d'handicapés cérébraux, et plus spécialement de malades à lésion cérébrale.

Pendant ces cinq années il y a eu collaboration entre médecins et psychologues d'une part et rééducateurs d'autre part. Le personnel médico-psychologique a dû faire l'expérience des nombreuses possibilités, à côté des nombreuses limites, qu'offre la rééducation par le fait qu'elle est encore à une phase débutante de son développement. Font partie de ces possibilités: le développement et l'adaptation des acquis de la théorie de l'apprentissage. Pour cela une collaboration entre un grand nombre de disciplines est nécessaire, lesquelles sont confrontées avec le devoir extrêmement complexe de donner une réponse ou une réponse partielle au sujet du traitement des malades souffrant de lésion cérébrale.

Le développement des idées de la théorie de l'apprentissage servant de modèles de travail et de réflexion pour le traitement des handicapés cérébraux se présente comme suit:

Dans le chapitre 1 on a esquissé en manière d'introduction la situation qui a permis cette étude. En se fondant sur l'idée que du moins une partie de la rééducation implique „nouvelle forme de comportement” et par conséquent „apprentissage”, ce „nouvel apprentissage du comportement” est considéré comme un des piliers sur lesquels la rééducation devrait s'appuyer. L'utilisation des principes d'apprentissage dans leur application au domaine de la rééducation, suppose une connaissance fondamentale de la théorie.

On traite de la façon dont les divers paradigmes d'apprentissage s'appliquent à la rééducation, mais que concrètement, également à partir de considérations pragmatiques, on préfère en ce moment le paradigme d'apprentissage actif, comme modèle d'explication et de traitement. Dans cette optique on regarde dans quelle mesure les différentes phases du processus de rééducation peuvent être également approchées et expliquées par le paradigme actif. Le premier chapitre se conclut par le prolongement des conséquences de ce paradigme; en ce qui concerne les applications pratiques de l'activité de rééducation en général, à ce qu'on appelle „le modèle d'apprentissage de rééducation”.

Après l'introduction de la théorie de l'apprentissage dans la rééducation, le chapitre 2 porte sur le groupe de patients souffrant de lésion cérébrale.

On y vérifie dans quelle mesure il est possible de préciser plus avant la problématique de ce groupe de patients à partir d'un cadre de „comportement”.

Sur la base d'informations à partir du „statut”, on considère quelles expressions sont utilisées par les membres de l'équipe, pour indiquer le comportement du patient. Cette analyse du contenu des dossiers conduit à distinguer:

- A. **Les déficits du comportement**, déterminés dans une situation-test standardisée, mais également à l'aide d'observations de comportement non structurées. En général il s'agit du comportement sur lequel portent, du point de vue de la rééducation, les divers programmes de formation du comportement. On tente de supprimer ou de compenser les déficits du comportement.
- B. **Le comportement excessif**, lequel bloque ces tentatives pour une nouvelle formation du comportement ou sa compensation, en bref appelé „inhibitions du comportement”. En général il s'agit du comportement qui, lorsqu'il dure trop

longtemps, amène à renvoyer le patient du centre de rééducation. Le patient est alors souvent décrit comme non rééducatable.

Pour ces deux sortes de déviations du comportement on a mis au point des procédés d'évaluation:

1. La réunion d'un certain nombre de méthodes d'investigation psychologique (tests), afin de mesurer au moins une partie des différents déficits du comportement.
2. La construction d'une échelle provisoire d'évaluation, spécialement destinée à signaler les inhibitions du comportement: L'échelle d'observation du comportement de la lésion cérébrale, communément appelée GOCC (Gedrags Observatieschaal van Contusio Cerebri).

Aussi en partant de la théorie de l'apprentissage on distingue le comportement excessif et les déficits du comportement, de sorte qu'on peut faire la jonction entre la théorie et la pratique. L'évaluation des excès et des déficits dans le comportement des patients trouve donc un appui dans la théorie comme dans la pratique.

En ce qui concerne le comportement excessif, la théorie de l'apprentissage présente la méthode de la validation différentielle pour réduire le comportement à problèmes.

En ce qui concerne les déficits du comportement la théorie de l'apprentissage cite trois méthodes ayant toutes comme but de réaliser un répertoire de comportement nouveau et meilleur, c'est-à-dire une validation sélective en ce qui concerne l'augmentation du comportement déjà existant, des procédés pour former un comportement totalement nouveau et une atténuation pour réaliser une préservation du comportement avec l'augmentation de la complexité des stimuli.

Tous ces procédés ont comme caractéristiques communes l'extinction du comportement inadéquat et la validation du comportement souhaité.

Les procédés d'évaluation développés et les techniques de modification tirées de la théorie de l'apprentissage forment ensemble la „stratégie provisoire de rééducation". Bien que cette stratégie provisoire de rééducation porte dans cette étude seulement sur ce qu'on appelle la phase clinique, il faut insister que l'idéal serait que le milieu familial puisse participer explicitement au traitement. Afin de créer une bonne intégration et consolidation du comportement nouvellement appris et réduit, ces stratégies ne doivent pas se limiter en plus à la phase clinique, mais ont besoin d'être poursuivies et complétées dans le milieu familial. On estime que la structure théorique de cette façon multiple d'aborder la question ne s'applique pas seulement aux patients ayant des traumatismes cérébraux. La possibilité de servir de modèle à des domaines plus vastes et à d'autres groupes de patients dans la rééducation semble bien exister.

La stratégie provisoire de rééducation décrite présente des points communs en ce qui concerne la conception et la réalisation de divers programmes de rééducation. Afin d'essayer ces programmes de façon empirique, on s'intéresse tout d'abord dans le chapitre 3 au schéma expérimental concernant l'exécution et l'évaluation de cette stratégie de rééducation. Etant donné qu'il s'agit ici d'une stratégie expérimentale avec des conséquences importantes possibles pour l'évolution ultérieure, on a porté une attention particulière à l'évaluation. Aussi bien la réduction du comportement excessif que la formation d'un nouveau comportement sont soumises à une triple évaluation:

1. Evaluation des problèmes, portant sur le comportement à problèmes constatés et l'éventuelle augmentation ou diminution de ce comportement si la situation est considérée avant et après le traitement.
2. L'évaluation des résultats, constituée par les scores dans l'échelle d'observation

du comportement mise au point et la réunion des investigations psychologiques, avant et après le traitement.

3. Evaluation des processus, portant sur le comportement visé, souvent le comportement qui est incompatible avec le comportement à problèmes, où l'établissement des scores peut être effectué grâce à une observation et un enregistrement presque continu pendant le traitement.

Etant donné qu'une partie importante des procédés d'évaluation est basée sur le GOCC, cette échelle est soumise à un traitement statistique, pour déterminer la fiabilité des inter- et intra-juges. Sur la base des résultats on peut conclure que le GOCC, en tant qu'échelle d'observation du comportement, constitue en ce qui concerne la composition du sujet et la structure de l'échelle, un instrument de mesure assez fiable pour évaluer les déviations du comportement chez les patients souffrant d'une lésion cérébrale.

L'évaluation des modifications du comportement porte tout d'abord sur le résultat des techniques concernant la réduction du comportement excessif, la formation du nouveau comportement et l'augmentation du comportement déjà existant. La signification qu'on peut attribuer à la mise à l'épreuve de ces techniques est limitée par le fait qu'aucun groupe de contrôle n'a pu être constitué et d'autre part par le fait que le groupe expérimental n'a pas pu être constitué selon les principes du hasard. Le comportement à problèmes comportant le comportement excessif, l'absence de comportement et la faible intensité du comportement existant, diminue chez les patients traités d'environ 85%, en calculant par rapport à la valeur de départ. Le comportement visé, comportant la réduction du comportement excessif, la formation du nouveau comportement et l'augmentation de l'intensité du comportement existant, est réalisé chez la plupart des malades en 6 semaines environ.

L'évaluation des résultats ne s'exprime pas pour les méthodes citées dans le changement des scores de l'investigation psychologique. Par contre les scores du GOCC présentent une nette amélioration si ces scores sont comparés avant et après le traitement.

L'évaluation des modifications du comportement portant sur la préservation du comportement sous augmentation de la complexité des stimuli mérite d'être traitée séparément, étant donné que pour cette stratégie on a pu cette fois former un groupe expérimental ainsi qu'un groupe de contrôle. Ici aussi d'ailleurs le groupe expérimental et le groupe de contrôle n'ont pas pu être constitués au hasard. Le comportement à problèmes comporte pour les deux groupes des déficiences de concentration et de mémoire assez considérables, déterminées grâce aux procédés d'investigation psychologique mis au point. Le groupe expérimental a subi un traitement d'environ 6 mois, comportant la présentation de stimuli de complexité croissante. Cette approche peut être ramenée au principe du „fading” (de l'atténuation) de la théorie de l'apprentissage, centré sur la diminution progressive de la facilité de stimuli. La conservation d'une mémoire adéquate et/ou d'une réponse au niveau de la concentration avec l'augmentation de la complexité des stimuli pourrait alors être attribuée à une amélioration du comportement de la mémoire et/ou de la concentration pendant les situations de l'entraînement. Le groupe de contrôle était composé de patients ayant présenté un mois avant leur renvoi de très nets troubles de la mémoire et/ou de la concentration. Ce groupe a été convoqué cinq mois après leur renvoi pour un examen de contrôle. La conclusion générale qu'on peut tirer de cette recherche est que les résultats des *tests* concernant la mémoire et la concentration grâce à l'entraînement décrit dans cette étude, montrent une nette amélioration, contrairement aux personnes qui n'ont pas subi

cet entraînement. La question de savoir si „la mémoire” et „la concentration” sont également influencées dans un sens favorable en dehors du cadre de la recherche, exige une étude plus approfondie.

Après la mise à l'épreuve des principes de la théorie de l'apprentissage dans le traitement des patients souffrant de lésion cérébrale, le chapitre 4 rend compte d'une étude de la littérature pour déterminer la suite de l'évolution. Bien qu'on ait tout d'abord essayé de baser les informations rassemblées sur les patients ayant une lésion cérébrale, il s'est avéré peu à peu que les publications concernant cette catégorie de patients étaient extrêmement limitées. Par conséquent on a étendu l'étude de la littérature aux diverses catégories d'handicapés cérébraux, c'est-à-dire les patients ayant des troubles de l'hémisphère droite ou gauche, des combinaisons des deux, un „minimal brain damage”, les patients paralysés cérébraux et les retardés mentaux. Les arguments allégués justifient l'assemblage d'un groupe de patients ainsi mêlés. Le cadre de référence est ici „la psychologie du comportement”, tout en s'attachant dans cette optique aux possibilités d'évaluation et de modification, présentées dans la littérature chez les patients présentant des déviations du comportement à la suite d'une atteinte cérébrale supposée, indépendamment du fait que cette déficience soit la conséquence d'une atteinte congénitale ou acquise.

Les résultats de cette réorientation peuvent être résumés de la façon suivante:

1. Différents auteurs accentuent la nécessité d'évaluer les déficits du comportement dans diverses „situations” comme la situation „prémorbide”, clinique, de post-traitement et à la maison. L'évaluation des déficits du comportement dans la situation clinique devrait se faire en principe selon deux procédés, c'est-à-dire à l'aide de tests standardisés et à l'aide d'échelles d'observation du comportement. Pour le procédé par tests comme pour l'observation du comportement on compare différents modèles. En ce qui concerne la „situation” de test clinique, la „Structure of Intellect de Guilford” a l'appui le plus empirique. En ce qui concerne l'observation du comportement le „Progress Assessment Chart de Gunzberg” s'avère offrir le plus de perspectives.
2. Afin de se faire une impression concernant l'évaluation des inhibitions du comportement, les critères d'observation d'un certain nombre d'auteurs sont comparés entre eux ainsi qu'avec l'échelle d'observation du comportement développée dans cette étude (GOCC). Il en ressort que le GOCC domine au mieux le comportement à problèmes des patients souffrant de lésion cérébrale et des autres handicapés cérébraux.
3. Dans un grand nombre de publications on reconnaît dans les tentatives de modification des déficits du comportement des principes de conditionnement selon la théorie de l'apprentissage et essentiellement actifs. Ceux-ci s'avèrent être utilisés par les membres de diverses disciplines, à chaque fois sous d'autres termes, et dans différentes formes de combinaisons.
4. Enfin la constatation la plus importante est peut-être le fait qu'un comportement indésirable, extrême, qui empêche la formation d'un comportement ne peut pas ou à peine être réduit ou éliminé dans les centres de rééducation actuels ici dans notre pays. Etant donné les résultats ailleurs il semble toutefois parfaitement possible de réduire également ce comportement excessif, mais seulement avec du personnel entraîné dans des instituts aux structures spécifiques.

Dans le chapitre 5 on essaie d'intégrer l'information sélectionnée à partir de la littérature avec les expériences de la pratique. Si, en travaillant dans la pratique, on veut éliminer provisoirement l'obstacle théorique, concernant la relation „cerveau-

comportement", et si on pouvait s'orienter, dans l'attente des développements ultérieurs dans ce domaine, vers la relation „input-output", la mise en marche d'une *évaluation* claire semble possible. En tentant de spécifier plus avant les stimuli et la réponse qui en résulte à l'aide d'échelles d'observation du comportement, combinées avec une recherche par tests standardisée qui s'y rapporte, on obtient une information concernant le comportement simple constitué de façon complexe et qui y est lié. Cette évaluation donne la possibilité d'approcher les déficits du comportement constatés, à partir de deux angles d'incidence différents à adapter l'un à l'autre. De même elle semble offrir des possibilités pour une recherche très souhaitée dans ce domaine.

Il ressort de la pratique et de l'étude de la littérature, qu'on peut également constater une situation similaire en ce qui concerne la *modification*. La tentative de guérir des déficits du comportement semble pouvoir être découplée des différentes structures théoriques concernant la relation „cerveau-comportement". Si on vérifie ce qui se passe dans la pratique en ce qui concerne les séquences de traitement actuelles, celles-ci peuvent être ramenées à un rétablissement du comportement, une compensation du comportement et une réorganisation du comportement.

Le but final de la présente étude est la concrétisation d'un processus d'apprentissage de rééducation. On entend en fait par processus d'apprentissage de rééducation que l'action médicale et para-médicale n'a pas à y perdre en valeur, mais qu'il y a autant de possibilités d'offertes pour impliquer dans l'ensemble des activités de la rééducation également „l'apprentissage" dans ses nombreux aspects. Le fait qu'une personne apprenne, que ce soit clair ici, n'est pas toujours une chose évidente. Apprendre constitue une condition implicite pour la rééducation et par conséquent il faut s'y intéresser de façon explicite pour créer des circonstances rendant possible cet apprentissage d'un nouveau comportement. Chez les patients chez qui l'apprentissage est bloqué, il faut par conséquent s'attacher d'abord à la réduction des „inhibitions du comportement". Si cela n'est pas ou est insuffisamment réalisable à l'intérieur du centre de rééducation, il faut rechercher à l'extérieur du centre des possibilités permettant de mettre en œuvre les méthodes existantes. Après réduction du comportement excessif, on peut alors essayer d'entreprendre dans le centre de rééducation la formation d'un nouveau comportement. L'interaction continue et l'intégration continue entre ce qu'on appelle le „modèle de maladie" et le „modèle d'apprentissage" semble devoir et pouvoir avoir sa chance dans le processus d'apprentissage de rééducation. Afin de donner une forme plus concrète à ceci, on s'intéresse dans la dernière partie du chapitre 5 à l'application du „modèle d'apprentissage médical" dans la pratique du centre de rééducation. Un centre de rééducation se prête par essence et par excellence à l'intégration de la théorie et de la pratique dans celui-ci.

Le fait de compléter et de soutenir l'action médicale de rééducation courante à partir de la théorie de l'apprentissage et la praxis de la thérapeutique du comportement, offre des possibilités de rééducation pour un groupe important de patients souffrant de troubles cérébraux et probablement également pour d'autres patients ayant des déviations du comportement, lesquelles ont été classés jusque là comme intraitables.

C'était le but de cette étude de contribuer aux développements dans cette direction.

6.4 Samenvatting

Deze studie is het resultaat van een circa vijfjarige ervaring binnen een revalidatie-centrum, waarin hoofdzakelijk bemoeienis bestond met cerebraal gestoorde patiënten en met name patiënten met contusio cerebri. In deze vijf jaren vond een ontmoeting plaats tussen medewerkers vanuit de medische psychologie enerzijds en vanuit de revalidatie anderzijds. De werkers vanuit medisch-psychologisch denk-kader hebben hierbij ervaren dat het revalidatiegebeuren vanwege de daaraan eigen jeugdige ontwikkelingsfase, naast vele beperkingen ook vele mogelijkheden biedt. Tot deze mogelijkheden behoort de ontwikkeling en toepassing van leertheoretische verworvenheden. Daartoe is een samenwerking nodig tussen een veelheid aan disciplines, die gekonfronteerd worden met de uitermate complexe opgave een antwoord of deelantwoord te geven inzake de behandeling van patiënten met contusio cerebri.

De ontwikkeling van leertheoretische ideeën tot denk- en werkmodellen ten behoeve van de behandeling van cerebraal gestoorde is als volgt weergegeven:

In hoofdstuk 1 wordt als introductie een schets gegeven van de situatie van waaruit deze studie kon ontstaan. Op grond van de gedachte, dat althans een deel der revalidatie „nieuwe gedragsvorming” en derhalve „leren” impliceert, wordt dit „opnieuw leren van gedrag” als een der pijlers gezien waarop revalidatie zou moeten berusten. Bij de behandeling van leerprincipes in hun toepassing op het gebied van de revalidatie wordt een basiskennis inzake leertheorie voorondersteld. Besproken wordt hoe diverse leerparadigmata in de revalidatie toepasbaar zijn, maar dat in concreto, mede vanuit pragmatische overwegingen, op dit moment de voorkeur wordt gegeven aan het operante leerparadigma als verklarings- en behandelingsmodel. Vanuit deze optiek wordt gezien in hoeverre de diverse fasen in het revalidatiegebeuren eveneens benaderd en verklaard kunnen worden door het operante paradigma. Het eerste hoofdstuk wordt besloten met het doortrekken van de konsekwenties van dit paradigma wat betreft de praktische toepassingen van het revaliderend handelen in het algemeen tot het zo genoemde „revalidatie-leermodel”.

Na de introductie van de leertheorie in de revalidatie richt hoofdstuk 2 zich op de groep van patiënten met contusio cerebri.

Er wordt nagegaan in hoeverre het mogelijk is de problematiek van deze patiëntengroep vanuit een „gedrags”kader nader te preciseren.

Op basis van informatie vanuit de „status” wordt gezien welke uitspraken er door teamleden worden gebezigd, teneinde het gedrag van de patiënt aan te geven. Deze inhoudsanalyse van de statussen leidt tot het onderscheid in:

- A. **Gedragstekorten**, vastgesteld in een gestandaardiseerde testsituatie maar ook wel door middel van niet gestructureerde gedragsobservaties. Over het algemeen is dit het gedrag waarop vanuit revalidatiestandpunt diverse gedragsvormende programma's worden gericht. Er wordt getracht de gedragstekorten op te heffen of te compenseren.
- B. **Excessief gedrag**, dat deze pogingen tot nieuwe gedragsvorming of compensatie hiervan blokkeert, in het kort „gedragsbelemmeringen” genoemd. Over het algemeen is het gedrag dat, bij langdurig voortbestaan, aanleiding geeft de patiënt uit het revalidatiecentrum te ontslaan. De patiënt wordt dan vaak als niet revalideerbaar omschreven.

Voor beide soorten van gedragsdeviaties worden assessmentprocedures ontwikkeld:

- 1e. De samenvoeging van een aantal psychologische onderzoeksmethoden (tests) om althans een deel van de diverse gedragstekorten te meten.
- 2e. De konstruktie van een voorlopige assessmentschaal welke met name bedoeld is om gedragsbelemmeringen te signaleren: De gedragsobservatieschaal van contusio cerebri, in de wandeling GOCC genoemd.

Ook vanuit de leertheorie wordt onderscheid gemaakt in excessief gedrag en gedragstekorten zodat een aansluiting tussen theorie en praktijk gelegd kan worden. De assessment naar excessen en tekorten in het gedrag van patiënten vindt aldus vanuit theorie en praktijk ondersteuning. Ten aanzien van excessief gedrag presenteert de leertheorie de methodiek van differentiële bekrachtiging ter reductie van het probleemgedrag. Ten aanzien van gedragstekorten noemt de leertheorie een drietal methodieken welke alle ten doel hebben een nieuw of beter gedragsrepertoire te realiseren; nl. selectieve bekrachtiging inzake toename van reeds bestaand gedrag, shapingsprocedures voor de vorming van totaal nieuw gedrag en fading ter bewerkstelling van gedragsbehoud onder toenemende stimuluscomplexiteit. Alle procedures hebben als gemeenschappelijke kenmerken de extinktie van adequaat gedrag en de bekrachtiging van gewenst gedrag.

De ontwikkelde assessmentprocedures en de uit de leertheorie betrokken modifikatietechnieken vormen tezamen de „voorlopige revalidatiestrategie”. Hoewel deze voorlopige revalidatiestrategie in deze studie slechts betrekking heeft op de zogenaamde klinische fase, moet wel worden benadrukt, dat idealiter het thuismilieu expliciet zou moeten kunnen participeren in de behandeling. Teneinde een goede integratie en konsolidatie van nieuw aangeleerd of gereduceerd gedrag te doen ontstaan, dienen deze strategieën bovendien niet beperkt te blijven tot de klinische fase, maar behoeven zij een voortzetting en aanvulling in het thuismilieu. De theoretische konstruktie van deze meervoudige aanpak wordt niet slechts toepasbaar geacht voor patiënten met cerebrale traumata. De mogelijkheid dat zij model zou kunnen staan voor bredere gebieden en andere patiëntengroepen in de revalidatie lijkt zeer wel aanwezig.

De beschreven voorlopige revalidatiestrategie biedt aanknopingspunten wat betreft het ontwerpen en realiseren van diverse revalidatieprogramma's. Teneinde deze programma's empirisch te toetsen wordt in hoofdstuk 3 in eerste instantie aandacht besteed aan het experimenteel design inzake uitvoering en evaluatie van deze revalidatiestrategie. Aangezien het hier om een experimentele strategie gaat met mogelijk verreikende konsekwenties voor latere ontwikkelingen, is extra aandacht besteed aan de evaluatie. Zowel de reductie van excessief gedrag alsook de vorming van nieuw gedrag worden aan een drievoudige assessment onderworpen:

- 1e. Probleemassessment, gericht op het gekonstateerde probleemgedrag en de eventuele toe- of afname van dit gedrag, indien de situatie vóór en na de behandeling wordt gezien.
- 2e. Effekassessment, gevormd door de scores op de ontwikkelde gedragsobservatieschaal en het samengevoegde psychologisch onderzoek, vóór en na de behandeling.
- 3e. Processassessment, gericht op het doelgedrag, veelal het gedrag dat incompatibel is met het probleemgedrag, waarbij de scoring tot stand komt door een vrijwel continue observatie en registratie tijdens de behandeling.

Aangezien een belangrijk deel der assessmentprocedure gebaseerd is op de GOCC, wordt deze schaal ter bepaling van de inter- en intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid aan een statistische bewerking onderworpen. Op grond van de resultaten kan gekonkludeerd worden, dat de GOCC als gedragsobservatieschaal wat betreft item-samenstelling en schaalconstructie, een redelijk betrouwbaar meetinstrument is ter assessment van gedragsdeviaties bij patiënten met contusio cerebri.

De evaluatie der gedragsmodifikaties is in eerste instantie gericht op het effect der technieken inzake de reductie van excessief gedrag, de vorming van nieuw gedrag en de toename van reeds aanwezig gedrag. De betekenis die aan de toetsing van deze technieken is toe te kennen wordt beperkt doordat geen controlegroep kon worden gevormd en bovendien de experimentele groep niet volgens randomisatie-principes kon worden samengesteld. Het probleemgedrag, bestaande uit excessief gedrag, afwezigheid van gedrag en lage intensiteit van bestaand gedrag, neemt bij de behandelde patiënten af met circa 85 procent gerekend ten opzichte van de beginwaarde. Het doelgedrag, bestaande uit reductie van excessief gedrag, vorming van nieuw gedrag en toename der intensiteit van bestaand gedrag wordt bij het merendeel der patiënten in circa 6 weken gerealiseerd. De effectassessment komt bij genoemde methodieken niet tot uiting in verandering der scores in het psychologisch onderzoek. Daarentegen tonen de GOCC-scores een duidelijke verbetering indien de scores vóór en na de behandeling worden vergeleken.

De evaluatie der gedragsmodifikaties gericht op gedragsbehoud onder toename van stimuluscomplexiteit verdient een aparte behandeling aangezien bij deze strategie wel een experimentele- en controlegroep kon worden gevormd. Ook hier kon overigens de experimentele en controlegroep niet at random worden samengesteld. Het probleemgedrag bestaat voor beide groepen uit vrij aanzienlijke geheugen- en concentratiedefecten vastgesteld door middel van de samengestelde psychologische onderzoekprocedure. De experimentele groep kreeg een behandeling van circa 6 maanden welke bestond uit het aanbieden van stimuli in toenemende complexiteit. Deze benadering kan herleid worden tot het leertheoretische „fading”-principe, waarin geleidelijke vermindering van stimulusfacilitatie centraal staat. Het behoud van een adequate geheugen- en/of concentratierepons onder toenemende stimuluscomplexiteit zou dan toegeschreven kunnen worden aan een verbetering van geheugen- en/of concentratiegedrag tijdens de trainingssituaties. De controlegroep werd samengesteld uit patiënten die een maand voor ontslag duidelijke geheugen- en/of concentratiestoornissen toonden. Deze groep werd 5 maanden na ontslag opgeroepen voor een herhalingsonderzoek. De algemene konklusie die uit het onderzoek kan worden getrokken is dat de *test*prestaties inzake geheugen en concentratie van patiënten die aan de in deze studie beschreven training deelnamen een duidelijke verbetering vertonen in vergelijking met die personen welke deze training niet ondergingen. De vraag of „het geheugen” en „de concentratie” buiten de onderzoeksituatie ook in gunstige zin worden beïnvloed vergt voortgezet onderzoek.

Na de toetsing van toepassingen der leertheoretische principes in de behandeling van patiënten met contusio cerebri geeft hoofdstuk 4 verslag van een literatuurstudie ter verdere koersbepaling. Hoewel in eerste instantie getracht werd de informatieverzameling te baseren op de patiënten met contusio cerebri, bleek gaandeweg dat publikaties inzake deze categorie patiënten uitermate beperkt waren. Derhalve werd de literatuurstudie uitgebreid tot verscheidene categorieën van cerebraal gestoorden, namelijk patiënten met rechter- of linker-hemisfeerstoornissen, combinaties hiervan, „minimal brain damage”, cerebral palsy patiënten en

mentaal geretardeerden. Er worden argumenten aangevoerd die het samenvoegen van een dergelijk gemêleerde patiëntengroep rechtvaardigen. Het referentiekader is hierbij „gedragspsychologie”, waarbij vanuit deze optiek gelet wordt op assessment- en modificatiemogelijkheden, die vanuit de literatuur gepresenteerd worden bij patiënten die gedragsdeviaties tonen tengevolge van een veronderstelde cerebrale aandoening, onafhankelijk of dit defekt het gevolg is van aangeboren of verworven aandoening.

De resultaten van deze heroriëntatie kunnen als volgt worden samengevat:

1e. Verscheidene auteurs beklemtonen de noodzaak tot assessment van gedragstekorten in diverse „situaties” zoals de premorbide, klinische, nabehandelings-, en thuissituatie. De assessment naar gedragstekorten in de klinische situatie zou in principe volgens twee procedures moeten geschieden nl. d.m.v. gestandaardiseerde testprocedures en gedragsobservatieschalen. Zowel voor de testprocedure en gedragsobservatie worden diverse modellen met elkaar vergeleken. Wat betreft de klinische testsituatie heeft de „Structure of Intellect van Guilford” de meeste empirische ondersteuning. Ten aanzien van de gedragsobservatie blijkt de „Progress Assessment Chart van Gunzberg” het meeste perspectief te bieden.

2e. Teneinde een indruk te verkrijgen inzake de assessment van gedragsbelemmeringen worden de observatiecriteria van een aantal auteurs met elkaar en met de in deze studie ontwikkelde gedragsobservatieschaal (GOCC) vergeleken. Hieruit blijkt dat de GOCC het probleemgedrag van patiënten met contusio cerebri en van anderszins cerebraal gestoorden het meest volledig bestrijkt.

3e. In een groot aantal publikaties kunnen bij de pogingen tot modificatie van gedragstekorten, leertheoretische en met name operante konditioneringsprincipes worden herkend. Deze blijken door de leden van diverse disciplines, steeds onder andere bewoordingen, en in diverse combinatievormen, gehanteerd te worden.

4e. Tenslotte is wellicht de belangrijkste bevinding dat extreem, ongewenst gedrag dat gedragsvorming belemmert niet of nauwelijks gereduceerd of geëlimineerd kan worden in de huidige revalidatiecentra hier te lande. Gegeven de resultaten elders blijkt het echter wel degelijk mogelijk ook dit excessief gedrag te reduceren, zij het alleen met getraind personeel in specifiek gestructureerde instituten.

In hoofdstuk 5 wordt getracht de informatie uit de literatuur te integreren met de praktijkervaringen. Indien men, werkende in een praktijksituatie, voorlopig wil afzien van het theoretische obstakel inzake de relatie „hersenen-gedrag”, maar zich – in afwachting van verdere ontwikkelingen op dit gebied – zou kunnen oriënteren op de „input-output”-relatie dan lijkt er een aanzet tot een overzichtelijke *assessment* mogelijk. Door een poging de stimulussituatie en de resulterende respons nader te specificeren aan de hand van gedragsobservatieschalen, in combinatie met hiermee in verband gebracht gestandaardiseerd testonderzoek, krijgt men informatie omtrent complex samengesteld en hiermee gerelateerd enkelvoudig gedrag.

Deze assessment verschaft de mogelijkheid gekonstateerde gedragstekorten vanuit twee verschillende op elkaar af te stemmen invalshoeken te benaderen. Tevens lijkt zij mogelijkheden te bieden voor zeer gewenste research op dit gebied.

Vanuit praktijk en literatuurstudie blijkt dat ook ten aanzien van de *modificatie* een soortgelijke situatie kan worden gekonstateerd. De poging om gedragstekorten te herstellen blijkt losgekoppeld te kunnen worden van de diverse theoretische konstrukties inzake de relatie „hersenen-gedrag”. Indien men nagaat wat er in de praktijk gebeurt wat betreft de actuele handelingssekwenties, dan zijn deze te herleiden tot gedragsrestauratie, gedragskompensatie en gedragsreorganisatie.

De uiteindelijke doelstelling van deze studie is de konkretisering van een revalidatie-leerproces. Met een revalidatie-leerproces wordt in feite bedoeld, dat het medisch-paramedisch handelen niet in waarde behoeft in te boeten, maar dat evenveel mogelijkheden worden gegeven om in het totaal der revalidatie-activiteiten ook het „leren” in zijn vele aspecten te betrekken. Dat een persoon leert, het zij hier duidelijk gesteld, is niet altijd een vanzelfsprekende zaak. Leren is een impliciete voorwaarde ter revalidatie en derhalve dient expliciet aandacht te worden besteed aan het scheppen van omstandigheden die dit leren van nieuw gedrag mogelijk maken. Bij patiënten waar het leren geblokkeerd wordt, dient derhalve eerst aandacht te worden besteed aan de reductie van „gedragsbelemmeringen”. Indien dit niet of onvoldoende te realiseren valt binnen het revalidatiecentrum dan moet buiten het centrum naar mogelijkheden gezocht worden om de voorhanden liggende methodieken aan te wenden. Na de reductie van het excessieve gedrag kan dan getracht worden in het revalidatiecentrum de vorming van nieuw gedrag te ondernemen. De voortdurende wisselwerking en integratie tussen het zogenaamde „ziektemodel” en „leermodel” lijkt in het revalidatie-leerproces zijn kans te moeten en kunnen krijgen. Teneinde hieraan meer concreet gestalte te geven wordt in het laatste deel van hoofdstuk 5 aandacht besteed aan de toepassing van het „medisch-leer-model” in de praktijk van het revalidatiecentrum. Een revalidatiecentrum leent zich uiteraard bij uitstek tot de integratie van theorie en praktijk in deze.

Aanvulling en ondersteuning van het gangbare revalidatiegeneeskundig handelen vanuit de leertheorie en gedragstherapeutische praktijk bieden revalidatiemogelijkheden voor een belangrijke groep patiënten met cerebrale stoornissen en waarschijnlijk eveneens voor andere patiënten met gedragsdeviaties welke tot voorheen als onbehandelbaar werden afgeschreven.

Het was de doelstelling van deze studie bij te dragen tot ontwikkelingen in deze richting.

REFERENCES

- Alabiso F. (1972) - Inhibitory functions of attention in reducing hyperactive behavior. *American Jr. of Mental Deficiency*, 77,3 (p. 259-283).
- Allen K. E., Turner K. E., Everett P. M. (1970) - A behavior modification classroom for Head Start children with problem behaviors. *Exceptional Children*, 37,2 (p. 119-129).
- Allen K. E. (1972) - Julie: a case study. Presented at the third annual conference on behavior analysis in education. University of Kansas. Lawrence, Kansas.
- Anderson N. (1961) - Scales and statistics: parametric and nonparametric. *Psychological Bulltin* LVIII.
- Anderson T. P. (1975) - An alternative frame of reference for rehabilitation. The helping process versus the medical model. *Arch. Phys. Med. Rehab.* 56 (p. 101-104).
- Ansink B. J. J. (1974) - Klinisch lessen. Inhibitie en leerproces. *Ned. Tijdschrift Geneeskunde* 118,35 (p. 1321-1323).
- Asch S. E. (1956) - Studies of the dependence and conformity. A minority of one against a unanimous majority. *Psychol. Monogr.* 76,9 (whole no. 416).
- Ayllon T., Azrin N. H. (1968) - The token economy: A motivational system for therapy and rehabilitation. Appleton - Century - Crofts - New York.
- Ayres J. E. (1974) - Sensory integration and learning disorders. Western Psychological Services, Los Angeles.
- Bakker P. (1974) - Samenvatting der werkzaamheden van de contusio werkgroep. Revalidatie Centrum „Hoensbroeck”. Interne rapportage.
- Bakker P. (1976) - Behandeling van contusio cerebri in de revalidatie. Voordracht gehouden op het colloquium voor revalidatie-artsen en psychologen, Utrecht (in press).
- Bandura A. (1970) - Interpretations of causal processes. In: *Principles of behavior modification* (p. 19-45). Ed. Bandura A. Stanford University, Holt Reinhart and Winston, London.
- Barendregt J. T. (1974) - Klinische psychologie is meer dan therapie bedrijven. *De Psycholoog* IX, 4. (p. 127 - 136).
- Beekers L. J. P. M. (1968) - Afname van handvaardigheidsproeven voor geestelijk zwakbegaafden. Test en trainingsafdeling van de Prinses Wilhelminastichting, Utrecht.
- Benders H (1974) - Reacties n.a.v. „Psychologie in het algemeen ziekenhuis”. *De Psycholoog* X, 8 (p. 402-410).
- Ben Yishay Y. (1970) - The ability to profit from cues as a function of initial competence in normal and brain damaged adults: A replication of previous findings. *Jr. of Abnormal Psychology*, 76, (p. 378-379).
- Berni R., Dressler J., Baxter J. C. (1971) - Reinforcing behavior. *American Journal Nursing*. (p. 2180-2183).
- Berni R., Fordyce W. E. (1973) - Behavior modification and the nursing process. The C. V. Mosby Company, Saint Louis 1973.
- Boeke P. E. (1962) - Psychodiagnostische problemen van de epilepsie. Dissertatie. Groningen, van Gorcum, Assen.
- Boneau G. (1961) - A note on measurement scales and statistical tests. *American Psychologist* XVI.
- Bowes K. B. (1975) - Hyperactivity: Etiology and intervention techniques. *Jr. School Health* 45,4 (p. 195 - 202).
- Bragg J. H. (1975) - Behavior modification: effects on reverse tailor sitting in children with cerebral palsy. *Physical Therapy* 55,8 (p. 860-868).
- Burger A. W. (1966) - De superioriteit van de synthetische beoordelaar. Voordrachtenreeks van de Nederlandse vereniging van psychiaters in dienstverband.
- Burger A. W., de Waard, Wilde (1966) - Graffelschaal. *Psych. inr.*, „Het Groot Graffel” Warnsfeld.
- Burger A. W., Hofman R., Peters N. J., Wolters F. J. (1971) - Warnsveldse aanpassingsschaal voor de verpleegafdeling. „Het Groot Graffel”, Warnsfeld.
- Byou S. W., Peterson R. F., Harris F. R., Allen K. E., Johnson M. S. (1969) - Methodology for experimental studies of young children in natural settings. *The Psychological Record*. 19,2 (p. 177-210).
- Cartwright D., Zander R. (1960) - Group dynamics research and theory. Tavistock, Publications Limited, London.

- Close D. W. (1973) - The use of token reinforcement with trainable mentally retarded in a work activity setting. *Vocational Evaluation and Work Adjustment*, 6,4 (p. 6-13).
- Clemment P. W. (1971) - Please mother I'd rather you did it yourself. Training parents to treat their own children. *Jr. of School Health*, febr. (p. 65-69).
- Cofer C. N., Appley M. (1967) - Toward an unified theory of motivation. In: *Motivation, theory and research* (p. 808-838). Ed: Cofer C. N., Appley M., John Wiley and Sons Inc. New York.
- Cohen H. J., Birch H. G., Taft L. T. - Evaluation of the Doman-Delacto „patterning” method. *Pediatrics* 45 (p. 302-314).
- Cohn R. (1961) - Delaying acquisition of reading and writing disabilities in children: A neurological study. *Archives of Neurology*, 4 (p. 153-164).
- Craft A. (1974) - Children with head injuries. *Special Education: Forward Trends* 1,3 (p. 11-12).
- Cruickshank W. M. (1972) - Buitenbeentjes. Kinderen met hersenbeschadigingen thuis, op school en in de groep. Lemniscaat, Rotterdam.
- Cull J. G., Hardy R. E. (1974) - Behavior modification in rehabilitation settings, applied principles. Charles C. Thomas, Publishers, Springfield.
- Dam F. van (1975) - De psycholoog in het algemeen ziekenhuis. *Psycholoog X*, 7 (p. 349-353) en de *Psycholoog X*, 8 (p. 402-410).
- Daniel C. W. (1973) - The use of token reinforcement with trainable mentally retarded in a work activity setting. *Vocational Ev. and Work Adj.* 6,4 (p. 6-13)
- D'Annunzio A., Steg D. R. (1974) - Effects of individualized learning procedures on children with specific learning disabilities. *Develop. Med. Child. Neurol.* 16 (p. 507-512).
- Deelman B. G. (1970-1) - College diktaat neuropsychologie. Rijks Universiteit Groningen. (niet gepubliceerd).
- Deelman B. G. (1970-2) - Kanttekeningen bij de behandeling van afasie. *Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie*. XXV, 10 (p. 637-648).
- Deese J., Hulse S. H. (1967) - Patterns of reinforcement. In: *The psychology of learning* (p. 142-169). Ed: Deese J., Hulse S. H., Mc. Graw Hill Book Company, New York.
- Diamant J. J., Vermeulen H. W. M. (1976) - „Closed Circuit” benadering van het funktie-revalidatie proces bij psychiatrische patiënten met organische hersenbeschadiging. *De Psycholoog XI*, 5 (p. 215-222).
- Diller L., Weinberg J. (1970) - Evidence for accident prone behavior in hemiplegic patients. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, june (p. 358-363).
- Diller L. (1971) - Cognitive and motor aspects of handicapping conditions in the neurologically impaired. In: *Rehabilitation psychology: proceedings of the national conference in the psychological aspects of disability*, held at the Asilomar Conference Center, Monterey, California. October 25-28, (p. 1-33). American Psychological Ass. Ed: Neff W. S. Washington D. C.
- Diller L. (1976) - A model for cognitive retraining in rehabilitation. *The Clinical Psychologist*. 29,2 (p. 13-25).
- Dollard J., Miller N. E. (1950) - Personality and psychotherapy. An analysis in terms of learning, thinking and culture. Mc. Graw Hill, New York.
- Doman R. J., Spitz E., Zucman E., Delacato C. and Doman G. (1960) - Children with severe brain injuries. *Jr. of the American Medical Associations*, 174 (p. 257 e.v.).
- Drenth J. P. (1966) - De psychologische test. Een inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Van Loghum Slaterus, Arnhem.
- Dumont J. J. (1973) - Leerstoornissen, oorzaken en behandelingsmethoden. Orthoreeks, Lemniscaat, Rotterdam.
- Edmondson B. (1974) - Arguing for a concept of competence. *Mental Retardation*, 12,6 (p. 14-15.)
- Ellis M. J. (1973) - Why people play. Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall.
- Farnhan-Diggory S. (1967) - Symbol and synthesis in experimental „reading”. *Child Development* 38 (p. 221-231).
- Feshbach A., Adelman H., Fuller W. W. (1974) - Early identification of children with high risk of reading failure. *Jr. of Learning Disabilities*. 7, 10 (p. 49-54).

- Fingado (1970) - A thirty day residential training program for retarded children. *Mental Retardation*, dec. (p. 42-45).
- Fokkens W. (1976) - Pleidooi voor een praktische toepassing van leerprincipes in bedrijven. *Intermediair* 12e jaargang, nr. 9 (p. 45-49).
- Fordyce W. E. (1971-1) - Psychological assessment and management. In: *Handbook of rehabilitation and medicine* (chapter 6). Ed: Krusen, Kottke and Elwood, New York.
- Fordyce W. E. (1971-2) - Behavioral methods in rehabilitation. In: *Rehabilitation Psychology* (p. 74-108). Ed: Neff W. S. American Psychological Association Inc. Washington D. C.
- Fordyce W. E., Sand P. L., Trieschman R. B., Fowler R. S. jr (1971) - Behavioral systems analyzed. *Medical Rehabilitation Facilities*, March, April (p. 29-33).
- Fordyce W. E. (1974-1) - Chronische pijn als operant gedrag. Gedeelten uit voordracht gehouden t.b.v. workshop revalidatie psychologen, september 1974. Revalidatie Centrum „Hoensbroeck”. (niet gepubliceerd)
- Fordyce W. E. (1974-2) - Chronische ziekte als operant gedrag. Gedeelten uit lezing t.b.v. workshop revalidatie psychologen, september 1974. Revalidatie Centrum „Hoensbroeck”. (niet gepubliceerd)
- Frostig M. (1968) - Sensory motor development. *Special Education*, 57 (p. 18 e.v.).
- Garber (1971) - Operant procedures to eliminate drooling behavior in a cerebral palsied adolescent. *Develop. Med. Child. Neurol*, 13 (p. 641-644).
- Gassel M. M., Williams (1963) - Visual function in patients with homonymous hemianopia. The contemplation phenomenon; insight and attitude to the defect and visual functional efficiency. *Brain*, 86 (p. 229).
- Geel C.A.A. van (1975) - „De tegenstelling tussen de visie van Pr. Dr. P. Leenhouders over vrijheid en het Behaviorisme”. Skriptie M.O. pedagogiek, Sittard. (niet gepubliceerd).
- Geller J. (1972) - The development of behavior therapy with autistic children: A review. *Jr. Chron. Disease*, 25 (p. 21-31).
- Gibson J.J. en Gibson E.J. (1955) - Perceptual training. *Psychol. Review*, 62 (p. 32)
- Glenn E., Snelbecker E., Mason J. (1970) - Cross discipline comparison of practitioners objectives and strategies concerning braindamage and rehabilitation/ educational planning. Prepublication Draft American Psychological Association Convention, Miami Beach.
- Goffman E. (1961) - Asylums, essays on the social situation of mental patients and other inmates. Anchor Books Double Day and Company Inc., Garden City New York.
- Gold M.W. (1972) - Stimulus factors in skill training of retarded adolescents on a complex assembling task. Acquisition, transfer, retention. *Am. Jr. Mental Deficiency* 76,5 (p. 517-526)
- Gold M.W. (1973-1) - Research in the vocational habilitation of the retarded. The present and the future. In: *International review of research in mental retardation*. Ed: Norman E.R. Academic Press, New York.
- Gold M.W. (1973-2) - Factors affecting production by the retarded. *Mental Retardation* 11,6 (p. 41-45).
- Goodkin R. (1966) - Case studies in behavioral research in rehabilitation. *Perceptual and Motor Skills*. 23 (p. 171-182)
- Graziano A.M. (1975) - Child without tomorrow. *Rehabilitation Literature* 36,5 (p. 151)
- Groot A.D. de (1959) - Wetenschap en leven. Volksuniversiteitsbibliotheek No. 62. De Erven F. Bohn N.V. Haarlem.
- Groot A.D. de (1966) - Methodologie, grondslagen van onderzoek en denken in gedragswetenschappen. Mouton en co 's Gravenhage.
- Guilford J. (1954) - *Psychometric methods* 2d ed. Mc. Graw Hill New York.
- Guilford J.P., Hoepfner R. (1971) - The analysis of intelligence. Mc. Graw Hill series in Psychology, Mc. Graw Hill Book Company, New York.
- Gunzberg H.C. (1973) - Sociale vaardigheden voor geestelijk gehandicapten. Orthoreeks, Lemniscaat, Rotterdam.
- Gunzberg H.C. (1974) - P.A.C. Manual progress assessment chart of social and personal development. Manual 3rd Edition. Sefa Publications L.T.D., Birmingham.
- Haring N.H., Hayden A.H., Allen K.E. (1971) - Programs and projects: Intervention in early childhood. *Educational Technology febr.* (p. 52-61).

- Harris F.A. (1974) - Electronic sensory aids as treatment for cerebral palsied children. *Physical Therapy* 54,4 (p. 354-365).
- Hawryluk A. (1974) - Rehabilitation gain. A new criterion for an old concept. *Rehabilitation Literature* 35, 11 (p. 322-328).
- Hefferline R.F. (1962) - Learning theory and clinical psychology - An eventual symbiosis. In : *Experimental foundations of clinical psychology* (p. 97-128) Ed: Bachrach A.J., Basic Books, Inc. Publishers New York.
- Heystek W. (1975) - Vaardigheidsdiagnostiek en modifikatie. Voordracht gehouden op het colloquium voor revalidatie geneeskunde. Utrecht (in press).
- Hilgard E.R. (1956) - Theories of learning. Appleton Century Crofts. New York.
- Hogg C. (1974) - Early infantile autism. *Canadian Jr. Occ. Ther.* 41, 3 (p. 58-64).
- Holland A.L., Sonderman J.C. (1974) - Effects of a program based on the token test for teaching comprehension skills to aphasics. *Jr. Speech and Hearing Research*. 17,4 (p. 589-598).
- Hollon T.H. (1973) - Behavior modification in a community hospital rehabilitation unit. *Arch. Phys. Med. Rehabil.* 54 (p. 65-68).
- Hooft F. van het (1975) - Schedeltraumata. *De Nederlandse Bibliotheek der Geneeskunde*. Deel 92 (p. 48-73)
- Ibbotson J. (1975) - Psychological effects of physical disability. *British Jr. of Occupational Therapy* 38, 1 (p. 5-6).
- Kaales I.M. (1971) - The role of occupational therapy in the early stages of rehabilitation of the head injury. *Occupational Ther.*, febr. (p. 30-35).
- Kanfer F.H., Philips J.S. (1970) - The behavioral learning model in clinical psychology. In: *Learning Foundations of Behavior Therapy* (p. 54-74). Ed: Kanfer F.H., Philips J.S. University of Cincinnati and Massachusetts. John Wiley and Sons Inc. New York.
- Katz P.A., Deutch M. (1964) - Modality of stimulus presentation in serial learning for retarded and normal readers. *Perceptual and Motor Skills* 19 (p. 627-633).
- Katz S. (1974) - Leisure time problems of mentally retarded graduates of training programs. *Mental Retardation* 12,3 (p. 54-57).
- Kazdin A.E. (1973) - Issues in behavior modification with mentally retarded persons. *American Journal of Mental Deficiency*, 78,2 (p. 134-140).
- Kerlinger F.N. (1972) - Foundations of behavioral research, educational and psychological enquiry. Holt, Rinehart and Winston, London.
- Keil E.C., Barbec J.R. (1973) - Behavior modification and training the disadvantaged job interviewee. *Vocational Guidance Quarterly* 22,1 (p. 50-56).
- Kephart N.C. (1971) - The slow learner in the classroom. Charles E. Merrill U.S.A.
- Kephart N.C. (1973) - Hekkesluiters 1,2 en 3. Sensomotorische ontwikkeling van moeizaam lerende kinderen. Lemniscaat, Rotterdam.
- Koekkoek J. (1977) - Mediatie therapie in de revalidatie: Begeleiding in en door het thuismilieu. *De Psycholoog* XII Nr. 4 (p. 133-156).
- Kolderie M.L. (1971) - Behavior modification in the treatment of children with cerebral palsy. *Physical Therapy* 51,10 (p. 1083-1091).
- Koolen H.J. (1974) - Basisbewegingstherapie, theorie. Agon-Elsevier, Amsterdam.
- Klages L. (1928) - Die Grundlagen der Charakterkunde, fünfte und sechste Auflage, Johann Ambrosius Barth, Leipzig.
- Krasner L. (1969) - Behavior modification, values and training. The perspective of a psychologist. In: *Behavior Therapy; Appraisal and status*. Ed: Franks C.M., Mc. Graw-Hill Book Company, New York.
- Krech D., Crutchfield R.S., Ballachey E.L. (1962) - Individual in society: a textbook of social psychology. Mac. Graw Hill Book Company Inc. New York.
- Kugel J. (1976) - Psychologie van het lichaam. Aula 488.
- Larsen J.J. (1973) - Factors in reading achievement; an interdisciplinary approach. *Jr. Learning Disabilities* 6,10 (p. 636-644)
- Leche P.M. (1974) - The speech therapist and hemiplegia. *Physiotherapy* 60,11 (p. 346-349).
- Leibowitz J. M., Holcer P. (1974) - Building and maintaining self-feeding skills in a retarded child. *American Jr. of Occupational Therapy* 28,9 (p. 545-548).

- Lindeboom J. (1976) - Geheugentraining. Lezing gehouden onder auspiciën der Ned. Vereniging voor Neuro-psychologie; Utrecht. (niet gepubliceerd).
- Linden E. v.d. (1975) - Kinderen met minimal brain disfunction. Ned. Tijdschrift Psychologie 29 (601-630).
- Linquist E.F. (1953) - Design and analysis of experiments in psychology and education. Houghton Mifflin Company, Boston.
- Linschoten J. (1964) - Gedrag. In: Idolen van de psycholoog (p. 396-399), Bijleveld, Utrecht.
- Loney J. (1974) - The intellectual functioning of hyperactive elementary school boys. A cross-sectional investigation. Am. Jr. Orthopsychiatr. 44,5 (p. 754-762).
- Lord F. (1954) - Further comments on „football numbers”. American Psychologist IX.
- Lundin R.W. (1967) - Personality theory in behavioristic psychology. In: Concepts of Personality (p. 257-290). Ed: Wepman J.M. and Heine R.W., Aldine Publishing Company, Chicago.
- Luria A.R. (1966) - Higher cortical functions in man. Basic Books, New York.
- Marinkelle A.B. (1969) - Experimentele schaal voor de gedragsbeoordeling in de psychiatrie. Assen (niet gepubliceerd).
- Mark H.J. (1962) - Elementary thinking and the classification of behavior. Science 135, (p. 75-87).
- Mark H.J. (1969) - Psychodiagnostics in patients with suspected minimal brain dysfunction. In: Minimal brain dysfunction in children. Dept. of Health, Education and Welfare. P.H.S. Publ. no 2015 N and SDCP Monograph. Bethesda Md, U.S.A.
- Mc. Kenzie H.S., Egner A.N., Knight M., Perdman P.F., Schneider B.M., Gawin J.S. (1970) - Training consulting teachers to assist elementary teachers in the management and education of handicapped children. Exceptional Children, okt (p. 137-144).
- Meel J.J.M. - samensteller (1975) - De ontwikkeling van temporale integratie. (Heyden A.H.C. van der - lonken naar lezen. Schroots J.J.F. - temporele orde in het lees-leerproces. Feltzer M.J.A. - ontwikkeling van temporele integratie in de waarneming). Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 30/ 4-5.
- Meyerson L., Kerr N., Michael J.L. (1967) - Behavior modification in rehabilitation. In: Child development readings in experimental analysis, (p. 214-239), Ed: Byou W., Bear D.M., Appleton Century - Crofts, New York.
- Mierlo J.M.A. van (1976) - Communicatology (the choice peeper). A new technical approach to communicational problem solving. Son, the Netherlands.
- Mitchell A.R.K. (1971) - Psychiatric consequences of head injuries. Occupational Therapy, febr. (p. 25-29).
- Moor W. de, Orlemans J.W.G. (1972) - Inleiding tot de gedragstherapie. Van Loghum Slaterus, Deventer.
- Mordock J.B. (1971) - Behavioral problems of the child with minimal cerebral dysfunction. Physical Therapy, 51,4 (p. 398-404).
- Okma W., Ruyter B. de, Leuteren H. van (1972) - Operante konditionering. Methoden om het gedrag van zwakzinnigen te veranderen. De Tijdstroom, Lochem.
- Ozer M.N., Richardson H.B. (1974 -1) - The diagnostic evaluation of children with learning problems. A „Process Approach”. Jr. of Learning Disabilities 7,2 (p. 30-34)
- Ozer M.N., Dworkin N.E. (1974 -2) - The assessment of children with learning problems: an in-service teacher training program. Jr. Learning Disabilities, 7,9 (p. 539-544).
- Pearson E.S., Hartley H.O., (1956) - Biometrika tables for statisticians. Volume I (p. 138). Canbridge.
- Perske R., Marquis J. (1973) - Learning to live in an apartment: Retarded adults from institutions and dedicated citizens. Mental Retardation, 11,5 (p. 18-19).
- Philage M.L., Kuna J.D. (1975) - The therapeutic contract and L.D. families. Academic Therapy 10,4 (p. 407-411).
- Poor C., Fletcher C., Thielgens J., Gutknecht G., Morgan C., (1975) - Vocational potential assessment. Arch. Psych. Med. Rehab., 56 (p. 33-36).
- Prins R.S., Wagenaar E. (1975) - Op bezoek bij prof. Luria. Een overzicht van zijn opvattingen over afasie in theorie en praktijk. Logopedie en Foniatrie, 47 (p. 206-222).

- Raven E. (1966) - Vraagstellingen bij het psychologisch onderzoek in de Tweede Psychiatrische Universiteitskliniek te Utrecht. Mededelingen van het instituut voor klinisch en industriële psychologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, nr. 10, Utrecht.
- Reed J.C. (1967) - Reading achievement as related to differences between WISC verbal and performance IQ's. *Child Development* 38, 3 (p. 836-839).
- Reissenweber M. (1953) - The use of modified block design in the evaluation and training of the brain injured. *Psychological Monographs*, vol. 67.
- Reitan R.M. (1966) - A research program on the psychological effects of brain lesions in human beings. In: *International review of research in mental retardation*. vol. 1 (p. 153-218) Ed: Ellis N.R., Academic Press, New York.
- Reitan R.M. (1968) - Manual for administration of neuropsychological testbatteries for adults and children. Neuropsychological laboratory, University of Washington, Seattle, Washington.
- Reitan R.M. (1969) - Examples of children with brain lesions and children with neuropsychological diagnostic problems: Neuropsychology Laboratory, University of Indiana, Medical Center, Indiana.
- Resnick L., Wang M.C., Kaplan J. (1973) - Task analysis in curriculum design: A hierarchically sequenced introductory mathematics curriculum. *Jr. Applied Behavior Analysis* 6,4, (p. 679-709).
- Riele H.F.W. te (1975-2) - Huisarts en revalidatie. *Revalidatie*, 21, 7/8 (p. 7-9).
stafbesprekingen in het Revalidatie Centrum „Hoensbroeck", (niet gepubliceerd).
- Riele H.F.W. te (1975 - 2) - Huisarts en revalidatie. *Revalidatie*, 21, 7/8 (p. 7-9).
- Rooyen P.J.A. van (1976) - „Het revalidatie centrum": een proeve van een typologie van het revalidatie centrum als instituut voor gezondheidszorg. VRIN-rapport.
- Rosenthal T.I., Zimmerman B.J. (1972) - Modeling by exemplification and instruction in training conversation. *Developmental Psychology*, 6 (p. 392-401).
- Rosinsky R.W. (1975) - Evaluating the severely disabled. *The Controlled Environmental Laboratory Evaluation. Rehabilitation Literature*, 36, 10 (p. 302-305).
- Ross A.O. (1966) - Conceptual issues in the evaluation of brain damage In: *Brain damage and mental retardation; a psychological evaluation* (p. 20-43). Ed: Khanna J.L., Springfield, Ill.
- Ross D.M. and Ross S.A. (1973) - Cognitive training for the E.M.R. child: situational problem solving and planning. *Am. Jr. Mental Deficiency* 78, 1 (p. 20-25).
- Ross D.M. and Ross S.A. (1974) - The pace-maker: primary curriculum, Belmont Calif.
- Rümke H.C. (1951) - Inleiding tot de karakterkunde, derde herziene druk. De Erven F. Bohn N.V. Haarlem.
- Ruyter C.W. de (1974) - Revalidatie, een multidisciplinaire opgave. *Metamedica* 5, (p. 92-94).
- Saan R.J., Schoonbeek H.R. (1973) - Problemen bij de behandeling en de evaluatie van een patiënt met rekenstoornissen. In: *Klinische Psychologie in Nederland II* (p. 223-256). Ed: Cassee A.P., Boeke P. Barendregt J., Deventer.
- Sand P.L., Trieschmann R.B. Fordyce W.E., Fowler R.S., (1970) - Behavior modification in the medical rehabilitation setting: Rational and some applications. *Rehabilitation Research and Practice Review* 1,2 (p. 11-24).
- Sarno M.T., Sands E. (1970-1) - An objective method for the evaluation of speech therapy in aphasia. *Archives of Physical Medicine and Rehab.*, 51 (p. 49-55).
- Sarno M.T., Silverman M., Sands E., (1970-2) - Speech therapy and language recovery in severe aphasia. *Jr. of Speech and Hearing Research*, 13 (p. 607-623).
- Savage A. (1971) - Perception and perceptual training activities. *Occupational Therapy*, febr. (p. 36-41).
- Scheff T.J. (1966) - Being mentally ill: a sociological theory. Aldine Publishing Company, Chicago.
- Scherzer A.L. (1973) - Educational and social development among intensively treated young patients having cerebral palsy. *Arch. Phys. Med. and Rehab.* 54, 10 (p. 478-484).
- Schroots J.J.F. (1972-1) - Prediktie, inferentie en decisie, een evaluatie van de neuropsychologische test. *Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie*, 27, 6 en 7 (p. 309-340).
- Schroots J.J.F., Hecht Ponger S.D. (1972-2) - Psycho-diagnostics in brain dysfunctions. A seminar organized by the Netherland Institute for Preventive Medicine T.N.O. Leiden.

- Schroots J.J.F. (1974) - Vroegtijdig herkenning van leerstoornissen, Leidse Diagnostische Test: konstruktie en psychometrische verkenning. Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde T.N.O. Leiden.
- Schubert J. (1967) - Effects of training on the performance of the WISC, block design subtest. *British Jr. of Social and Clinical Psychology*, 6 (p. 144-149)
- Schuerman J. A. (1974) Psychologische diagnostiek en behandelingsmogelijkheden bij hersentraumata. *Meta Medica* 5 (p. 98-102).
- Schuerman J.A. (1975-1) - Perspectief van de contusio cerebri in de revalidatie. *De Psycholoog* 10,3 (p. 83-95).
- Schuerman J.A. (1975-2) - Perspectief van de contusio cerebri in de revalidatie (slot). *De Psycholoog*, 10, 5 (p. 227-251).
- Shapiro M.B. (1966) - The single case in clinical psychological research. *Jr. of General Psychology*, 74 (p. 3-23).
- Silver A.A., Hagin R.A., Hersch M.S. (1967) - Reading disability, teaching through stimulation of deficit perceptual areas. *American Jr. of Orthopsychiatry* 37, (p. 744-752).
- Snelbecker G.E., Fullard W., Reiling A., Love G. (1974) - Auditory information processing by normal and CVA hemiplegic adults. *Perceptual and Motor Skills*, 38 (p. 855-860).
- Spitz J.C. (1968) - Statistiek voor psychologen, pedagogen, sociologen. 3e druk. Noord-Hollandse Uitgeversmaatschappij, Amsterdam.
- Tate B.G., Baroff G.S. (1976) - Training the mentally retarded in the production of a complex product: a demonstration of work potential. *Exceptional Children* 33,6 (p. 405-408).
- Thomson I.V. (1974) - The patient with severe head injury and his family. A follow-up study of 50 patients. *Scandinavian Jr. Rehab. Med.* 6,4 (p. 180-183).
- Trieschmann R.B. (1974) - Coping with a disability. A sliding scale of goals. *Arch. Phys. Med. Rehabil.* 55. dec. (p. 556-560).
- Ullman L.P., Krasner L. (1965) - Case studies in behavior modification. Holt, New York.
- Ullman L.P., Krasner L. (1969) - A psychological approach to abnormal behavior. Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Underwood C.S. (1974) - Occupational therapy in the early stages of hemiplegia. *Physiotherapy*, 60, 11 (p. 343-345).
- Vester F. (1976) - Hoe wij denken, leren en vergeten. Bosch en Kenning, Baarn, De Fontein, Bilthoven.
- Villiers J.G. de, Naughton J.M. (1974) - Teaching a symbol language to autistic children. *Jr. Consulting and Clinical Psychol.* 42,1 (p. 111-117).
- Walker H.M., Buckley N.K. (1968) - The use of positive reinforcement in conditioning attending behavior. *Jr. Applied Behavior Analysis* 1,3 (p. 245-250).
- Wehman P.H. (1975) - Toward a social skill curriculum for developmentally disabled clients in vocational settings. *Rehabilitation Literature* 36,11 (p. 342-384).
- West M.G. (1975) - A 3-D program for L.D. children. *Academic Therapy*, 10, 3 (p. 309-319).
- Wiltz N.A. (1973) - Behavior therapy techniques in treatment of emotionally, disturbed children and their family *Child Welfare* 11,8 (p. 483-491).
- Winkelstein E., Shapiro B.J., Bernard J., Shapiro P.P., (1973) - Art, curricula and mental retarded preschoolers. *Mental Retardation* 11, 3 (p. 6-9).
- Wright B. (1960) - Physical disability - a psychological approach. Harper, New York.
- Yates A.J. (1966) - Psychological deficit. In : *Annual Review of Psychology*, 17 (p. 111-144). Ed: Farnsworth P.R. Mc. Nemar O. and Mc. Nemar Q. Palo Alto, Calif.
- Yates A.J. (1970) - Servo mechanistic control of behavior. In: *Behavior therapy*. (p. 37-41) Ed: Yates A.J. University of Western Australia, John Wiley and sons Inc. New York.
- Yoder P., Forehand R. (1974) - Effects of modeling and verbal cues upon concept acquisition of retarded and non- retarded children. *American Jr. of Mental Deficiency* 78,5 (p. 566-570).
- Zaad Ch.P.M. (1975) - Opvoeding en behandeling van kinderen na een ernstig schedelletsel. *Tijdschrift voor Orthopedagogiek*. 1 (p. 20-29).
- Zimmerman J. (1969) - Operant conditioning in a sheltered workshop. *Rehab. Lit.* 30,11 (p. 326-334).

BIJLAGEN

BIJLAGE 1:

GEDRAGSOBSERVATIESCHAAL CONTUSIO CEREBRI (GOCC)

Aanwijzingen voor de beoordelaar

- 1e. Op elk van de hierna volgende bladzijden vindt u een serie gedragsomschrijvingen. Iedere serie bestaat uit altijd 5 omschrijvingen van waar te nemen gedrag.
- 2e. Het is de bedoeling dat u niet meer dan één patiënt tegelijk beoordeelt. U wordt verzocht telkens een bladzijde voor u te nemen, de serie beschrijvingen op deze bladzijde door te lezen en dan daaruit die omschrijving te kiezen, die het meest op het gedrag van patiënt van toepassing is. Het nummer van de gekozen omschrijving omcirkelt u op het antwoordformulier. Hierna doet u hetzelfde aan de hand van de volgende bladzijden met de volgende serie omschrijvingen.
- 3e. U vult dus het gehele antwoordformulier in voor één patiënt. Pas daarna gaat u over op de beoordeling van een eventueel volgende patiënt.
- 4e. Het zal wel eens gebeuren dat het moeilijk is een keuze te doen. Het kan gebeuren dat geen van de omschrijvingen van een serie precies het gedrag van deze patiënt weergeeft of dat u verscheidene omschrijvingen van toepassing vindt. In dat geval moet u toch één omschrijving kiezen en dus slechts één nummer op het antwoordformulier omcirkelen. In de rubriek „opmerking” op het antwoordformulier kunt u dan aangeven in welk opzicht de omschrijving niet voldoet.
- 5e. De invulling der antwoordformulieren moet steeds plaatsvinden op de 2e en 4e donderdag van de maand. De daaropvolgende dag (2e en 4e vrijdag van de maand) moeten de antwoordformulieren per interne post verzonden worden naar de afdeling psychologie.
- 6e. S.v.p. geen onderling overleg tussen beoordelaars, en ook niet met het overige personeel.
- 7e. De beoordeling moet tot stand komen op grond van *eigen observatie* van de patiënt. Hiertoe moet de beoordelaar in de betreffende periode van 14 dagen driemaal gelegenheid tot observatie nemen. Pas indien eigen observatie niet gerealiseerd kan worden mag de beoordelaar „indrukken verzamelen” van het behandelend personeel. Deze indrukken moeten echter met voorzichtigheid gewogen en met elkaar vergeleken worden.

VERVOLG BIJLAGE I

Items

I Huilen

5. Huilt, zonder aanleiding een half uur achter elkaar of langer.
4. Huilt dikwijls, ook wel zonder aanleiding.
3. Huilt soms, maar eigenlijk alleen bij het spreken over, het zien van sentimentele onderwerpen, of het spreken over eigen probleem.
2. Huilt zelden, en dan alleen bij zeer verdrietige gebeurtenissen of vervelende behandelingen.
1. Huilt nooit.

II Angstig gedrag

5. Voortdurend angsten aanwezig, het gesprek wordt voortdurend door angst beheerst, er is vrees en wanhoop, eventueel zijn er fobieën.
4. Patiënt is snel in paniek en in consternatie; op zulke momenten beheerst de angst hem volledig; hij is niet instaat op zulke momenten angst te verbergen.
3. Er is weliswaar over het algemeen angst aanwezig, maar patiënt kan zich van deze angstgevoelens losmaken; hij doet moeite ze te verbergen en hij kan over gewone onderwerpen praten.
2. Van angsten merkt men alleen onder bepaalde omstandigheden iets; in een normaal gesprek merkt men van angsten niet veel.
1. Van angsten bemerkt men niets.

III Neerslachtige stemming/depressief

5. Vrijwel altijd erg neerslachtig, praat over suicide (Het leven heeft geen zin meer voor patiënt).
4. Erg neerslachtig, lijkt suïcidaal, maar praat er niet spontaan over.
3. Alleen 'smorgens of alleen 's avonds somber gestemd, stil en erg teruggetrokken.
2. Slechts een enkele maal in zichzelf getrokken, stil en in zichzelf piekerend.
1. Van een sombere stemming of van een downstemming blijkt niets.

IV Klagen

5. Patiënt klaagt vrijwel altijd over van alles en nog wat; zeurt ontzettend; moppert over een heleboel dingen en mensen.
4. Patiënt klaagt regelmatig, zeurt nogal veel.
3. Patiënt klaagt *spontaan* slechts een enkele maal, maar bij *navraag* dikwijls over allerlei zaken.
2. Patiënt klaagt nooit *spontaan* maar bij *navraag* blijkt er toch een enkele maal iets niet te deugen.
1. Patiënt klaagt spontaan niet, maar bij navraag ook niet.

V Onzelfstandig gedrag

5. Patiënt is slaafs en te volgbaar. Kan geen eigen besluiten nemen. Is onzeker, weifelend in iedere activiteit die hij onderneemt.
4. Patiënt komt zelden tot eigen besluitvorming. Vraagt daarom regelmatig advies en beslissingen van anderen.
3. Afwisselend momenten van onzekerheid en advies vragen met momenten waarin wel tot gericht handelen en besluitvorming wordt overgegaan.
2. Over het algemeen een wat onzekere opstelling, maar komt over het algemeen toch tot gericht handelen en besluitvorming.
1. Van onzekerheid, twijfelen, blijkt niets. Patiënt regelt zijn eigen zaken en heeft geen advies nodig.

VI Zich afzonderen

5. Patiënt schenkt in het geheel geen aandacht aan verpleging/therapeuten/patiënten. Vermijdt ieder contact. Pogingen tot het leggen van kontakten lopen op niets uit. Lijkt in zichzelf opgesloten, ook al dringt men erop aan dat hij meedoet.
4. Contact tot stand brengen lukt met verpleging/therapeuten/patiënten slechts voor korte tijd (± 5 min.) en dan alleen bij aandringen of gebruik van veel tact, doet patiënt eventjes mee en praat eventjes.
3. Patiënt zoekt een enkele maal uit zichzelf contact met verpleging/therapeuten/patiënten. Hij trekt zich snel terug op zichzelf, er gaat verder weinig van hem uit.
2. Patiënt zoekt uit zichzelf wel contact met verpleging/therapeuten/patiënten, maar is wat te bedeesd of verlegen. Patiënt is toch in staat het gesprek of bezigheden enige tijd gaande te houden.
1. Van te grote geremdheid, bedeesdheid, verlegenheid, blijkt in het contact met verpleging/therapeuten/patiënten niets.

VII Aandacht vragend, opdringerig

5. Patiënt is voortdurend hinderlijk of opdringerig en laat verpleging/therapeuten/patiënten bijna „geen moment met rust”. Is een klever, wil altijd haantje de voorste zijn, maakt altijd opmerkingen, wil het centrum van aandacht zijn. Dringt hulpvaardigheid op.
4. Patiënt is zelden in staat tot een rustig contact. Hij vraagt *dikwijls* aandacht door zijn houding of vertoont overdreven joviaal gedrag. Is een uitslover, wil op overdreven wijze iedereen helpen, probeert aandacht te trekken door grappig te zijn.
3. Patiënt neigt tot druk, joviaal, opdringerig gedrag, maar als men hem laat merken dat men rustiger contact op prijs stelt, dan is patiënt hiertoe in staat. Er is toch nog wel duidelijke contactbehoefte.

2. Er is af en toe sprake van duidelijke contactbehoefte, maar er zijn sporadisch momenten van druk, overdreven gedrag.
1. Van opdringerigheid of sterke contactbehoefte is geen sprake. Patiënt gaat gewoon zijn gang.

VIIIa Dwangmatig gedrag in werk

5. Werkt veel te precies, nauwgezet en pietepeuterig. (Is wel steeds bezig, toch blijft hij steken en er komt vrijwel niets uit zijn handen).
4. Werkt te perfectionistisch (maar wat klaar komt is perfect en af, het duurt echter wel te lang).
3. Werkt erg zorgvuldig waardoor hij meestal onvoldoende produceert en te traag is.
2. Wat hij aflevert, is meestal prima. Door de iets te grote precisie produceert hij meestal nog net voldoende.
1. Van te precies of te nauwgezet werk blijkt niets.

VIIIb Dwangmatig gedrag in zelfverzorging

5. Patiënt is dagelijks zeer lang en eventueel op rituele wijze bezig met de verzorging van zijn lichaam, uiterlijk, kleding, leefruimte. Hij kan geen wanorde, vuil e.d. om zich zien. Zonder hulp of aansporing komt hij niet klaar.
4. Patiënt is langdurig en vaak dwangmatig bezig met de lichamelijke verzorging en andere verzorging, maar kan er tenslotte zelf wel een eind aan maken.
3. Patiënt vertoont bij de verzorging van lichaam en kamer een overdreven aandacht, zorgvuldigheid of pietepeuterigheid en is daardoor steeds te laat klaar.
2. Patiënt besteedt een wat overdreven aandacht aan verzorging van lichaam en ruimte waarin hij leeft.
1. Patiënt is niet overdreven netjes, noch dwangmatig in zelfverzorging.

IX Euphorie

5. Voortdurend lacherig, opgewekt en blij, zelfs indien de omstandigheden (handicap) eerder een downstemming zouden doen vermoeden. Dwanglachen en overdreven lang doorlachen.
4. Landurig perioden van opvallende opgewektheid en blijheid. Lacht op onevenwichtige wijze vaak te veel (lachbuien eventueel vaak afgewisseld met huilbuien).
3. Lacht verscheidene malen in zichzelf. Lacht verscheidene malen te opgewekt.
2. Lacht een enkele maal in zichzelf. Glimlacht nogal vaak of lacht dikwijls als enige. Iets te overdreven lachen.
1. Van overdreven lachen blijkt niets. Lacht niet op abnormale wijze, noch abnormaal veel.

Xa Slordigheid in werk, met gereedschap e.d.

5. Wat patiënt aflevert zit vol fouten, het is niet af. Patiënt laat altijd gereedschap slingeren, onderhoudt het niet, ruimt niets op.
4. Als men er nauwlettend op toeziet of aandringt neemt de slordigheid af en ruimt hij wat op. Maar aan zichzelf overgelaten neemt het slordige gedrag weer toe.
3. Patiënt let in het algemeen zelf op afwerking, kwaliteit en fouten. Hij ruimt ook meestal alles wel op, maar men moet een oogje in het zeil houden en aansporing is nog wel nodig.
2. Patiënt zorgt grotendeels uit eigen beweging voor goede kwaliteit en voor opruiming. Slechts af en toe hapert er wat aan.
1. Van slordigheid in werk en opruiming van materiaal en gereedschap blijkt niets.

Xb Slordigheid in zelfverzorging, leefruimte

5. Bekommert zich in het geheel niet om orde en netheid. Patiënt is totaal onverschillig t.a.v. lichamelijke verzorging. Een ander moet er steeds op letten of kleding en leefruimte netjes zijn.
4. Is er met veel takt toe te krijgen wat op te ruimen. Verzorgt zichzelf alleen als men er nauwlettend op toeziet.

3. Met een kleine aansporing ruimt patiënt rommel op. Patiënt heeft wel enige aandacht voor lichaam en kleding, maar men moet toch een oogje in het zeil houden, anders gaat het met de franse slag.
2. Is meestal netjes uit zichzelf. Er hapert slechts af en toe wat aan.
1. Van onzorgvuldigheid in de verzorging van kleding, uiterlijk en leefruimte blijkt niets.

XI Niet coöperatief gedrag

5. Patiënt onttrekt zich voortdurend aan de voorschriften en afspraken. Zijn onverzettelijkheid en weerspannigheid maken hem niet korrigeerbaar. Hij helpt nooit mee, zelfs niet bij de grootste aandrang.
4. Patiënt onttrekt zich aan afspraken en voorschriften als hij er de kans toe krijgt. Hij helpt alleen bij zeer sterke aandrang mee.
3. Patiënt houdt zich aan de regels zij het niet altijd even gewillig en hij zal zich niet spontaan voor afdeling en verpleging inzetten. Helpt alleen als het om iets prettigs gaat en als hem hierom gevraagd wordt.
2. Patiënt helpt spontaan, vooral bij prettige aangelegenheden. Hij houdt zich aan de regels en dikwijls voelt hij zich ook verantwoordelijk voor de gang van zaken.
1. Patiënt zet zich in voor afdeling en andere patiënten.

XII Onrustig, ontreemd gedrag

5. Patiënt toont zich voortdurend onrustig, gespannen, gejaagd en heftig geëmotioneerd. Er is een overmatige bewegingsdrang. Patiënt is voortdurend bezig en overmatig actief. Maakt rusteloze, altijd gehaaste indruk en kan zelden stilzitten.
4. Gelaatsuitdrukking is gespannen (broeierig). Bij *perioden* ook uiterlijk onrustig, gejaagd en rusteloos (bv. ijsberen op de gang)
3. Gespannenheid en onrustige gejaagdheid zijn wel dikwijls merkbaar, doch vooral wanneer men met patiënt praat (er zijn dus perioden dat het niet opvallend is).
2. Van enige onrust en gespannenheid merkt men alleen *in het gesprek* iets. Over het algemeen is patiënt actief bezig, hij *loopt wat versneld*, hij zit niet lang op dezelfde plaats. Men zou zeggen: „iets meer vlotheid dan gewoon”.
1. Van onrust, gespannenheid, gejaagdheid, bewegingsdrang of gehaaste beweging en overmatige activiteit, blijkt niets.

XIII Agressief gedrag/geprikkeldheid

5. Patiënt is openlijk vijandig zonder duidelijke reden. *Slaat* andere patiënten, verplegenden of therapeuten (motorisch agressief).
4. Patiënt slaat zelden, maar is snel verbaal agressief. Hij kan dan schelden en tieren of zich dreigend opstellen en raakt voortdurend in een konfliktsituatie met patiënten, verplegenden of therapeuten.
3. Patiënt gedraagt zich alleen bij vriendelijke en tactvolle benadering door omgeving vriendelijk en beleefd. Anders reageert hij gauw geprikkeld en geïrriteerd.
2. Patiënt gedraagt zich meestal vriendelijk en beleefd, maar is een enkele keer iets ontstemd en kan dan weinig hebben.
1. Patiënt is bijna nooit boos, alleen als er een goede reden voor is en dan vaak zelfs ook niet eens.

XIV Agressief gedrag in de zin van domineren, sfeer bederven

5. Patiënt tracht voortdurend andere patiënten ongunstig te beïnvloeden. Hij tracht ook verpleging en/of therapeuten te intimideren en zelfs te overheersen.
4. Patiënt tracht zijn omgeving voornamelijk te overheersen d.m.v. intrigeren, opstoken tegen elkaar, ageren en protesteren.
3. Patiënt stelt zich t.o.v. medepatiënten vaak bedillerig, bemoeizuchtig of baasspelerig op. Hij heeft altijd zijn mening klaar en verkondigt die als enige waarheid.
2. Patiënt heeft weliswaar dikwijls zijn „mening” klaar doch hij tracht deze slechts af en toe aan anderen op te dringen.
1. Van ongunstige beïnvloeding, overheersen of sfeerbederf blijkt bij patiënt niets.

XV Inaktiviteit/traagheid

5. Patiënt zit voortdurend op dezelfde plaats. Als hij zich eens een keer beweegt, gaat dat altijd langzaam. Hij reageert vrijwel niet op aansporingen. Patiënt maakt een willoze, levensloze indruk.
4. Patiënt blijft lang op dezelfde plaats zitten, beweegt zich over het algemeen weinig en traag, maar reageert wel op aansporingen.
3. Patiënt's activiteit is over het algemeen niet groot, hij loopt betrekkelijk traag maar hij is op verzoek tot vergrote of versnelde activiteit te krijgen.
2. Patiënt is eigenlijk wel voortdurend spontaan actief bezig. Zijn handelingen en bewegingen zijn voldoende afwisselend, maar over het algemeen zijn zij nog iets te traag.
1. Van enige traagheid, onbeweeglijkheid, starheid of te geringe activiteit is geen sprake.

XVI Ongemotiveerdheid

5. Patiënt gedraagt zich willoos, passief, initiatiefloos. Toont weerstand of geen lust voor vrijwel alle therapieën en activiteiten. Tracht zich op alle mogelijke manieren aan deze zaken te onttrekken. Verschijnt niet of veel te laat op afspraken.
4. Patiënt oppert een enkele maal ideeën of plannen, maar ze worden nooit uitgevoerd. Toont in het algemeen veel weerstand tegen therapieën. Alleen met veel takt is patiënt ergens toe te krijgen of bezig te houden.
3. Brengt alleen maar aandacht op voor het werk dat hij zelf wil. Zet ideeën soms om tot daden. Komt op therapie, maar doet matig zijn best.
2. Doet mee met de meeste soorten van werk en therapie. Hij heeft nog wat moeite zich te schikken en zijn best te doen in werk of therapie als dit hem niet aanstaat.
1. Doet ijverig mee, van weerstand of ageren blijkt niets. Patiënt is actief. Doet zelf suggesties, heeft er echt zin in.

XVII Gebrek aan zelfkritiek

5. Maakt de meest fantastische plannen voor de toekomst. Bagatelliseert zijn gehandicapt zijn. Is zeer zelfverzekerd. Is impulsief, resoluut, roekeloos. Komt bij kritiek niet tot correctie van zijn ziens- en handelwijze.
4. Maakt allerlei plannen, die wel reëel zijn voor gezonde, maar minder voor de gehandicapte mensen. Is wel impulsief, roekeloos of resoluut, maar komt bij aansporingen, kritiek tot correctie.
3. Iets te zelfverzekerd en te snelle besluitvorming. Kan echter wel naar anderen luisteren. Het is mogelijk met hem het probleem te bespreken, maar meestal worden reële verwachtingen en ideeën door hem tegengesproken.
2. Overweegt in het algemeen eerst rustig en komt vervolgens tot een gericht besluit en tot reëel handelen. Toch blijkt een enkele maal de zelfkritiek te gering.
1. Van overmatige impulsiviteit of te grote zelfverzekerdheid is geen sprake. Patiënt overweegt betrekkelijk nuchter zijn mogelijkheden.

VERVOLG BIJLAGE 1

ANTWOORDFORMULIER GOCC

naam van de patient: _____ man/vrouw/kind afd.: _____

naam van de observator: _____ vd. discipline _____

dagen en tijdstip waarop geobserveerd: _____ van _____ tot _____

_____ van _____ tot _____

_____ van _____ tot _____

opmerkingen		opmerkingen		opmerkingen	
5 4 3 2 1	I	5 4 3 2 1	II	5 4 3 2 1	III
5 4 3 2 1	IV	5 4 3 2 1	V	5 4 3 2 1	VI
5 4 3 2 1	VII	5 4 3 2 1	VIII	5 4 3 2 1	IX
5 4 3 2 1	X	5 4 3 2 1	XI	5 4 3 2 1	XII
5 4 3 2 1	XIII	5 4 3 2 1	XIV	5 4 3 2 1	XV
5 4 3 2 1	XVI	5 4 3 2 1	XVII		

BIJLAGE 2:

VOORBEWERKINGSTABELLEN INZAKE GOCC scores.

verzameling 1 (dec. 1975)

Sommatie over de patiënten												
(A)tijdstip t_1							(C)tijdstip t_2					
Item	Observator nr						Observator nr					
NR	1	2	3	4	5	M	1	2	3	4	5	M
1	22	24	24	19	23	22,4	20	21	24	17	23	21,0
2	28	30	30	28	32	29,6	22	28	33	24	28	27,0
3	31	32	33	23	28	29,4	25	29	30	21	27	26,4
4	32	29	32	34	38	33,0	34	36	35	36	44	37,0
5	42	40	38	41	42	40,6	32	41	42	43	46	40,8
6	33	27	37	30	31	31,6	32	30	37	26	31	31,2
7	35	29	30	24	24	28,4	32	31	35	30	40	33,6
8	21	21	24	23	32	24,2	19	23	20	23	35	24,0
9	24	22	24	24	24	23,6	23	23	24	28	28	25,2
10	29	27	32	27	34	29,8	27	29	34	38	33	32,2
11	40	36	37	40	39	38,4	35	43	35	35	41	37,8
12	29	23	34	21	26	26,6	30	33	30	26	33	30,4
13	33	28	32	22	30	29,0	29	28	28	24	31	28,0
14	23	21	26	23	28	24,2	21	23	21	21	29	23,0
15	33	32	38	40	43	37,2	35	32	34	37	44	36,4
16	32	33	36	33	30	32,8	33	40	34	33	35	35,0
17	29	28	28	28	32	30,8	30	33	29	40	40	34,4

Sommatie over de GOCC-items												
(E)tijdstip t_1							(G)tijdstip t_2					
Pat NR	Observator nr						Observator nr					
	1	2	3	4	5	M	1	2	3	4	5	M
1	35	34	44	40	53	41,2	28	31	34	39	46	35,6
2	21	20	21	32	23	23,4	32	21	21	33	26	26,6
3	26	29	28	34	36	30,6	27	30	30	36	38	32,2
4	32	26	30	30	42	32,0	27	29	29	30	37	30,4
5	35	42	45	30	44	39,2	28	49	32	33	52	38,8
6	40	40	30	19	30	31,8	28	45	23	35	45	35,2
7	26	31	37	20	35	29,8	30	25	39	19	26	27,8
8	19	17	22	17	17	18,4	17	17	17	17	17	17,0
9	27	20	30	20	19	23,2	26	21	24	38	41	30,0
10	31	30	40	31	30	32,4	31	30	42	23	39	33,0
11	54	25	30	37	50	39,2	29	33	44	34	33	34,6
12	28	27	21	17	29	24,4	25	26	22	18	28	23,8
13	26	30	25	49	25	33,0	41	41	41	49	43	43,0
14	36	37	34	37	30	34,8	37	36	36	35	35	35,8
15	35	28	36	19	24	28,4	32	34	38	18	27	29,8
16	19	24	23	31	25	24,4	18	31	30	23	36	27,5
17	26	22	29	21	29	25,4	23	24	23	22	19	22,2

VERVOLG BIJLAGE 2
Verzameling (6 dec. 1976)

Item NR	Sommatie over de patiënten											
	(B)tijdstip t_1						(D)tijdstip t_2					
	Observator nr						Observator nr					
	1	2	3	4	5	M	1	2	3	4	5	M
1	43	38	41	34	38	38,8	43	36	37	32	38	37,2
2	51	47	47	49	54	49,6	50	41	49	44	53	47,4
3	52	50	49	42	45	47,6	54	46	53	42	45	48,0
4	53	57	51	55	61	55,4	58	55	61	57	70	60,2
5	66	76	75	69	76	72,4	72	59	61	70	81	68,6
6	56	57	56	51	54	54,8	56	61	57	48	54	55,2
7	50	55	49	43	52	49,8	54	54	55	45	57	53,0
8	37	37	35	37	52	39,6	34	34	36	37	54	39,0
9	42	41	42	42	50	43,4	43	39	46	51	47	45,2
10	62	56	51	44	60	54,6	64	54	56	55	62	58,2
11	63	71	68	63	66	66,2	70	64	73	58	70	67,0
12	51	44	43	35	48	44,2	46	47	55	49	49	49,2
13	49	54	46	37	51	47,4	51	53	52	42	51	49,8
14	40	41	41	38	47	41,4	36	36	40	35	46	38,5
15	64	63	65	70	71	66,6	59	66	57	67	78	65,4
16	61	65	63	54	52	59,0	62	64	67	54	63	62,0
17	51	53	48	59	65	55,2	54	57	56	61	71	59,8

VERVOLG BIJLAGE 2
Verzameling 2 (6 dec. 1976)

Sommatie over de GOCC-items													
(F)tijdstip t_1							(H)tijdstip t_2						
Pat	Observator nr						Observator nr						
NR	1	2	3	4	5	M	1	2	3	4	5	M	
1	32	40	40	19	28	31,8	23	28	43	35	45	34,8	
2	22	19	17	17	17	18,4	17	17	17	17	17	17,0	
3	28	28	28	22	37	28,6	34	32	33	27	36	32,4	
4	23	27	25	24	34	26,6	26	33	29	26	31	29,0	
5	33	36	41	28	41	35,8	50	49	57	22	40	43,6	
6	31	26	37	20	35	29,8	39	30	27	19	25	28,0	
7	30	54	25	37	50	39,2	44	29	33	34	33	34,6	
8	40	31	30	30	30	32,2	42	31	30	23	39	33,0	
9	26	22	26	21	29	24,8	23	24	23	22	19	22,2	
10	35	26	30	49	25	33,0	43	41	40	49	43	43,2	
11	44	35	32	40	53	40,8	34	28	31	39	46	35,6	
12	30	32	26	30	42	32,0	29	29	26	30	37	30,2	
13	21	21	20	32	23	23,4	21	30	21	33	25	26,0	
14	21	30	21	33	25	26,0	23	30	24	32	39	29,6	
15	28	26	29	34	36	30,6	30	27	30	36	38	32,2	
16	30	27	20	20	19	23,2	24	26	21	38	41	30,0	
17	31	28	26	21	22	25,6	32	29	32	21	31	29,0	
18	33	26	30	17	30	27,2	31	26	28	24	26	27,0	
19	31	34	31	25	32	30,6	34	31	27	28	29	29,8	
20	22	22	22	21	26	22,6	18	20	21	27	24	22,0	
21	23	19	24	31	25	24,4	30	18	31	23	36	27,6	
22	34	36	37	37	30	34,8	36	37	36	35	35	35,8	
23	36	35	28	19	24	28,4	40	32	34	18	27	30,2	
24	27	29	23	33	41	30,6	25	22	17	29	30	24,6	
25	28	32	32	28	30	30,0	25	23	28	30	26	26,4	
26	24	30	34	19	30	27,4	27	27	33	18	29	26,8	
27	45	35	42	30	44	39,2	29	28	49	33	52	38,2	
28	44	47	45	38	28	40,4	34	41	46	29	29	35,8	
29	21	28	27	17	29	24,4	22	25	26	18	28	23,8	
30	18	24	22	30	27	24,2	21	23	18	32	33	25,4	

BIJLAGE 3:

INTER- en INTRABEOORDELAARSBETROUWBAARHEIDSCOËFFICIËNT INZAKE GOCC SKORES

GOCC scores gesommeerd over de patiënten (17 GOCC items).

Verzameling 1 (december 1975)

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoëfficiënten

	(A) t_1		(C) t_2	
	$r_{\text{coëff.}}$	t-toets	$r_{\text{coëff.}}$	t-toets
r_{1-2}	.884	7.32	.845	6.12
r_{1-3}	.848	6.20	.786	4.92
r_{1-4}	.718	4.00	.706	3.86
r_{1-5}	.563	2.64	.753	4.43
r_{2-3}	.768	4.69	.787	4.94
r_{2-4}	.780	4.83	.729	4.12
r_{2-5}	.635	3.18	.733	4.17
r_{3-4}	.697	3.76	.667	3.47
r_{3-5}	.582	2.77	.595	2.87
r_{4-5}	.887	7.44	.844	6.09

Intrabeoordelaars - betrouwbaarheidscoëfficiënten

	(A-C) t_1-t_2	
	$r_{\text{coëff.}}$	t_{toets}
r_1	.834	5.85
r_2	.820	5.55
r_3	.844	6.09
r_4	.811	5.37
r_5	.776	4.77

Student's t-toets

éénzijdig $\alpha = .01$

df = 15

Kritieke grens: 2.60

* = niet significant

GOCC scores gesommeerd over de items (17 patiënten). Eerste verzameling (dec. 1975)

Interbeoordelaarsbetrouwba.h.coëfficiënten

	(E) t_1		(G) t_2	
	$r_{\text{coëff.}}$	t-toets	$r_{\text{coëff.}}$	t-toets
r_{1-2}	.476	2.10*	.448	1.94*
r_{1-3}	.416	1.77*	.606	2.95
r_{1-4}	.201	.79*	.558	2.16*
r_{1-5}	.650	3.31	.330	1.35*
r_{1-m}	.741	4.28	.724	4.06
r_{2-3}	.684	3.64	.433	1.86*
r_{2-4}	.250	1.00*	.447	1.94*
r_{2-5}	.487	2.16*	.732	4.16
r_{2-m}	.740	4.26	.813	5.40
r_{3-4}	.333	1.37*	.226	.90*
r_{3-5}	.537	2.46*	.329	1.35*
r_{3-m}	.768	4.65	.651	3.33
r_{4-5}	.417	1.78*	.690	3.70
r_{4-m}	.616	3.03	.779	4.81
r_{5-m}	.854	6.36	.844	6.08

Intrabeoordelaars - betrouwba.h.coëfficiënten

	(E-G) t_1-t_2	
	$r_{\text{coëff.}}$	t_{toets}
r_1	.331	1.36*
r_2	.859	6.50
r_3	.645	3.27
r_4	.730	4.25
r_5	.450	1.95*
r_m	.810	5.35

Student's t-toets

éénzijdig $\alpha = .01$

df = 15

Kritieke grens: 2.60

* = niet significant

BIJLAGE 3 (VERVOLG):

INTER- EN INTRABEOORDELAARSBETROUWBAARHEIDSCOËFFICIËNT INZAKE GOCC SKORES

GOCC scores gesommeerd over de patiënten (17 GOCC items) Tweede verzameling (dec. 1976)

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoeff.

	(B) t_1		(D) t_2	
	r_{veel}	t-toets	r_{veel}	t-toets
r_{1-2}	.915	8.78	.857	6.44
r_{1-3}	.916	8.84	.889	7.52
r_{1-4}	.776	4.56	.781	4.84
r_{1-5}	.719	4.01	.744	4.31
r_{2-3}	.963	13.84	.896	7.81
r_{2-4}	.833	5.83	.776	4.76
r_{2-5}	.781	4.84	.765	4.60
r_{3-4}	.870	6.83	.737	4.22
r_{3-5}	.755	4.46	.682	3.61
r_{4-5}	.901	8.04	.913	8.67

Intrabeoordelaarsbetrouwb.h.coëff.

	(B-D) t_1-t_2	
	r_{veel}	t-toets
r_1	.950	11.78
r_2	.897	7.86
r_3	.812	5.39
r_4	.884	7.32
r_5	.964	14.04

Student's t-toets
éénzijdig $\alpha = .01$
df = 15
kritieke grens: 2.60
* niet significant

GOCC scores gesommeerd over de items (30 patiënten). Tweede verzameling (dec. 1976).

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheidscoeff.

	(F) t_1		(H) t_2	
	r_{veel}	t-toets	r_{veel}	t-toets
r_{1-2}	.570	3.67	.723	5.54
r_{1-3}	.699	5.17	.635	4.35
r_{1-4}	.344	1.94*	.876	.40*
r_{1-5}	.405	2.34*	.329	1.84*
r_{1-m}	.804	7.14	.752	6.03
r_{2-3}	.566	3.63	.725	5.57
r_{2-4}	.316	1.76*	.227	1.23*
r_{2-5}	.513	3.16	.344	1.94*
r_{2-m}	.802	7.11	.808	7.26
r_{3-4}	.158	.85*	.129	.69*
r_{3-5}	.357	.202*	.542	3.41
r_{3-m}	.734	5.71	.837	8.09
r_{4-5}	.360	.204*	.612	4.09
r_{4-m}	.607	4.04	.533	3.33
r_{5-m}	.743	5.88	.768	6.34

Intrabeoordelaarsbetrouwb.h.coëff.

	(F-H) t_1-t_2	
	r_{veel}	t-toets
r_1	.605	4.02
r_2	.483	2.92
r_3	.833	7.97
r_4	.729	5.64
r_5	.409	2.37*
r_m	.789	6.80

Student's t-toets
éénzijdig $\alpha = .01$
df = 28
kritieke grens: 2.47
* = niet significant

BIJLAGE 4: VERZAMELTABEL INZAKE GEDRAGSVORMING, GEDRAGSTOENAME EN GEDRAGSDEVIATIES

Gegevens patiënt	GOCC	P.O.																							
		Memory																Concetratie							
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	I.Q.	Ra/A	Ra/V	T.	R.	F.	
V.1. 1. m 2. 33 jaar 3. 3 mnd. + 15 dagen 4. 77 5. contusio	duur observatie: 6 weken voor, 2 weken na behandeling	Psychologisch onderzoek voor behandeling																							
	duur behandeling: 7 weken	Psychologisch onderzoek na behandeling																							
	GOCC voor behandeling	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	1,5	1,0	2,0	1,5	1,5	1,5	3,0	1,5	1,0	3,0	1,5	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	GOCC na behandeling	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,0	2,5	1,5	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
		0	0	0	0	-1,5	0	0	-0,5	0	0	0	-0,5	0	0	-0,5	0	-0,5	0	0	0	0	0	0	
V.2 1. m 2. 23 jaar 3. 6 jr. + 8 mnd. + 7 dagen 4. 77 5. stamcontusio + cerebrale paresis rechts	duur observatie: 6 weken voor, 2 weken na behandeling	Psychologisch onderzoek voor behandeling																							
	duur behandeling: 5 weken	Psychologisch onderzoek na behandeling																							
	GOCC voor behandeling	1,0	1,0	1,0	1,0	3,5	1,5	1,0	2,0	1,5	1,5	1,5	3,0	1,5	1,0	3,0	1,5	3,0	2,5	5,0	4,5	5,0	4,0	5,0	
	GOCC na behandeling	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,0	2,5	1,5	2,5	2,5	3,0	4,5	5,0	3,0	5,0	
		0	0	0	0	-2,0	0	0	-0,5	0	0	0	-0,5	0	0	-0,5	-0	-0,5	0	0	0	0	-1,0	0	
T.1. 1. m 2. 16 jaar 3. 11½ maand 4. 5 maanden 5. contusio cerebri + hemi paresis links	duur observatie: 4 weken voor, 1 week na behandeling	Psychologisch onderzoek voor behandeling																							
	duur behandeling: 6 weken	Psychologisch onderzoek na behandeling																							
	GOCC voor behandeling	1,0	1,6	1,2	2,5	4,1	3,0	1,6	1,0	1,8	3,2	3,4	1,0	1,0	1,0	3,8	3,6	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	GOCC na behandeling	1,0	1,4	1,2	1,6	2,6	1,0	2,2	1,2	1,2	1,8	2,2	1,2	1,6	1,0	3,2	2,2	1,4	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	
		0	-0,2	0	-0,9	-1,5	-2,0	+0,6	+0,2	-0,6	-1,6	-1,2	+0,2	+0,6	0	-0,6	-1,4	-2,6	0	-0,5	0	0	0	0	
T.2. 1. m 2. 3 jr. 7 mnd. 3. 6 weken 4. 10 dagen 5. stamcontusio	duur observatie: 4 weken voor, 1 week na behandeling	Psychologisch onderzoek voor behandeling																							
	duur behandeling: 6 weken	Psychologisch onderzoek na behandeling																							
	GOCC voor behandeling	2,3	1,0	1,7	3,3	3,0	3,3	3,7	1,0	1,7	2,3	3,0	4,3	2,3	2,0	1,0	2,0	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0	
	GOCC na behandeling	1,4	1,6	1,6	1,0	1,6	1,6	3,2	1,5	1,5	2,0	3,0	3,0	2,6	2,0	1,2	2,4	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	
		0,9	+0,6	-0,1	-2,3	-1,4	-1,7	-0,5	+0,5	-0,2	-0,3	0	-1,3	+0,3	0	+0,2	+0,4	0	0	0	0	0	-1,0	-1,0	
T.3. 1. v 2. 4 jaar 3. 2 maanden + 16 dagen 4. 77 5. contusio	duur observatie: 4 weken voor, 1 week na behandeling	Psychologisch onderzoek voor behandeling																							
	duur behandeling: 11 weken	Psychologisch onderzoek na behandeling																							
	GOCC voor behandeling	3,5	2,5	1,0	3,5	3,5	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,5	3,0	2,5	2,0	3,0	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	GOCC na behandeling	2,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
		1,5	-1,0	0	-2,0	-2,5	0	-1,0	0	0	0	-2,5	-1,0	-1,0	-0,5	-1,5	-1,0	-1,0	0	0	0	0	0	0	
R.1. 1. v 2. 20 jaar 3. 6 maanden 4. 2 maanden 5. stamcontusio + hemiparesis re. dysartrie	duur observatie: 7 weken voor, 1 week na behandeling	Psychologisch onderzoek voor behandeling																							
	duur behandeling: 9 weken	Psychologisch onderzoek na behandeling																							
	GOCC voor behandeling	1,5	1,5	2,4	2,4	2,5	1,3	3,4	2,0	1,9	3,1	3,2	1,8	2,9	2,3	2,5	2,9	3,1	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	GOCC na behandeling	1,5	1,5	2,4	2,0	2,5	1,3	2,5	2,0	1,9	2,0	2,2	1,8	2,0	2,3	2,2	2,9	3,1	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
		0	0	0	-0,4	0	0	-0,9	0	0	1,1	-1,0	0	-0,9	0	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	
R.2. 1. v 2. 20 jaar 3. 3 jaar + 9 maanden 4. 2 maanden 5. stamcontusio	duur observatie voor beh. 2 weken, na beh. 1 week	Psychologisch onderzoek voor behandeling																							
	duur behandeling: ± 4 weken	Psychologisch onderzoek na behandeling																							
	GOCC voor behandeling	1,0	1,1	1,1	1,1	2,6	1,3	2,7	1,0	2,6	3,1	2,7	1,6	1,6	1,9	2,7	2,4	1,3	3,5	2,5	5,0	5,0	5,0	4,5	
	GOCC na behandeling	1,0	1,6	1,7	2,7	2,4	1,3	3,0	1,0	2,3	3,0	2,9	1,6	2,6	1,6	2,6	3,3	2,2	3,5	2,5	5,0	5,0	5,0	4,5	
		0	+0,5	+0,6	+1,6	-0,2	0	+0,3	0	+0,3	-0,1	+0,2	0	+1,0	-0,3	-0,1	+0,9	+0,2	0	0	0	0	0	0	

VERVOLG VAN BIJLAGE 4

Gegevens patiënt	GOCC	P.O.																Memory				Concen- tratie											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	I.Q.	Ra/A	Ra/V	Ra/A	Ra/V	T	R	F							
R.3: 1. m 2. 15 jaar 3. 3½ maand 4. 5½ week 5. stamcontusio + hemiplegie rechts afwijking l.n.v. hemisfeer	duur observatie: 4 weken voor, 2 weken na behandeling																	Psychologisch onderzoek voor behandeling															
	duur behandeling: 4 weken																	Psychologisch onderzoek na behandeling															
	GOCC voor behandeling	1,5	2,1	1,3	2,0	3,9	1,5	3,4	1,3	1,3	1,9	1,7	3,4	1,0	1,3	1,0	2,5	2,1	2,0	3,0	2,5	3,0	2,0	4,0	5,0	2,5							
	GOCC na behandeling	1,5	2,1	1,3	2,0	2,9	1,5	2,0	1,3	1,3	1,9	1,7	2,3	1,0	1,3	1,0	1,5	2,1	2,0	2,5	2,0	2,0	1,0	2,5	3,0	1,0							
		0	0	0	0	-1,0	0	-1,4	0	0	0	0	-1,1	0	0	0	-1,0	0	0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,0	-1,5	-4,0	-1,5							
R.4. 1. m 2. 3 jaar + 7 maanden 3. 6 weken 4. 10 dagen 5. stamcontusio	duur observatie: voor behandeling 4 weken, na behandeling 1 week																	Psychologisch onderzoek voor behandeling															
	duur behandeling: 5 weken																	Psychologisch onderzoek na behandeling															
	GOCC voor behandeling	1,4	1,6	1,6	1,0	1,6	1,6	3,2	1,5	1,5	2,0	3,0	3,0	2,6	2,0	1,2	2,4	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0							
	GOCC na behandeling	1,2	1,0	1,7	1,4	2,0	1,3	2,6	1,0	1,1	2,3	2,4	2,6	2,0	1,3	1,0	2,1	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0							
		-0,2	-0,6	+0,1	+0,4	-0,3	-0,6	-0,5	-0,4	+0,3	-0,6	-0,4	-0,6	-0,7	-0,2	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
R.5. 1. m 2. 12 jaar 3. 4 maanden + 24 dagen 4. 4 maanden 5. contusio cerebri	duur observatie: voor behandeling 3 weken, na behandeling 2 weken																	Psychologisch onderzoek voor behandeling															
	duur behandeling: 2 weken																	Psychologisch onderzoek na behandeling															
	GOCC voor behandeling	1,0	1,0	1,5	1,3	3,0	1,8	2,0	1,8	1,3	2,8	1,8	1,0	2,0	1,0	2,8	1,8	1,3	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0							
	GOCC na behandeling	1,0	1,0	1,5	1,3	2,5	1,8	1,0	1,5	1,3	2,5	1,5	1,0	1,0	1,0	2,2	1,5	1,3	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0							
		0	0	0	0	-0,5	0	-1,0	-0,3	0	-0,3	-0,3	0	-1,0	0	-0,6	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
R.6. 1. v 2. 52 jaar 3. onbekend 4. onbekend 5. contusio	duur observatie: 4 weken voor, 2 weken na behandeling																	Psychologisch onderzoek voor behandeling															
	duur behandeling: 2 weken																	Psychologisch onderzoek na behandeling															
	GOCC voor behandeling	1,0	3,0	1,0	1,5	3,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0							
	GOCC na behandeling	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0							
		0	-1,5	0	-0,5	-1,5	0	-1,5	0	0	0	0	-1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
R.7. 1. v 2. 16 jaar 3. 3½ maand 4. 1 week 5. contusio cerebri hemiplegie r. + afasie	duur observatie: 2 weken voor, 1 week na behandeling																	Psychologisch onderzoek voor behandeling															
	duur behandeling: 2 weken																	Psychologisch onderzoek na behandeling															
	GOCC voor behandeling	1,0	1,3	1,8	1,6	2,3	1,6	1,8	1,0	1,5	3,0	2,8	1,0	1,5	1,5	2,8	3,0	2,3	2,0	3,5	4,0	5,0	3,5	3,0	2,5	1,5							
	GOCC na behandeling	1,0	1,3	1,4	1,7	1,2	1,0	1,7	1,0	1,2	2,7	2,5	1,1	2,0	2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	3,5	4,0	5,0	3,5	2,5	2,0	1,5							
		0	-0,2	-0,4	+0,1	-1,1	-0,6	-0,1	0	-0,1	-0,1	-0,3	+0,1	+0,5	+0,8	-0,7	-0,7	-0,2	0	0	0	0	0	0	-0,5	-0,5							

**BIJLAGE 5: TOETSING VAN DE PROCEDURES TER GEDRAGSVORMING,
GEDRAGSTOENAME EN GEDRAGSREDUKTIE.**

$H_0 - T_1$		
GOCC	Σ pat. [GOCC-sc.]	
items	Voor	Na
1	8,8	6,4
2	7,1	6,5
3	5,9	5,8
4	11,3	6,1
5	17,6	8,7
6	10,3	6,6
7	10,3	9,4
8	7,0	6,7
9	7,5	6,7
10	9,5	7,8
11	12,9	9,2
12	14,3	11,2
13	8,8	8,7
14	7,0	6,5
15	13,8	10,9
16	10,6	8,6
17	13,0	9,4

$t = 4,344$
 $\alpha = 0,01$ éénzijdig
 $df = 16$; Kr.gr. = 2,583
 Sign. Verw. H_0

$H_0 - E_1$		
GOCC	Σ pat. [GOCC-sc.]	
items	Voor	Na
1	8,4	8,2
2	11,6	9,8
3	10,7	11,0
4	10,9	12,1
5	18,9	15,0
6	10,1	9,2
7	19,5	14,3
8	9,6	8,8
9	11,1	10,1
10	16,9	15,4
11	16,2	14,2
12	13,3	11,4
13	12,6	11,6
14	11,0	10,8
15	14,0	12,1
16	16,0	14,6
17	12,1	12,8

$t = 3,421$
 $\alpha = 0,01$ éénzijdig
 $df = 16$; Kr.gr. = 2,583
 Sign. Verw. H_0

$H_0 - D_1$		
GOCC	Σ pat. [GOCC-sc.]	
items	Voor	Na
1	17,2	14,6
2	18,7	16,3
3	16,6	16,8
4	22,2	18,2
5	36,5	23,7
6	20,4	15,8
7	29,8	23,7
8	16,6	15,5
9	18,6	16,8
10	26,4	23,2
11	29,1	23,4
12	27,6	22,6
13	21,4	20,3
14	18,0	17,3
15	27,8	23,0
16	26,6	23,2
17	25,1	22,2

$t = 4,983$
 $\alpha = 0,01$ éénzijdig
 $df = 16$; Kr.gr. = 2,583
 Sign. Verw. H_0

$H_0 - T_2$		
Pa-tiënt	Σ_{17}^{17} GOCC [GOCC sc.]	
Nr.	Voor	Na
V1	29,5	26,0
V2	29,5	25,5
T1	38,8	27,6
T2	38,9	32,2
T3	39,0	22,5

$t = 3,436$
 $\alpha = 0,01$ éénzijdig
 $df = 4$; Kr.gr. = 3,747
 niet sign. op $\alpha = 0,01$
 niet verw. H_0

$H_0 - E_2$		
Pa-tiënt	Σ_{17}^{17} GOCC [GOCC-sc.]	
Nr.	Voor	Na
R1	40,7	36,1
R2	31,8	36,8
R3	33,2	28,7
R4	32,2	28,0
R5	29,2	24,9
R6	24,0	18,5
R7	31,8	28,4

$t = 2,251$
 $\alpha = 0,01$ éénzijdig
 $df = 6$; Kr.gr. = 3,143
 niet sign. op $\alpha = 0,01$
 niet verw. H_0

$H_0 - D_2$		
Pa-tiënt	Σ_{17}^{17} GOCC [GOCC-sc.]	
Nr.	Voor	Na
V1	29,5	26,0
V2	29,5	25,5
T1	38,8	27,6
T2	38,9	32,2
T3	39,0	22,5
R1	40,7	36,1
R2	31,8	36,8
R3	33,2	28,7
R4	32,2	28,0
R5	29,2	24,9
R6	24,0	18,5
R7	31,0	28,4

$t = 3,631$
 $\alpha = 0,01$ éénzijdig
 $df = 11$; Kr.gr. = 2,718
 Sign. Verw. H_0

BIJLAGE 6: VERZAMELTABEL INZAKE BEHOUD VAN GEDRAG ONDER TOENEMENDE STIMULUS-COMPLEXITEIT.

Verzameltabel - Experimentele groep

Gegevens patiënt	GOCC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Memory					Concentratie		
		IQ	RoA	RoV	RaA	RaV	T.	R.	F.
E-1 1. m. 2. 21 jaar 3. 2 maanden 4. 3 weken 5. stamcontusio 6. geh. + conc. tr.	Voor training 1,0 1,2 1,7 1,0 2,9 3,3 1,1 1,0 1,0 1,6 1,7 1,0 1,1 1,1 2,6 1,3 1,7 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,0 1,4 1,3 1,3 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,6 1,3 1,3 1,0 1,8 1,4 1,1 Probleem afname 7%	3,0 — 3,0 —	3,0 — 1,0 —	5,0 2,0 4,0 1,0	5,0 2,0 5,0 —	3,5 0,5 4,5 1,0	4,5 1,5 4,5 0	4,0 1,0 1,0 1,0	3,5 0,5 4,0 -0,5
E-2 1. m. 2. 22 jaar 3. 4 maanden 4. 3 maanden 5. cont. cer. + hemi.l. 6. geh. + conc. tr.	Voor training 1,3 2,2 1,7 1,7 4,0 2,5 1,2 1,3 1,8 1,7 2,8 1,3 1,5 1,0 3,3 2,8 2,2 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,0 1,4 1,4 1,6 1,6 1,0 1,0 1,4 2,3 2,1 1,0 1,5 1,5 2,4 1,9 1,9 Probleemafname 35%	2,0 — 2,0 —	2,0 — 1,5 —	5,0 2,0 5,0 0	5,0 2,0 1,5 0	3,5 0,5 1,5 0,5	5,0 2,0 3,5 1,5	5,0 2,0 4,0 1,0	2,0 — 1,0 —
E-3 1. m. 2. 23 jaar 3. 1 jaar + 2 mnd. + 17 dg. 4. 4½ maand 5. stamcont. + hemi.l. 6. geh. + conc. tr.	Voor training 1,0 1,5 1,2 2,7 2,3 1,0 2,0 1,3 1,2 2,2 2,0 1,7 1,2 1,2 2,1 2,9 2,8 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,5 1,2 1,0 1,5 1,0 2,0 1,3 1,2 2,0 1,0 1,5 1,2 1,2 1,5 1,0 1,0 Probleemafname 45%	2,5 — 2,0 —	1,0 — 1,0 —	2,5 — 1,5 —	5,0 2,0 5,0 0	3,5 0,5 1,5 0,5	4,0 1,0 2,5 1,0	5,0 2,0 4,0 1,0	2,0 — 2,0 —
E-4 1. m. 2. 31 jaar 3. 8 mnd. + 22 dagen 4. 8 dagen 5. cont. cer. + hemi.l. 6. geheugentraining	Voor training 1,0 3,0 3,0 3,5 2,0 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,5 1,0 3,5 Probleemgedrag: Na training 1,0 3,0 3,0 3,5 2,0 1,0 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,5 1,0 3,5 Probleemafname 66%	2,5 — 2,5 —	5,0 2,0 1,0 2,0	5,0 2,0 2,5 2,0	5,0 2,0 5,0 —	3,0 — 1,0 —	3,0 — 3,0 —	3,0 — 3,0 —	— — — —
E-5 1. m. 2. 15 jaar 3. 3½ maand 4. 5½ week 5. stamcont. + hemi.r. 6. concentr. tr.	Voor training 1,5 2,1 1,3 2,0 3,9 1,5 3,4 1,3 1,3 1,9 1,7 3,4 1,0 1,3 1,0 2,5 2,1 Probleemgedrag: Na training 1,5 2,1 1,3 2,0 2,9 1,5 2,5 1,3 1,3 1,9 1,7 2,3 1,0 1,3 1,0 1,5 2,1 Probleemafname 83%	2,0 — 2,0 —	3,0 — 2,5 —	2,5 — 2,0 —	3,0 — 2,0 —	2,0 — 1,0 —	4,0 1,0 3,5 0,5	5,0 2,0 1,0 2,0	2,5 — 1,0 —
E-6 1. m. 2. 28 jaar 3. 4 jaar + 8 mnd. 4. twee weken 5. cont. cer. 6. geheugentr.	Voor training 1,0 1,3 1,3 1,4 1,6 1,1 1,7 1,6 1,3 1,6 1,3 1,9 1,1 1,4 1,3 1,1 1,7 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,3 2,0 2,9 2,4 1,4 2,5 1,8 1,4 1,4 2,1 2,6 1,9 1,8 1,6 2,4 2,0 Probleemafname 0%	2,0 — 2,0 —	3,0 — 1,0 —	5,0 2,0 5,0 0	5,0 2,0 5,0 —	2,5 — 1,0 —	2,0 — 1,0 —	1,0 — 1,0 —	1,0 — 2,0 —
E-7 1. m. 2. 18 jaar 3. 4 maanden 4. 1 dag 5. contusio 6. geh. + conc. tr.	Voor training 1,0 1,1 1,1 1,7 1,9 1,6 1,4 1,1 1,0 2,0 2,1 1,0 1,4 1,3 2,9 2,0 2,3 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2 1,0 1,0 1,3 2,0 2,5 1,0 1,3 1,2 2,0 1,8 1,8 Probleemafname 88%	2,0 — 2,0 —	2,0 — 2,0 —	3,5 0,5 3,0 0,5	5,0 2,0 3,5 1,5	2,0 — 1,5 —	3,5 0,5 2,5 0,5	4,0 1,0 2,5 1,0	1,0 — 1,0 —
E-8 1. m. 2. 39 jaar 3. 5 jaar 4. 1 dag 5. cont. cer. 6. geheugentraining	Voor training 1,0 1,3 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Probleemafname 100%	2,0 — 2,0 —	2,5 — 1,0 —	5,0 2,0 1,5 2,0	4,5 1,5 1,0 1,5	1,0 — 1,0 —	1,0 — 1,0 —	1,0 — 1,0 —	1,0 — 1,0 —

VERVOLG BIJLAGE 6.

Verzameltabel inzake behoud van gedrag onder toenemende stimulus-complexiteit.

Verzameltabel - Experimentele groep.

Gegevens patiënt	GOCC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Memory					Concentratie		
		IQ	RaA	RoV	RaA	RaV	T	R	F
E-9 1. v. 2. 22 jaar 3. 4 maanden 4. 1 maand 5. contusio 6. geheugentraining	Voor training 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Probleemafname 80%	3,0 —	2,0 —	5,0 2,0	5,0 2,0	1,5 —	3,5 0,5	3,5 0,5	2,0 —
E-10 1. v. 2. 17 jaar 3. 3 mnd. + 3 weken 4. 3 weken 5. cont. + hemi. links 6. geh. + conc. tr.	Voor training 1,1 1,4 1,1 2,3 2,1 1,1 2,4 1,4 2,0 1,4 1,6 1,3 2,0 1,3 1,7 1,4 1,6 Probleemgedrag: Na training 1,1 1,4 1,6 2,3 2,0 1,1 2,1 1,1 1,3 1,3 1,9 1,6 2,0 1,7 1,9 1,4 1,6 Probleemafname 71%	3,5 0,5	1,5 —	5,0 2,0	2,5 —	3,5 0,5	2,0 —	5,0 2,0	5,0 2,0
E-11 1. v. 2. 20 jaar 3. 3 jaar + 9 mnd. 4. 2 maanden 5. stamcontusio 6. geh. + conc. tr.	Voor training 1,0 1,1 1,1 1,1 2,6 1,3 2,7 1,0 2,6 3,1 2,7 1,6 1,6 1,9 2,7 2,4 1,3 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,6 1,7 2,7 2,4 1,3 3,0 1,0 2,3 3,0 2,9 1,6 2,6 1,6 2,6 3,3 3,2 Probleemafname 31%	3,5 3,5 0	2,5 2,5 —	5,0 5,0 0	5,0 5,0 0	5,0 3,5 1,5	4,5 3,5 1,0	3,0 2,0 —	2,0 1,0 —
E-12 1. v. 2. 16 jaar 3. 3½ jaar 4. 1 week 5. cont. cer. + hemi.r. 6. geheugen + conc. tr.	Voor training 1,0 1,3 1,8 1,6 2,3 1,6 1,8 1,0 1,5 3,0 2,8 1,0 1,5 1,5 2,8 3,0 2,3 Probleemgedrag: Na training 1,0 1,1 1,4 1,7 1,2 1,0 1,7 1,0 1,2 2,7 2,5 1,1 2,0 2,3 2,1 2,3 2,1 Probleemafname 50%	2,0 —	3,5 0,5	4,0 1,0	5,0 2,0	3,5 0,5	3,0 —	2,5 —	1,5 —

Verzameltabel - controle groep

C-1 1. m. 2. 28 jaar 3. 2 maanden 4. een week 5. cont. + hemi.r.	Voor contr. per 1,0 1,3 1,7 1,0 1,7 1,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 Probleemafname + 13%	2,5 —	4,0 1,0	4,0 1,0	5,0 2,0	3,5 0,5	5,0 2,0	4,0 1,0	1,0 —
C-2 1. m. 2. 22 jaar 3. 3 mnd. + 1 week 4. 6 weken 5. stamcontusio	Voor contr. per. 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,6 1,3 2,3 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,6 1,3 2,3 Probleemafname - 11%	2,5 —	1,5 —	4,5 1,5	4,5 1,5	3,0 —	3,0 —	4,0 1,0	3,5 0,5
C-3 1. m. 2. 26 jaar 3. 3 maanden 4. 3 weken 5. stamcontusio	Voor contr. per. 1,0 1,5 1,5 1,0 2,2 1,7 1,2 1,0 3,5 1,7 1,5 2,0 1,0 2,0 2,5 2,3 2,4 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 1,0 3,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 Probleemafname + 40%	2,0 —	1,5 —	4,0 1,0	5,0 2,0	1,0 —	5,0 2,0	5,0 2,0	5,0 2,0
C-4 1. m. 2. 16 jaar 3. 1 mnd. + 3 weken 4. 2 weken 5. contusio cer.	Voor contr. per. 1,0 1,4 1,6 2,6 1,8 1,0 3,9 1,8 2,1 1,6 2,9 3,3 2,9 2,5 2,1 2,8 2,1 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,3 1,0 2,6 1,6 1,0 3,6 1,0 1,3 1,0 2,6 1,0 1,6 2,6 2,0 2,0 2,0 Probleemafname - 27%	2,5 —	1,0 —	2,5 —	5,0 2,0	2,0 —	5,0 2,0	4,5 1,5	2,0 —

VERVOLG BIJLAGE 6.

Verzameltabel inzake behoud van gedrag onder toenemende stimulus-complexiteit. Verzameltabel-controle groep.

Gegevens patiënt	GOCC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Memory					Concentratie		
		IQ	RoA	RoV	RaA	RaV	T.	R.	F.
C-5 1. m. 2. 33 jaar 3. 1 jaar + 2 mnd. 4. 1 week 5. contusio cerebri	Voor contr. per. 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Problemafname - 25%	2,0 —	4,0 1,0	4,0 1,0	1,0 —	1,5 —	1,5 —	1,0 —	1,0 —
C-6 1. m. 2. 21 jaar 3. 3 maanden + 3 weken 4. 4 weken 5. cont. cer. + hemi.l.	Voor contr. per. 1,0 1,0 1,6 1,0 1,0 1,0 2,6 1,6 1,6 1,3 2,0 2,3 1,0 1,0 1,0 2,0 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 1,6 1,0 1,0 1,0 2,6 1,0 1,6 1,3 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 2,0 Problemafname - 13%	2,5 —	2,0 —	5,0 2,0	5,0 2,0	2,5 —	2,0 —	2,5 —	2,0 —
C-7 1. m. 2. 25 jaar 3. 1½ week 4. 1 maand 5. contusio cerebri	Voor contr. per. 1,0 1,4 1,6 1,2 2,0 2,2 1,0 1,0 1,2 1,2 2,0 2,0 1,2 2,0 2,2 2,0 2,2 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,3 2,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 2,3 1,0 2,0 Problemafname + 35%	3,5 0,5	3,5 0,5	5,0 2,0	5,0 2,0	3,5 0,5	4,5 1,5	4,0 1,0	5,0 2,0
C-8 1. m. 2. 25 jaar 3. 1 jaar + 2 mnd. 4. 4½ maand 5. contusio cerebri	Voor contr. per. 1,0 1,5 1,2 2,0 2,5 1,0 2,0 1,3 1,2 2,0 3,0 1,5 1,2 1,2 1,5 2,0 2,0 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 1,0 3,5 2,5 1,0 4,5 1,0 1,5 1,0 3,0 1,5 2,5 3,0 2,0 2,5 1,5 Problemafname - 25%	2,0 —	1,0 —	1,5 —	5,0 2,0	1,5 —	2,5 —	5,0 2,0	2,0 —

C-9 1. v. 2. 23 jaar 3. 7 jaar 4. 4 maanden 5. cont. cer. + hemi.l.	Voor contr. per. 1,0 1,2 1,4 1,0 2,8 1,7 2,8 1,4 1,0 1,4 2,0 1,2 1,8 1,3 2,8 1,6 2,0 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 2,0 2,3 2,6 1,3 1,6 1,3 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 2,3 1,0 2,0 Problemafname - 50%	2,5 —	2,0 —	5,0 2,0	5,0 2,0	3,0 —	1,5 —	1,0 —	1,0 —
C-10 1. v. 2. 34 jaar 3. 3 maanden 4. 1 maand 5. contusio cerebri	Voor contr. per. 1,0 1,0 1,0 1,3 2,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 1,0 1,3 2,6 1,0 1,6 1,6 1,0 1,0 1,6 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 2,0 Problemafname + 32%	3,5 0,5	2,5 —	5,0 2,0	5,0 2,0	5,0 2,0	4,5 1,5	4,5 1,5	1,0 —
C-11 1. v. 2. 20 jaar 3. 6 mnd. + 1 week 4. 8 weken 5. contusio cer.	Voor contr. per. 1,0 1,4 1,9 1,8 2,8 2,4 1,1 1,0 1,1 2,4 2,5 2,1 1,6 1,0 2,4 2,2 2,2 Probleemgedrag: Na contr. per. 1,0 1,0 1,3 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 2,0 Problemafname + 11%	1,0 —	1,0 —	4,0 1,0	5,0 2,0	4,5 1,5	3,0 —	1,5 —	1,0 —
C-12 1. v. 2. 36 jaar 3. 1 jaar + 5 mnd. 4. 5 weken 5. stamcont. + hemi.r.	Voor contr. per. 3,0 2,0 3,5 4,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 3,0 1,0 Probleemgedrag: Na contr. per. 2,5 2,0 3,5 4,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 1,5 3,0 1,0 Problemafname + 38%	3,5 0,5	2,0 —	5,0 2,0	4,0 1,0	3,5 0,5	1,5 —	2,0 —	2,5 —

BIJLAGE 7: TOETSING VAN DE PROCEDURE TOT GEDRAGSBEHOUD ONDER TOENEMENDE STIMULUSCOMPLEXITEIT.

A. TOETSING DER A-HYPOTHESEN.

$H_0 - A 1$			$H_0 - A 2$			$H_0 - A 3$		
GOCC item.	$\Sigma^{1/2}$ pat. [GOCC sk] Exp.	Contr.	pat. Nr.	$\Sigma^{1/2}$ GOCC [GOCC sk] Exp.	Contr.	PO item	$\Sigma^{1/2}$ pat. [PO sk] Exp.	Contr.
1.	12.9	14.0	1.	26.3	20.3	IQ	30.0	30.0
2.	18.5	15.7	2.	34.4	22.8	RoA	31.0	26.0
3.	17.4	19.0	3.	30.3	30.8	RoV	52.5	49.5
4.	21.0	19.3	4.	32.5	37.4	RaA	55.0	54.5
5.	27.7	23.3	5.	33.2	17.3	RaV	34.5	34.5
6.	18.0	17.2	6.	23.7	24.0	T	40.0	39.0
7.	23.7	21.4	7.	26.9	27.4	R	42.0	39.0
8.	14.0	14.6	8.	18.0	20.1	F	26.5	27.0
9.	16.7	16.7	9.	17.0	28.4	$t = 0,288$ $df = 14$ $\alpha = 0,50$ tweezijdig kritieke gr. 0,692 $t =$ niet sign. niet verwerpen $H_0 - A 3$		
10.	21.7	18.6	10.	27.2	24.3			
11.	21.7	22.8	11.	21.8	30.9			
12.	19.5	21.4	12.	31.8	34.0			
13.	15.4	16.7	$t = 0,286$ $df = 22$ $\alpha = 0,50$ tweezijdig kritieke gr. 0,686 $t =$ niet sign. niet verwerpen $H_0 - A 2$					
14.	15.0	16.5						
15.	23.9	23.0						
16.	22.4	22.2						
17.	23.5	22.5						
$t = 0,400$ $df = 32$ $\alpha = 0,50$ tweezijdig krit. gr. 0,674 $t =$ niet significant niet verwerpen $H_0 - A 1$			$H_0 - A 4$			$H_0 - A 5$		
			pat Nr.	$\Sigma^{1/2}$ PO [PO sk] Exp.	Contr.	pat Nr.	$\Sigma^{1/2}$ PO [PO > 3 sk] Exp.	Contr.
			1.	31.5	29.0	1.	5.0	7.5
			2.	29.5	26.5	2.	7.0	4.5
			3.	25.5	28.5	3.	8.0	9.0
			4.	29.5	24.5	4.	4.0	2.0
			5.	24.0	16.0	5.	3.0	2.0
			6.	21.5	23.5	6.	4.0	4.0
			7.	23.0	34.0	7.	4.0	10.0
			8.	18.0	20.5	8.	3.5	4.0
			9.	25.5	21.0	9.	7.5	4.0
			10.	28.0	31.0	10.	8.5	9.5
			11.	30.5	21.0	11.	5.5	4.5
			12.	25.0	24.0	12.	6.0	4.0
			$t = 0,535$ $df = 22$ $\alpha = 0,50$ tweezijdig kritieke gr. 0,686 $t =$ niet sign. niet verwerpen $H_0 - A 4$			$t = 0,215$ $df = 22$ $\alpha = 0,50$ tweezijdig kritieke gr. 0,686 $t =$ niet sign. niet verwerpen $H_0 - A 5$		

De H-A hypothesen kunnen voor alle bewerkingen worden aanvaard. Dit impliceert akseptatie dat experimentele groep en controle-groep, althans vóór de behandeling-resp. controleperiode aan elkaar gelijk kunnen worden gesteld.

Deze konklusie wettigt verdere toetsing van de B-hypothesen „Er bestaat (voor meerdere kriteria) geen verschil in experimentele groepsscores vóór en na de behandeling en er bestaat geen verschil in controle groepsscores vóór en na de controleperiode.”

VERVOLG BIJLAGE 7.
B. TOETSING DER B-HYPOTHESEN

H ₀ - B 1			H ₀ - B 3			H ₀ - B 5		
GOCC item	Σ I ² pat. [GOCC sk]		PO item	Σ I ² pat. [PO sc.]		GOCC item	Σ I ² pat. [GOCC sc.]	
	voor	na		voor	na		voor	na
1.	12.9	12.6	IQ	30.0	29.5	1.	14.0	13.8
2.	18.5	17.2	RoA	31.0	19.0	2.	15.7	13.6
3.	17.4	18.5	RoV	52.5	34.5	3.	19.0	18.9
4.	21.0	22.3	RaA	55.0	44.5	4.	19.3	23.0
5.	27.7	20.5	RaV	34.5	22.5	5.	23.3	20.8
6.	18.0	14.6	T	40.0	32.0	6.	17.2	16.3
7.	23.7	22.9	R	42.0	29.0	7.	21.4	22.7
8.	14.0	13.6	F	26.5	19.5	8.	14.6	12.9
9.	16.7	15.4	t = 5,591 df = 7 α = 0,01 tweezijdig kr. grens = 3,499 signifikant 14. verwerpen H ₀ - B 3			9.	16.7	15.7
10.	21.7	20.6				10.	18.6	15.8
11.	21.7	21.3				11.	22.8	18.4
12.	19.5	19.0				12.	21.4	12.8
13.	15.4	17.8				13.	16.7	15.1
14.	15.0	16.6				14.	16.5	16.1
15.	23.9	20.4				15.	23.0	22.3
16.	22.4	20.0				16.	22.2	19.1
17.	23.5	22.3				17.	22.5	21.1
t = 1,741 df = 16 α = 0,01 tweezijdig kr. grens: 2,921 niet sign. geen verw. H ₀ - B 1			H ₀ - B 4			t = 2,510 df = 16 α = 0,01 tweezijdig kr. grens 2,92 niet sign. geen verw. H ₀ - B 5		
			pat. nr.	Σ [*] PO voor	[PO sc.] na			
			1.	31.5	27.0			
			2.	29.5	23.5			
			3.	25.5	19.5			
			4.	29.5	21.0			
			5.	24.0	15.0			
			6.	21.5	18.0			
			7.	23.0	18.0			
			8.	18.0	9.5			
			9.	25.5	15.0			
			10.	28.0	21.0			
			11.	30.5	26.0			
12.	25.0	17.0						
H ₀ - B 2			H ₀ - B 6					
pat. nr.	Σ I ² GOCC [GOCC sk]		pat. nr.	Σ I ² GOCC [GOCC sk]				
	voor	na		voor	na			
1.	26.3	21.2	1.	20.3	19.4			
2.	34.3	26.0	2.	22.8	23.1			
3.	30.3	22.1	3.	30.0	27.5			
4.	32.5	32.5	4.	37.4	29.2			
5.	33.2	29.2	5.	17.3	17.0			
6.	23.7	32.5	6.	24.0	21.4			
7.	26.9	24.5	7.	27.4	23.9			
8.	18.0	17.0	8.	28.1	24.0			
9.	17.0	17.0	9.	28.4	24.7			
10.	27.2	27.4	10.	24.3	24.7			
11.	31.8	37.8	12.	30.9	21.2			
12.	31.8	28.4	t = 1,981 df = 11 α = 0,01 tweezijdig kr. grens: 3,106 niet signifikant geen verw. H ₀ - B 6					
t = 0,987 df = 11 α = 0,01 tweezijdig kr. grens 3,106 niet sign. niet verw. H ₀ - B 2								

VERVOLG BIJLAGE 7. Toetsing der B-hypothesen

$H_0 - B 7$			$H_0 - B 9$		
PO item	Σ_1^{12} pat voor	[PO sc.] na	pat nr.	Σ_1^8 PO voor	[PO > 3 sc.] na
IQ	30.0	33.0	1.	5.0	1.0
RoA	26.0	27.5	2.	7.0	2.0
RoV	49.5	54.5	3.	8.0	6.5
RaA	54.5	52.5	4.	4.0	2.0
RaV	34.5	33.0	5.	3.0	0.5
T	39.0	35.0	6.	4.0	4.0
R	39.0	33.0	7.	4.0	0.5
F	27.0	23.5	8.	3.5	0
			9.	7.5	6.0
			10.	8.5	5.5
			11.	5.5	3.0
			12.	6.0	2.0
$t = 0,705$ $df = 7$ $\alpha = 0,01$ tweezijdig kr. grens = 3,499 niet sign. niet verw. $H_0 - B 7$			$t = 6,306$ $df = 11$ $\alpha = 0,01$ tweezijdig kritieke grens 3,106 signifikant verwerpen $H_0 - B 9$		
$H_0 - B 8$			$H_0 - B 10$		
pat nr.	Σ_1^{17} PO voor	[PO sc.] na	pat. nr.	Σ_1^8 PO voor	[PO > 3 sc.] na
1.	29.0	28.0	1.	7.5	6.5
2.	26.5	24.5	2.	4.5	5.0
3.	28.5	24.5	3.	9.0	5.5
4.	24.5	28.0	4.	5.5	7.0
5.	16.0	16.5	5.	2.0	2.5
6.	23.5	26.0	6.	4.0	4.5
7.	34.0	28.5	7.	10.0	6.5
8.	20.5	25.5	8.	4.0	5.0
9.	21.0	23.5	9.	4.0	6.0
10.	31.0	26.5	10.	9.5	6.5
11.	21.0	20.0	11.	4.5	4.0
12.	24.0	20.5	12.	4.0	2.5
$t = 0,544$ $df = 11$ $\alpha = 0,01$ tweezijdig kr. grens 3,106 niet sign. geen verw. $H_0 - B 8$			$t = 1,076$ $df = 11$ $\alpha = 0,01$ tweezijdig kr. grens 3,106 niet sign. geen verw. $H_0 - B 10$		

Uit bovenstaande toetsingsbevindingen kan gekoncludeerd worden:

1e. Er bestaat geen verschil in gemiddelden der GOCC-scores vóór en na de behandeling, zowel bij experimentele als controlegroep.

2e. Er bestaat geen verschil in gemiddelden der PO-scores vóór en na de controleperiode bij de controlegroep.

3e. Er bestaat wel verschil in gemiddelden der PO-scores vóór en na de behandeling bij experimentele groep.

Bij deze konklusie wordt een fout van 0,01 geaksepteerd.

VERVOLG BIJLAGE 7.

Toetsing der C-hypothesen.

Alleen Hypothese H_0 -C 2 komt voor verdere toetsing in aanmerking.

Per apart PO-kriterium zal worden gezien in hoeverre deze nulhypothese kan worden verworpen.

Uit de verzameltabel blijkt dat de IQ-skores bij de experimentele groep vóór en na toetsing gelijk zijn. Derhalve lijkt ook toetsing voor dit PO-kriterium overbodig en kan de nulhypothese wat betreft IQ niet worden verworpen.

H_0 -C 2	RoA		RoV		RaA		RaV		PO-skores voor/na		R		F	
patient nr.	PO-skores voor/na		PO-skores voor/na		PO-skores voor/na		PO-skores voor/na		PO-skores voor/na		PO-skores voor/na		PO-skores voor/na	
1.	3.0	1.0	5.0	4.0	5.0	5.0	3.5	4.5	4.5	4.5	4.0	1.0	3.5	4.0
2.	2.0	1.5	5.0	5.0	5.0	5.0	3.5	1.5	5.0	3.5	5.0	4.0	2.0	1.0
3.	1.0	1.0	2.5	1.5	5.0	5.0	3.5	1.5	4.0	2.5	5.0	4.0	2.0	2.0
4.	5.0	1.0	5.0	2.5	5.0	5.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.	3.0	2.5	2.5	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	4.0	3.5	5.0	1.0	2.5	1.0
6.	3.0	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	2.5	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
7.	2.0	2.0	3.5	3.0	5.0	3.5	2.0	1.5	3.5	2.5	4.0	2.5	1.0	1.0
8.	2.5	1.0	5.0	1.5	4.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9.	2.0	1.0	5.0	1.0	5.0	1.0	1.5	1.0	3.5	3.5	3.5	3.5	2.0	1.0
10.	1.5	2.0	5.0	3.0	2.5	2.0	3.5	3.5	2.0	2.0	5.0	4.0	5.0	1.0
11.	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.5	4.5	3.5	3.0	2.0	2.0	1.0
12.	3.5	2.5	4.0	1.0	5.0	5.0	3.5	1.5	3.0	1.5	2.5	2.0	1.5	1.5
	$t = 2,421$ $df = 11; \alpha = 0,01$ eenzijdig kr. gr.: 2,718 niet sign. niet verworpen van H_0		$t = 3,605$ $df = 11; \alpha = 0,01$ eenzijdig kr. gr.: 2,718 sign. verwerpen H_0		$t = 2,131$ $df = 11; \alpha = 0,01$ eenzijdig kr. gr.: 2,718 niet sign. niet verworpen van H_0		$t = 3,450$ $df = 11; \alpha = 0,01$ eenzijdig kr. gr.: 2,718 sign. verwerpen H_0		$t = 3,582$ $df = 11; \alpha = 0,01$ eenzijdig kr. gr.: 2,718 sign. verwerpen H_0		$t = 2,964$ $df = 11; \alpha = 0,01$ eenzijdig kr. gr.: 2,718 sign. verwerpen H_0		$t = 1,654$ $df = 11; \alpha = 0,01$ eenzijdig kr. gr.: 2,718 niet sign. niet verworpen van H_0	

RoA = recognitie Auditief

RoV = recognitie Visueel

RaA = recall Auditief

RaV = recall Visueel

T = Tempo

R = Regelmaat

F = Fouten

CURRICULUM VITAE

J. A. Schuerman, geboren 4-12-1931 te Goes, volgde na het eindexamen H.B.S.-B aldaar de H.T.S. te Amsterdam. Met een onderbreking van twee jaar militaire dienst, werkte hij bij het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium te Amsterdam, alwaar hij in 1962 aan de Gemeentelijke Universiteit tevens begon met de studie psychologie. Met als hoofdrichting persoonlijkheidsleer behaalde hij in 1970 het doktoraalexamen psychologie, waarna hij zich specialiseerde in de gedragstherapie. Als psycholoog werd hij aangesteld in het psychiatrisch centrum „Licht en Kracht” te Assen ten behoeve van de klinische psychodiagnostiek en psychotherapie van psychiatrische patiënten.

In 1972 werd hij aangesteld als hoofd van de afdeling psychologie van het Revalidatie Centrum „Hoensbroeck”. Als medewerker van de capaciteitsgroep Medische Psychologie van de Medische Faculteit Maastricht werkte hij o.a. als opleider en supervisor mee aan de opleiding van gedragstherapeuten en psychotherapeuten in het kader van het Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg te Maastricht. Vanaf 1973 werkte hij in het Revalidatie Centrum „Hoensbroeck” aan de ontwikkeling van de revalidatiepsychologie met name wat betreft de toepassing van leertheoretische verworvenheden en gedragstherapeutische methodieken ten behoeve van cerebraal gestoorde. In een specifiek daarop toegespitst researchproject zal hij aan deze ontwikkeling de eerstkomende jaren blijven werken.

Publicaties:

- Psychologische diagnostiek en behandelingsmogelijkheden bij hersentraumata
Meta Medica 1974, 5 (p. 98-102)
- Perspektief voor de Contusio Cerebri in de Revalidatie I en II. De Psycholoog
1975, resp. 10/3 (p. 83-95) en 10/5 (p. 227-251).
- Gedragsverandering. Ned. Tijdschrift voor Fysiotherapie 1977, 7/8.