Hartrevalidatie in Nederland geregistreerd en geevalueerd : een inventariserend onderzoek naar hartrevalidatie in Nederland

Citation for published version (APA):

Soons, P. H. G. M. (1995). *Hartrevalidatie in Nederland geregistreerd en geevalueerd : een inventariserend onderzoek naar hartrevalidatie in Nederland*. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse / Universitaire Pers Maastricht. <https://doi.org/10.26481/dis.19950629ps>

Document status and date:

Published: 01/01/1995

DOI:

[10.26481/dis.19950629ps](https://doi.org/10.26481/dis.19950629ps)

Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

HARTREVALIDATIE IN NEDERLAND
GEREGISTREERD EN GEËVALUEERD

CIP-DATA KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG

Soons, Paulus Hubertus Gerardus Marie

Hartrevalidatie in Nederland geregistreerd en geëvalueerd

: een inventariserend onderzoek naar hartrevalidatie in

Nederland / Paulus Hubertus Gerardus Marie Soons. -

Maastricht : Universitaire Pers Maastricht. - Met

lit. opg. - Met samenvatting in het Engels.

ISBN 90 5278 194 X

Trefw.: hartrevalidatie ; Nederland ; onderzoek.

HARTREVALIDATIE IN NEDERLAND GEREGISTREERD EN GEËVALUEERD

Een inventariserend onderzoek naar
hartrevalidatie in Nederland

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht,
op gezag van de Rector Magnificus, Prof. mr. M.J. Cohen,
volgens het besluit van het College van Dekanen,
in het openbaar te verdedigen
op donderdag 29 juni 1995 om 16.00 uur

door

Paulus Hubertus Gerardus Marie Soons

geboren te Merkelbeek

UNIVERSITAIRE PERS MAASTRICHT

Promotor:

Prof.dr. H.J.J. Wellens

Co-promotores:

Dr. F.W.H.M. Bär

Dr. J.P.M. Diederiks

Beoordelingscommissie:

Prof.dr. A.P.W.M. Appels (voorzitter)

Dr. J.J. van Dixhoorn (arts, Amersfoort)

Prof.dr. C.M.J.G.Maes (Rijksuniversiteit Leiden)

Prof.dr. J.W. van Ree

Dr. C. de Zwaan

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1.1	Ontwikkelingen in de hartrevalidatie: algemeen	9
1.2	Hartrevalidatie in Nederland	11
1.3	Doelen hartrevalidatie	13
1.4	Fasen van hartrevalidatie	13
1.4.1	<i>Fase 1: opname in het ziekenhuis</i>	14
1.4.2	<i>Fase 2: revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis</i>	14
1.4.3	<i>Fase 3: nazorg</i>	15
1.5	Revalidatiegeneeskunde en hartpatiënten	15
1.6	Probleemstelling	16
1.7	Het Registratieproject	17
1.8	Hoofdstukindeling	18

Hoofdstuk 2: INVENTARISATIESTUDIES BETREFFENDE HARTREVALIDATIE IN BINNEN- EN BUITENLAND

2.1	Inleiding	19
2.2	Nederland	19
2.2.1	<i>Onderzoek naar aard en omvang van de zorg voor hartpatiënten</i>	19
2.2.2	<i>Onderzoek naar specifieke aspecten van de zorg voor hartpatiënten</i>	23
2.2.3	<i>Beschouwing over de hartrevalidatie in Nederland</i>	26
2.3	Europa	27
2.3.1	<i>West-Duitsland</i>	27
2.3.2	<i>Engeland</i>	30
2.3.3	<i>Italië</i>	31
2.3.4	<i>Commentaar op studies uit Europa</i>	32
2.4	Niet-Europese landen	33
2.4.1	<i>Verenigde Staten</i>	33
2.4.2	<i>Canada</i>	34
2.4.3	<i>Australië</i>	35
2.5	Discussie	37
2.5.1	<i>Algemeen</i>	37
2.5.2	<i>Inhoudelijke beschouwingen</i>	37
2.5.3	<i>Methoden van onderzoek</i>	39
2.5.4	<i>Consequenties voor het eigen onderzoek</i>	40
2.6	Conclusies	40

Hoofdstuk 3: MOBILISATIE TIJDENS OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

3.1	Inleiding	41
3.2	Vraagstelling	41
3.3	Methoden	41
3.4	Resultaten	42
3.4.1	<i>Respons</i>	42
3.4.2	<i>Onderzoeksgegevens</i>	42
3.5	Discussie	46
3.5.1	<i>Dataverzameling en beperkingen</i>	47
3.5.2	<i>Onderzoekspopulaties</i>	48
3.5.3	<i>Vergelijking van de resultaten van de twee onderzoeksmethoden</i>	48
3.5.4	<i>Beschouwingen</i>	49
3.6	Conclusies	51

Hoofdstuk 4: REVALIDATIE NA ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS

4.1	Inleiding	53
4.2	Vraagstelling	53
4.3	Methoden	53
4.4	Resultaten	54
4.4.1	<i>Respons</i>	54
4.4.2	<i>Onderzoeksgegevens</i>	55
4.5	Discussie	65
4.5.1	<i>Onderzoekspopulaties</i>	65
4.5.2	<i>Dataverzameling en beperkingen</i>	65
4.5.3	<i>Vergelijking van de onderzoeksmethoden</i>	65
4.5.4	<i>Beschouwingen</i>	67
4.6	Conclusies	72

Hoofdstuk 5: NAZORG

5.1	Inleiding	75
5.2	Vraagstelling	75
5.3	Methode	75
5.4	Resultaten	76
5.4.1	<i>Respons</i>	76
5.4.2	<i>Onderzoeksgegevens</i>	76
5.5	Discussie	83
5.5.1	<i>Dataverzameling</i>	
5.5.2	<i>Beschouwingen</i>	83
5.6	Conclusies	84

Hoofdstuk 6: ALGEMENE DISCUSSIE

6.1	Inleiding	85
6.2	Evaluatie van de gebruikte methoden van onderzoek	85
6.3	Evaluatie van de revalidatie in Nederland	86
6.3.1	<i>Opnamefase</i>	86
6.3.2	<i>Revalidatie na ontslag</i>	88
6.3.3	<i>Nazorg</i>	92
6.4	Hoe verder?	93
Samenvatting		95
Summary		101
Literatuurlijst		107
Bijlage I:	Enquête hartrevalidatie tijdens opname	115
Bijlage II:	Individuele patiëntenregistratielijst hartrevalidatie tijdens opname en hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis	121
Bijlage III:	Enquête hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis	129
Bijlage IV:	Enquête nazorg hartpatiënten	135
Dankwoord		141
Curriculum vitae		143

HOOFDSTUK 1

Inleiding en probleemstelling

1.1 ONTWIKKELINGEN IN DE HARTREVALIDATIE: ALGEMEEN

Voor 1950 werd langdurige bedrust (zes weken) voor de hartinfarctpatiënt noodzakelijk geacht, omdat de verlittekening van het necrotisch myocard tenminste zes weken zou vergen (Hellerstein, 1986). Een dergelijk beleid had grote terughoudendheid en zelfs angst voor inspanning tot gevolg. Deze visie impliceerde eveneens zeer beperkte toekomstperspectieven voor de patiënt. Een infarct resulteerde ondermeer bijna automatisch in arbeidsongeschiktheid.

Een kentering ontstond door twee ontwikkelingen: op de eerste plaats versnelden Levine en Lown (1951), omstreeks 1950, de mobilisatie door toepassing van "chair treatment" tijdens de herstelfase na een infarct. Tijdens een dergelijke behandeling bleken geen complicaties op te treden. Deze resultaten waren zowel fysiek als psychologisch gunstig voor de patiënt. Deze ontwikkeling was de start van fysieke reconditionering tijdens opname in het ziekenhuis.

De tweede ontwikkeling was dat de inspanningstolerantie bij hartpatiënten onderzocht werd om een eventuele arbeidsgeschiktheid te beoordelen. Hiertoe werden de zogenaamde "work classification units" in de Verenigde Staten en later ook in Zweden en Australië opgezet (Dixhoorn van, 1990). In deze instellingen werd bepaald in welke mate een hartpatiënt weer kon gaan werken. Veel patiënten bleken in staat volwaardige arbeid te verrichten zonder extra ziekteverzuim, maar ook zonder extra risico's. Hiermee was de opvatting van langdurige immobilisatie en invaliditeit van hartinfarctpatiënten achterhaald.

Als vervolg hierop werden in de Verenigde Staten en Finland fysieke programma's ontwikkeld en succesvol toegepast. Doel was achteruitgang van de fysieke conditie, thromboëmbolieën en emotionele invaliditeit te beperken cq te voorkomen (Dixhoorn van, 1990). Door gunstige effecten van deze programma's op werkhervatting ontstond het idee om de fysieke capaciteit van de patiënt te vergroten door middel van expliciete trainingsprogramma's. Deze programma's vormden de aanzet voor de huidige hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis. In bovengenoemde ontwikkelingen lag de kiem voor de latere, eenzijdige gerichtheid op fysieke reconditionering.

Indien er na de revalidatiefase nog fysieke en/of psychosociale problemen waren, of

wanneer de patiënt de effecten van de revalidatie wilde bestendigen, kon deze middels een fysiek onderhoudsprogramma zijn revalidatie vervolgen (Denolin, 1985).

De grote nadruk op de inspanningsfysiologie en het niet tot ontwikkeling komen van de psychosociale zorg was kenmerkend voor de zestiger en zeventiger jaren. Het inspanningsfysiologisch onderzoek kon gerealiseerd worden dankzij nieuwe ontwikkelingen in de cardiologie: onder meer toepassing van ergometrie en ECG-monitoring, die bewaakte inspanning mogelijk maakte. Het ergometrisch onderzoek kreeg een steeds centralere rol. Revalidatie was langzamerhand identiek geworden aan conditieverbetering. In deze periode ontstonden ook de eerste hartrevalidatiecentra in de USA, Finland, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland. Deze kwamen mede tot stand door regelmatige bijeenkomsten van de Wereldgezondheidsraad met als doel hartrevalidatie ook in Europa te propageren. De WHO zorgde voor het verzamelen van know-how (WHO, 1964 en 1967) en gaf aanbevelingen omtrent de inhoudelijke vormgeving van revalidatie programma's. Hartrevalidatie diende zowel fysieke aspecten (WHO, 1968), als psychosociale onderdelen (WHO, 1970) te bevatten. Van dat laatste kwam in de praktijk echter weinig terecht. Op papier werd het belang van psychologische aspecten hoog ingeschat (Gentry & Williams, 1975; Stocksmeier, 1976; König, 1976).

Dankzij het herkennen van de risicofactoren voor het krijgen van coronariaalijden werd langzamerhand de waarde van secundaire preventie herkend (Hellerstein, 1986). Tijdens de revalidatie werd in beperkte mate aandacht besteed aan de verandering van deze risicofactoren. Ze richtte zich onder meer op roken, hypercholesterolemie, hypertensie en gebrek aan bewegen.

Rond 1980 was reconditionering in de ziekenhuisfase in de meeste ziekenhuizen een geaccepteerde therapie. Ook omtrent fysieke reconditionering na de ziekenhuisfase bestond redelijke consensus. Een multidisciplinaire aanpak, psychosociale zorg en de systematisch toepassing van secundaire preventie kwam echter nog steeds weinig voor. De noodzaak ervan werd, in ieder geval theoretisch, wel ingezien (Denolin, 1985).

Naast de inhoudelijke aanpak van hartrevalidatie is belangrijk hoe revalidatie-activiteiten betreffende revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis georganiseerd moeten worden. Dit is vooral een probleem omdat hiervoor, in tegenstelling tot de revalidatie tijdens de opname, aparte organisatorische eenheden gecreëerd dienden te worden, die relatief kostbaar zijn.

In sommige landen gaan de patiënten vanuit het ziekenhuis van opname direct door naar een gespecialiseerd (klinisch) revalidatiecentrum, andere landen prefereren een minder formeel poliklinisch revalidatieprogramma in het ziekenhuis van opname (Cantwell, 1979). Bovendien bestaat een combinatie van deze twee mogelijkheden: een deel van de patiënten wordt doorgestuurd naar een revalidatiecentrum voor klinische revalidatie en een ander deel voor poliklinische revalidatie. Per land of regio bestaat er een enorme variatie aan revalidatiefaciliteiten, met aan het ene uiterste klinische revalidatie in een revalidatiecentrum en aan het andere uiterste fysieke oefeningen voor thuis met geen of weinig controlemogelijkheden. Totaal onduidelijk is hoe activiteiten van patiëntenver-

enigingen na afloop van de revalidatie georganiseerd zouden moeten worden (Denolin, 1985).

In de tachtiger jaren wordt dan ook, vanwege de inhoudelijke en organisatorische onduidelijkheden, steeds vaker de vraag gesteld: "hoe moeten we nu verder met hartrevalidatie?". De hartrevalidatie zit in een impasse! Idealiter zou per individuele patiënt bekeken moeten worden of de patiënt revalidatie nodig heeft en welk revalidatieprogramma het meest geschikt is. Als consequentie hiervan zou de organisatie van de hartrevalidatie hieraan aangepast moeten worden. Standaard programma's, zoals nu gangbaar zijn, gericht op groepen zouden dan niet meer voldoen (Verkley, 1982; Meyer, 1985; Wenger, 1987; Erdman & Dixhoorn van, 1987; Erdman & Weeda, 1989).

1.2 HARTREVALIDATIE IN NEDERLAND

In het navolgende wordt een beeld geschetst van het gevoerde beleid door de Nederlandse Hartstichting en de overheid ten aanzien van hartrevalidatie.

Op 18 mei 1965 werd door de Nederlandse Hartstichting de Revalidatie Commissie opgericht. Een jaar later resulteerde dit in een rapport getiteld "Revalidatie van de hartpatiënt" (NHS, 1966; Bonjer, 1968; Straten van, 1968), waarin aanbevelingen gedaan werden om hartrevalidatie in Nederland van de grond te krijgen. Het hoofddoel was de kans op werkhervatting te verbeteren. De volgende behandelonderdelen werden aanbevolen: fysieke reconditionering, psychische reconditionering, ergometrie ter meting van het resterend arbeidsvermogen en voorbereiding op werkhervatting. Revalidatie na ontslag zou geconcentreerd moeten worden in een beperkt aantal gespecialiseerde, regionaal opererende hartrevalidatiecentra. Revalidatie na ontslag was geïndiceerd voor patiënten met een middelzwaar infarct, patiënten met een discrepantie tussen subjectieve klachten en objectieve bevindingen, en ongeschoolde hartpatiënten van middelbare leeftijd. Revalidatie werd ongeschikt geacht voor patiënten die zonder meer weer aan het werk konden en voor patiënten die arbeidsongeschikt waren.

Na een studiereis van de Revalidatie Commissie naar Scandinavië ging de hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis in 1970 officieel van start in 5 centra (NHS, 1969): Academisch Ziekenhuis Leiden/Zeehospitium Katwijk, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Academisch Ziekenhuis Groningen/Beatrixoord Haren, Wilhelmina Gasthuis Amsterdam/Revalidatie Instituut Muiderpoort en Ziekenhuis Ziekenzorg Enschede. Na gunstige ervaringen in het eerste proefjaar werden overeenkomsten met de ziekenfondsen aangegaan, zodat er een gezonde financiële basis ontstond om deze activiteiten voort te zetten (Weeda & Visser, 1981). De verdere uitbreiding van de hartrevalidatie verliep geleidelijk (Meijler, 1973; Verstappen ea, 1974; Meijberg-Schutte & Meijler, 1975; Kazemier, 1979; Dam van & Boer, 1985; Vries de, 1985). De overheid voerde in 1974 een erkenningenbeleid in met de bedoeling een adequate regionale spreiding van

voorzieningen te bewerkstelligen (Vos, 1978). Erkende afdelingen dienden een poliklinisch, multidisciplinair revalidatie programma aan te bieden.

In 1977 verscheen het tweede rapport van de Revalidatie Commissie (NHS, 1977), de 5 bovengenoemde projecten werden geëvalueerd. Doel van de revalidatie diende niet alleen werkhervatting te zijn, maar ook andere aspecten die voor de patiënt in zijn dagelijks leefpatroon van belang waren behoorden onderwerp van hulpverlening te zijn. Verder was revalidatie een belangrijk middel gebleken om een hartpatiënt in fysiek en psychosociaal opzicht tot optimaal functioneren te brengen. Revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis diende voor alle patiënten, voor wie dat nuttig bleek, beschikbaar te komen. Precieze indicatie-criteria werden niet geformuleerd. Psychosociale zorg werd van groot belang geacht. De hulpverleners die hiervoor het meest in aanmerking kwamen waren de maatschappelijk werker, de klinisch psycholoog en soms de psychiater. Er werden enkele instrumenten aanbevolen voor diagnostiek en indicatiestelling op dit terrein. Als behandelingsmogelijkheden werden aanbevolen: crisisinterventie, counselingsgesprekken en psychotherapie. Psychosociale zorg diende gericht te zijn op het individu (de patiënt), het echtpaar/gezin en de werksituatie. Betreffende de organisatie van hartrevalidatie hinkte de Commissie op twee gedachten: aan de ene kant bestond er een voorkeur voor gespecialiseerde centra en aan de andere kant vond men dat in principe ieder ziekenhuis zijn eigen revalidatie moest kunnen geven.

In de praktijk werkte het erkenningenbeleid van de overheid dat gericht was op regionale concentratie niet: patiënten werden niet of onvoldoende doorverwezen en vaak was de wachttijd te lang (Weeda & Visser, 1981). Deze ervaringen waren voor de Revalidatie Commissie aanleiding haar beleid te wijzigen: in 1981 was de Commissie van mening dat ieder ziekenhuis zijn eigen patiënten diende te revalideren (Weeda & Visser, 1981) met als gevolg dat het erkenningenbeleid van de overheid hieraan aangepast diende te worden. Dit is echter niet gebeurd, waardoor er een impasse is opgetreden in de revalidatie: een multidisciplinaire aanpak en met name ook de psychosociale zorg is mede hierdoor onvoldoende tot ontwikkeling gekomen.

Ondertussen nam het aantal afdelingen met alleen fysieke reconditionering aanzienlijk toe, vooral omdat hiervoor een aparte tariefstelling was geregeld. Een andere ontwikkeling was dat secundaire preventie gericht op verandering van risicogedrag, althans op papier, steeds belangrijker gevonden werd (Weeda, 1981).

In 1984 kwam een derde rapport uit (NHS, 1984). De belangrijkste motieven om dit rapport te schrijven waren: het stagnerend erkenningenbeleid, het onvoldoende beschikbaar zijn van revalidatievoorzieningen voor hartpatiënten en het ontbreken van eenstemmigheid over de waarde van hartrevalidatie. Enkele conclusies: voor de meeste patiënten leek reconditionerende fysiotherapie, met als nieuwe factor dat dit kon geschieden in groepsverband, en zonodig begeleiding door maatschappelijk werk, voldoende te zijn. Verder werd ingegaan op de indicatiestelling voor poliklinische hartrevalidatie. Het rapport gaf de volgende indicaties aan: hartinfarct, hartoperatie, lichtere vormen van

angina pectoris, die niet gunstig reageerden op de gebruikelijke behandeling, hartangst, somatisering en onvoldoende zelfvertrouwen.

Medische contra-indicaties waren: ernstige ritmestoornissen, geleidingsstoornissen, ernstige angina pectoris en pompfunctiestoornissen, kortom de cardiaal hogere risicogroep. Ook niet-cardiale aandoeningen die een ongunstige invloed uitoefenen op de lichamelijke conditie zoals sommige longaandoeningen, werden uitgesloten.

Psychosociale contra-indicaties werden eveneens genoemd: gebrek aan motivatie en ernstige psychopathologie. Anno 1990 waren de problemen in de hartrevalidatie in grote lijnen hetzelfde (NHS, 1990).

Samenvattend: er is sprake van een impasse betreffende de manier waarop revalidatie georganiseerd moet worden. Op de tweede plaats is op papier duidelijk welke onderdelen revalidatie dient te bevatten, maar in de praktijk is er geen sprake van een adequate realisering. Op de derde plaats zijn de indicatiecriteria veel te onnauwkeurig omschreven.

1.3 DOELEN HARTREVALIDATIE

In de zorg voor hartpatiënten is, naast medische zorg, revalidatie van groot belang. De doelstellingen van hartrevalidatie zijn tweeledig (Denolin, 1985; NHS, 1990):

- (a) Het terugbrengen van de patiënt naar zijn vroegere toestand, in fysiek, sociaal en psychologisch opzicht, afhankelijk van de beperkingen als gevolg van het incident en
- (b) De beïnvloeding van de factoren die hebben bijgedragen tot het ontstaan van de hartaandoening, de zogenaamde risicofactoren, zoals verkeerde voeding, roken, hypertensie, gebrek aan beweging, stress, persoonlijkheidsstructuur (Appels, 1983). Het gaat hier om secundaire preventie ter voorkoming van recidieven of uitbreiding van de reeds aanwezige aandoening.

Pre-morbide ziekten en psychosociale problematiek cq psychopathologie zijn geen direct onderdeel van hartrevalidatie. Genoemde doelstellingen van revalidatie hebben in de verschillende fasen van het zorgtraject een ander gewicht, zoals beschreven zal worden in paragraaf 1.4.

1.4 FASEN VAN HARTREVALIDATIE

Het hartrevalidatieproces bestaat uit drie fasen (NHS, 1966; Wilson e.a., 1979; Denolin, 1985; NHS, 1990). Deze fasering komt ook tot uitdrukking in de organisatie van de hartrevalidatie. Het gaat om de revalidatie tijdens opname in het ziekenhuis (fase 1), de revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis (fase 2) en de nazorgfase (fase 3), die buiten de institutionele gezondheidszorg valt. Uiteraard is deze indeling globaal, de verschillende fasen lopen in elkaar over. Dit geldt met name voor fase 2 en 3.

1.4.1 Fase 1: opname in het ziekenhuis

(a) De acute fase: voor infarctpatiënten betreft dat de tijd op de Coronary Care Unit en voor operatiepatiënten de tijd op de Intensive Care. Deze fase duurt meestal enkele dagen. Tijdens deze fase is het hoofddoel de patiënt in leven te houden en medische complicaties te voorkomen cq op te vangen. Normaliter vindt tijdens deze fase al een stuk passieve mobilisatie plaats, dat in de subacute fase gevolgd wordt door actieve mobilisatie. Hierbij zijn zowel verpleegkundigen als fysiotherapeuten betrokken.

(b) De subacute fase: dit is de periode waarin de patiënt op de verpleegafdeling of medium care ligt. Deze fase duurt gemiddeld 5 tot 14 dagen. Dan wordt in de meeste ziekenhuizen gestart met actieve mobilisatie van de patiënt, die erop gericht is om tenminste het Activities of Daily Living (ADL)-niveau te bereiken, variërend van aankleden tot traplopen. Meestal kunnen de patiënten echter veel meer. Daarnaast vindt er zonodig onderzoek plaats naar risicofactoren. Vervolgens wordt voorlichting gegeven door arts en/of verpleging. Sporadisch zal een consult van klinisch psycholoog of maatschappelijk werker nodig zijn.

Rond het ontslag wordt vaak een inspanningstest gedaan (met name bij infarctpatiënten) om high risk patiënten te selecteren. Indien geïndiceerd zal hartcatheterisatie plaatsvinden en daarna zonodig operatie of PTCA.

1.4.2 Fase 2: revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

Dit is de eerste periode na ontslag uit het ziekenhuis. Deze fase duurt ongeveer 3 maanden. In deze periode krijgen vele patiënten hartrevalidatie. Een naar schatting beperkt aantal patiënten kan, vanwege de beperkte fysieke mogelijkheden, niet deelnemen aan een dergelijk revalidatie programma, een aantal mag dat niet vanwege te grote cardiale risico's en een aantal wil niet. De revalidatie dient in deze fase allereerst gericht te zijn op herstel van de pre-morbide situatie. Dit kan bereikt worden door het opbouwen van de conditie en verwerking van het incident. Daarnaast is revalidatie gericht op verandering van levensstijl waarbij risicovolle gedragingen zoals roken aangepakt worden (secundaire preventie). Tenslotte dient revalidatie benut te worden als voorbereiding op werkhervatting of zonodig afkeuring. Ten behoeve van werkproblematiek zijn instanties als GAK, GMD en bedrijfsarts actief. Met andere woorden, het doel van de revalidatie is om fysiek, psychisch en sociaal zoveel mogelijk weer het pré-morbide niveau te bereiken.

In de praktijk zijn er drie vormen waarin hartrevalidatie na ontslag gegeven wordt: klinische revalidatie, revalidatiedagbehandeling en fysieke reconditionering. Een vierde vorm, namelijk fysiotherapie in particuliere praktijken, heeft alleen in experimentele vorm bestaan. Het is nooit een aparte vorm van revalidatie geworden (KNGF, 1990; Bär & Vonken, 1990).

1.4.3 Fase 3: nazorg

Deze fase, de onderhouds- of resocialisatiefase, volgt op de eventuele hartrevalidatie van fase 2. Kenmerkend voor deze fase is dat de patiënt, los van ziekenhuis of

revalidatieafdeling, zijn resocialisatie vervolgt. Dit houdt in dat hij weer zoveel mogelijk zijn normale leven oppakt in het gezin, dit geldt ook voor zijn bezigheden, hobbies en werk. Op de tweede plaats dient deze fase om de in gang gezette verandering van levensstijl te bestendigen (Miller ea, 1979). De patiënt blijft in deze fase doorgaans onder controle van de cardioloog. Ook de huisarts begeleidt de patiënt. Overigens is het contact met de huisarts als herkenbare figuur en vaste begeleider ook in eerdere fasen van de revalidatie van grote waarde voor de patiënt.

Voor problemen op het vlak van uitkeringen en eventuele werkhervatting zijn instanties als GAK, GMD en de bedrijfsarts van belang. Doorgaans bestaat al snel na de start van de revalidatie contact tussen patiënt en deze instanties. Bij belangrijke psychosociale problematiek die onvoldoende is afgerond tijdens de revalidatie fase kan de patiënt voor verdere begeleiding doorgestuurd worden naar het Algemeen Maatschappelijk Werk, het RIAGG, de psychiatrische polikliniek of andere instanties. Er worden in deze fase nogal wat activiteiten specifiek ten behoeve van de hartpatiënten georganiseerd zoals: sportgroepen voor hartpatiënten en psychosociale groepsbegeleiding.

1.5 REVALIDATIEGENEESKUNDE EN HARTPATIËNTEN

Revalidatie is volgens de World Health Organization (WHO, 1969) het gecoördineerd en gecombineerd gebruik van maatregelen op medisch, paramedisch, sociaal, arbeidstechnisch en onderwijskundig terrein, die de gehandicapte op de voor hem optimale plaats in de maatschappij moet brengen en houden. De revalidatiegeneeskunde is dat deel van de geneeskunde dat zich richt op het zo vroeg mogelijk onderkennen en behandelen van organische functiestoornissen en de daardoor veroorzaakte (dreigende) beperkingen met de eventueel daaruit weer voortvloeiende sociale consequenties, de handicap (Bangma, 1988).

In de revalidatie geneeskunde wordt de "International Classification of Impairment, Disability and Handicap" van de World Health Organization gebruikt (TNO, 1981). In het navolgende zal deze terminologie toegespitst worden op hartpatiënten:

(a) *Functiestoornis*: elk lichamelijk verlies of afname van functies. Bij cardiale ziekten kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een afgenomen pompfunctie van het hart.

(b) *Beperkingen*: elke vermindering of afwezigheid van de vaardigheid een activiteit uit te voeren, die van iemand van een bepaalde leeftijd, geslacht en cultuur verwacht had mogen worden. Deze beperkingen kunnen volledig bepaald worden door de functiestoornis, maar ze kunnen ook veroorzaakt worden door de psychische reactie van patiënt op zijn ziekte. Bij hartziekten kunnen we bijvoorbeeld te maken hebben met beperkingen in loopafstand, traplopen of het verrichten van handarbeid ten gevolge van pompfunctiestoornissen of angina pectoris. Anderzijds kunnen ook angsten ten gevolge van een hartinfarct deze beperkingen veroorzaken.

(c) *Handicap*: de nadelige sociale positie ten gevolge van een functiestoornis of beperking waardoor een normale vervulling van zijn of haar maatschappelijke rol beperkt of verhinderd wordt. Bij hartziekten hebben we onder meer te maken met handicaps in de zin van gestoord functioneren bij de arbeid en/of in de rol als partner. Daarnaast kunnen

er handicaps zijn op het gebied van vrijetijdsbesteding, zelfstandig wonen, huishouding, vervoer enz.

Revalidatie richt zich doorgaans op motorisch gehandicapten. Het aantal hartpatiënten met motorische functiestoornissen is beperkt. Hartrevalidatie is dan in principe gericht op de beperkingen en handicaps niet direct ontstaan door het hartlijden, maar slechts indirect door bijvoorbeeld extreme angst (Weeda, 1983; Bangma, 1986 en 1987).

Het revalidatiemodel dient duidelijk onderscheiden te worden van het medisch model. Het medisch model beoogt primair morbiditeit en mortaliteit te beïnvloeden. Deze invalshoek is gericht op de somatische stoornis. Het zijn met name de cardioloog en cardiochirurg bijgestaan door verpleegkundigen die op dit vlak werkzaam zijn. Het revalidatiemodel (revalidatie in brede zin) is primair gericht op het optimaal functioneren van de patiënt in de meest brede zin. Deze invalshoek is gericht op de beperkingen en handicaps van de hartpatiënt. De hulpverleners die op dit vlak werkzaam zijn, zijn fysiotherapeut, revalidatiearts (revalidatiezorg in engere zin), maatschappelijk werker, ergotherapeut en klinisch psycholoog. Beide modellen zijn complementair in de zorg voor hartpatiënten (Weeda, 1983; Bangma, 1988). In elke fase van het zorgproces nemen beide benaderingen een verschillende plaats in.

1.6 PROBLEEMSTELLING

Hartrevalidatie heeft zich, ook in Nederland, divers ontwikkeld. Er zijn geen eenduidige richtlijnen hoe revalidatie aan te pakken. Hartrevalidatie zit op een aantal gebieden in een impasse: er zijn diverse regelingen volgens welke hartrevalidatie gefinancierd wordt, er is een diversiteit aan instellingen die hartrevalidatie geven, er is een veelvoud van opvattingen hoe hartrevalidatie er inhoudelijk uit moet zien, en er is discussie welke patiënten wel en welke patiënten niet daadwerkelijk gerevalideerd dienen te worden en hoe effectief dit is.

Er is in de relatief korte historie van hartrevalidatie sprake van een reeks initiatieven, die deels op lokaal niveau en deels via de overheid tot stand gekomen zijn. De overheid heeft zich beziggehouden met de financiering. Ook de Nederlandse Hartstichting heeft zowel beleidsmatig als inhoudelijk bijgedragen aan de ontwikkeling van de hartrevalidatie. Daar komt nog bij dat het gevoerde beleid niet altijd eenduidig is geweest, mede door de omstandigheid dat effectstudies het effect van revalidatie activiteiten nog lang niet eenduidig hebben aangetoond.

De eerste doelstelling van deze dissertatie is te inventariseren hoe de hartrevalidatie in Nederland zich door de jaren heen in kwantitatief opzicht ontwikkeld heeft. De volgende vragen staan op de voorgrond:

(a) Hoeveel instellingen geven revalidatie activiteiten voor hartpatiënten? Welke soorten instellingen zijn er en hoe worden deze gefinancierd? Hoe is hun geografische spreiding over het land? Wanneer zijn ze gestart met revalideren? Zijn er ontwikkelingen in de tijd waarneembaar?

- (b) Welke patiënten worden in de praktijk gerevalideerd en welke niet? Zijn er ontwikkelingen door de jaren heen te signaleren?
- (c) Welke behandelonderdelen worden er gegeven, welke disciplines werken er mee? Zijn er ontwikkelingen te zien door de jaren heen?

De tweede doelstelling van deze dissertatie is te onderzoeken of de feitelijke gang van zaken in de revalidatie in overeenstemming is met de officiële regels die hiervoor gesteld worden op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied. De gevonden cijfers en ontwikkelingen zullen worden afgezet en besproken tegen het licht van de volgende facetten:

- (a) In welke mate voldoet de hartrevalidatie zoals deze zich heeft ontwikkeld in Nederland aan de doelstellingen van hartrevalidatie zoals door de WHO opgesteld?
- (b) Hoe verhoudt de concrete gang van zaken in de hartrevalidatie zich tot de revalidatiegeneeskundige opvattingen omtrent de revalidatie van hartpatiënten?
- (c) In welke mate voldoet de hartrevalidatie in de praktijk aan de regels en aanbevelingen van de overheid en de Nederlandse Hartstichting?
- (d) Hoe verhouden zich de ontwikkelingen in Nederland tot die in het buitenland. Zijn er overeenkomsten en/of verschillen? Loopt de revalidatie in Nederland voor op het buitenland of achter? Hiertoe is een literatuuronderzoek gedaan.

Samenvattend kan gesteld worden dat de pretentie van dit onderzoek is om allereerst een zo compleet mogelijke beschrijving te geven van de stand van zaken in de hartrevalidatie in Nederland, die vervolgens geconfronteerd wordt met het gevoerde beleid op dit gebied. Op de derde plaats wordt de Nederlandse situatie vergeleken met die in het buitenland.

1.7 HET REGISTRATIEPROJECT

“Het Registratieproject” is door de Revalidatie Commissie van de Nederlandse Hartstichting geëntameerd om op grond van genoemde probleemstelling een kwantitatieve inventarisatie te maken van alle hartrevalidatie activiteiten in Nederland. Vervolgens kan hiermee het gevoerde beleid geëvalueerd worden. Het project is gestart in 1987 en in 1991 is gestopt met de onderzoeken.

Naast de genoemde doelstellingen werd het ook belangrijk gevonden het beleid op instellingsniveau te beïnvloeden: met behulp van de door de instellingen, middels de schriftelijke enquête, verstrekte gegevens werd via het project een jaarverslag per instelling gemaakt. Tevens werd een verslag gemaakt van alle instellingen tezamen, waardoor de instellingen zichzelf konden vergelijken met het gemiddelde. Verder is er een computerprogramma ontwikkeld waarbij de instellingen, die deze patiëntengegevens bijhielden, nauwkeuriger inzicht hadden in de gegevens op individueel patiëntenniveau, maar ook in staat waren computeruitdraaiën en tellingen van hun patiëntenbestand te maken. Tevens was het mogelijk om met behulp van de zelf ingevoerde gegevens een patiëntenbrief samen te stellen (Soons ea, 1989).

De volgende onderzoeksactiviteiten hebben in het kader van "Het Registratieproject" plaatsgevonden in de periode 1987 tot 1991:

- (a) In de periode 1987-1989 hebben diverse enquêteringen plaatsgevonden betreffende de fase na ontslag (Soons & Bär, 1990a en b; Soons, 1993).
- (b) Hieraan werd in 1987/88 een mondelinge enquête aan de instellingen die hartrevalidatie na ontslag gaven toegevoegd om de kwaliteit van de verkregen gegevens te verbeteren en te completeren.
- (c) In 1989 is tevens een enquête rondgestuurd om gegevens te verkrijgen betreffende de ziekenhuisfase.
- (d) De nazorgfase is in 1990 onderzocht.

De nadruk van bovengenoemde enquêtes lag steeds op het inventariseren van kenmerken van de instellingen en hun programmaonderdelen; in beperkte mate kwamen ook patiëntkenmerken aan bod.

- (e) In de periode 1988-1991 zijn door een deel van de instellingen die revalidatie tijdens opname en/of na ontslag uit het ziekenhuis gaven, individuele patiëntengegevens verzameld (Soons ea, 1989), middels de individuele patiëntenregistratielijst.

Een groot deel van de data die middels bovengenoemde onderzoeksinspanningen zijn verzameld, zijn gebruikt voor deze dissertatie.

1.8 HOOFDSTUKINDELING

In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek betreffende inventarisatie-onderzoeken naar de stand van zaken van hartrevalidatie in zowel binnen- als buitenland. De balans van de stand van zaken in Nederland zal worden opgemaakt. Deze zal vergeleken worden met de situatie in het buitenland. Hoofdstuk 3 betreft revalidatie in de ziekenhuisfase. Hierin worden resultaten van zowel een schriftelijke enquête, als van individuele patiëntenlijsten gepresenteerd. Hoofdstuk 4 betreft de revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis. Hierin worden de resultaten van enkele enquêtes en van individuele patiëntenlijsten gepresenteerd. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de enquête betreffende de nazorgfase beschreven. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt een kwantitatief beeld geschetst van de stand van zaken van de hartrevalidatie in Nederland. In hoofdstuk 6 zullen ontwikkelingen gesignaleerd worden. Tevens zullen de cijfers en ontwikkelingen kritisch besproken worden in het licht van het gevoerde beleid. Daarnaast zullen de ontwikkelingen geëvalueerd worden aan de hand van bestaande definities van hartrevalidatie. Tot slot zullen aanbevelingen gegeven worden voor de toekomst van de hartrevalidatie in Nederland.

HOOFDSTUK 2

Inventarisatiestudies betreffende hartrevalidatie in binnen- en buitenland

2.1 INLEIDING

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de resultaten van inventarisatie studies betreffende hartrevalidatie in binnen- en buitenland. Het gehele zorgtraject in drie fasen, dat een hartpatiënt kan afleggen, komt aan bod: de mobilisatie tijdens de opname, de revalidatie na ontslag en de nazorg. Ook zal nagegaan worden welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt. Hiertoe zijn de volgende bronnen geraadpleegd: de Index Medicus, de bibliotheek van de Nederlandse Hartstichting en een rondschrijven aan hartstichtingen in het buitenland.

2.2 NEDERLAND

2.2.1 Onderzoek naar aard en omvang van de zorg voor hartpatiënten

Onderzoek I

In 1979 is, op verzoek van de Revalidatie Commissie van de Nederlandse Hartstichting, een inventariserend onderzoek gedaan naar de revalidatie van hartpatiënten in Nederland (Weeda & Visser, 1981; Aquarius & Smit, 1980). Het betrof zowel hartrevalidatie tijdens opname in het ziekenhuis, als na ontslag.

Er werden vragenlijsten gestuurd naar cardiologen, hoofden van hartbewakingseenheden en fysiotherapeuten van alle ziekenhuizen met een hartbewakingseenheid: 98 van de 140 aangeschreven ziekenhuizen (70%) reageerden (zie tabel I).

In de meeste ziekenhuizen werd tijdens opname na een hartinfarct of een hartoperatie aandacht besteed aan actieve mobilisatie, reactivering en Activities of Daily Living (ADL)-training. De helft van de ziekenhuizen zette hiervoor fysiotherapeuten in, de rest verpleegkundigen. Ten behoeve van de professionele psychosociale zorg waren in de

helft van de ziekenhuizen maatschappelijk werkers beschikbaar en in sommige klinisch psychologen.

Bijna de helft van de ziekenhuizen bood poliklinische revalidatie aan; hiervan hadden er twintig een erkenning voor revalidatiedagbehandeling van hartpatiënten. Drie instellingen gaven klinische revalidatie na ontslag. In 1974 telde Nederland ongeveer 20 afdelingen, waarvan de helft erkenning had.

De hierna gepresenteerde gegevens hebben allemaal betrekking op de poliklinische hartrevalidatie. Er bleek een grote variëteit te bestaan in beschikbare disciplines, zoals duidelijk werd uit gegevens van 46 centra die poliklinische zorg aanboden. De meest voorkomende hulpverleners waren: fysiotherapeut (93%), cardioloog (70%), maatschappelijk werker (67%), klinisch psycholoog (46%), revalidatiearts (24%), diëtiste (24%) en internist (15%).

De patiënten kregen in alle ziekenhuizen een fysiek trainingsprogramma aangeboden. Duur en opbouw van het fysieke programma in de poliklinische fase toonden een grote verscheidenheid. De gemiddelde duur was 16 weken, met een variatie van 8 tot meer dan 28 weken. Het gemiddeld aantal sessies bedroeg 33, met een variatie van 20 tot 50. Verder bleek hartrevalidatie in 1979 meestal pas drie tot acht weken na ontslag uit het ziekenhuis te beginnen. Slechts in een kwart van de gevallen werd binnen twee weken gestart.

Psychosociale zorg werd in de helft van de programma's verstrekt op indicatie; in de andere helft kreeg iedere patiënt deze hulp aangeboden. Individuele psychosociale zorg was in vrijwel alle instellingen mogelijk. In eenderde van de instellingen vond ook begeleiding in groepen plaats, waarbij onduidelijk blijft hoe deze groepen werden opgezet. Psychosociale zorg werd voornamelijk gegeven door de maatschappelijk werker, die in bijna alle instellingen betrokken was bij de hartrevalidatie. Daarnaast waren in de helft van de instellingen de klinisch psycholoog en in mindere mate de wijkverpleegkundige en de revalidatiearts beschikbaar voor psychosociale zorg.

In bijna alle 46 op dit punt responderende ziekenhuizen werden patiënten zowel na een hartinfarct als na een hartoperatie gerevalideerd, terwijl in ruim de helft van de ziekenhuizen ook patiënten met angina pectoris gerevalideerd werden. De aandacht ging toen nog sterk uit naar werkhervatting, zoals impliciet blijkt uit het leeftijdscriterium: 4% accepteerde geen patiënten ouder dan 50 jaar, 12% legde de grens bij 60 jaar, 52% bij 65 jaar en 2% bij 70 jaar, 30% van de instellingen hanteerde geen leeftijdsgrens.

Onderzoek II

In 1984 werd de hiervoor beschreven inventarisatie door Van Dixhoorn ea (1988) herhaald en uitgebreid (zie tabel I). Bij dit onderzoek was overigens alleen hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis onderwerp van onderzoek. In de regio's Noord-Oost, West en Zuid-Nederland werden, voor vertegenwoordigers van de toen bekende hartrevalidatieinstellingen, regionale bijeenkomsten georganiseerd, waarop aan de bezoekers (cardiologen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten) gevraagd werd een schriftelijke enquête in te vullen die, ten opzichte van 1979, op een aantal punten verbeterd was. De niet-aanwezigen kregen de enquête toegestuurd. De respons was zeer hoog en bedroeg

97% (zie tabel I) (86 van de 89 instellingen). 27 van deze 89 afdelingen hadden een erkenning voor revalidatiedagbehandeling.

De landelijke spreiding zag er in 1984 als volgt uit: in de regio West (Randstad tot en met de Veluwe) waren 33 (12 erkend), in de regio Zuid (provincies Zeeland, Brabant en Limburg) 35 (10 erkend) en tenslotte in de regio Noord-Oost 21 afdelingen (5 erkend).

De betrokken onderzoekers hebben de gegevens van de klinische en poliklinische revalidatie bij het verwerken niet gescheiden gehouden. Uit de gegevens van de 86 reagerende centra bleek de betrokkenheid van de verschillende disciplines bij de revalidatie: fysiotherapeut (91%), cardioloog (72%), maatschappelijk werker (72%), klinisch psycholoog (59%), diëtiste (41%), arts (40%), verpleegkundige (23%). In erkende afdelingen waren meer disciplines beschikbaar dan in niet-erkende. Regelmatig teamoverleg vond tenminste eenmaal per twee weken plaats in alle erkende afdelingen; en in slechts 45% van de niet-erkende.

Iedere instelling bood een fysiotherapieprogramma aan. Het fysieke programma startte in 1984 al tussen de twee en drie weken na ontslag (in 1979 nog drie tot acht weken); de helft begon zelfs binnen twee weken na ontslag. Wel varieerde het fysieke programma in hoge mate in duur (3 tot 25 weken, gemiddeld 12 à 13 weken), aantal bijeenkomsten (tot maximaal 50 sessies, gemiddeld 28 sessies) en inhoud.

Psychosociale zorg (individueel en/of groepsgewijs) werd in 96% van de erkende en in 59% van de niet-erkende afdelingen gegeven, hetgeen natuurlijk samenhangt met de financiering.

Individuele begeleiding vond plaats bij 37% van de erkende afdelingen en bij 22% van de niet-erkende afdelingen. Een kwart van de ziekenhuizen bood groepsgewijze psychosociale zorg aan (48% versus 19%), waarbij 90% van de patiënten uit die centra betrokken was. De disciplines die psychosociale zorg gaven, waren in volgorde van frequentie: maatschappelijk werker, klinisch psycholoog, arts en verpleegkundige. Hieruit blijkt dat psychosociale zorg breed gedefinieerd is.

77% van de erkende en 53% van de niet-erkende afdelingen stuurden patiënten na de revalidatiefase zonodig door naar instanties voor psychosociale zorg, zoals het RIAGG of algemeen maatschappelijk werk.

Ook nu hadden de meeste revalidanten een hartinfarct of hartoperatie gehad. 65% van de instellingen hanteerde geen expliciete leeftijdsgrens, 1% revalideerde geen patiënten boven de 55 jaar, 7% had 60 jaar als leeftijdsgrens, 15% 65 jaar en 3% 70 jaar.

De helft van de ziekenhuizen revalideerde alleen patiënten uit eigen huis. Dat gold ook voor 37% van de erkende afdelingen, die officieel een regionale functie hebben, terwijl opvallenderwijs 20% van de niet-erkende afdelingen ook patiënten van elders revalideerde.

Het totaal aantal gerevalideerde patiënten in Nederland werd in 1984 retrospectief geschat op 11.000 (5.200 in erkende en 5.800 in niet-erkende afdelingen). De onderzoekers gingen uit van ongeveer 40.000 potentiële kandidaten (24.017 patiënten met een hartinfarct, die het ziekenhuis levend verlieten; 8689 patiënten na hartoperatie; 7808 patiënten met dreigend infarct of andere ischemische hartziekte) voor hartrevalidatie,

Tabel I

Hartrevalidatie in Nederland: aard en omvang

Onderzoek	I	II	III
Onderzoekers	Weeda & Visser	Dixhoorn van ea	Maes ea
Jaar van onderzoek	1979	1984	1986
Onderzoeksinstrument	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête
Respondenten	cardiologen verpleegkundigen fysiotherapeuten	cardiologen verpleegkundigen fysiotherapeuten	onbekend
Respons	70%	95%	84%
Revalidatiefase	1 en 2	2	2
Aantal aangeschreven instellingen	140	89	197
Onderzochte programma onderdelen	alle	alle	alle
Patiëntgegevens	nee	beperkt	nee

hetgeen impliceert dat slechts ongeveer een kwart van de patiënten gerevalideerd zou worden.

Onderzoek III

In 1986 is door Maes ea (1986) in opdracht van het Ministerie van WVC een inventarisatie gemaakt van de programmaonderdelen van revalidatieprogramma's na ontslag uit het ziekenhuis. Alle 197 ziekenhuizen en revalidatiecentra werden benaderd via een post-enquête (zie tabel I). De respons was 84%, de achtergrond van de invullers was onbekend. Van de 139 instellingen die uiteindelijk informatie verstrekten, waren er 18 (=13%) die geen revalidatie na ontslag gaven, maar de patiënten naar elders verwezen. Alle overblijvende 121 afdelingen hadden als basis een fysiotherapieprogramma, 77 (64%) boden daarnaast de mogelijkheid voor individuele gesprekken met een maatschappelijk werker, 54 (=45%) hadden een klinisch psycholoog beschikbaar voor individuele consulten en in 30 afdelingen (25%) werd aandacht besteed aan voorlichting en begeleiding in groepsverband.

Commentaar

Onduidelijk is of de inventarisaties van met name onderzoek I en II een compleet beeld bieden. Hoewel in onderzoek II een respons gehaald wordt van 95% van de 89

benaderde centra, ligt het totale aantal afdelingen dat revalidatie na ontslag geeft, waarschijnlijk hoger. Maes ea (1986) schatte dit aantal op 121, wat wil zeggen dat ongeveer een kwart van de instellingen niet in het onderzoek van Van Dixhoorn opgenomen is, waardoor het landelijk beeld er mogelijk anders uit zal zien. Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal centra in de twee tussenliggende jaren veranderd is.

De in de onderzoeken I en II gehanteerde definitie van psychosociale zorg is zeer breed: deze omvat zorg door een maatschappelijk werker, een klinisch psycholoog, een wijkverpleegkundige, een revalidatiearts en een psychiater. Uiteraard is emotionele steun onderdeel van de inbreng van alle disciplines en kan daarom psychosociale zorg in brede zin genoemd worden. In dit proefschrift zal de term psychosociale zorg echter gereserveerd worden voor de professionele zorg in engere zin gegeven door een maatschappelijk werker of een klinisch psycholoog.

Een laatste punt van kritiek op de gepresenteerde resultaten is dat klinische revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis niet onderscheiden wordt van poliklinische revalidatie.

2.2.2 Onderzoek naar specifieke aspecten van zorg voor hartpatiënten

Onderzoek IV

De onderzoekers van onderzoek III hebben ook gekeken naar inhoud, organisatievorm en problemen rondom groepsvoorlichting (Maes ea, 1986) (zie tabel II). Bij de meeste van de 22 instellingen (de keuze hiervan werd niet in de verslaggeving aangeduid) die nader onderzocht werden, zijn de gegevens verzameld via een mondelinge enquête, van enkele afdelingen was schriftelijk materiaal beschikbaar. De respondenten waren afkomstig uit alle bij de zorg voor hartpatiënten betrokken disciplines.

Verder werd informatie vergaard over het "Project Hartgroepen" van de Provinciale Kruisvereniging Zuid-Holland, het project "Reïntegratie met Duo's" in Zuid-Limburg en over de meerdaagse bijeenkomsten voor hartpatiënten in "De Hartenark" te Bilthoven.

Er bestond een grote verscheidenheid aan opvattingen over de vorm waarin de groepsbegeleiding diende plaats te vinden: een deel van de afdelingen koos voor een duidelijk gestructureerde, educatieve, informatieve opzet waarbij volgens een vast programma werd gewerkt; andere instellingen kozen juist voor een ongestructureerde benadering, waarbij gespreksonderwerpen door patiënten werden aangedragen en de groeps gesprekken zoveel mogelijk non-directief waren.

In vrijwel alle ziekenhuizen werd in de klinische fase gebruik gemaakt van audiovisuele middelen, in de poliklinische fase wisselde dit nogal. Het geven van informatieve lezingen gevolgd door een groepsdiscussie, werd door sommige hulpverleners als bijzonder nuttig gezien, anderen vonden deze opzet te zwaar en voorzagen bovendien problemen in verband met de heterogeniteit van de patiëntenpopulatie. Het aantal disciplines dat bij een voorlichtingsprogramma aan bod kwam, varieerde in hoge mate: alle voorkomende disciplines konden erbij betrokken zijn.

Over het starttijdstip van het groepsprogramma werd eveneens nogal verschillend gedacht: een deel van de hulpverleners wilde zo snel mogelijk na ontslag starten, om te

voorkomen dat de patiënt in het gevreesde “zwarte gat” zou vallen; anderen meenden dat later gestart diende te worden, omdat de patiënten in het begin nog niet toe zouden zijn aan zo'n groepsgebeuren. Ook over het al dan niet gezamenlijk in één groep plaatsen van infarct- en bypasspatiënten bestond geen eensgezindheid. In de praktijk werden uiteenlopende selectiecriteria gebruikt, zoals de ernst van het medisch ziektebeeld en de leeftijd. In slechts enkele ziekenhuizen werden na het beëindigen van de groep follow-up sessies gegeven.

Onderzoek V

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Hart- en Vaatziekten (NVFH) is begin 1988 door Gutker de Geus een inventarisatie gemaakt van fysiotherapie voor hartpatiënten tijdens opname in het ziekenhuis (NVFH, 1988; Gutker de Geus, 1988). Hiertoe werden, middels een post-enquête, 189 fysiotherapie-afdelingen (zie tabel II) benaderd, die verdeeld waren over 174 ziekenhuizen en 15 revalidatiecentra. De respons was 85%, de respondenten waren allen fysiotherapeut. 136 ziekenhuizen namen hartpatiënten op. In 98% (N=136) van de ziekenhuizen werd tijdens de opname fysiotherapie gegeven in de vorm van: wandelen, actieve oefeningen, ergometrie, sport en spel, en ontspanningsoefeningen (respectievelijk in 100%, 93%, 73% en 26% van de ziekenhuizen).

De behandeling per sessie duurde doorgaans 10 tot 30 minuten. In driekwart van de ziekenhuizen werd de patiënt tijdens opname eenmaal per dag behandeld en in de rest tweemaal. In 55% van de ziekenhuizen werd de patiënt gedurende de gehele opname individueel behandeld, in 45% individueel in de beginfase en groepsgewijs na voldoende mobilisatie.

Fysiotherapie na een hartinfarct startte doorgaans de tweede of derde dag. Voor bypass- en klepoperatiepatiënten lag dit tijdstip enkele dagen later. In de meeste cardiochirurgische centra werd met fysiotherapie al voorafgaand aan de ingreep gestart. De duur van de fysiotherapie bedroeg na een infarct 5 tot 15 dagen, na een bypass 5 tot 10 dagen en na een klepoperatie 5 tot 15 dagen. Dit hing uiteraard samen met de opnameduur. 90% van de fysiotherapeuten hield een eigen patiëntendossier bij.

Doorgaans vond er wekelijks overleg plaats met arts en verplegend personeel. Besprekingen met maatschappelijk werker, klinisch psycholoog of revalidatiearts kwamen minder frequent voor. Bij 20% van de ziekenhuizen kwamen de patiënten na ontslag niet meer terug voor fysiotherapie; onduidelijk was of zij doorverwezen werden naar een gespecialiseerd centrum; bij de andere ziekenhuizen waren de patiënten doorgaans binnen één week terug.

Onderzoek VI

In 1991 is door Schäperclaus ea (1991) een enquête-onderzoek gedaan naar sportgroepen voor hartpatiënten in de nazorgfase in Nederland (zie tabel II). Doel van de enquête was de organisatie, omvang, doelstellingen en programma's in kaart te brengen. 157 bekende verenigingen werden aangeschreven en de respons was 94%. De achtergrond van de respondenten is niet beschreven in het onderzoek.

De eerste patiëntenvereniging werd in 1966 opgericht, terwijl 6% van de huidige verenigingen reeds voor 1975 actief was. 74% werd na 1980 opgericht, waarvan de helft tussen 1980 en 1985. 69% van de verenigingen is aangesloten bij Hart In Beweging (HIB), 9% bij de Nederlandse Invalidenbond, 15% is elders aangesloten (provinciale sportraden, belangenvereniging voor patiënten van de Nederlandse Hartstichting of invalidenbonden). 69% van de verenigingen hebben trimgroepen (gemiddeld 21 deelnemers per groep), 16% zwemgroepen (gemiddeld 34 deelnemers per groep) en 15% hebben beide. Bijeenkomsten van zowel trim- als zwemgroepen vinden in 95% van de gevallen eenmaal per week plaats en duren doorgaans één uur. Er zijn gemiddeld drie sportgroepen per vereniging.

Het totaal aantal deelnemers van de onderzoeksgroep lag op 10.624. Een schatting van de totale populatie in Nederland komt uit op 12.000. De deelnemers zijn gemiddeld drie jaar lid. Dit betekent dat zich circa 4.000 nieuwe deelnemers per jaar aanmelden. Van de 30.000 tijdens opname gerevalideerde patiënten stroomt 13% door naar dit soort patiëntengroepen.

Tabel II

Hartrevalidatie in Nederland: specifieke onderdelen

Onderzoek	IV	V	VI	VII
Onderzoekers	Maes ea	Gutker de Geus	Schäperclaus ea	Schäperclaus ea
Jaar van onderzoek	1986	1988	1991	1991
Onderzoeks-instrument	mondelinge enquête	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête
Respondenten	diverse disciplines	fysiotherapeuten	onbekend	patiënten
Respons	100%	85%	94%	onbekend
Revalidatiefase	2	1	3	3
Aantal aangeschreven instellingen	22	189	157	10
Onderzochte programma-onderdelen	groepsvoorlichting	fysiotherapie	fysiotherapie	fysiotherapie
Patiëntgegevens	nee	nee	ja	ja

Onderzoek VII

In hetzelfde onderzoek van Schäperclaus ea (1991) zijn ook de kenmerken van deelnemers aan sportgroepen voor hartpatiënten onderzocht (zie tabel II). Deelnemers van 10 verenigingen (de reden van keuze is niet beschreven) werden na afloop van het sportuurtje uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen. De vragen betroffen enige persoonskenmerken, de gezondheidstoestand, de gezondheidsbeleving en risicofactoren. Hier zullen alleen de aspecten aan bod komen die relevant zijn voor dit literatuuronderzoek.

136 deelnemers, waarvan 18% vrouwen, verleenden hun medewerking. Onduidelijk blijft hoeveel en welke ex-patiënten niet hebben deelgenomen, waardoor de representativiteit van de data in het vage blijft. 86% van de deelnemers was tussen de 50 en 70 jaar oud, 5% ouder dan 70 jaar. 72% had een hartinfarct achter de rug, 36% een bypassoperatie, 6% een klepoperatie en 18% had een andere hartziekte. 68% was tijdens de opname al gerevalideerd.

Commentaar

De mondelinge enquête blijkt een goed instrument te zijn om de gevarieerdheid van de psychosociale groepsbegeleiding in de praktijk in kaart te brengen, terwijl de respons hoog is. Er is een adequaat beeld ontstaan van dit deel van de zorg voor hartpatiënten. Het uitvoeren van een mondelinge rondgang is echter tijdsintensief en kan dus maar op beperkte schaal plaatsvinden.

Een kanttekening bij het onderzoek van Maes ea (1986) is dat de groepen die deel uitmaken van een revalidatieprogramma na ontslag uit het ziekenhuis, en de groepen die georganiseerd worden in het kader van de nazorg, tezamen geanalyseerd zijn en dus impliciet aan elkaar gelijkgesteld zijn. Het is zaak juist hierin een tweedeling aan te brengen, omdat ze zich onderscheiden in doelstellingen en uitgangspunten.

Een kanttekening bij het onderzoek naar fysiotherapie voor hartpatiënten is dat de verstrekte gegevens en getallen mogelijk overtrokken zijn, omdat ze verstrekt zijn door fysiotherapeuten zelf. De enquête per patiënt blijkt een goed middel om verhoudingsgetallen te bepalen die, voorzover het de steekproef betreft, zeer precies zijn. Onduidelijk blijft in hoeverre de steekproef representatief is voor de deelnemers aan sportgroepen voor hartpatiënten.

2.2.3 Beschouwing over de hartrevalidatie in Nederland

Nagenoeg alle ziekenhuizen blijken tijdens de opname fysiotherapie te geven. Of er verder nog andere programma-onderdelen worden aangeboden, is onbekend. Met name voorlichting zou onderdeel kunnen zijn, maar valt waarschijnlijk in de meeste ziekenhuizen niet onder revalidatie.

Het aantal afdelingen dat hartpatiënten revalideert na ontslag uit het ziekenhuis laat door de jaren heen een duidelijke toename zien: van 46 in 1979 tot ongeveer 120 eind jaren tachtig. Er zijn op basis van het financieringsmodel drie soorten afdelingen te onderkennen: afdelingen voor klinische revalidatie, afdelingen met revalidatiedagbehandeling en

afdelingen die fysieke reconditionering geven. Van deze laatste groep blijkt, volgens Van Dixhoorn (1988), de helft tot tweederde naast fysiotherapie ook psychosociale zorg te geven, gecombineerd met regelmatig teamoverleg, wat betekent dat een groot deel van deze groep de vergelijking met een erkende afdeling op dit punt goed kan doorstaan.

Fysieke training, in welke vorm dan ook, en medisch specialistische zorg vormen samen, vanaf de start van hartrevalidatie, het hoofdbestanddeel van het gehele zorgtraject dat een hartpatiënt kan afleggen. De rol die deze onderdelen spelen tijdens de mobilisatie, de revalidatie en in de patiëntengroepen is redelijk goed in kaart gebracht. In de praktijk van de revalidatie na ontslag bleek overigens wel een grote variatie te bestaan in opbouw, duur en frequentie van de fysiotherapie. De start van het fysieke programma na ontslag vindt door de jaren heen steeds eerder plaats, de duur wordt steeds korter. De zorg staat vaker onder leiding van een multidisciplinair team en omvat meer psychosociale begeleiding. De leeftijdsgrens voor de patiënten wordt geleidelijk losgelaten (Dixhoorn *et al.*, 1988).

Er is geen eenduidigheid te bespeuren in de opvattingen over de vraag hoe psychosociale zorg (zowel individueel als in groepsverband) gegeven dient te worden; over een systematische aanpak van secundaire preventie is nauwelijks iets bekend. Wel is de trend waarneembaar dat er steeds meer klinisch psychologen en diëtisten betrokken worden bij de revalidatie van hartpatiënten en steeds minder verpleegkundigen, hetgeen wil zeggen dat de revalidatie organisatorisch losser is komen te staan van de mobilisatie tijdens de opname.

Er is een ernstig gebrek aan exacte aantallen en kenmerken van patiënten die revalidatie krijgen tijdens opname of na ontslag uit het ziekenhuis.

Concluderend kan gesteld worden dat in de praktijk de revalidatie van hartpatiënten primair gericht is op conditieverbetering, in een deel van de ziekenhuizen aangevuld met een of andere vorm van psychosociale begeleiding. Een systematische aanpak gericht op secundaire preventie ontbreekt nagenoeg geheel.

2.3 EUROPA

2.3.1 West-Duitsland

In West-Duitsland worden de meeste patiënten na hun opname, die overigens gemiddeld daar nog drie à vier weken duurt, doorverwezen naar speciale klinieken voor klinische revalidatie. Deze vorm van revalidatie na ontslag duurt doorgaans vier weken. Er zijn ongeveer tachtig klinieken en "Kurorten" voor hartpatiënten, met verschillende niveaus van zorg. Er zijn vijf gespecialiseerde hartrevalidatieklinieken (Jetté *et al.*, 1988). Deze centra werden in de zeventiger jaren opgezet, omdat hartpatiënten steeds vroeger gemobiliseerd werden. Daarnaast werd een start gemaakt met ambulante hartpatiëntengroepen (Gleichmann *et al.*, 1983). Deze waren zowel bedoeld als alternatief voor, maar

ook als aanvulling op de klinische revalidatie (Stocksmeier, 1978). Er zijn drie publicaties bekend over de nazorgfase (sport/oefengroepen) van hartpatiënten. De rest van het zorgtraject is niet in kaart gebracht.

Onderzoek VIII

In 1982 is een post-enquête gestuurd naar alle 420 geregistreerde ambulante trainingsgroepen voor hartpatiënten (Gleichmann ea, 1983) (zie tabel III). De respons bedroeg 67%. De formulieren werden meestal gezamenlijk door artsen en fysiotherapeuten ingevuld.

Het land telde in 1982 ongeveer 280 "Träger" voor hartpatiëntengroepen (sportverenigingen, sportverenigingen voor gehandicapten, particuliere clubs, volkshogescholen). In totaal werden er zo'n 500 sportgroepen getraceerd, waarvan 390 trainings- en 110 oefengroepen. De eerste trainingsgroepen zijn begin zeventiger jaren gestart; vanaf 1978 was een duidelijke toename te bespeuren: 45% van de groepen ontstond na dit jaar.

De meeste groepen bleven langer dan 2 jaar bij elkaar; 65% waren gesloten groepen, met steeds dezelfde deelnemers dus. 60% van de groepsleden werd deelnemer middels verwijzing door artsen en revalidatieklinieken, en 30% door eigen initiatief. Slechts een gering percentage deelnemers werd aangetrokken via reclame-activiteiten van de groepen zelf. De voornaamste reden om te stoppen met de groep (aantallen zijn niet bekend) was een gebrek aan motivatie (40%); medische redenen kwamen op de tweede en privéredenen op de derde plaats.

Voor méér dan 90% van de groepen moest een inspannings-ECG gedaan zijn alvorens patiënten werden toegelaten (75 Watt was vereist voor een trainingsgroep en 50 Watt voor een oefengroep). In 60% werden standaard ook andere non-invasieve technieken toegepast (bijvoorbeeld een röntgen-thoraxfoto en laboratoriumonderzoeken). In 50% werd een meting van de druk in de rechter harthelft gedaan. Bij 34% van de patiënten werd ook een coronairangiografie verricht.

Het merendeel van de groepen hield eenmaal per week, gedurende gemiddeld anderhalf uur, een bijeenkomst. De inhoud van de programma's bestond uit gymnastische oefeningen, loopoefeningen en speltherapie zonder prestatiemotief; 65% hield regelmatig groepsgesprekken en 40% deed aan ontspanningstraining. In Duitsland wordt deze vorm van nazorg door de ziektekostenverzekeraars vergoed; de "Krankenkasse" is dus de belangrijkste financier, maar ook bijdragen van verenigingen en van de deelnemers zelf vormen een bron van inkomsten.

Het toenmalige aantal deelnemers was 9.000. Tot dan waren 16.000 patiënten lid geweest of nog steeds lid. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 23 tot 80 jaar en de geslachtsverhouding was 5 (mannen) : 1 (vrouwen). 68% van de deelnemers had een hartinfarct achter de rug, 10% had of een coronaire bypass- of een klepoperatie ondergaan, 11% leed aan een klinisch manifeste coronaire hartziekte zonder infarct (meestal angina pectoris), 4% had alleen maar cardiale risicofactoren zonder een klinisch manifeste coronaire hartziekte, 1% had een andere hartziekte en 6% betrof gezonde

partners van patiënten. 3% kreeg binnen twee jaar, gemeten vanaf de start met de patiëntengroep, een re-infarct en bijna 1% was het slachtoffer van een plotselinge dood. 20% van de overlevenden na een hartinfarct zou in aanmerking komen voor deze groepen, in 1982 deed in concreto 10% mee (Gleichmann ea, 1983). De filosofie achter deelname is een levenslange betrokkenheid.

Onderzoek IX

In 1991 is door Schäperclaus ea (1991), middels een schriftelijke enquête, een onderzoek gedaan naar sportgroepen voor hartpatiënten in West-Duitsland (zie tabel III). Er werd een steekproef genomen van 280 verenigingen uit een totaal van 2.500. De respons was 63% (177), de achtergrond van de respondenten was onbekend. Doel was het inventariseren van organisatie, omvang, doelstellingen en programma's.

Na 1978 is het aantal sportverenigingen sterk toegenomen. De helft is opgericht na 1980. In 1985 zijn er ongeveer 1.100 groepen met rond de 25.000 deelnemers, in 1990 meer dan 2.500 groepen met meer dan 55.000 deelnemers. 57% van de groepen is georganiseerd binnen sportverenigingen, 20% binnen gehandicaptensportverenigingen en de rest binnen particuliere verenigingen, volkshogescholen of combinaties hiervan. De 177 verenigingen telden 340 groepen, waarvan 261 trainingsgroepen en 79 oefengroepen. Het totale aantal deelnemers bedroeg 6.000, gemiddeld 18 per groep. De groepen kwamen gemiddeld eenmaal per week bij elkaar, gedurende ongeveer anderhalf uur.

Tabel III

Hartrevalidatie in (voormalig) West-Duitsland

Onderzoek	VIII	IX	X
Onderzoekers	Gleichmann ea	Schäperclaus ea	Schäperclaus ea
Jaar van onderzoek	1982	1991	1991
Onderzoeksinstrument	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête
Respondenten	artsen fysiotherapeuten	onbekend	patiënten
Respons	67%	63%	onbekend
Revalidatiefase	3	3	3
Aantal aangeschreven instellingen	420	280	5
Onderzochte programma onderdelen	alle	fysiotherapie	fysiotherapie
Patiëntgegevens	ja	ja	ja

Onderzoek X

In het genoemde onderzoek van Schäperclaus ea (1991) is door 70 deelnemers van sportverenigingen een uitgebreide enquête ingevuld, met als doel een reeks patiëntgegevens te verzamelen (zie tabel III).

76% van de deelnemers was man. De leeftijdsverdeling was: 15% jonger dan 50 jaar, 75% tussen 50 en 70 jaar en tenslotte 10% ouder dan 70 jaar. 62% had een hartinfarct achter de rug, 36% een bypassoperatie, 3% een klepoperatie, 29% een andere hartziekte. 84% had al deelgenomen aan een klinisch hartrevalidatieprogramma; blijkbaar stroomde 16% rechtstreeks door vanuit het opnameziekenhuis, of was helemaal niet opgenomen geweest.

Commentaar

In het eerste project is sprake van een respons van 67%. De auteur concludeert in zijn artikel dat hierdoor een representatief beeld is verkregen van de sportgroepen voor hartpatiënten. Het is echter onduidelijk op welke manier de niet-responderende groepen functioneerden. Het is mogelijk dat zij niet of nauwelijks van de grond zijn gekomen en daarom niet reageerden. De projecten VIII en IX zijn gebaseerd op steekproeven. Ook hier blijft de vraag open in hoeverre de gegevens representatief zijn voor de gehele populatie.

Gesteld dient te worden dat de drie beschreven onderzoeken een goed beeld verschaffen van de sportgroepen voor hartpatiënten in West-Duitsland. Ook zijn er goede patiëntgegevens bekend. Het aantal deelnemers blijkt vanaf 1982 enorm toegenomen: destijds waren er 9.000, in 1985 25.000 en in 1990 55.000. Deelname aan zo'n sportgroep is door de jaren heen een belangrijk onderdeel geworden van de nazorg voor hartpatiënten.

2.3.2 Engeland

Onderzoek XI

In 1985/86 is een schriftelijke enquête gehouden om de hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis in Groot-Brittannië te kunnen inventariseren (Green ea, 1988; Davidson ea, 1988). 132 "Health Districts" werden aangeschreven (zie tabel IV). Uit de respons van 70% kwam naar voren dat in 41 districten hartrevalidatie werd gegeven, in de overige 57 districten niet. Daarnaast werd nog van vijf andere instanties informatie verkregen. De enquêtes werden ingevuld door fysiotherapeuten.

Alle instellingen (N=46) accepteerden post-infarctpatiënten, 63% ook patiënten met angina pectoris, en 65% patiënten die een coronaire bypassoperatie hadden ondergaan. Meer dan de helft hanteerde een leeftijdsgrens, variërend van 55 tot 70 jaar. 17% gaf individuele behandeling, de rest behandelde groepsgewijs. 17% gebruikte standaard een fietstest voor de start van het programma, 19% gebruikte de fietstest slechts op indicatie. 85% van de programma's startte binnen acht weken na het infarct; meer dan de helft startte binnen vier weken. De duur bedroeg gemiddeld 6 tot 8 weken. De meeste

programma's kenden twee sessies per week. Eén centrum gaf klinische revalidatie en dit programma duurde drie weken.

Alle instellingen hadden fysiotherapeuten ingeschakeld, 24% artsen en 15% verpleegkundigen. De helft had diëtisten bij de programma's betrokken, 26% klinisch psychologen en 24% maatschappelijk werkers. 61% van de instellingen werd tijdens de oefeningen zo nu en dan geconfronteerd met angina pectoris en 11% wel eens met een re-infarct. Slechts 25% had sporadisch te maken met een circulatiestilstand, die soms gevolgd werd door de dood. Slechts één instelling had een follow-up georganiseerd.

Commentaar

Reeds in 1970 werd een korte enquête gestuurd naar de leden van de "British Cardiac Society" (Grodén ea, 1971) om de hartrevalidatiefaciliteiten in Engeland te inventariseren. Slechts enkele ziekenhuizen bleken faciliteiten te hebben voor revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis.

Omdat er toentertijd nog weinig belangstelling was voor hartrevalidatie, werd in 1975 een gezamenlijke werkgroep van de "Royal College of Physicians of London" en de "British Cardiac Society" opgericht, met als doel know-how betreffende hartrevalidatie te verzamelen en aanbevelingen te formuleren omtrent het vormgeven aan de hartrevalidatie in Engeland (Royal College of Physicians/British Cardiac Society, 1975). In 1986 volgde de in dit hoofdstuk beschreven enquête. De Coronary Prevention Group (1989) heeft in 1988 aanbevelingen geformuleerd hoe hartrevalidatie vorm te geven.

De hiervoor besproken enquête uit 1986 toont duidelijk aan dat ook in Engeland revalidatie nagenoeg synoniem is aan fysieke training, en dat zowel psychosociale zorg als secundaire preventie zeer beperkt aan bod komen. Verder dient gesteld te worden dat hartrevalidatie na ontslag anno 1986 in Engeland weinig verspreid was en slechts in minder dan de helft van het land werd toegepast.

2.3.3 Italië

Onderzoek XII

In 1987 is in Italië een schriftelijke enquête gestuurd naar 222 bekende instellingen om inzicht te krijgen in de hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis (Giordano, 1989). Uit de respons van 72% bleek dat 59 instellingen na ontslag hartrevalidatie gaven (zie tabel IV). Maar liefst 70% bleek in het noorden van Italië te liggen. De achtergrond van de invullers was onbekend.

In totaal werden ongeveer 11.000 patiënten per jaar gerevalideerd, 65% was hartinfarctpatiënt. Alle instellingen gaven revalidatie direct na de ziekenhuisopname: 34 in poliklinische vorm, 9 in klinische vorm en 16 in beide vormen. De gebruikte diagnostische procedures waren: fietstest (100% van de instellingen), echo (96%) en Holter monitoring (80%).

Medische en fysieke aspecten stonden steeds centraal in de programma's, terwijl veel minder gedaan werd aan psychologische begeleiding (42%) en diëetadviezen (31%).

Tabel IV

Hartrevalidatie in Engeland en Italië

Onderzoek	XI	XII
Land	Engeland	Italië
Onderzoekers	Green ea	Giordano
Jaar van onderzoek	1986	1987
Onderzoeksinstrument	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête
Respondenten	fysiotherapeuten	onbekend
Respons	70%	72%
Revalidatiefase	2	2
Aantal aangeschreven instellingen	132	222
Onderzochte programma onderdelen	alle	alle
Patiëntgegevens	nee	beperkt

Voorlichting over risicofactoren (75%) kwam wel frequent voor. Alle fysieke programma's werden gesuperviseerd door cardiologen, fysiotherapeuten of verpleegkundigen. Bijna alle instellingen werden gesteund door de Servizio Sanitario Nazionale.

Commentaar

Dankzij deze enquête zijn er redelijk gedetailleerde gegevens beschikbaar. Slechts een klein deel van de ziekenhuizen heeft de mogelijkheid hartpatiënten te revalideren. Italië kent een gedifferentieerd aanbod van faciliteiten in een zeer beperkt aantal centra: klinische en poliklinische revalidatie en een combinatie van beide! Het is niet duidelijk op wat voor gronden patiënten klinische en/of poliklinische revalidatie krijgen. Gezien de vrij eenzijdige verdeling over het land, moeten andere dan revalidatiedoelstellingen een belangrijke rol spelen.

2.3.4 Commentaar op studies uit Europa

In Europa zijn nog maar weinig enquêtes gehouden naar de stand van zaken op het gebied van de zorg voor hartpatiënten (in drie fasen): van de voormalige Sovjet-Unie en de voormalige Oostblok-landen is geen inventarisatie bekend, hetzelfde geldt voor Scandinavië, Ierland en Schotland, Frankrijk, Spanje en Portugal, Oostenrijk en Zwitser-

land. Van de drie landen die wel onderzoek gedaan hebben, heeft West-Duitsland een zeer uitgebreid netwerk van patiënten sportgroepen. In Engeland en Italië is revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis in het grootste deel van het land niet beschikbaar. Overigens ligt in alle landen de nadruk op fysieke revalidatie cq conditieverbetering.

2.4 NIET-EUROPESE LANDEN

2.4.1 Verenigde Staten

Onderzoek XIII

In 1983 werd een schriftelijke enquête gehouden op initiatief van de Revalidatie Commissie van de Hartstichting van Virginia in de Verenigde Staten (Wolfe ea, 1987) (zie tabel V). De respons was 90% (44 van de 49 instellingen). De respondenten waren artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

De opzet van de revalidatie varieerde in hoge mate: ongeveer eenderde van de instellingen bood alleen revalidatie tijdens de opname, een deel alleen poliklinische revalidatie of een of andere vorm van nazorg, bijna de helft een combinatie van twee of drie van de genoemde mogelijkheden.

Fysieke training werd gegeven door alle instellingen, dieetadvisering door 93%; stoppen met roken kwam aan de orde in 65% van de instellingen en stressmanagement in 63%. Er werden 4.300 patiënten per jaar gerevalideerd, driekwart was post-infarctpatiënt. De rest betrof post-operatieve patiënten, "coronary prone"-patiënten, soms patiënten met angina pectoris of met andere cardiovasculaire ziekten. Slechts 15 tot 20% van de patiënten uit Virginia die een infarct overleefden, kreeg revalidatie na ontslag. De meeste instellingen konden zichzelf financieel onvoldoende bedruipen.

Onderzoek XIV

Ten behoeve van de enquêtering van het hierna te beschrijven onderzoek werd een aselechte steekproef getrokken (Southard & Broyden, 1990) van 202 uit 1195 bekende instellingen, met als doel psychosociale aspecten binnen de hartrevalidatie te inventariseren. 58% (107) leverde bruikbare informatie (zie tabel V). De achtergrond van de respondenten was onbekend.

De verdeling naar soort revaliderende instelling (N=107) was: 75% ziekenhuizen, 12% privé-klinieken, 9% "community clinics" en 4% universiteitsziekenhuizen. 71% van de instellingen gaf zowel revalidatie tijdens opname als na ontslag, 25% alleen na ontslag en 4% alleen tijdens opname.

In de helft van de instellingen werden niet-gestandaardiseerde psychosociale methoden gebruikt; eenderde gebruikte gestandaardiseerde methoden. De resultaten van de psychosociale screening werden in ongeveer tweederde van de instellingen informeel besproken met andere teamleden, bij de rest gebeurde dit middels een formeel teamoverleg of door het schrijven van een rapport; in minder dan eenderde van de instellingen

werden de psychosociale gegevens geïntegreerd in een multidisciplinair geschreven rapport.

Er werden diverse psychosociale interventies toegepast: "patient support groups" in 71% van de instellingen, betrekking van het gezin in 62%, stress management programma's in 60% en een korte psychosociale consultatie in 62%. Minder toegepast werden: biofeedback (39%), uitgebreide individuele psychotherapie (32%) en groepspsychotherapie (18%).

Met name verpleegkundigen verzorgden de psychosociale screening, terwijl maatschappelijk werkers en klinisch psychologen vooral kortdurende consultaties en individuele psychotherapie gaven. Meer dan de helft van de instellingen vond dat ontoereikende financiële vergoeding het gebruik van psychosociale diensten negatief beïnvloedde.

2.4.2 Canada

Onderzoek XV

In 1985 is een enquête gehouden in Ontario door de Queen's Universiteit in samenwerking met het ministerie van Toerisme en Recreatie (Afdeling Sport en Fitness) (Wolfe *et al.*, 1990). Van de 43 aangeschreven hartrevalidatieafdelingen gaven er 37 (86%) respons (zie tabel V). Respondenten waren artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.

25 afdelingen waren verbonden aan een "hospital" of "medical clinic", 10 aan "YM-YWCA's", 5 waren "community based organizations" en 3 waren gelieerd aan "kinesiology/physical education"-afdelingen van universiteiten. 5 afdelingen gaven alleen revalidatie tijdens de opname, 16 alleen nazorg. De rest van de afdelingen gaf programma's die samengesteld waren uit elementen afkomstig uit twee of drie fasen van het zorgtraject dat een hartpatiënt kan doorlopen.

Alle afdelingen gaven fysieke training. In aanvulling hierop boden 25 afdelingen diëetadvisering aan, 20 stressmanagement en 19 hielden zich bezig met programma's gericht op het stoppen met roken. De patiënten kregen de programma-onderdelen individueel aangeboden of in gestructureerde groepen waaraan, naast een fysiotherapeut, ook andere disciplines meewerkten.

Extrapolatie van de enquêtegegevens leert dat in 1985, gerekend over alle 43 aangeschreven afdelingen tezamen, ongeveer 5.000 patiënten deelnamen aan de diverse hartrevalidatieprogramma's; de helft van de patiënten had een infarct gehad en eenderde een hartoperatie. Naar schatting werd 10 tot 15% van alle patiënten na een infarct gerevalideerd, hetgeen inhoudt dat er in Canada jaarlijks tussen de 25.000 en 37.500 infarctpatiënten zijn. Vooral artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, en slechts enkele diëtisten en klinisch psychologen waren bij de revalidatie betrokken.

Commentaar op studies afkomstig uit Noord-Amerika

Opmerkelijk in Noord-Amerika (Verenigde Staten plus Canada) is dat er na ontslag geen klinische revalidatie is. Verder valt op dat een deel van de instellingen slechts revalideert tijdens de opname, een deel alleen na ontslag en een deel alleen in de nazorgfase

(sportgroepen). In de diverse onderzoeken worden al deze verschillende benaderingen niet uitgesplitst bij het berekenen van het aantal gerevalideerde patiënten, de beschikbare programmaonderdelen en de disciplines. Het resultaat is dat het onmogelijk is een juist beeld te krijgen van de hartrevalidatie, onderscheiden in haar drie fasen. Hierdoor is het ook moeilijk om vergelijkingen te maken met andere landen. De veronderstelling van een samenhang met het feit dat de revalidatie van hartpatiënten nog onvoldoende ontwikkeld is in Noord-Amerika, wordt onderstreept door de auteurs.

In het onderzoek van Southard & Broyden (1989) wordt een uiterst ruime definitie gebruikt voor psychosociale zorg. Wanneer we ons, zoals reeds eerder is gesteld, beperken tot de professionele psychosociale zorg gegeven door maatschappelijk werker en/of klinisch psycholoog, blijkt dat niet 75% maar slechts 10% van de instellingen deze professionele hulp biedt. Daar komt bij dat de respons van dit onderzoek op 58% uitkwam. Het is aannemelijk dat er bij de non-respondenten zeer veel instellingen zitten die helemaal geen psychosociale zorg geven. In deze twee landen wordt wel relatief veel aandacht besteed aan secundaire preventie activiteiten.

2.4.3 Australië

Onderzoek XVI

In 1984/85 is op verzoek van de Revalidatie Commissie van de Hartstichting van Australië een enquête gehouden (Worcester, 1986) (zie tabel V). Alle 153 aangeschreven ziekenhuizen reageerden. De invullers waren artsen en verpleegkundigen.

69% (106) kende een oefenprogramma tijdens de opname, in alle gevallen op individuele basis. Dit programma werd in 69% van deze ziekenhuizen gegeven door verpleegkundigen en in de rest door fysiotherapeuten. In 59% (90) werd tijdens de opname een inspanningstest verricht; het merendeel testte echter slechts een klein deel van de patiënten op hun belastbaarheid.

Groepseducatieprogramma's werden in 18% van de 153 ziekenhuizen tijdens de opname gegeven. In 71% was de diëtiste beschikbaar voor individuele consulten. Individuele psychosociale hulp door maatschappelijk werker of klinisch psycholoog was mogelijk in 84%, terwijl 58% ergotherapie toepaste bij de revalidatie.

Slechts 26 (17%) van de 153 ziekenhuizen hadden na ontslag een gestructureerd groepsoefenprogramma, 8% stuurde soms patiënten door naar een ander ziekenhuis. In ongeveer een kwart onderging de helft van de patiënten poliklinisch alsnog een inspanningstest. Eveneens ongeveer een kwart had een groepseducatie-programma, waarbij overigens ook steeds de partner uitgenodigd werd. 68% bood de mogelijkheid voor een individueel consult door een diëtiste en 17% voor individuele psychosociale hulp door de maatschappelijk werker. In 56% konden patiënten doorverwezen worden voor ergotherapie.

Tabel V
Hartrevalidatie in Noord-Amerika en Australië

Onderzoek	XIII	XIV	XV	XVI
Land	Virginia/ Verenigde Staten	Verenigde Staten	Ontario/ Canada	Australië
Onderzoekers	Wolfe ea	Southard & Broyden	Wolfe ea	Worcester
Jaar van onderzoek	1983	1989	1985	1984/85
Onderzoeks- instrument	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête	schriftelijke enquête
Respondenten	artsen verpleegkundigen fysiotherapeuten	onbekend	artsen verpleegkundigen fysiotherapeuten	artsen verpleegkundigen
Respons	90%	58%	86%	100%
Revalidatiefase	1, 2 en 3	1 en 2	1, 2 en 3	1 en 2
Aantal aangeschreven instellingen	49	202	43	153
Onderzochte programma- onderdelen	alle	psychosociale aspecten	alle	alle
Patiëntgegevens	beperkt	nee	beperkt	beperkt

Commentaar

Oefenprogramma's tijdens de mobilisatie blijken in Australië redelijk algemeen te zijn, maar ze worden doorgaans door verpleegkundigen gedaan. Daarentegen is de revalidatie na ontslag nog maar nauwelijks ontwikkeld. Het is verder onduidelijk in welke mate van de diverse faciliteiten gebruik gemaakt wordt. Concrete aantallen zijn namelijk niet beschikbaar. Niettemin is dit het meest uitgebreide en degelijke onderzoek naar fase 1 en 2 dat buiten Nederland gedaan is. En ook hier is de conclusie op haar plaats dat de revalidatie van hartpatiënten in Australië nog van zeer beperkte omvang is.

2.5 DISCUSSIE

2.5.1 Algemeen

Het ontbreekt aan een coherente en het hele zorgtraject voor hartpatiënten omvattende visie wat de doelstellingen moeten zijn, hoe de zorg georganiseerd dient te worden, welke patiënten in aanmerking komen en hoe het programma eruit dient te zien. Zowel in binnen- als buitenland ligt in de praktijk de nadruk op fysieke training cq conditietraining. Het alledaags functioneren van de patiënt voor het incident wordt niet als uitgangspunt genomen voor de revalidatie. Ook secundaire preventie komt nauwelijks aan bod. Internationaal is opmerkelijk weinig gepubliceerd over inventariserend onderzoek van de hartrevalidatie. Opvallend is dat bij het zoeken via de Index Medicus geen enkele studie is gevonden! Dit zegt waarschijnlijk iets over het geringe belang dat gehecht wordt aan revalidatie. Het blijft overigens onduidelijk hoe het staat met de hartrevalidatie in de landen die niet gerapporteerd hebben.

In Nederland is naar verhouding veel inventariserend onderzoek gedaan, gemiddeld van behoorlijke kwaliteit. Gepubliceerd onderzoek in andere landen toont een sterk wisselende kwaliteit. In Europa is vooral door West-Duitsland bericht over sportgroepen voor ex-hartpatiënten. Van Frankrijk, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, de voormalige Oostblok-landen en de voormalige Sowjet-Unie zijn geen inventarisatiestudies bekend, van Noord-Amerika (Verenigde Staten en Canada) slechts enkele fragmentarische onderzoeken, van Midden- en Zuid-Amerika is niets bekend, en ook niet van landen uit Azië en Afrika. In Australië is een goede en meer omvattende studie gepubliceerd.

In geen enkele studie komt het hele, in drie fasen te onderscheiden zorgtraject voor hartpatiënten in zijn onderlinge samenhang aan bod. Overigens is een aantal van de gehouden enquêtes al behoorlijk gedateerd, waardoor het mogelijk is dat de situatie in de betreffende landen inmiddels is veranderd.

2.5.2 Inhoudelijke beschouwingen

Mobilisatie tijdens de ziekenhuisopname

Revalidatie tijdens opname (=fysieke reactivering tot ADL-niveau) staat inhoudelijk niet ter discussie. Er is overigens geen onderzoek bekend naar het effect van revalidatie in deze fase. Het is relatief eenvoudig te organiseren binnen het ziekenhuis en de kosten zijn relatief laag. Het meest voorkomende programmaonderdeel is fysieke training. In Nederland wordt dit in nagenoeg alle ziekenhuizen gegeven, in het buitenland is dat lang niet altijd het geval. In situaties waar revalidatie nog in de kinderschoenen staat, worden de oefenprogramma's tijdens de mobilisatie vaak door de verpleging begeleid.

Overigens blijft, in zowel binnen- als buitenland, onduidelijk hoeveel en welke patiënten daadwerkelijk in deze fase gerevalideerd worden en bovendien of er nog andere programma-onderdelen dan alleen fysieke training aangeboden worden. Zo zou er een

start gemaakt dienen te worden met voorlichting en secundaire preventie. Ook zou er op afroep psychosociale hulp in te roepen moeten zijn.

Revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

Hartrevalidatie na ontslag is de meest onderzochte fase in het zorgtraject, zowel in Nederland als daarbuiten. Doel hiervan is enerzijds fysiek en psychosociaal herstel en anderzijds verandering van risicogedrag. In de praktijk bestaat revalidatie vooral uit conditietraining.

Ook in deze fase blijkt de nadruk eenzijdig op de fysieke reconditionering, zoals uit het belang van de inspanningstest blijkt, te liggen. Meestal is de enige doelstelling een verbetering van de fysieke belastbaarheid, soms wordt ook herstel van psychische en sociale facetten nagestreefd. De doelstelling dat de patiënt zijn normale leven weer kan gaan leiden wordt uit het oog verloren. Doorgaans is echter het enige beschikbare middel hiertoe fysieke training. In feite wordt hiermee conditieverbetering beoogd. Secundaire preventie, een tweede doelstelling, komt nauwelijks aan bod en zeker niet op een systematische manier.

Op het gebied van de organisatie blijken de volgende mogelijkheden aanwezig te zijn: klinische revalidatie, poliklinische revalidatie in een daartoe gespecialiseerde afdeling, en een beperkt poliklinisch programma in hetzelfde ziekenhuis als waar de opname heeft plaatsgevonden. In sommige landen, zoals West-Duitsland, wordt alleen klinische revalidatie in speciale klinieken gegeven. In andere landen, zoals Australië, Noord-Amerika en Engeland wordt uitsluitend een beperkt poliklinisch programma aangeboden in het opnameziekenhuis. Nederland kent het gehele scala aan mogelijkheden. Een adequate en systematische indicatiestelling voor de verschillende vormen van revalidatie ontbreekt echter, zodat het van toevallige factoren afhangt welke vorm van revalidatie de patiënt krijgt.

Ook is niet bekend hoeveel en welke patiënten in de verschillende revalidatievormen terechtkomen, noch op grond waarvan. In enkele landen, waaronder Nederland, is globaal bekend, op basis van schattingen, hoeveel patiënten gerevalideerd worden. Dit geldt ook voor een aantal patiëntkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en diagnose.

Onderhoudsfase: patiënteninitiatieven

Nazorgactiviteiten hebben tot doel het herstel en de ingezette verandering van risicogedrag voort te zetten cq vast te houden. In feite is hier ook het centrale onderdeel fysieke training cq conditietraining. Het is zeer de vraag of dit voldoende is om de genoemde doelstellingen te realiseren.

In een aantal studies wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen van hartrevalidatie: vaak lopen revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis en de nazorg in elkaar over. In deze fase is de bemoeienis van de reguliere gezondheidszorg minimaal. De patiënt onderneemt op eigen initiatief activiteiten die het effect van de revalidatie dienen te continueren. Hier zou wel enige sturing cq advisering van belang zijn. Cardioloog en huisarts kunnen hier een belangrijke rol spelen.

Qua organisatie valt de nazorg, in ieder geval in Nederland, buiten de reguliere gezondheidszorg en is zij afhankelijk van particulier initiatief. Er zijn overigens slechts twee landen die onderzoek naar nazorg hebben gedaan: het voormalige West-Duitsland en Nederland. Beide landen hebben een uitgebreid netwerk van sportclubs. In West-Duitsland is, van het hele zorgtraject, alleen de nazorg in de vorm van deelname aan (speciale) sportgroepen uitgebreid geïnventariseerd. Daar bestaat de opvatting dat sportclubs voor een deel van de hartpatiënten direct na ontslag uit het ziekenhuis ook een goede revalidatie kunnen bieden. In Nederland hadden en hebben sportclubs soms dezelfde functie, met name in die regio's waar geen revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis gegeven wordt.

Bij de nazorg vormen sportieve activiteiten blijkbaar het belangrijkste element. Dit is in ieder geval het enige onderdeel van de nazorg waarnaar onderzoek is uitgevoerd. Onduidelijk blijft of er ook andere programma-onderdelen bestaan en zo ja in welke mate en door wie er gebruik van gemaakt wordt. Uitgaande van de doelstelling van deze fase in het zorgtraject ligt het voor de hand dat ook andere behandelonderdelen hier een rol krijgen.

De aantallen en kenmerken van patiënten die aan sportgroepen deelnemen, zijn zowel van West-Duitsland als van Nederland redelijk bekend en zijn voor beide landen vergelijkbaar. In Nederland komt 13% van de hartpatiënten die het ziekenhuis verlaten, terecht in zo'n sportgroep, voor West-Duitsland geldt hetzelfde (Schäperclaus ea, 1991).

2.5.3 Methoden van onderzoek

Voor vrijwel elke in dit hoofdstuk behandelde studie, is de schriftelijke enquête gebruikt als onderzoeksmethode. Een vergelijking van de diverse schriftelijke enquêtes leert dat zij hun beperkingen hebben. De data zijn doorgaans afkomstig van de eigen afdeling; sociale wenselijkheid kan de verschafte data vertekenen. De dataverzameling is retrospectief, wat een minder nauwkeurig beeld oplevert; het zijn meestal schattingen.

De enquêtes zijn vooral gericht op de organisatie van hartrevalidatie en op de programma-onderdelen. Hoewel een globale indruk van het aantal patiënten wordt verkregen, blijft onduidelijk welke patiënten gerevalideerd worden en welke programma-onderdelen ze aangeboden krijgen. De gegevens hangen af van degene die de enquête invult.

Sterke punten zijn: inzicht en cijfers zijn op een snelle manier (globaal) beschikbaar. Er kan gemakkelijk een groot gebied bestreken worden. Het is een gepast middel om organisatie, faciliteiten en beschikbare programma-onderdelen te inventariseren.

In één onderzoek is de mondelinge enquête toegepast. Deze aanpak is met name geschikt om een gedetailleerd inzicht te krijgen in een of enkele onderdelen van de hartrevalidatie. Nadelig is dat deze methode relatief veel tijd kost, en daardoor moeilijk grootschalig kan worden toegepast. De respons is doorgaans hoog.

Overigens zijn het doorgaans artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten die de gegevens aangeleverd hebben, hetgeen het verschafte beeld van het zorgtraject voor hartpatiënten vertekend kan hebben.

2.5.4 Consequenties voor het eigen onderzoek

Er dient ook onderzoek gedaan te worden naar de samenhang en overgang tussen de drie fasen van het zorgtraject. Vandaar dat in deze dissertatie al de drie fasen onderzocht worden. De diversiteit van revalidatievormen in de periode na ontslag uit het ziekenhuis vraagt eveneens om een verklaring. Quantitatieve gegevens ontbreken of zijn niet meer actueel te noemen. Het betreft type zorg, de organisatie, programma-onderdelen en patiëntaantallen en kenmerken.

Om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen, zullen in dit registratie onderzoek, naast retrospectieve, ook prospectieve gegevens verzameld worden. De respondenten zullen de bij de revalidatie betrokken disciplines zijn. Zoals in het voorafgaande reeds gesteld zal dit waarschijnlijk een vertekening opleveren: zij zullen geneigd zijn de zaken mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. De verwachting is dat middels prospectieve gegevensverzameling dit effect verkleind kan worden en tot een aanvaardbaar niveau gereduceerd wordt.

2.6 CONCLUSIES

Van Nederland is bekend dat het (in vergelijking met dat deel van het buitenland dat geënquêteerd heeft) een uitgebreid netwerk van faciliteiten beschikbaar heeft voor de revalidatie van de hartpatiënt. Er is, eveneens in vergelijking met het buitenland, veel enquête-onderzoek verricht van redelijke tot goede kwaliteit. Zowel in binnen- als buitenland is fysieke training het centrale onderdeel van revalidatie.

HOOFDSTUK 3

Mobilisatie tijdens opname in het ziekenhuis

3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van inventariserend onderzoek naar de mobilisatie van hartpatiënten tijdens de ziekenhuisopname. De twee gebruikte onderzoeksmethoden waren: de schriftelijke enquête en de individuele patiëntenregistratielijst.

3.2 VRAAGSTELLING

Met de schriftelijke enquête werd onderzocht: (a) hoeveel en welke ziekenhuizen coronaire hartpatiënten revalideerden tijdens de opnamefase, (b) welke disciplines bij de revalidatie betrokken waren en welke behandelonderdelen toegepast werden, (c) hoeveel en welke patiënten (aantal, leeftijd, geslacht, indicatie, uitvallers) gerevalideerd werden.

Met behulp van de individuele patiëntenregistratielijsten werd getracht de volgende vragen te beantwoorden: (a) hoeveel en welke patiënten maken tijdens opname en na ontslag gebruik van welke behandelonderdelen? (b) zijn de patiëntgegevens verkregen via de schriftelijke (retrospectieve) enquête betrouwbaar?

3.3 METHODEN

De schriftelijke enquête over het jaar 1988 (zie bijlage I) werd in het voorjaar van 1989 opgestuurd naar 151 ziekenhuizen, waarvan bij de Nederlandse Hartstichting bekend was dat ze hartpatiënten opnamen. De contactpersonen voor de enquête waren doorgaans fysiotherapeuten.

Benaderd werden 138 algemene ziekenhuizen met een cardiologische/interne afdeling, 4 algemene ziekenhuizen met zowel een afdeling cardiologie als een afdeling cardiochirurgie, 1 categoriaal ziekenhuis met een afdeling cardiochirurgie, 7 academische ziekenhuizen met zowel een afdeling cardiologie als een afdeling cardiochirurgie, en 1

academisch ziekenhuis met alleen een afdeling cardiologie. In totaal ging het om 150 afdelingen cardiologie/interne geneeskunde en 12 afdelingen cardiochirurgie. Indien er na zes weken nog geen respons was, volgde een schriftelijke herinnering.

In 1988 werd aan de hiervoor genoemde 151 ziekenhuizen de mogelijkheid geboden om, met behulp van speciale registratielijsten (zie bijlage II), individuele gegevens van hartpatiënten te verzamelen omtrent hun revalidatie tijdens en na de opname. De lijsten dienden niet alleen als registratiemiddel van prospectieve gegevens ten behoeve van het onderhavige onderzoek, maar konden ook als zodanig gebruikt worden voor de betrokken afdelingen zelf.

Er zijn voor dit onderzoek 13 computers ter beschikking gesteld door de Nederlandse Hartstichting. Zij dienden naar evenredigheid verdeeld te worden over het land, en tussen erkende en niet-erkende afdelingen. Tenminste één ziekenhuis met cardiopulmonale chirurgie moest ook bedeed worden. De uitverkoren afdelingen moesten een voldoende aantal patiënten behandelen, en gemotiveerd zijn om te registreren.

De ziekenhuizen die een computer kregen, verplichtten zich data te verzamelen en de gegevens geanonimiseerd ter beschikking te stellen. Daarnaast konden ziekenhuizen, die niet in aanmerking kwamen voor een computer, de registratielijsten plus het bijbehorende computer-software-programma gratis bestellen. De lijsten, de programmatuur en de computers werden begin 1988 verzonden, met het verzoek alle patiënten te registreren die in dat jaar met revalidatie startten. De gegevens waren medio 1989 binnen.

3.4 RESULTATEN

3.4.1 Respons

De respons van de schriftelijke enquête was matig: slechts 56 van de 151 ziekenhuizen (37%) reageerden, ook na herhaald verzoek tot medewerking. Behalve het categorale ziekenhuis (met alleen een afdeling cardiochirurgie), hadden alle 55 andere ziekenhuizen (52 algemene en drie academische) een afdeling cardiologie. Twee van de drie academische ziekenhuizen en één algemeen ziekenhuis hadden daarnaast tevens een afdeling cardiochirurgie.

De registratielijsten, gebruikt door 14 algemene ziekenhuizen en één academisch ziekenhuis (met afdeling cardiochirurgie), leverden bruikbare gegevens op van in totaal 4375 patiënten.

3.4.2 Onderzoeksgegevens

In het navolgende zullen de resultaten van de schriftelijke enquête en van de registratielijsten gezamenlijk gepresenteerd worden. In die gevallen dat van een variabele zowel

enquête- als registratiegegevens beschikbaar waren, is gekozen voor de laatste, omdat deze gegevens gebaseerd zijn op het registreren van de concrete gang van zaken in de revalidatie, en daardoor naar verwachting betrouwbaarder zijn.

Ziekenhuizen

54 van de 56 ziekenhuizen die reageerden op de schriftelijke enquête, gaven hun hartinfarct- en hartoperatiepatiënten inderdaad fysiotherapie tijdens de opname. De vraag wanneer gestart werd met het geven van deze therapie, werd door 39 ziekenhuizen beantwoord: 36% startte reeds voor 1975, 38% tussen 1976 en 1980 en 26% na 1980.

Disciplines en programma-onderdelen

Disciplines

Gemiddeld waren op een of andere manier per ziekenhuis zes disciplines bij de revalidatie betrokken, waaronder meestal de cardioloog en de verpleegkundige, alsook de fysiotherapeut (tabel I). Van de psychosociale sector was de maatschappelijk werker het meest vertegenwoordigd.

Tabel I

Disciplines betrokken bij de revalidatie tijdens opname*

Disciplines	Ziekenhuizen (N=55)
Cardioloog	86%
Revalidatiearts	39%
Arts/internist	27%
Fysiotherapeut	80%
Verpleegkundige	71%
Diëtiste	66%
Maatschappelijk werker	86%
Klinisch psycholoog	56%

* Op basis van enquêtegegevens.

In tweederde van de ziekenhuizen vond eenmaal per week teamoverleg plaats; in een kwart (alle algemene ziekenhuizen met alleen een cardiologische/interne afdeling) gebeurde dat niet of slechts incidenteel. Het team bestond meestal uit een cardioloog, een verpleegkundige en een fysiotherapeut; in ongeveer de helft van de ziekenhuizen was ook een maatschappelijk werker aanwezig bij het overleg (NVFH, 1988). De besprekingen gingen vooral over de individuele patiëntenvoortgang en in mindere mate over beleidsaspecten.

Tabel II

Start fysiotherapie na opname*

Indicatie	Ziekenhuizen (aantal)	Start na opname (in dagen)	
		(gemiddeld)	(spreiding)
Infarct	(N=39)	2,4	1 - 5
Bypass	(N=21)	1,8	0 - 7
PTCA	(N=18)	1,3	0 - 3

* Op basis van enquêtegegevens.

Tabel III

Inhoud fysiotherapie tijdens opname (na individuele mobilisatie)*

Programma-onderdeel	Ziekenhuizen (N=44)
Fietsergometer	64%
Oefenzaal	55%
Ontspanningsoefeningen	32%
Sport en spel	30%
Circuittraining	12%
Loopband	9%

* Op basis van enquêtegegevens.

Mobilisatie

De tijdsduur tussen incident en start van de fysiotherapie bedroeg bij de helft van de patiënten minder dan drie dagen, bij 40% vier tot negen dagen en bij 10% tien dagen of langer (zie tabel II). Vroege start van de revalidatie vond met name plaats bij de infarctpatiënten (gemiddeld vier dagen) en de patiënten uit de restcategorie (gemiddeld drie dagen); bij de meeste operatiepatiënten startte de fysiotherapie vanaf de vierde dag (gemiddeld zes dagen) na de opnamedag. Dit gold zowel voor de algemene ziekenhuizen als voor het academisch ziekenhuis met de cardiochirurgie-afdeling.

Gemiddeld werden per patiënt negen fysiotherapiebehandelingen gegeven, één behandeling per dag. Opvallend is dat de operatiepatiënten gemiddeld slechts vijf behandelingen kregen, in het operatieziekenhuis was dit gemiddeld slechts 3,5. De veelal vroege overplaatsting naar het verwijzende ziekenhuis zal hiervoor de verklaring zijn. De meeste ziekenhuizen hanteerden geen expliciete leeftijdsgrens voor fysiotherapie tijdens de opname. Drie deden dat wel: genoemd werden 65 en 80 jaar.

Patiënten werden de eerste dagen individueel gemobiliseerd op de CCU/IC of de observatieafdeling. Begonnen werd met oefeningen op bed, gevolgd door ADL- en loopoefeningen. Indien de patiënt weer redelijk ter been was, werd de behandeling meestal in groepsverband voortgezet in de oefenzaal (tabel III). Het programma bestond

Tabel IV

Redenen voortijdig stoppen met revalidatie*

Redenen	Patiënten (N=429)
Overlijden	22%
Andere cardiale klachten	18%
Hartoperatie	8%
PTCA	7%
Andere lichamelijke klachten	11%
Weigering/desinteresse	5%
Overige	29%
Totaal	100%

* Op basis van patiëntenregistratielijsten; 10% van het totaal aantal gerevalideerde patiënten stopte voortijdig (N=3956).

Tabel V

Aantal patiënten dat een inspanningstest krijgt rond ontslag naar diagnosegroep*

Indicatie	Patiënten met test (N=1151)	Spreading per ziekenhuis
Infarct	668 (28%)	3 – 75%
Operatie	331 (27%)	0 – 77%
Rest	152 (14%)	0 – 50%

* Op basis van patiëntenregistratielijsten; 25% van alle patiënten kreeg een inspanningstest (N=4771).

vrijwel steeds uit fietsen, ontspanningsoefeningen en sport & spel. Daarnaast werd individueel vaak traplopen geoefend. Van alle gerevalideerde patiënten kreeg 79% het standaard- mobilisatie-programma van het behandelende ziekenhuis, 19% een individueel toegespitst programma.

Aantal patiënten voortijdig gestopt met fysiotherapie

10% van alle patiënten moest voortijdig afhaken, relatief weinig operatiepatiënten (7%) en relatief veel patiënten uit de categorie "overige coronaire hartpatiënten" (12%). Bij de meesten gebeurde dit al in het begin van de therapie. De belangrijkste redenen waarom gestopt werd, waren: overlijden (22%), cardiale klachten, of andere lichamelijke klachten (tabel IV).

Inspanningstest

Iets meer dan de helft van alle ziekenhuizen gaf aan bij infarctpatiënten in principe een inspanningstest te doen tijdens de opname of in de periode direct na ontslag. In totaal bleek slechts een kwart van alle onderzochte patiënten van ziekenhuizen die zo'n test in het programma hadden rond het ontslag, daadwerkelijk getest te zijn: 28% van de infarctpatiënten, 27% van de operatiepatiënten en 14% van de patiënten uit de

restcategorie. Het aantal gerevalideerde patiënten dat een inspanningsonderzoek kreeg, varieerde sterk per ziekenhuis: van 0 tot 67% (tabel V).

Voorlichting

In een aantal ziekenhuizen werd het videoprogramma van de Nederlandse Hartstichting "Een nieuw begin" gedraaid voor de patiënten en hun eventuele partners. In 12% van de ziekenhuizen kregen de patiënten een speciaal gepland voorlichtingsgesprek. Sporadisch vond dit onderhoud groepsgewijs plaats, meestal was het een individueel gesprek met de patiënt en zijn/haar eventuele partner. Bij de overige 88% werd voorlichting minder gestructureerd gegeven tijdens gesprekken met hulpverleners, onder andere bij visites, tijdens de oefeningen en de verzorging, en bij het ontslag. De disciplines die het meest aan voorlichting deden, waren: cardioloog, verpleegkundige, fysiotherapeut en diëtiste. Onduidelijk is of hier ook leeftijdsgrenzen gehanteerd worden.

Individuele consulten

In de meeste ziekenhuizen bestond de mogelijkheid individuele psychosociale consulten aan te vragen. Uit tabel I blijkt dat er doorgaans een maatschappelijk werker (86%) en/of klinisch psycholoog (56%) beschikbaar waren voor voorlichting, crisisinterventie of counseling en advisering. Een diëtiste kon in tweederde van de ziekenhuizen ook geconsulteerd worden.

Patiëntgegevens

Aantal

Per afdeling cardiologie werden gemiddeld 183 patiënten per jaar gerevalideerd, waarvan 79% (=145) na hartinfarct, 5% na CABG en 1% na klepoperatie, en 15% overige diagnoses (zie tabel VI). In de hartchirurgische centra werden nagenoeg alle patiënten na CABG en klepoperatie aldaar gerevalideerd, behoudens patiënten met ernstige complicaties.

Indicatie, geslacht en leeftijd

54% van de gerevalideerde patiënten had een infarct, 23% onderging een operatie en 23% behoorde tot de restcategorie (angina pectoris, PTCA of dreigend infarct) (tabel VII). 70% van de gerevalideerde patiënten was man (tabel VII). De meeste patiënten (56%) waren tussen de 50 en 70 jaar oud, 15% was jonger dan 50 jaar en 29% ouder dan 70 jaar (tabel VII). Naarmate de leeftijd vorderde, was het percentage vrouwen hoger: bij de leeftijdscategorie tot 50 jaar was dat 19%, tussen de 50 en 70 jaar 26% en boven de 70 jaar zelfs 43%.

3.5 DISCUSSIE

Ondanks de lage respons op de enquête is deze studie om meerdere redenen uniek: in Nederland is nog nooit zo'n omvangrijk onderzoek gedaan naar revalidatie-activiteiten

Tabel VI

Aantal gerevalideerde patiënten tijdens opname per diagnosegroep en type afdeling*

Afdeling	Infarct	CABG	Klep	Rest	Totaal
Cardiologie (N=40)*	5.837 (79%)	368 (5%)	56 (1%)	1.058 (15%)	7.319 (100%)
Hartchirurgie (N=2)*	—	1.600 (80%)	400 (20%)	—	2.000 (100%)
Totaal (N=42)*	5.837 (63%)	1.968 (21%)	456 (5%)	1.058 (11%)	9.319 (100%)

* Op basis van enquêtegegevens.

Tabel VII

Indicatie, leeftijd en geslacht van tijdens de opname gerevalideerde patiënten (N=4375)*

		<50 jaar (15%)		50-69 jaar (56%)		≥70 jaar (29%)		Totaal (100%)	
		M	V	M	V	M	V	M	V
Infarct	2.362	87%	13%	78%	22%	61%	39%	74%	26%
Operatie	1.047	72%	28%	73%	27%	56%	44%	70%	30%
Rest	966	76%	24%	66%	34%	49%	51%	61%	39%
Totaal	4.375	81%	19%	74%	26%	57%	43%	70%	30%

* Op basis van patiëntenregistratielijsten.

voor hartpatiënten tijdens de opname in het ziekenhuis. Van het buitenland is alleen een, overigens minder uitgebreide, studie bekend uit Australië. Ook het aantal met behulp van de individuele registratielijsten onderzochte patiënten is uniek.

3.5.1 Dataverzameling en beperkingen

De lage respons van de schriftelijke enquête kan mogelijk verklaard worden door het feit dat de enquête voornamelijk gericht was aan fysiotherapeuten, die soms een compleet overzicht van de revalidatie tijdens opname ontbeerden, en waarschijnlijk daarom niet reageerden. Ook het ontbreken van exacte gegevens binnen een afdeling, door een aantal respondenten aangegeven, kan een rol gespeeld hebben. Daarnaast kan er sprake zijn geweest van "enquête-moeheid": van 1984 tot en met 1988 zijn de ziekenhuizen de nodige malen over hartrevalidatie geënuquêteerd (Maes ea, 1986; NVFH, 1988; Gutker de Geus, 1988; Dixhoorn van ea, 1988; Soons & Bär, 1990a). De respons van 85% op de schriftelijke enquête in 1988 door Gutker de Geus (NVFH, 1988; Gutker de

Geus, 1988) betreffende fysiotherapie tijdens de opnamefase, is zeer goed te noemen en onder andere te verklaren door het feit dat de vragen over het fysiotherapieprogramma gesteld werden door een fysiotherapeut aan vakgenoten, terwijl bovendien geen patiëntenaantallen aan de orde kwamen.

De hoge non-respons betekent dat de nodige voorzichtigheid betracht dient te worden bij het doen van uitspraken over alle ziekenhuizen in Nederland, alleen op basis van onderhavige onderzoeksgegevens. Een beperking van het onderzoek met de registratielijsten is het ontbreken van vragen aangaande individuele consulten tijdens de opnamefase door diëtiste, maatschappelijk werker en klinisch psycholoog.

3.5.2 Onderzoekspopulaties

Van de 151 aangeschreven ziekenhuizen reageerden er 56 op de schriftelijke enquête: 51 ziekenhuizen met alleen een afdeling cardiologie en 5 operatieziekenhuizen, respectievelijk 37% (van de 139) en 42% (van de 12). Dit betekent dat beide typen ziekenhuizen zeer matig, maar wel redelijk evenredig vertegenwoordigd waren in de respons. Dit kan een gunstige invloed hebben gehad op de juistheid van de gegevens.

De individuele patiëntenregistratielijsten leverden gegevens op over 2388 infarctpatiënten, 10% van de totaalpopulatie (LMR/SIG, 1989) en over 1017 operatiepatiënten, 11% van de totaalpopulatie (Begeleidingscommissie Hartchirurgie, 1989). Dit betekent dat de onderzoeksgroep een adequate steekproef lijkt te zijn van de Nederlandse populatie voor deze twee diagnosegroepen. 14 algemene ziekenhuizen met alleen een afdeling cardiologie en één operatieziekenhuis stuurden de lijsten op, respectievelijk 10% (van de 139) en 8% (van de 12). Ook hier blijken beide typen ziekenhuizen redelijk evenredig vertegenwoordigd te zijn.

3.5.3 Vergelijking van de resultaten van de twee onderzoeksmethoden

De data van de schriftelijke enquête bleken vooral geschikt om een landelijk overzicht te krijgen van de revalidatie tijdens de opname. Dit bleek met name te gelden voor "instellingsgegevens" en "programma-onderdelen". Anders ligt dat voor de "patiëntgegevens" uit de schriftelijke enquête. Slechts een deel van het toch al beperkt aantal responderende ziekenhuizen produceerde gegevens en deze werden in de meeste gevallen retrospectief (door middel van schattingen) genoteerd, wat maakt dat de betrouwbaarheid van de verstrekte data ongetwijfeld beperkt is. Om dit euvel te overwinnen, werd in 1988 gestart met prospectieve gegevensverzameling door middel van individuele patiëntenregistratielijsten. Een dergelijke benadering biedt tevens de mogelijkheid om enquête- en lijstgegevens van sommige variabelen met elkaar te vergelijken, bij die afdelingen die op beide manieren data aangeleverd hebben.

De volgende zes variabelen kwamen in aanmerking: "start fysiotherapie na opname", "aantal patiënten dat voortijdig gestopt is met fysiotherapie", "indicatie", "geslacht", "leeftijd" en "aantal gerevalideerde patiënten" (zie tabel VIII). Het moment van start volgens de patiëntenregistratielijstgegevens, in vergelijking met de gegevens van de enquête, lag beduidend later: bij infarctpatiënten gemiddeld respectievelijk 4 en 2,4

Tabel VIII

Vergelijking van data uit de ziekenhuisfase verkregen met behulp van enquête en individuele patiëntenregistratielijst (IP)

Variabelen		Enquête	IP
Aantal gerevalideerde patiënten per afdeling		342	317
Aantal dagen dat fysiotherapie start na opname	infarct	2,4	4,0
	operatie	1,8	6,0
Percentage patiënten voortijdig gestopt met fysiotherapie		7,5	7,5
Indicatie gerevalideerde patiënten	infarct	77%	77%
	operatie	7%	9%
	rest	16%	14%
Leeftijd gerevalideerde patiënten in jaren	0 – 50	11%	12%
	50 – 70	54%	54%
	70 –	35%	34%
Geslacht gerevalideerde patiënten	Man	74%	75%
	Vrouw	26%	25%

dagen na opname, en bij operatiepatiënten idem 6 en 1,8 dagen. Ten aanzien van de variabelen "aantal patiënten voortijdig gestopt met fysiotherapie", "indicatie", "aantal gerevalideerde patiënten", "geslacht" en "leeftijd" zijn er kleinere of geen verschillen. Concluderend kan gesteld worden dat er behoudens het startmoment van revalidatie geen grote verschillen te zien zijn tussen de data uit beide onderzoeksmethoden.

3.5.4 Beschouwingen

In het navolgende worden de onderzoeksresultaten vergeleken met reeds bekende cijfers uit binnen- en buitenland. Australië is het enige land buiten Nederland dat ook een gedegen studie heeft verricht naar de opnamefase.

Het aantal van 151 ziekenhuizen dat hartpatiënten opneemt, uitgangspunt van deze studie, is correct (Spaan & van der Speld, 1990; NZI, 1989; NZI, 1990; Lorscheyd, 1990; LMR/SIG, 1989). Sinds 1979, toen er 140 van dergelijke ziekenhuizen waren, is dit totaal dus nauwelijks meer gestegen (Weeda & Visser, 1981). Het aantal cardiologische afdelingen bedraagt 134 (Klein Nulens ea, 1991), wat impliceert dat 16, waarschijnlijk kleine, ziekenhuizen de hartpatiënten op de afdeling interne geneeskunde onderbrengen.

Conform de bevindingen uit deze studie constateerde ook de NVFH (1988) dat nagenoeg elk ziekenhuis een door fysiotherapeuten verzorgd mobilisatie-programma voor hartpatiënten kende: slechts drie van de 136 aan de NVFH-enquête deelnemende ziekenhuizen

gaven geen fysiotherapie tijdens de opname. Op basis hiervan kan gesteld worden dat aan de belangrijkste doelstelling van de zorg voor hartpatiënten tijdens de ziekenhuisopname, namelijk reactivering, in Nederland ruimschoots voldaan wordt.

In 1979 werd in Nederland in de meeste ziekenhuizen al aandacht besteed aan actieve mobilisatie, reactivering en ADL-training (Weeda & Visser, 1981). Viel toen de begeleiding van de activiteiten, in de helft van de ziekenhuizen, nog onder de zorg van verpleegkundigen, in 1988 was deze taak, in nagenoeg alle ziekenhuizen, inmiddels toebedeeld aan fysiotherapeuten, een ontwikkeling die erop wijst dat steeds vaker gespecialiseerde/professionele krachten worden ingeschakeld.

In 1984 had 69% van de Australische ziekenhuizen die hartpatiënten opnamen een mobilisatie-programma, grotendeels verzorgd door verpleegkundigen, hetgeen betekent dat de professionalisering van de mobilisatie daar nog niet zo ver doorgevoerd is als in Nederland.

In veel ziekenhuizen kan een inspanningstest afgelegd worden, slechts een kwart van de patiënten krijgt echter zo'n test, bovendien varieert het aantal geteste patiënten per ziekenhuis enorm: van 0 tot 77%. In Australië bestaat deze mogelijkheid in ruim de helft van de ziekenhuizen, meestal worden ook daar slechts weinig patiënten daadwerkelijk getest. Exacte cijfers ontbreken echter. Onduidelijk is of de variatie veroorzaakt wordt door inhoudelijke dan wel financiële redenen. Het is wenselijk dat er onder medisch specialisten consensus bereikt wordt over op welk moment, welke patiënten, gelet op diagnose en eventuele complicaties, zo'n test dienen te krijgen.

Secundaire preventie staat vrijwel nergens op het programma, en van een systematische aanpak is helemaal geen sprake. Hierdoor wordt niet voldaan aan de doelstelling om reeds tijdens de opname een start te maken met voorlichting en verandering van risicogedrag (Wenger, 1979; Superko, 1985; Maeland & Havik, 1987; Bär & Vonken, 1990; Elderen van, 1991). In Australië bleek de situatie wat dat betreft beter te zijn: 18% van de ziekenhuizen verzorgde een groepsvoorlichtingsprogramma tijdens de opname.

De beschikbaarheid van psychosociale disciplines is fors toegenomen in vergelijking met 1979: toen was in ongeveer de helft van de ziekenhuizen een maatschappelijk werker beschikbaar en slechts in enkele een klinisch psycholoog (Weeda & Visser, 1981). Dit wijst op een groeiende aandacht voor en acceptatie van de psychosociale aspecten van revalidatie tijdens de opname.

Waarschijnlijk is het aantal diëtisten dat bij de zorg voor hartpatiënten is betrokken sterk toegenomen, omdat in het onderzoek van Weeda & Visser, dat de situatie in 1979 beschreef, geen melding werd gemaakt van de beschikbaarheid van een diëtiste tijdens de opname. Blijkbaar wordt het belang van gezonde voedingsgewoonten steeds sterker onderkend.

In Australië bleek in 84% van de ziekenhuizen een maatschappelijk werker beschikbaar, hetgeen overeenkomt met de Nederlandse situatie; een klinisch psycholoog was slechts sporadisch te consulteren. In 71% was daarentegen een diëtiste beschikbaar. Onduidelijk was in hoeverre daadwerkelijk en systematisch van deze disciplines gebruik werd

gemaakt. De indruk bestaat dat deze disciplines op ad hoc basis en weinig frequent ingeschakeld werden, ook al omdat ze meestal niet deelnamen aan het teamoverleg. Het ontbreekt in Nederland aan consensus over de inbreng van deze disciplines, en ook aan een expliciete financiële structuur.

Per afdeling werden gemiddeld 196 patiënten opgenomen na een infarct (LMR/SIG, 1989), waarvan er 33 (=17%) overleden in het ziekenhuis. Gezien de bevinding uit onderhavig onderzoek dat er 145 infarctpatiënten per afdeling gerevalideerd werden, kan gekonkludeerd worden dat 74% van alle opgenomen infarctpatiënten en 90% van alle infarctpatiënten die het ziekenhuis levend verlieten, gerevalideerd werden.

Het totaal aantal patiënten na CABG van hartchirurgische centra in Nederland bedroeg 8.283 en het totaal aantal klepoperaties 1.350 (Begeleidingscommissie Hartchirurgie, 1989). Gesteld kan dan ook worden dat 17% van alle patiënten na CABG na terugplaatsing op de afdeling cardiologie van herkomst verder gerevalideerd werd, en 21% van de patiënten na klepoperatie.

Uit cijfers van het LMR/SIG (1989) blijkt dat 40% van de opgenomen infarctpatiënten ouder was dan 70 jaar, terwijl 29% van de gerevalideerde patiënten ouder is dan 70 jaar. De patiënten die niet gerevalideerd werden zijn waarschijnlijk de ouderen en degenen met zeer ernstige klachten en complicaties. Verder blijkt uit dezelfde cijfers dat 69% van de opgenomen hartinfarctpatiënten man was en 31% vrouw. De man-vrouw verdeling in de gerevalideerde populatie was 74% respectievelijk 26%. Dit verschil komt tot uiting in met name de groep patiënten boven de 70 jaar: de geslachtsverdeling bij de opgenomen infarctpatiënten was hier 54% respectievelijk 46% en die van de gerevalideerde infarctpatiënten 61% respectievelijk 39%. Voor de opnamefase kan dan ook gesteld worden dat in verhouding ongeveer evenveel mannen als vrouwen in aanmerking kwamen voor revalidatie.

Uit bovenstaande cijfers kan geconcludeerd worden dat een zeer groot deel van de hartpatiënten tijdens opname gereactiveerd wordt.

3.6 CONCLUSIES

Het gaat hier om een eerste studie die een redelijk betrouwbaar totaalbeeld geeft van de revalidatie van hartpatiënten tijdens de ziekenhuisopname. Bijna alle responderende ziekenhuizen gaven fysiotherapie tijdens de opname aan een zeer groot deel van hun patiënten, waardoor voldaan wordt aan de belangrijkste doelstelling van de zorg voor hartpatiënten tijdens de ziekenhuisopname. Een kwart van de patiënten kreeg een inspanningstest op het einde van de opname of direct na ontslag. Inzet van diëtist, maatschappelijk werk en klinisch psycholoog gebeurde waarschijnlijk weinig en bovendien meestal op ad hoc basis. Systematische voorlichting ontbrak nagenoeg, waardoor niet voldaan wordt aan de doelstelling reeds tijdens de opname een start te maken met voorlichting en verandering van risicogedrag.

HOOFDSTUK 4

Revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

4.1 INLEIDING

Hoe het staat met de revalidatie van hartpatiënten na ontslag uit het ziekenhuis, wordt in dit hoofdstuk beschreven. Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van mondelinge en schriftelijke enquêtes en van individuele patiëntenregistratielijsten. Dit onderzoek kan gezien worden als een vervolg op de enquëtering van Van Dixhoorn ea (1988).

4.2 VRAAGSTELLING

Ten aanzien van de revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis werd getracht de volgende vragen te beantwoorden: (a) hoeveel en welke instellingen revalideren hartpatiënten, (b) welke disciplines zijn erbij betrokken en welke behandelonderdelen worden gegeven, (c) hoeveel en welke patiënten (aantal, leeftijd, geslacht, indicatie, uitvallers, verwijzingen) worden gerevalideerd, (d) veranderingen in de tijd van bovengenoemde variabelen.

4.3 METHODEN

Op de eerste plaats zijn in de periode 1986-1989 in Nederland schriftelijke enquêtes gehouden (elk jaar één). De enquêteformulieren werden steeds na afloop van het te enquêteren jaar opgestuurd naar de contactpersonen van de instellingen. De enquêtes uit 1988 en 1989 (zie bijlage III) werden vereenvoudigd: instellingskenmerken en behandelonderdelen hoefden alleen genoteerd te worden indien er, in vergelijking met het jaar daarvoor, veranderingen waren opgetreden. Als de formulieren na ongeveer zes weken niet teruggestuurd waren, volgde een schriftelijke herinnering, indien nodig ook nog een telefonische. Alle gegevens waren medio 1989 binnen. Het betrof 115 afdelingen.

Op de tweede plaats heeft een mondelinge enquête plaatsgevonden in 1987/88 en betrof de toentertijd bij de onderzoekers bekende afdelingen (N=88). Doel van de mondelinge

enquête was de middels de schriftelijke enquête gevonden gegevens aan te vullen en te controleren. Verder werden details gevraagd van het behandelprogramma, met name psychosociale zorg, voorlichting en klinische revalidatie dienden verduidelijkt te worden. Ook diende het interview ertoe afdelingen te motiveren om mee te werken aan het onderzoek. In principe kon het hele team bij het interview aanwezig zijn. Het gesprek duurde gemiddeld één uur.

Op de derde plaats werd in 1988 aan de toen bekende afdelingen de mogelijkheid geboden via registratielijsten (zie bijlage II) prospectief individuele gegevens van patiënten te verzamelen, met als doel een antwoord te krijgen op de volgende vragen: (a) hoeveel en welke patiënten maken gebruik van welke behandel faciliteiten? en (b) zijn de patiëntgegevens, verkregen via de enquêtes, betrouwbaar? Medio 1989 waren de gegevens binnen. Voor verdere informatie over de patiëntenlijsten zie paragraaf 3.3.

4.4 RESULTATEN

4.4.1 Respons

Van de 115 instellingen waarvan in 1989 bekend was dat daar hartrevalidatie na ontslag werd gegeven, hebben 111 (97%) tenminste eenmaal op de schriftelijke enquêtes in de periode 1986-1989 gereageerd, 75% heeft minimaal tweemaal gereespondeerd. De contactpersonen, die ook de enquêtes invulden, waren doorgaans fysiotherapeuten (75%) en artsen (16%). Uit de gegevens van instellingen die meer dan één keer gereespondeerd hebben, bleek dat de instellingskenmerken en programma-onderdelen over het tijdsbestek van vier jaar in vrijwel alle centra ongewijzigd waren. Indien er verschillen waren, zijn de meest recente gegevens van de instellingen verwerkt in de resultaten. Patiëntkenmerken zijn per jaar berekend.

92% van de 88 in 1987 bekende en benaderde instellingen was bereid mee te werken aan de mondelinge enquête, 7 instellingen weigerden. In 54 (67%) afdelingen was één discipline, in de overige 27 (33%) afdelingen waren twee of meer disciplines bij het interview aanwezig. Fysiotherapeut en arts waren het meest vertegenwoordigd. Met behulp van de interviews werden de via de schriftelijke enquêtes verzamelde gegevens gecontroleerd en aangevuld. Daarnaast werd aanvullende informatie verkregen in de vorm van protocollen, jaarverslagen en patiënteninformatiefolders. Ook werd zo het aantal bekende afdelingen vergroot.

15 afdelingen met hartrevalidatie na ontslag hebben via de registratielijsten data geleverd betreffende 2.043 patiënten. Het gaat om tien afdelingen met een fysiek reconditioneringsprogramma verbonden aan algemene ziekenhuizen, twee afdelingen met erkenning voor revalidatiedagbehandeling verbonden aan algemene ziekenhuizen en alledrie de afdelingen met erkenning voor klinische revalidatie na ontslag.

4.4.2 Onderzoeksgegevens

In deze paragraaf worden de gegevens gepresenteerd van de schriftelijke en mondelinge enquêtes, plus de resultaten van de individuele patiëntenregistratielijsten. Wanneer van een variabele gegevens beschikbaar waren via zowel de enquêtes als de individuele patiëntenlijsten, is gekozen voor de data van de laatstgenoemde onderzoeksmethode, daar deze gegevens gebaseerd zijn op een registratie van de concrete gang van zaken en daardoor, naar verwachting, betrouwbaarder zijn dan de gegevens van de enquêtes die gebaseerd zijn op schattingen. In de discussie zal hierop worden teruggekomen.

Instellingen

Soorten instellingen

Er bestaan in Nederland drie vormen van hartrevalidatie na ontslag:

- (a) *Klinische revalidatie*: de patiënt wordt opgenomen en krijgt een multidisciplinair en geïndividualiseerd revalidatieprogramma aangeboden. Deze vorm van zorg werd verstrekt in twee revalidatiecentra (Haren en Hoensbroek) en in één algemeen ziekenhuis (Hilversum). Hierbij dient opgemerkt te worden dat met de klinische revalidatie in het Revalidatie Instituut Muiderpoort in 1988 is gestopt en dat anno 1992 de klinische revalidatieafdeling in Hilversum (Zonnestraal) is opgeheven. Daar staat tegenover dat er een nieuwe mogelijkheid gecreëerd is in Katwijk (Zeehospitium). Patiënten krijgen doorgaans een multidisciplinair, dagvullend programma. Naast fysieke training wordt expliciet aandacht besteed aan secundaire preventie. Verder bestaat de mogelijkheid voor individuele consulten van maatschappelijk werker, klinisch psycholoog en diëtiste. Overigens kunnen patiënten in deze instellingen tegelijkertijd poliklinisch revalideren.
- (b) *Revalidatiedagbehandeling*: de patiënt krijgt een poliklinisch multidisciplinair programma aangeboden (Ziekenfondsraad, 1981). Naast een meestal groepsgewijs fysiek programma wordt ook aan secundaire preventie gedaan. Verder bestaat hier eveneens de mogelijkheid van individuele consulten van maatschappelijk werker, klinisch psycholoog en diëtiste. Deze vorm van revalidatie vond toepassing in 25 instellingen: 7 revalidatiecentra en 18 algemene ziekenhuizen.
- (c) *Fysieke reconditionering, door afdelingen zonder erkenning voor revalidatiedagbehandeling*: de patiënt krijgt in principe alleen een poliklinisch fysiek programma aangeboden, meestal in groepsverband. Behandeling aldus gebeurde in 87 instellingen: 3 academische en 84 algemene ziekenhuizen.

Incidenteel werden hartpatiënten in perifere fysiotherapie praktijken behandeld (KNGF, 1990). Dit kan echter niet gezien worden als een vorm van revalidatie naast de genoemde drie.

23% van de algemene en academische ziekenhuizen gaf geen revalidatie na ontslag. De meeste van deze ziekenhuizen verwezen echter door naar een hiervoor erkend centrum. 77% van de instellingen had wel revalidatie na ontslag in huis, 70% in de vorm van fysieke reconditionering, 7% in de vorm van revalidatiedagbehandeling.

Tabel I

Jaar van start hartrevalidatie na ontslag naar soort afdeling#

Start jaar	Klin* (N=3)	RDB** (N=25)	FR*** (N=80)	Totaal (N=108)
1965-69	1	1 (4%)	0	2 (2%)
1970-74	1	11 (44%)	12 (15%)	24 (22%)
1975-79	0	8 (32%)	30 (38%)	38 (35%)
1980-84	1	5 (20%)	29 (36%)	35 (33%)
1985-88	0	0 (0%)	9 (11%)	9 (8%)
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

* Klinische revalidatie; ** Revalidatiedagbehandeling; *** Fysieke reconditionering; # op basis van enquêtegegevens.

Startjaar hartrevalidatie

Uit tabel I blijkt dat twee instellingen reeds voor de officiële start in 1970 hartrevalidatie toepasten. Drie instellingen voor klinische revalidatie waren er vanaf de start bij: Amsterdam, Haren en Hilversum.

De meeste afdelingen met erkenning voor revalidatiedagbehandeling zijn gestart tussen 1970 en 1976: zij kregen de financiële armslag om patiënten multidisciplinair te behandelen. Na 1984 is er geen erkende afdeling meer bijgekomen omdat het erkenningen-beleid van de overheid stagneerde. Fysieke reconditionering van hartpatiënten wordt vergoed als fysiotherapieverrichting. Vanaf het begin van de jaren 70 tot medio 80-er jaren is er een forse groei geweest van het aantal niet-erkende afdelingen. Het aantal groeit nog steeds, hoewel de laatste jaren mondjesmaat. Anno 1989 waren er 87 niet-erkende afdelingen voor hartrevalidatie.

Spreiding over Nederland

De hartrevalidatie is in Nederland verdeeld over drie regio's (Dixhoorn van ea, 1988): Noord/Oost (provincies Groningen, Friesland, Overijssel en deel van Gelderland met als westgrens de Veluwe en als zuidgrens de Rijn), West (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en deel Gelderland) en Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en deel Gelderland) (tabel II).

Uit de inventarisatie blijkt dat elke regio een mogelijkheid had voor klinische revalidatie. In de praktijk blijkt dat met name naburige ziekenhuizen verwijzen voor klinische revalidatie, hetgeen inhoudt dat landelijk niet evenredig gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid tot revalidatie. Gerelateerd aan het aantal inwoners kende regio Zuid de meeste hartrevalidatie-afdelingen, namelijk ongeveer tweemaal zoveel als de rest.

Daarnaast is Nederland opgedeeld in 27 gezondheidsregio's ten behoeve van de intramurale gezondheidszorg (Spaan & Speld van der, 1990). Wanneer het aantal instellingen per aantal inwoners van een gezondheidsregio als uitgangspunt wordt

Tabel II

Spreiding van soorten afdelingen voor hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis over Nederland in 1988#

Regio	Inwonersaantal (miljoen)	Klin* (N=3)	RDB** (N=25)	FR*** (N=87)	Totaal (N=115)
Noord	4,1 (28%)	1	5 (20%)	21 (24%)	27 (24%)
West	6,5 (44%)	1	11 (44%)	31 (36%)	43 (37%)
Zuid	4,1 (28%)	1	9 (36%)	35 (40%)	45 (39%)
Totaal	14,7 (100%)	3 (100%)	25 (100%)	87 (100%)	115 (100%)

* Klinische revalidatie; ** Revalidatiedagbehandeling; *** Fysieke reconditionering; # op basis van enquêtegegevens.

genomen, bleken met name de regio's Leiden en Den Haag relatief sterk ondervertegenwoordigd (tabel III). Regio 't Gooi had de meeste instellingen ter beschikking.

Disciplines en programma-onderdelen

Disciplines

Aan iedere afdeling waren een of meerdere artsen verbonden, die ofwel vast lid van het team of op afroep beschikbaar waren (tabel IV). Van de paramedische sector was de fysiotherapeut altijd aanwezig, niet verwonderlijk omdat fysieke training vrijwel steeds onderdeel van het programma was. Van belang hierbij is dat er een expliciete financieringsregeling voor fysiotherapie-verrichtingen bestaat. In de psychosociale sector waren de maatschappelijk werker en de klinisch psycholoog de meest voorkomende disciplines. In 93% van alle erkende afdelingen (klinisch en revalidatiedagbehandeling) en 35% van alle niet-erkende vond wekelijks teamoverleg plaats. Bijna de helft van de niet-erkende afdelingen had echter geen regelmatig, gestructureerd overleg.

Het fysieke programma

14 van de 87 afdelingen gericht op fysieke reconditionering, een minderheid, hanteerden een, niet absolute, leeftijdsgrens van 65, 70 of 75 jaar.

De meeste instellingen gaven een standaard fysiek groepsprogramma dat door het merendeel van de patiënten (85%) gevolgd werd. De rest kreeg, vanwege complexe fysieke cq medische problematiek, een individueel toegespitst programma. Met name in klinische afdelingen kregen veel patiënten een dergelijk programma aangeboden (39%); voor afdelingen met fysieke reconditionering lag dat lager (13%). Opvallend was het geringe percentage (3%) patiënten dat in een erkende afdeling voor revalidatiedagbehandeling een individueel programma kreeg.

Het fysieke programma startte, voor zowel infarct- als operatiepatiënten, gemiddeld ongeveer twee weken na ontslag, voor 11% van de patiënten gebeurde dat pas na zes of meer weken.

Tabel III

Spreiding van soorten afdelingen voor hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis per gezondheidsregio in 1988

Regio	Aantal inwoners	Aantal ziekenhuizen	Aantal instellingen met revalidatie na ontslag			
			Klin* N=3	RDB** N=25	FR*** N=87	Totaal N=115
1. Groningen	556.757	6	1	-	3	4
2. Friesland	599.104	6	-	1	3	4
3. Drenthe	436.586	5	-	-	4	4
4. Zwolle	472.014	5	-	1	4	5
5. Twente	569.704	5	-	2	2	4
6. Stedendriehoek	448.820	4	-	2	2	4
7. Arnhem	838.115	10	-	1	5	6
8. Nijmegen	432.086	3	-	1	3	4
9. Utrecht	1.009.929	13	-	3	7	10
10. Flevoland	193.739	2	-	-	2	2
11. 't Gooi	252.643	4	1	-	3	4
12. Alkmaar	545.436	4	-	1	1	2
13. Kennemerland	375.562	7	-	1	2	3
14. Amsterdam	1.194.754	12	-	1	5	6
15. Leiden	470.913	4	-	1	-	1
16. Den haag	680.391	4	-	-	1	1
17. Delft	247.657	1	-	1	-	1
18. Midden-Holland	219.921	2	-	-	2	2
19. Rijnmond	1.191.080	12	-	1	5	6
20. Dordrecht	351.940	5	-	1	3	4
21. Zeeland	355.501	6	-	1	4	5
22. Breda	601.836	8	-	2	4	6
23. Tilburg	376.468	3	-	-	3	3
24. Den Bosch	578.154	7	-	1	6	7
25. Eindhoven	642.345	6	-	1	6	7
26. Noord-Limburg	440.610	3	-	1	2	3
27. Zuid-Limburg	631.464	6	1	1	5	6@
Totaal	14.714.948	154	3	25	87	115

* Klinische revalidatie; ** Revalidatiedagbehandeling; *** Fysieke reconditionering; @ 1 instelling heeft zowel een RDB- als een FR-afdeling.

Het fysiotherapieprogramma duurde gemiddeld drie maanden, met een variatie tussen vijf en zestien weken. De klinische programma's namen een tijdspanne van ongeveer vier tot zes weken in beslag, de patiënten kregen dan doorgaans een dagvullend programma; 29% van de patiënten kreeg hierna een poliklinische vervolgbehandeling. Het gemiddeld aantal fysiotherapiesessies lag op 26. Klinische afdelingen kwamen vanwege hun intensieve programma hoger uit, namelijk op 44 sessies.

Tabel IV

Beschikbaarheid van disciplines per soort revalidatie afdeling na ontslag#

	Klin* (N=3)	RDB** (N=25)	FR*** (N=83)	Totaal (N=111)
<i>Disciplines aanwezig</i>				
Cardioloog	0	16 (64%)	35 (42%)	51 (46%)
Revalidatiearts	1	12 (48%)	5 (6%)	18 (16%)
Internist/arts	3	3 (12%)	11 (13%)	17 (15%)
Verpleegkundige	2	9 (27%)	15 (18%)	26 (23%)
Fysiotherapeut	3	25 (100%)	83 (100%)	111 (100%)
Dietiste	2	8 (32%)	13 (16%)	23 (21%)
Maatschappelijk werker	2	24 (96%)	26 (31%)	52 (47%)
Klinisch psycholoog	2	11 (44%)	6 (7%)	19 (17%)
Secretaresse	3	18 (72%)	18 (22%)	39 (35%)
Overige	1	8 (32%)	6 (7%)	15 (14%)
Gemiddeld	6,3	5,4	2,6	3,3
<i>Disciplines op afroep</i>				
Cardioloog	3	9 (36%)	37 (44%)	49 (44%)
Revalidatiearts	0	2 (8%)	10 (12%)	12 (11%)
Internist/arts	0	3 (12%)	25 (30%)	28 (24%)
Verpleegkundige	1	3 (12%)	20 (24%)	24 (22%)
Fysiotherapeut	0	0	0	0
Dietiste	1	10 (40%)	45 (54%)	56 (50%)
Maatschappelijk werker	1	1 (4%)	40 (48%)	42 (38%)
Klinisch psycholoog	1	10 (40%)	45 (54%)	56 (50%)
Secretaresse	0	1 (4%)	7 (8%)	8 (7%)
Overige	0	3 (12%)	4 (5%)	7 (6%)
Gemiddeld	2,3	1,7	2,8	2,5

* Klinische revalidatie; ** Revalidatiedagbehandeling; *** Fysieke reconditionering; * op basis van enquêtegegevens.

Gemiddeld duurde een fysiotherapiesessie in alle drie de typen instellingen één uur (in 63% van alle afdelingen). Het betrof fysiotherapietraining in groepen. Sommige niet-erkende afdelingen (met weinig patiënten) gaven alleen individuele fysiotherapie van doorgaans een half uur (11% van alle afdelingen). 17% van de afdelingen had sessies van langer dan één uur. De meest genoemde programmaonderdelen van de fysieke training waren: sport & spel (92% van alle afdelingen), fietsen (89%), oefenzaal (74%), ontspanningsoefeningen (62%), circuittraining (50%), loopband (21%), zwemmen (15%) en wandelen (13%). Dit geldt voor alle drie typen instellingen.

68% van de patiënten rondde het volledige fysieke programma af, 19% volgde slechts een beperkt programma, terwijl 13% voortijdig stopte. De belangrijkste redenen voor het voortijdig termineren van het fysieke programma waren: cardiale klachten (19%), andere fysieke klachten (16%), overlijden (5%) en weigering (4%).

Testprocedures

Zoals te verwachten was, werden testprocedures vaker uitgevoerd in erkende dan in niet-erkende afdelingen. In 17% van de afdelingen werd standaard geen inspanningstest gedaan voor de start van het oefenprogramma (tabel V). Van de afdelingen die dat wel deden, bood de helft een submaximale test aan en de andere helft een maximale. Deels vonden deze inspanningstesten aan het einde van de opname plaats of vlak erna, ter screening van de high-risk patiënten (zie voor frequentie testen hoofdstuk 3).

Een psychosociaal interview door een maatschappelijk werker werd vaker afgenomen in een erkende dan in een niet erkende afdeling. Psychologische vragenlijsten werden weinig gebruikt. Beide psychosociale instrumenten werden nog het meest toegepast in erkende afdelingen verbonden aan een revalidatiecentrum (tabel V).

Tabel V

Soorten testprocedures die standaard per type afdeling bij aanvang en/of afsluiting van revalidatie na ontslag uitgevoerd worden#

	Klin* (N=3)	RDB** (N=24)	FR*** (N=83)	Totaal (N=110)
<i>Testprocedures bij aanvang</i>				
Cardiaal onderzoek	2	20 (83%)	49 (59%)	71 (64%)
Submaximale inspanningstest	-	11 (46%)	35 (42%)	46 (41%)
Maximale inspanningstest	1	12 (50%)	34 (41%)	47 (42%)
Psychosociaal interview	2	14 (58%)	6 (7%)	22 (20%)
Psychologische vragenlijst	1	5 (21%)	3 (4%)	9 (8%)
<i>Bij afsluiting</i>				
Cardiaal onderzoek	2	18 (75%)	31 (37%)	51 (46%)
Submaximale inspanningstest	-	5 (21%)	8 (10%)	13 (12%)
Maximale inspanningstest	1	16 (67%)	41 (49%)	58 (52%)
Psychosociaal interview	-	6 (25%)	5 (6%)	11 (10%)
Psychologische vragenlijst	1	4 (17%)	1 (1%)	6 (5%)

* Klinische revalidatie; ** Revalidatiedagbehandeling; *** Fysieke reconditionering; # op basis van enquêtegegevens.

Groepsvoorlichting

Systematische voorlichting vond meestal groepsgewijs plaats. Uiteraard werd ook voorlichting op ad hoc basis gegeven tijdens individuele gesprekken met artsen gedurende de opname en op de polikliniek of met de maatschappelijk werker of andere disciplines. Deze individuele voorlichting wordt hier niet besproken.

De groepsprogramma's varieerden in hoge mate betreffende doelstellingen, aantal sessies, organisatievorm en betrokken disciplines. Het aantal voorlichtingssessies varieerde van één tot tien. Soms was er een groepsprogramma specifiek gericht op

Tabel VI

Psychosociale zorg en diëtetiek tijdens revalidatie na ontslag per soort afdeling (N=1499)#

Programma onderdeel	Klin*	RDB**	FR***
Psychosociaal groepsprogramma	52%	7%	9%
Consult maatschappelijk werker	33%	15%	13%
Consult klinisch psycholoog	9%	3%	13%
Consult diëtist	32%	7%	9%
Groepsvoorlichting diëtist	57%	62%	24%

* Klinische revalidatie; ** Revalidatiedagbehandeling; *** Fysieke reconditionering; # op basis van patiëntenregistratiegegevens)

partners. De meest betrokken disciplines bij de groepsvoorlichting waren: maatschappelijk werker, diëtiste, fysiotherapeut, klinisch psycholoog en cardioloog.

49 instellingen (42%) boden een of andere vorm van groepsvoorlichting aan: 2 van de 3 centra voor klinische revalidatie, 6 van de 7 revalidatiecentra met revalidatiedagbehandeling, 9 van de 18 algemene ziekenhuizen met revalidatiedagbehandeling en 32 van de 87 niet-erkende afdelingen. Ook in dit opzicht kan ruim eenderde van de niet-erkende afdelingen zich meten met de erkende! Over de kwaliteit van dergelijke bijeenkomsten kan via dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden.

52% van de patiënten die klinische revalidatie hadden, kreeg een groepsprogramma. Bij de andere instellingen gold dit slechts voor 8% van de patiënten (tabel VI), waarbij opviel dat in afdelingen voor revalidatiedagbehandeling verbonden aan algemene ziekenhuizen een dergelijk programma aan weinig patiënten (9%) werd aangeboden.

Individuele psychosociale zorg

Onder individuele psychosociale zorg wordt hier de hulpverlening verstaan die gegeven wordt door maatschappelijk werker en klinisch psycholoog (of soms psychiater). Een maatschappelijk werker was bij 52% van de afdelingen aanwezig en in 42% van de gevallen op afroep beschikbaar. Een klinisch psycholoog was slechts bij 19% van de afdelingen aanwezig en bij 56% op consultbasis te raadplegen (tabel IV).

10% van alle patiënten kreeg individuele behandeling door de klinisch psycholoog en 17% door de maatschappelijk werker (tabel VI). Ook hier bestond weer een grote spreiding per afdeling: betreffende de klinisch psycholoog was er een variatie van 1 tot 75% en de maatschappelijk werker van 1 tot 100%.

Diëtetiek

Bij 21% van de instellingen maakte een diëtiste deel uit van het team. Ze deed aan groepsvoorlichting betreffende gezonde voeding en gaf individuele consulten. Hoewel bij de helft van de instellingen, met name de niet-erkende, de diëtiste slechts op afroep

ter beschikking stond, was zij bij 16% van de niet-erkende instellingen in het team aanwezig (tabel IV).

Bij instellingen die een diëtiste ter beschikking hadden, kwam 43% van alle patiënten daadwerkelijk in contact met haar middels een groepsvoorlichtingsgesprek (variatie 0% - 100% per afdeling). Daarnaast kreeg 15% individuele diëetadviezen en begeleiding (variatie 0% - 46%) (tabel VI). Opvallend is het lage aantal individuele consulten bij de afdelingen voor revalidatiedagbehandeling (7%), dat in dezelfde orde van grootte blijkt te liggen als voor niet-erkende afdelingen.

Deelname partner

Slechts bij ongeveer eenderde van alle afdelingen kon ook de partner actief deelnemen aan het hele fysieke programma of een deel ervan. Bij erkende afdelingen was daar meer mogelijkheid toe dan bij niet-erkende. Deelname aan het psychosociale programma was wel vanzelfsprekend: doorgaans werden de partners bij alle voorlichtings- en gespreksgroepen uitgenodigd. Enkele instellingen gaven gespreksgroepen apart voor partners! 11% van de partners (variërend van 1 tot 65% per afdeling) deed mee met een deel van of het hele fysieke programma. 69% van de deelnemers aan een psychosociaal groepsprogramma werd vergezeld door hun partner.

Beleid na afloop van de revalidatie

De patiënten kregen aan het einde van de revalidatie bijna allemaal het advies om fysieke activiteiten te ontplooiën, met name door deel te nemen aan een sportgroep of door te gaan fietsen, wandelen of zwemmen.

Uiteraard kregen alle patiënten poliklinische cardiologische zorg na afloop van de revalidatie en bijna alle patiënten werden terugverwezen naar de huisarts ter verdere begeleiding, 3% werd doorverwezen voor verdere psychosociale zorg (algemeen maatschappelijk werk, RIAGG, klinisch psycholoog, psychiater).

Patiëntgegevens

Aantal gerevalideerde patiënten

De drie klinische afdelingen tezamen behandelden per jaar naar schatting ongeveer 750 patiënten. De dagbehandelingsafdelingen van revalidatiecentra behandelden eveneens gemiddeld 250 patiënten per jaar, die van algemene ziekenhuizen ongeveer 160, de niet-erkende afdelingen ongeveer 95 patiënten. Op grond van deze cijfers worden per jaar in Nederland naar schatting in totaal ongeveer 13.500 patiënten gerevalideerd na ontslag uit het ziekenhuis, waarvan ca. 8.250 patiënten in niet-erkende afdelingen en 4.500 patiënten in erkende afdelingen.

Geslacht

De deelname van vrouwen aan hartrevalidatie nam van slechts 13% in 1985 toe tot 26% in 1988 (tabel VII). Met name de klinische revalidatieafdelingen revalideerden het hoogste percentage vrouwen (tabel VIII). Dit hangt samen met de gemiddelde leeftijd van de patiënten.

Leeftijd

Door de jaren heen werden steeds meer oudere patiënten (boven de 70 jaar) gerevalideerd: in 1985 nog 5%, in 1988 al 17% (tabel VII). Met name de klinische afdelingen revalideren juist veel meer patiënten boven de 70 jaar.

Tabel VII

Indicatie-, geslacht- en leeftijdsverdeling van patiënten met revalidatie na ontslag per soort afdeling#

(N=1898)		Klin*	RDB**	FR***	Totaal
Indicatie:	Infarct	36%	50%	64%	51%
	Operatie	45%	39%	27%	36%
	Rest	19%	11%	9%	13%
Geslacht:	Man	61%	83%	81%	74%
	Vrouw	39%	17%	19%	26%
Leeftijd:	<50 jaar	16%	20%	22%	19%
	50 – 70 jaar	54%	71%	68%	64%
	≥70 jaar	30%	9%	10%	17%

* Klinische revalidatie; ** Revalidatiedagbehandeling; *** Fysieke reconditionering; # op basis van patiëntenregistratiegegevens.

Indicaties

51% van de patiënten werd gerevalideerd na een hartinfarct, 36% na een hartoperatie en 13% na een andere indicatie (angina pectoris, percutane transluminale coronairangioplastie, hartfalen) (tabel VII). Deze verhoudingen bleven in de loop van het onderzoek vrij constant. De klinische afdelingen revalideerden in vergelijking met de andere afdelingen veel meer operatiepatiënten en ook meer patiënten uit de categorie "rest".

Door alle afdelingen werden patiënten gerevalideerd uit de categorie "rest": dreigend infarct, AP, pompfunctiestoornis of PTCA (ca. 13% van het totaal). In welke verhouding dit staat tot het totaal aantal opnames met deze diagnoses is onbekend. Over de aanpak van deze groepen is ook onvoldoende bekend.

Verwijzingen

Twee ziekenhuizen die deelnamen aan de gegevensverzameling door middel van de individuele patiëntenlijst, gaven geen revalidatie na ontslag. Van hun patiënten werd 39% naar een revalidatiecentrum verwezen, bij 61% was er geen vervolgbehandeling. Ruim de helft van alle patiënten die tijdens de opname gerevalideerd waren in een ziekenhuis met een eigen mogelijkheid voor revalidatie na ontslag, kregen deze nazorg niet, 31% kreeg na ontslag revalidatie in het eigen ziekenhuis, terwijl 13% in een andere instelling nabehandeld werd. Opvallend was dat met name bij veel infarctpatiënten (56%) en patiënten uit de restcategorie (87%) de revalidatie tijdens opname geen vervolg kreeg (tabel VIII).

Tabel VIII

Aantal patiënten per diagnose dat tijdens opname gerevalideerd is en een vorm van revalidatie na ontslag kreeg[#]

	Infarctpatiënten		Operatiepatiënten		Restcategorie		Totaal	
Eigen ziekenhuis	648	(36%)	319	(42%)	100	(12%)	1.067	(31%)
Ander ziekenhuis	14	(1%)	288	(38%)	3	(0%)	305	(9%)
Revalidatiecentrum	78	(4%)	88	(12%)	2	(2%)	168	(5%)
Fysiotherapie in periferie	29	(2%)	5	(1%)	1	(0%)	35	(1%)
Geen voortzetting	1.021*	(56%)	54**	(7%)	744***	(87%)	1.819	(53%)
Anders	15	(1%)	2	(0%)	4	(1%)	21	(1%)
Totaal	1.805	(100%)	756	(100%)	854	(100%)	3.415	(100%)

* spreiding 6%-79%; ** spreiding 0%-69%; *** spreiding 0%-97%; # op basis van patiëntenregistratiegegevens.

Er was een enorme variatie per ziekenhuis (met eigen mogelijkheid voor revalidatie na ontslag) in het percentage infarctpatiënten dat geen revalidatie na ontslag kreeg: van 6% tot 79%! Daarentegen kreeg de revalidatie van slechts 7% van alle operatiepatiënten geen vervolg (tabel VIII). Operatiepatiënten werden overigens veelvuldig in andere instellingen gerevalideerd (51%), wat ondermeer verklaard kan worden door het feit dat de start van de revalidatie in het operatieziekenhuis plaatsvond. Na de operatie werden veel patiënten weer teruggestuurd naar het ziekenhuis waar ze oorspronkelijk opgenomen waren, alwaar ze verder gerevalideerd werden. Patiënten met complexe problematiek werden echter doorgestuurd naar een klinisch revalidatiecentrum.

Patiënten van revalidatiedagbehandelingsafdelingen (verbonden aan algemene ziekenhuizen) en van de niet-erkende afdelingen waren bijna allemaal afkomstig uit het eigen ziekenhuis; sporadisch werd iemand via de huisarts of via een ander ziekenhuis doorverwezen. Er bestond dus nauwelijks een supraregionale functie zoals verwacht zou mogen worden voor de afdelingen met erkenning. De patiënten die in een revalidatiecentrum gerevalideerd werden, kwamen uiteraard uit andere instellingen. De drie afdelingen voor klinische revalidatie hadden wel een supraregionale functie, zij het dat ze samen niet het hele land bestreken en dat een groot deel van hun patiënten uit de eigen verzorgingsregio afkomstig was.

Uit onze steekproef door middel van de individuele patiëntenlijsten in 15 ziekenhuizen bleek dat 46% van alle tijdens de opname gerevalideerde patiënten doorgestuurd werd voor een of andere vorm van revalidatie na ontslag: 43% van de infarctpatiënten, 93% van de operatiepatiënten en 12% van de restcategorie.

4.5 DISCUSSIE

Deze studie biedt een vrijwel compleet en daardoor betrouwbaar beeld van de stand van zaken van de hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis. Het is tevens een unieke studie: nergens ter wereld is een zo omvangrijk onderzoek gedaan. Op deze schaal zijn patiëntkenmerken elders evenmin beschikbaar.

4.5.1 Onderzoekspopulaties

In de patiëntenpopulatie van de individuele patiëntenregistratielijsten zit een bias, omdat relatief veel klinische revalidatiepatiënten er deel van uitmaakten. Deze patiënten waren ouder, een groter deel was vrouw, bovendien zaten in deze onderzoeksgroep meer operatiepatiënten en meer patiënten uit de restgroep dan in de totale revalidatiepopulatie. De populatie omvatte 13% van alle revalidatiepatiënten (11% van alle infarct- en 15% van alle operatiepatiënten). Alle klinische revalidatieafdelingen, 8% van de erkende en 12% van de niet-erkende afdelingen waren vertegenwoordigd. Erkende afdelingen verbonden aan een revalidatiecentrum deden niet mee. De onderzoeksgroep kan daarom niet geheel representatief geacht worden als het gaat om diagnosegroepen en typen instellingen.

Met behulp van de enquêtes werden nagenoeg alle instellingen bereikt, waardoor een redelijk compleet beeld van de instellingen en hun programma-onderdelen geschetst kon worden.

4.5.2 Dataverzameling en beperkingen

De patiëntenaantallen verkregen via deze enquêtes zijn minder compleet: vaak ontbraken bij de gegevens van de responderende afdelingen cijfers hieromtrent. Vrijwel altijd waren de cijfers retrospectief.

De data die met behulp van de enquêtes verzameld zijn, betreffen in feite alleen die patiënten die een fysiek programma doorlopen hebben. Onduidelijk is dan ook hoeveel patiënten gebruik hebben gemaakt van andere revalidatieonderdelen, zoals een psychosociaal groepsprogramma of consulten van diëtiste, maatschappelijk werker of klinisch psycholoog. Daarnaast is onduidelijk of er ook patiënten zijn geweest die van andere faciliteiten gebruik maken zonder deel te nemen aan het fysieke programma.

Mogelijk zijn de medische en fysieke kanten van de hartrevalidatie beter belicht dan de psychosociale, omdat de data aangeleverd zijn door fysiotherapeuten.

4.5.3 Vergelijking van de onderzoeksmethoden

Doordat met beide onderzoeksinstrumenten, enquête en patiëntenregistratielijst, ten aanzien van een aantal dezelfde variabelen bij dezelfde afdelingen gegevens verzameld

zijn, biedt dit de mogelijkheid de gevonden data met elkaar te vergelijken. De variabelen die hiervoor in aanmerking komen zijn: "start fysiotherapie na ontslag uit het ziekenhuis", "duur van het fysieke programma", "aantal sessies fysiotherapie", "aantal patiënten voortijdig gestopt", "aantal gerevalideerde patiënten", "geslachtsverdeling", "leeftijdverdeling", "indicatie".

De scores op de variabelen "aantal gerevalideerde patiënten", "aantal weken dat fysiotherapie start na ontslag", "percentage patiënten dat voortijdig stopt met fysiotherapie", "leeftijdverdeling van de gerevalideerde patiënten", "aantal sessies fysiotherapie" laten enige afwijking zien tussen de beide onderzoeksmethoden. Hierbij geven de data van de enquête een gunstiger beeld (zie tabel IX). De scores op de variabelen "duur van het fysiotherapie programma", "indicatie van gerevalideerde patiënten", "geslachtsverdeling van gerevalideerde patiënten" komen in hoge mate met elkaar overeen.

Concluderend kan gesteld worden dat de data van beide onderzoeksinstrumenten redelijk met elkaar overeenstemmen.

Tabel IX

Vergelijking van data omtrent de fase na ontslag uit het ziekenhuis verkregen met behulp van enquêtes en individuele patiëntenregistratielijst (IP)

Variabelen		Enquetes	IP
Aantal gerevalideerde patiënten per afdeling		124	114
Aantal weken dat fysiotherapie start na ontslag uit ziekenhuis	infarct	2,5	3,0
	operatie	2,5	3,5
Percentage patiënten voortijdig gestopt met fysiotherapie		10,5%	16%
Duur fysiotherapie programma in weken		11	11
Indicatie gerevalideerde patiënten	infarct	69%	68%
	operatie	22%	23%
	rest	9%	9%
Geslacht gerevalideerde patiënten	Man	82%	80%
	Vrouw	18%	20%
Leeftijd gerevalideerde patiënten in jaren	0 – 50	31%	21%
	50 – 70	56%	63%
	70 –	13%	16%
Aantal sessies fysiotherapie		28	23

4.5.4 Beschouwingen

In het navolgende worden de in dit onderzoek gevonden gegevens vergeleken met cijfers uit andere bronnen uit binnen- en buitenland. Buiten Nederland zijn data beschikbaar uit de volgende landen: Engeland, Italië, Australië, Verenigde Staten en Canada. Verder zullen de gevonden resultaten getoetst worden aan de doelstellingen van revalidatie.

Vanaf 1970 heeft er een enorme groei van het aantal revalidatie-afdelingen plaatsgevonden: van 5 in 1970, 46 in 1979 tot 115 in 1989 (Weeda & Visser, 1981; Meegdes, 1988). 23% van de algemene en academische ziekenhuizen had in 1988 geen eigen afdeling voor revalidatie na ontslag. Dit komt overeen met de bevindingen van de NVFH (NVFH, 1988) dat een percentage van 20% vond. Overigens verwijst het merendeel van deze ziekenhuizen wel door naar een erkend centrum.

In het buitenland is revalidatie veel minder mogelijk: in Engeland in 42% van de ziekenhuizen (Green et al., 1988) en in Australië in 17% (Worcester, 1986). Gesteld kan worden dat Nederland in vergelijking met het buitenland ruim voorzien is van revalidatiemogelijkheden.

Bij de afdelingen met een erkenning voor revalidatiedagbehandeling is een duidelijke tweedeling zichtbaar. Aan de ene kant bevinden zich de afdelingen die verbonden zijn aan revalidatiecentra: deze hebben conform de financieringsregeling (Ziekenfondsraad, 1981) een uitgebreide multidisciplinaire staf en een breed pakket aan behandel mogelijkheden; bovendien vervullen ze in redelijke mate hun regionale functie. Deze instellingen voldoen in hoge mate aan de eisen voor regionale, gespecialiseerde afdelingen voor hartrevalidatie zoals die in 1966 opgesteld zijn door de Revalidatie Commissie (NHS, 1966). Aan de andere kant zijn er de afdelingen voor revalidatiedagbehandeling die verbonden zijn aan algemene ziekenhuizen: deze hebben een minder uitgebreide staf en een beperkter behandelingspakket, terwijl ze niet of nauwelijks een regionale functie vervullen; ze voldoen dan ook niet of slechts in beperkte mate aan het besluit revalidatie dagbehandeling (Ziekenfondsraad, 1981 en 1989). Het rapport van de Revalidatie Commissie uit 1977 (NHS, 1977) geeft aan dat er geen unanimititeit bestond betreffende de organisatie van de hartrevalidatie in Nederland: een deel van de commissie hield vast aan de bovengenoemde specialistische en regionaal opererende revalidatieafdelingen, terwijl een ander deel de voorkeur eraan gaf dat met name de grote ziekenhuizen zelf hun hartrevalidatie organiseerden. Dit verschil in opvatting heeft zich vertaald naar de praktijk, waarin momenteel deze twee typen afdelingen naast elkaar bestaan!

De omvang van de klinische revalidatie is vanaf de start in 1970 door de jaren heen ongeveer hetzelfde gebleven. Hoewel de instellingen die klinische revalidatie geven niet alleen patiënten opnemen uit de eigen verzorgingsregio, is het gebruik van hun faciliteiten toch niet evenredig over Nederland verspreid, maar beperkt tot die gebieden waar ze gevestigd zijn. Vooral naburige ziekenhuizen verwijzen patiënten naar deze centra door.

Deze klinische centra revalideren een andere populatie dan de overige instellingen: meer operatiepatiënten, meer probleemgevallen, meer ouderen en ook meer vrouwen. Bovendien is er ruim mogelijkheid het behandelprogramma toe te spitsen op de individuele

patiënt. In een onderzoek van Bär ea (1988) gericht op de situatie van het Revalidatie Centrum Hoensbroek wordt bevestigd dat de behandelde populatie patiënten fors afwijkt van die van poliklinische afdelingen.

Overigens verlopen de verwijzingen naar de verschillende typen afdelingen lang niet altijd adequaat. Er is landelijk gezien geen adequate selectie en indicatiestelling voor revalidatie na ontslag.

Internationaal gezien bestaat er een grote variatie in de verhouding poliklinische en klinische revalidatie. Zoals al eerder gesteld, is er hierover echter slechts weinig literatuur bekend. Duitsland (Jette ea, 1988, peiljaar 1988) kent vrijwel alleen maar klinische revalidatie in speciale klinieken, waarvan er 196 zijn. De gemiddelde behandelduur aldaar is ongeveer vier weken. In Canada/Ontario en in de VS/Virginia (Wolfe ea, 1990; Wolfe ea, 1987; peiljaar 1983 en 1985), alsmede in Australië (Worcester, 1986; peiljaar 1985) wordt uitsluitend poliklinische revalidatie gegeven. Italië (Giordano, 1989; peiljaar 1987) neemt een tussenpositie in: 9 van de 59 instellingen bieden klinische revalidatie aan, 16 klinische en poliklinische revalidatie en de rest alleen poliklinische revalidatie. Samenvattend kan gesteld worden dat Nederland, in vergelijking met het buitenland, een gedifferentieerd aanbod van instellingen voor hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis heeft.

Het percentage verpleegkundigen nam door de jaren heen af (68% in 1979, tegen 45% in 1988) (Weeda & Visser, 1981; Dixhoorn van ea, 1988). Dit betekent dat revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis organisatorisch losser is komen te staan van de verpleegafdeling. Gezien de financieringsregeling zouden bij niet-erkende afdelingen alleen een arts (op afroep) en een fysiotherapeut (aanwezig) te verwachten zijn. De cijfers laten echter zien dat ongeveer een derde van deze afdelingen werkte met een team dat vergelijkbaar was met dat van een erkende afdeling.

In het buitenland zijn de fysiotherapeuten, evenals in Nederland, vrijwel altijd bij de revalidatie betrokken (Wolfe ea, 1990; Worcester, 1986; Giordano, 1989; Soons & Bär, 1990a; Green ea, 1988). De overige disciplines zijn in het buitenland juist veel minder vertegenwoordigd: diëtiste (Nederland 71%; Engeland 50%; Italië 31%; Canada/Ontario 25%; Australië 68%), maatschappelijk werker (Nederland 94%, Engeland 24%; Australië 17%; VS 16%), klinisch psycholoog (Nederland 75%; Engeland 26%; Italië 42%; Canada/Ontario 7%; Australië zelden; VS 22%). Gesteld kan worden dat in Nederland veel vaker multidisciplinair gewerkt wordt dan in het buitenland.

In 1979 werd door tweederde van de instellingen een leeftijdsgrens in verband met mogelijke werkhervatting als insluiting voor revalidatie gehanteerd (Weeda & Visser, 1981), anno 1989 door nog slechts enkele ziekenhuizen, hetgeen betekent dat de doelstelling van werkhervatting als algemeen doel is losgelaten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat werkhervatting nog steeds een individuele doelstelling kan zijn.

Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat poliklinisch vrijwel alleen standaard groepsfysiotherapieprogramma's gegeven worden. Op deze wijze wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de individuele noden van de patiënt (Soons & Bär, 1990). De mogelijkheid

tot individuele aanpassing van het programma dient aanwezig te zijn. Dit geldt niet alleen voor de niet-erkende, maar ook voor alle afdelingen met revalidatiedagbehandeling, die oorspronkelijk opgezet waren om complexere patiënten ook op individuele basis te revalideren. In de klinische centra is er wel uitgebreid de mogelijkheid voor individuele fysiotherapie.

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt steeds sneller met fysieke training gestart: in 1979 begon slechts 26% van de instellingen binnen twee weken, in 1984 reeds 64% en in 1988 71% (Dixhoorn van ea, 1988; Weeda & Visser, 1981; Aquarius & Smit, 1980). Deze trend ligt in het verlengde van de opvatting dat patiënten na een hartinfarct of hartoperatie weer zo snel mogelijk gemobiliseerd en geactiveerd moeten worden, en dat dit veilig kan gebeuren (Mallory e.a., 1939; Harrison, 1944; Editorial, 1974; Wenger, 1977; West & Henderson, 1979; Messen & Demaret, 1982; Wenger ea, 1982; Wenger, 1982; Collins ea, 1984; Wenger, 1984; Bär ea, 1988). De kans op terugkeer in het arbeidsproces wordt overigens niet groter (Diederiks, 1982; Wiklund e.a., 1985). Van twee landen buiten Nederland is het moment van starten bekend: in Engeland start de meerderheid van de instellingen binnen vier weken (Green ea, 1988), in Australië, evenals in Nederland, binnen twee weken (Worcester, 1986).

Er bestaat een redelijke consensus betreffende duur en intensiteit van fysieke revalidatie in Nederland: de gemiddelde duur is 12 weken met een gemiddelde van 26 sessies. Het blijkt dat steeds meer afdelingen naar deze gemiddelden opschuiven. In 1979 lag de gemiddelde revalidatieduur nog op 16 weken en het aantal sessies gemiddeld op 33; er was ook een grotere variatie (Weeda & Visser, 1981; Aquarius & Smit, 1980). Mogelijk wordt het belang van langdurige intensieve training de laatste jaren lager ingeschat en realiseert men zich dat conditieverbetering slechts als hulpmiddel moet worden gezien bij het herstel van de patiënt. Ook kunnen de bezuinigingen meespelen. Gemiddeld twee keer per week oefenen is overigens onvoldoende om een maximaal fysiek trainingseffect te bereiken (Dixhoorn van ea, 1988). Verder zijn mogelijk de programma's in het ziekenhuis korter geworden omdat in veel regio's de fysieke training vervolgd kan worden door deelname aan sportgroepen voor hartpatiënten (onderhoudsfase).

Buiten Nederland is van twee landen de gemiddelde duur van het fysieke programma bekend: Engeland 6-8 weken (Green ea, 1988) en Australië eveneens 6-8 weken (Worcester, 1988). Betreffende het aantal fysiotherapiesessies zijn uit het buitenland geen cijfers bekend.

Duidelijk is dat fysiotherapie een in elk revalidatie programma aanwezig onderdeel is. Een belangrijke reden hiervoor is dat er een expliciete financieringsregeling is gekomen voor dit onderdeel. Bovendien vormen fysiotherapeuten een beroepsgroep die met grote inzet en voortvarendheid hun aanpak van hartpatiënten hebben geprofessionaliseerd. Zo bestaat er al jarenlang een eigen revalidatiecursus, mede onder auspiciën van de Nederlandse Hartstichting. Verder appelleert fysieke training sterk aan de patient: er moet hard gewerkt worden om beter te worden. Niet vergeten dient te worden dat het beginnen met fysiotherapie ingegeven werd door de deconditionering vanwege een te lange bedrust. Aangezien het deconditioneringseffect aanzienlijk verminderd is door

verkorting van de opnameperiode valt deze reden voor het uitvoeren van fysieke training deels weg. Overigens kan angst voor inspanning een belangrijke beperkende factor zijn in het herstel en kan fysieke training een goede methode zijn om dit te doorbreken. Het is echter niet de enige methode en ook niet altijd de beste. Belastbaarheid verhogen en conditie verbeteren is echter hooguit een intermediair doel. Van belang is het dan ook zich bij elke patient af te vragen of conditieverlies is opgetreden en of fysieke verbetering bijdraagt aan herstel in ruimere zin.

De inspanningstest is bedoeld om "high-risk"-patiënten op te sporen (WHO, 1972; Waters, 1986a en b; Waters ea, 1985) en om de belastbaarheid te meten. Onderzoek heeft aangetoond dat een inspanningstest kort na een infarct veilig kan worden uitgevoerd (Blomqvist, 1971; Froelicher ea, 1979; Lindvall ea, 1979; Theroux ea, 1979; Davidson & DeBusk, 1980; Vermeulen, 1983; Pryor ea, 1983; Weiner, 1986a en b). Een maximale inspanningstest brengt nauwelijks meer risico's met zich mee dan een submaximale, terwijl de diagnostische waarde van een maximale test aanzienlijk hoger is (Miller & Borer, 1982).

In Australië (Worcester, 1986) kon in 1985 27% van de ziekenhuizen een poliklinische inspanningstest uitvoeren. In Engeland (Green ea, 1988) had 37% van de instellingen die een poliklinisch fysiek programma boden, in 1985 de mogelijkheid voor een inspanningstest. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat hoewel in Nederland de meeste afdelingen een inspanningstest kunnen afnemen, er een grote variatie is in het percentage patiënten dat zo'n test daardwerkelijk krijgt. In de praktijk bestaat er kennelijk geen duidelijkheid over de vraag welke patiënten, wanneer en op welke gronden zo'n test behoeven. In hoeverre de gegevens van de test in de praktijk verder nog gebruikt worden is ter discussie. Immers de patiënten krijgen een standaard groepsprogramma, waarbij de test hooguit als ingangscriterium van veiligheid wordt gebruikt. Harde bewijzen dat dit zinvol is zijn er overigens niet.

Psychologische vragenlijsten worden erg weinig gebruikt. Deze kunnen een belangrijke signalerende, evaluerende en selecterende functie hebben, die een aanvulling geeft op de "klinische blik". In Nederland is de meest gebruikte de Medisch Psychologische Vragenlijst voor Hartpatiënten (Erdman, 1982), die het welbevinden van de patiënt meet. Daarnaast bestaan er diverse andere vragenlijsten die gebruikt kunnen worden om onder andere angst, depressie en type-A gedrag te meten (Soons, 1989; Soons & Erdman, 1990). Echter er is geen overeenstemming over welk instrument het best gebruikt kan worden. Gesteld kan dan ook worden dat er zowel op fysiek als op psychosociaal vlak niet consequent geëvalueerd wordt.

Ongeveer een kwart van de afdelingen had een groepsvoorlichtingsprogramma, hetgeen overeenkomt met de resultaten van Maes ea (1986). Het nut hiervan is aangegeven door Maes en van Elderen (Maes ea, 1987; Elderen van & Maes, 1988; Maes & Elderen van, 1988), mits ze volgens een bepaald stramien zijn opgezet. Buiten Nederland zijn hierover alleen van Australië cijfers bekend: 24% van de ziekenhuizen die hartpatiënten opnamen, had een poliklinisch voorlichtingsgroepsprogramma (Worcester, 1986).

In Nederland vertoont het beschikbaar zijn van de psychosociale disciplines een duidelijke toename. Door de jaren heen is het percentage instellingen dat aan psychosociale zorg doet, toegenomen: het beschikbaar zijn van een maatschappelijk werker steeg van 67% in 1979 tot 85% in 1988 en van een klinisch psycholoog van 46% in 1979 tot 67% in 1988 (Weeda & Visser, 1981; Dixhoorn van ea, 1988). Dit wijst op meer aandacht voor en acceptatie van psychosociale aspecten bij de revalidatie. Tegelijkertijd bestaat er een grote variatie in het percentage patiënten per afdeling dat deze individuele consulten daadwerkelijk krijgt, wat overeenkomt met de situatie in de Zuid-Limburgse ziekenhuizen (Gosselink, 1989).

Buiten Nederland is de beschikbaarheid van de genoemde disciplines veel geringer (Worcester, 1986; Wolfe ea, 1987; Green ea, 1988; Giordano, 1989; Southard & Broyden, 1990; Wolfe ea, 1990).

In dit onderzoek is uitgegaan van een onderscheid tussen psychosociale zorg in engere zin en die in ruime zin. Psychosociale zorg in engere zin beperkt zich tot de zorg door klinisch psycholoog en maatschappelijk werker. Dat neemt niet weg dat de inbreng van andere disciplines ook psychosociaal gericht kan zijn, of dat deze een belangrijke rol kunnen spelen in de psychosociale zorg, zoals bijvoorbeeld het geruststellen van patiënten of het fungeren als gespreksleider van een voorlichtingsbijeenkomst.

Het percentage instellingen met een te consulteren diëtiste is gegroeid van 24% in 1979 tot 71% in 1988, hetgeen wijst op een toegenomen interesse voor gezonde eetgewoonten. Ook hier bestaat een grote variëteit in het percentage patiënten per afdeling dat groepsvoorlichting of een individueel consult krijgt.

Hoewel de partners veelal hun eigen problematiek hebben, zijn zij toch zeer belangrijk bij de revalidatie van hartpatiënten (Segev & Schlesinger, 1981). Partners spelen een grote rol bij het verwerken van angst, onzekerheid en depressieve gevoelens door de patiënt. Ze bieden sociale ondersteuning. De partners zijn evenwel zelf vaak onzeker. Vandaar dat het nuttig is hen bij de revalidatie te betrekken. Weinig instellingen geven aan dat ze dit consequent doen. In principe kunnen de partners in de meeste centra meedoen met de voorlichtingsprogramma's.

Samenvattend kan gesteld worden dat in de revalidatie programma's uitgebreid plaats is voor fysieke training. Onderdelen gericht op psychosociale zorg zijn in ongeveer de helft van de instellingen beschikbaar. Expliciete en systematische aanpak van risicofactoren is in weinig instellingen aanwezig.

Uitgaande van 25.000 patiënten (LMR/SIG, 1989) die na een infarct het ziekenhuis levend verlaten, en van 9.000 patiënten (Begeleidingscommissie Hartchirurgie, 1989) na een hartoperatie, kan gesteld worden dat er 34.000 potentiële kandidaten voor revalidatie na ontslag zijn. Wanneer aangenomen wordt dat ongeveer 4.000 patiënten zullen weigeren, impliceert dit dat er ongeveer 30.000 kandidaten overblijven. Onze schatting houdt in dat slechts 45% hiervan een of andere vorm van revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis krijgt. Overigens is een dergelijke schatting in het buitenland alleen

bekend van Canada/Ontario en van de VS/Virginia, alwaar in 1983 slechts 15% van de patiënten werd gerevalideerd (Wolfe ea, 1987; Wolfe ea, 1990).

Van de hartinfarctpatiënten die het ziekenhuis levend verlaten, is 28% vrouw (7.007 van de 24.629 patiënten) (LMR/SIG, 1989). Aangezien vrouwen met revalidatie beter herstellen dan zonder, (Bär ea, 1992) is de stijging van het aantal vrouwelijke revalidanten toe te juichen. Overigens komt het percentage vrouwen ten opzichte van mannen met een hartinfarct dat het ziekenhuis levend verlaat ongeveer overeen met het percentage vrouwen dat daadwerkelijk gerevalideerd wordt na ontslag (28% en 26%).

In 1970 waren de programma's gericht op "jongere" patiënten beneden de 50-55 jaar die een ongecompliceerd hartinfarct met een lange immobilisatie fase overleefd hadden: de "low-risk"-patiënten (Bär & Vonken, 1990). Het hoofddoel van de revalidatie toen was werkhervatting door middel van fysieke reconditionering. Dit idee is inmiddels door de steeds vroegere start van de revalidatie en het beperkte nut van revalidatie ten aanzien van de werkhervatting grotendeels verlaten.

Nu worden ook andere doelen nagestreefd, genoemd is reeds herstel van functioneren, verder psychosociale verbetering en secundaire preventie (Bär & Vonken, 1990). Dit is echter nauwelijks te merken aan de programma's. Patiënten met complicaties of een groot infarct werden in het verleden uitgesloten. Dit beleid is geleidelijk gekenterd. Ook een aantal van deze patiënten krijgt nu een vorm van revalidatie.

Slechts naar schatting 17% van de gerevalideerden is ouder dan 70 jaar, terwijl het percentage van de hartinfarctpatiënten, dat levend het ziekenhuis verlaat en ouder is dan 70 jaar, 34% is (8.450 van de 24.629 infarctpatiënten) (LMR/SIG, 1989). Overigens is het percentage oudere revalidanten na ontslag pas de laatste jaren gestegen: van 5% in 1985 tot 17% in 1988. In de praktijk wordt er blijkbaar nog vaak vanuit gegaan dat het revalideren van oudere patiënten niet zinvol is. Hillebrand en Vermeulen (1981) en Bär ea (1992) geven aan dat deze gedachte onjuist is. Anderzijds zijn het juist de ouderen die weinig gemotiveerd zijn om mee te doen. Zeker is dat vooral door de vergrijzing van de bevolking de behoefte aan revalidatie zal toenemen.

De patiëntenpopulatie van de dagbehandelingsafdelingen onderscheidt zich, in tegenstelling tot de klinische afdelingen, niet van de patiëntenpopulatie van de niet-erkende afdelingen betreffende indicatie, leeftijd en geslacht!

4.6 CONCLUSIES

Dit onderzoek biedt een uitgebreid en betrouwbaar beeld van de instellingen in Nederland die hartrevalidatie geven na ontslag uit het ziekenhuis, en van de daarbij betrokken programma-onderdelen. Hoewel in het buitenland deze revalidatiefase ook onderzocht is, zijn de daar verkregen gegevens beperkt in omvang en slechts bekend van een paar landen; bovendien waren deze onderzoeken gemiddeld veel minder diepgaand.

Nederland kent een grote diversiteit aan instellingen (afdelingen voor klinische revalidatie, revalidatiedagbehandelingsafdelingen, afdelingen met fysieke reconditionering en

een beperkt psychosociaal programma, afdelingen met alleen een fysiek programma) en aan programma-onderdelen (medische begeleiding, fysieke groepstraining, psychosociaal groepsprogramma, individuele psychosociale begeleiding, individuele consulten door diëtiste).

In principe zijn in Nederland alle typen instellingen en behandelonderdelen aanwezig voor een adequate aanpak van hartrevalidatie na ontslag. De verdeling en de beschikbaarheid over het hele land is echter onevenredig. Daar komt nog bij dat een gerichte indicatiestelling ontbreekt. Herordening en systematische indicatiestelling is noodzakelijk, omdat verwijzing nu teveel op basis van toeval plaatsvindt.

Tevens bestaat er in de praktijk een grote variatie in het percentage patiënten dat gerevalideerd wordt. Krijgen patiënten revalidatie dan houdt dat standaard medische controle plus fysieke training in. Het percentage deelnemers aan de andere behandelonderdelen varieert in hoge mate. Debet hieraan is dat het doel van revalidatie onvoldoende duidelijk geformuleerd is. Deze grote variatie in deelname aan de revalidatie en de verschillende behandelonderdelen daarbinnen is onwenselijk. Richtlijnen zijn nodig betreffende het selecteren van patiënten voor de verschillende onderdelen.

HOOFDSTUK 5

Nazorg

5.1 INLEIDING

Dit deel van het onderzoek had als doel inzicht te verkrijgen in de organisatie en de omvang van de nazorg voor hartpatiënten. Hierbij zijn de "wilde", niet geïnstitutionaliseerde en niet georganiseerde sportclubs buiten beschouwing gelaten, omdat gegevens over deze clubs nauwelijks te achterhalen zijn.

5.2 VRAAGSTELLING

Het onderzoek geschiedde middels een schriftelijke enquête (zie bijlage IV), die gericht was op de volgende vragen: (a) Welke instellingen/verenigingen/organisaties geven nazorg? Hoe zijn ze georganiseerd? Welk werkgebied bestrijken zij? Zijn ze aangesloten bij een landelijke koepel? Wat zijn de financiële bronnen? Welke patiënten kunnen lid worden? (b) Welke programma's worden aangeboden? Op welk tijdstip na het incident kan gestart worden met de activiteiten? (c) Hoeveel leden hebben de organisaties? (d) Hoeveel patiënten met welke kenmerken nemen deel aan nazorgactiviteiten?

5.3 METHODE

In de eerste helft van 1990 werd de enquête gestuurd naar de organisaties waarvan bekend was dat ze nazorg gaven die specifiek bedoeld was voor hartpatiënten. De vragen betroffen het jaar 1989. Indien het antwoord niet binnen acht weken retour was, werd een schriftelijke herinnering gestuurd. De volgende verenigingen en organisaties werden benaderd:

- (a) Patiëntenverenigingen, aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Verenigingen van Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten (FNVVNH, in het vervolg Federatie genoemd).
- (b) Patiëntenverenigingen die niet bij de Federatie zijn aangesloten (Overige).
- (c) Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT). De enquête-formulieren werden gestuurd naar de coördinator van de door de LVT landelijk gegeven cursussen.

- (d) De Hartenark.
- (e) Trimclubs, aangesloten bij Hart In Beweging (HIB).
- (f) Het Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg Limburg (PSBG) te Sittard. Gegevens zijn verkregen via uitgebreide jaarverslagen van de instelling zelf (PSBG, 1988 en 1991).

5.4 RESULTATEN

5.4.1 Respons

De totale respons was 91%.

- (a) De Federatie: hierbij zijn 13 verenigingen aangesloten (FNVVNH, 1990). Zij is in 1985 opgericht en ondersteunt de aangesloten organisaties; daarnaast helpt ze actief bij de oprichting van nieuwe verenigingen. 12 (92%) van de 13 verenigingen reageerden.
- (b) Overige: deze verenigingen zijn vergelijkbaar met die welke aangesloten zijn bij de Federatie. Alle 11 verenigingen reageerden.
- (c) De LVT: een professionele organisatie die bestaat sinds 1990. Ze is ontstaan uit een fusie tussen de Nationale Kruisvereniging en de Centrale Raad voor de Gezinsverzorging. De LVT geeft in verschillende regio's voorlichtingscursussen voor hartpatiënten (Leeuwen van ea, 1986). Alle 9 afdelingen reageerden.
- (d) De Hartenark: opgericht in 1977. Geeft bijscholing aan beroepskrachten die werkzaam zijn ten behoeve van hartpatiënten; zet verder patiëntenprojecten op, waaronder voorlichtingscursussen (Kromme de-van der Klis, 1982). Ook de Hartenark vulde de enquête in.
- (e) Het HIB: hierbij zijn 99 clubs aangesloten. Het HIB, in 1977 opgericht, is een samenwerkingsverband van plaatselijke recreatiesportverenigingen van ex-hartpatiënten (HIB, 1989a). 82 (83%) van de 99 sportclubs reageerden.
- (f) Het PSBG: alleen de provincie Limburg kent een dergelijke organisatie, die bewegingsactiviteiten voor onder andere hartpatiënten ondersteunt. Er zijn 70 sportclubs bij aangesloten, waarvan 45 tevens deel uitmaken van een patiëntenvereniging. Het gaat daarbij om sport-, trim- en zwemclubs. De organisatie is ondergebracht bij het Limburgse Groene Kruis. Van alle 70 aangesloten sportclubs zijn gegevens verkregen.

5.4.2 Onderzoeksgegevens

Organisaties

Startjaar

De eerste activiteiten zijn al in 1970 door het HIB ontwikkeld (tabel I). De patiëntenverenigingen van de FEDERATIE en OVERIGE zijn midden zeventiger jaren opgericht. De LVT is in de tachtiger jaren gestart met haar activiteiten, evenals de PSBG sportgroepen.

Tabel I
Startjaar nazorgactiviteiten per type organisatie

Startjaar	Federatie* (N=9)	Overige** (N=9)	HIB# (N=73)	LVT## (N=10)
1966-1970	0	0	2	0
1971-1975	1	0	1	0
1976-1980	3	1	13	0
1981-1985	3	8	24	3
1986-1990	2	0	34	7

* Federatie van Nederlandse Verenigingen Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten; ** niet bij de Federatie aangesloten verenigingen; # Hart In Beweging; ## Landelijke Vereniging Thuiszorg.

Werkgebied

Er zijn vier patiëntenverenigingen uit de categorie OVERIGE die een landelijke functie hebben: de Vereniging van Vaatpatiënten, de Belangenvereniging voor Nederlandse Hartgetransplanteerden "Harten Twee", de Stichting Nederlandse Hartpatiënten en de Stichting " 't Cardiogram", die zich alleen bezighoudt met het op landelijk niveau uitgeven van een periodiek dat gericht is op voorlichting voor hartpatiënten.

De Hartenark geeft zijn patiëntenvoorlichtingsgroepen ten behoeve van patiënten uit het hele land. De sport- cq trimclubs aangesloten bij het HIB of PSBG (alleen provincie Limburg) werken alle plaatselijk, evenals de provinciale c.q. districtsafdelingen van de LVT, die voorlichtingsgroepen geven. Lang niet alle gezondheidsregio's (Meegdes, 1988) worden evenredig bediend. Zuid-Limburg heeft in vergelijking met de rest van het land veel meer patiëntenverenigingen en sportgroepen.

Een deel van de sportactiviteiten van de patiëntenverenigingen (Federatie en Overige) valt onder de auspiciën van het HIB of het PSBG: drie patiëntenverenigingen organiseren hun sportactiviteiten met behulp van het HIB. In Limburg worden 45 van de 70 (64%) bij het PSBG aangesloten sportgroepen georganiseerd onder de paraplu van patiëntenverenigingen, afkomstig uit de categorie Overige.

Financiering

De meest voorkomende vorm van financiering is het contributieheffen van de leden/deelnemers. Voor de meeste sportclubs vormt dit vrijwel de enige inkomstenbron. Daarnaast levert de overheid (meestal de gemeente) in veel gevallen een bijdrage. Maar ook via andere, vaak creatieve, oplossingen blijken veel patiëntenverenigingen hun financieën aan te vullen: via sponsors, collectes, reclame en advertenties in hun periodiek.

De meerderheid zegt voldoende financiën te hebben om hun doelstellingen te kunnen realiseren; niettemin geven velen aan dat zij hun activiteitenpakket zouden uitbreiden, indien er meer financiële armslag zou zijn.

Het bestuur van zowel de Federatie als het HIB bestaat uit vrijwilligers. Beide krijgen subsidie van de Nederlandse Hartstichting, het HIB ook van het Ministerie van WVC.

Tabel II

Spreiding over Nederland per gezondheidsregio van de verschillende typen organisaties die nazorg geven

Gezondheidsregio	Aantal inwoners	Fed* (N=12)	OV** (N=11)	HIB# (N=99)	PSBG* (N=70)	LVT## (N=9)
1. Groningen	556.757	-1		5		
2. Friesland	599.104			6		
3. Drente	436.586			1		6
4. Zwolle	472.014	1		2		1
5. Twente	569.704			2		
6. Stedendriehoek	448.820			6		
7. Arnhem	838.115	-1		6		5
8. Nijmegen	432.086			3		
9. Utrecht	1.009.929		1	11		
10. Flevoland	193.739			2		
11. 't Gooi	252.643			1		
12. Alkmaar	545.436	1		3		1
13. Kennemerland	375.562	-1		3		
14. Amsterdam	1.194.754			4		1
15. Leiden	470.913			4		1
16. Den haag	680.391		1	2		1+1
17. Delft	247.657					
18. Midden-Holland	219.921			2		
19. Rijnmond	1.191.080	-2		6		
20. Dordrecht	351.940			3		
21. Zeeland	355.501			5		
22. Breda	601.836	1		2		
23. Tilburg	376.468					
24. Den Bosch	578.154			8		
25. Eindhoven	642.345	2		5		3
26. N-Limburg	440.610	1	1 1/2	4	29	
27. Z-Limburg	631.464		4 1/2	4	41	
Totaal	14.714.948					
Landelijk werkend		4				

* Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg; * Federatie van Nederlandse Verenigingen Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten; ** niet bij de Federatie aangesloten verenigingen; # Hart In Beweging; ## Landelijke Vereniging Thuiszorg.

Voor het PSBG werken enkele betaalde medewerkers. De Hartenark heeft acht medewerkers in dienst, die allen door de NHS betaald worden; dit geldt ook voor de accommodatie in Bilthoven. Echter hun activiteiten richten zich niet alleen op het gebied van hartrevalidatie. De LVT wordt gefinancierd via de AWBZ.

Tabel III

Soorten financiering van de verschillende organisaties die nazorgactiviteiten geven

Financiering	Federatie* (N=12)	Overige** (N=11)	HIB# (N=79)	LVT## (N=9)
Donaties/contributies	12	10	73	9
Subsidie overheid	4	3	24	0
Activiteiten	1	3	8	2
Subsidie stichtingen	0	2	10	0
Industriesponsoring	1	3	7	0
Collecte/inzamelacties	0	1	8	0

* Federatie van Nederlandse Verenigingen Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten; ** niet bij de Federatie aangesloten verenigingen; # Hart In Beweging; ## Landelijke Vereniging Thuiszorg.

Tabel IV

Soorten leden van patiëntenverenigingen

Leden	Federatie* (N=12)	Overige** (N=11)
Alle hartpatiënten	12	5
Patiënten na harttransplantatie	0	1
Vaatpatiënten	0	1
Partners	9	5
Professionals	7	2
Geen leden	0	4

* Federatie van Nederlandse Verenigingen Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten; ** niet bij de Federatie aangesloten verenigingen.

Leden

Het HIB, het PSBG en de Hartenark hebben geen leden. Het LVT wel, maar dat zijn niet alleen hartpatiënten. Verder kunnen hartpatiënten lid worden van alle patiëntenverenigingen die horen bij de Federatie en van vijf van de elf patiëntenverenigingen uit de categorie Overige. Meestal mogen ook partners lid worden. De andere zes verenigingen uit de categorie Overige hebben alle een stichtingsvorm en tellen dus geen leden.

Start na ontslag

De meeste patiëntenverenigingen en sportclubs geven aan dat patiënten in principe direct na afloop van de ziekenhuisopname zouden mogen starten met sportactiviteiten; bij sommige andere kan dit pas na de revalidatieperiode. Voor deelname aan de meeste sportactiviteiten is wel (schriftelijke) toestemming van de cardioloog nodig. De kruisverenigingen starten drie tot zes maanden na ontslag uit het ziekenhuis met hun voorlichtingscursussen, de Hartenark houdt ongeveer 4 maanden na opname aan.

Tabel V

Soorten doelgroepen van de verschillende typen organisaties die nazorg geven

Doelgroepen	Fed* (N=12)	OV** (N=11)	HIB# (N=75)	LVT## (N=9)	PSBG* (N=25)	HART** (N=1)
Alle hartpatiënten	12	9	75	9	25	1
Patiënten na harttransplantatie	0	1	0	0	0	0
Vaatpatiënten	0	1	0	0	0	0
Partners	11	8	27	12	0	1
Professionals	1	1	11	0	0	1

* Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg; ** Hartenark; * Federatie van Nederlandse Verenigingen Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten; ** niet bij de Federatie aangesloten verenigingen; # Hart In Beweging; ## Landelijke Vereniging Thuiszorg.

Doelgroepen

Eén patiëntenvereniging richt zich specifiek op vaatpatiënten en één uitsluitend op hartgetransplanteerden. De activiteiten van de meeste andere patiëntenverenigingen/groepen zijn voornamelijk gericht op patiënten na infarct of operatie, een enkele keer ook op andere patiënten (harttransplantatie, PTCA en vaatpatiënten).

Bij de voorlichtingsactiviteiten van de LVT worden de partners uitdrukkelijk uitgenodigd. Dat geldt ook voor de meeste activiteiten van de Federatie, de patiëntenverenigingen die vallen in de categorie Overige en de Hartenark. Slechts eenderde van de sportgroepen van het HIB laten partners toe. Bij de PSBG-bewegingsgroepen is 23% van de deelnemers partner.

Activiteiten voor patiënten

Het HIB en het PSBG houden zich in principe alleen bezig met sportgroepen. Het LVT en de Hartenark, beide professionele organisaties, geven uitsluitend cursussen gericht op secundaire preventie. De patiëntenverenigingen geven het hele scala aan activiteiten (Tabel VI), zoals:

(a) Sport- en trimgroepen: de meest voorkomende activiteit. In verschillende vormen mogelijk: sport en spel, gymnastiek of zwemmen. Doel is meestal niet de prestatie, maar het (weer) plezier krijgen en houden in bewegen.

(b) Voorlichtingsgroepen: hierin wordt, ook door professionals, voorlichting gegeven over de hartziekte en over risicofactoren aan patiënten en hun partners. Tevens wordt aandacht besteed aan gedragsverandering en het uitwisselen van ervaringen.

(c) Emotionele ondersteuning door lotgenoten: vrijwilligers, die zelf hartklachten (gehad) hebben en daar emotioneel enige afstand van konden nemen, worden opgeleid om patiënten individueel te ondersteunen bij hun verwerkingsproces.

(d) Ontspannings-, vrijetijdsactiviteiten: het betreft hier zowel incidenteel als regelmatig terugkerende activiteiten. Incidenteel: bijvoorbeeld sportdag, gezellige avond, nieuwjaarsfeest. Regelmatig: bijvoorbeeld een soos-middag/avond, biljartclub.

Tabel VI

Aard van nazorgactiviteiten verzorgd door de verschillende typen nazorgorganisaties

Soort activiteit	Federatie* en overige** (N=22)	HIB# en PSBG' (N=99)	LVT## (N=12)	HART'' (N=1)
Sport	17 (77%)	99 (100%)	0	0
Voorlichtingsgroepen	11 (50%)	0	12 (100%)	1
Individuele psychosociale zorg	6 (27%)	0	0	0
Vrije tijd activiteiten	7 (32%)	17 (17%)	0	0
Individuele belangenbehartiging	11 (50%)	0	0	0
Collectieve belangenbehartiging	6 (27%)	0	0	0

* Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg; '' Hartenark; * Federatie van Nederlandse Verenigingen Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten; ** niet bij de Federatie aangesloten verenigingen; # Hart In Beweging; ## Landelijke Vereniging Thuiszorg.

(e) Individuele belangenbehartiging: patiënten (en partners) die in financiële nood komen doordat ze hartpatiënt zijn geworden, kunnen bij sommige verenigingen een beroep doen op een speciaal fonds. Daarnaast wordt juridische hulp geboden bij WAO- en ziektewetprocedures. Verder wordt geholpen bij klachten over medische zorg.

(f) Collectieve belangenbehartiging: denk bijvoorbeeld aan de luchtbrug voor hartpatiënten bij lange wachtlijsten.

Wie verzorgen de activiteiten?

Bij patiëntenverenigingen van de Federatie en uit de categorie Overige worden alle bestuurswerkzaamheden door vrijwilligers, meestal ex-patiënten, verricht. Sportactiviteiten gegeven door sportgroepen aangesloten bij het HIB of het PSBG, worden meestal begeleid door gediplomeerde begeleiders. Dit kunnen zowel betaalde als niet-betaalde krachten zijn. Onduidelijk is of dat ook geldt voor de sportgroepen die vallen onder de patiëntenverenigingen. Ten behoeve van de voorlichtingscursussen worden doorgaans professionals ingehuurd om onderdelen hiervan te verzorgen, zoals cardiologen, psychologen, diëtisten etc.

Patiëntenaantallen

Voorafgaande aan de presentatie van de gegevens dient opgemerkt te worden dat de verstrekte gegevens kwantitatief zeer beperkt zijn. Bovendien zijn het vaak schattingen geweest.

Aantal leden

De patiëntenverenigingen aangesloten bij de Federatie hebben samen 5.337 leden (N=12). De patiëntenverenigingen uit de categorie Overige tellen 1.212 leden (N=7). De verhouding man-vrouw bij de Federatie is 60%-40% (N=9), bij de Overige 70%-30% (N=7).

Tabel VII

Aantal deelnemers per nazorgactiviteit per type nazorgorganisatie

Soort activiteit	Federatie* en overige** (N=23)	HIB# en PSBG' (N=169)	LVT## (N=9)	HART'' (N=1)	Totaal (N=202)
Sport	2.500 (N=12)	5.416 (N=143)	0	0	7.916
Voorlichtingsgroepen	246 (N=6)	0	214 (N=8)	250 (N=1)	710
Lotgenoten ondersteuning	365 (N=3)	0	0	0	365
Vrije tijd activiteiten	755 (N=6)	542 (N=12)	0	0	1.297
Individuele belangenbehartiging	73 (N=5)	0	0	0	73

* Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg; '' Hartenark; * Federatie van Nederlandse Verenigingen Voor- en Nazorg bij Hartpatiënten; ** niet bij de Federatie aangesloten verenigingen; # Hart In Beweging; ## Landelijke Vereniging Thuiszorg.

Aantal deelnemers

(a) Sportactiviteiten: in totaal namen bijna 8.000 deelnemers regelmatig deel, meestal wekelijks. Dit aantal is gebaseerd op een respons van 12 van de 17 patiëntenverenigingen die sportactiviteiten geven, en op een respons van 73 van de 99 clubs die bij het HIB zijn aangesloten en de 70 clubs die bij het PSBG zijn aangesloten. Een schatting van de totale populatie komt uit op 10.000 deelnemers.

Bij het HIB was de verhouding man-vrouw: 85%-15%; bij het PSBG 64%-36%.

(b) Voorlichtingsgroepen: in totaal hadden ongeveer 710 patiënten voorlichting in groepsverband genoten.

(c) Zes verenigingen gaven aan dat ze emotionele ondersteuning door lotgenoten verzorgen: 365 mensen (N=3) kregen een dergelijke begeleiding.

(d) Ontspanningsactiviteiten: bijna 1.300 patiënten namen hieraan deel.

(e) Individuele belangenbehartiging: elf hartpatiëntenverenigingen gaven aan deze vorm van service te bieden. Slechts vijf konden cijfers leveren waarbij in totaal 73 mensen zouden zijn geholpen.

5.5 DISCUSSIE

5.5.1 Dataverzameling en beperkingen

Gezien de grote respons (91%) kan gesteld worden dat een vrijwel compleet beeld geschetst is van de bekende organisaties en hun activiteiten in Nederland. In mindere mate geldt dit voor de patiëntenaantallen: de respons hierop lag een stuk lager (zie tabel VII), waarbij de cijfers gebaseerd werden op retrospectieve schattingen.

Een nadeel van dit onderzoek is dat de data zijn geleverd door de verenigingen en sportgroepen zelf. Het is zeer wel mogelijk dat sociale wenselijkheid een rol gespeeld heeft bij het invullen van de enquêtelijsten: men kan de neiging hebben de situatie rooskleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid is. Er dient echter in acht genomen te worden dat dit een van de eerste Nederlandse onderzoeken is naar de nazorgfase. Schäperclaus e.a. (1991) hebben de nazorgfase in Nederland ook geïnventariseerd, waarbij ze zich beperkt hebben tot sportactiviteiten. Hun respons was 94%.

In het buitenland is alleen in West-Duitsland zo'n onderzoek naar sportgroepen gedaan, in 1982 (Gleichmann, 1983). De respons bedroeg 67%. Schäperclaus e.a. (1991) hebben in 1990 een inventariserend onderzoek gedaan naar de sportgroepen voor hartpatiënten in Duitsland. Ze deden dat op basis van een steekproef van 280 verenigingen (totaal 2.500) en kregen een respons van 63%. Mogelijk dat dit de data minder betrouwbaar heeft gemaakt.

5.5.2 Beschouwingen

De activiteiten en de organisaties zijn niet evenredig verdeeld over het land. Zo zijn er in bepaalde regio's blinde vlekken, terwijl in Zuid-Limburg een keur aan organisaties actief is, die elkaar mogelijk zelfs voor de voeten lopen. Sportgroepen zijn in verhouding het meest frequent aanwezig en nagenoeg alle regio's van het land zijn voorzien. In dit opzicht wordt voldaan aan de doelstelling dat de effecten van revalidatie gestabiliseerd dienen te worden. Er zijn nauwelijks activiteiten die het psychosociaal herstel kunnen bestendigen; op sporadische plekken wordt emotionele ondersteuning door lotgenoten geboden. Ook voor het vervolgen van het veranderen van risicogedrag worden weinig activiteiten gegeven: in enkele regio's worden voorlichtingsgroepen gegeven.

Sturing en afstemming op organisatorisch niveau lijkt nuttig om meer (ex)patiënten te bereiken en hen naar de juiste instantie te kunnen verwijzen. Hiertoe dient ook op inhoudelijk niveau selectie, indicatiestelling en zo nodig doorverwijzing van (ex)patiënten plaats te vinden. Dit zou bijvoorbeeld door de huisarts of cardioloog kunnen geschieden. De Federatie (Rooy de & Cornet, 1988) is landelijk actief in het organisatorisch afstemmen van de patiëntenverenigingen, terwijl het HIB dat doet voor de sportgroepen. Echter niet voor alle initiatieven bestaat een landelijke afstemming. Het is van belang dat aan alle activiteiten voor hartpatiënten die buiten de reguliere gezondheidszorg vallen, landelijk enige sturing gegeven wordt.

Op provinciaal niveau tracht in Limburg het PSBG sturing te geven aan bewegingsactiviteiten voor hartpatiënten, en probeert het Steunpunt Zelfzorg Initiatieven (Rooy de &

Cornet, 1988) de patiëntenverenigingen te stroomlijnen. Ideaal zou zijn dat per ziekenhuis of gezondheidsregio bekend was welke nazorgactiviteiten ter beschikking staan, wat ook een gerichte advisering aan patiënten mogelijk zou maken.

Duitsland is het enige land, naast Nederland, waar inventariserend onderzoek is gedaan naar de nazorgfase. Daar is de organisatie van de hartrevalidatie anders dan in Nederland (Gleichmann ea, 1983). Na de revalidatie tijdens opname in het ziekenhuis, worden de patiënten doorgestuurd voor klinische revalidatie in een revalidatiekliniek gedurende een periode van vier weken (Jette ea, 1988). De ambulante sportgroepen worden gezien als een logische voortzetting op deze twee fasen. Vergeleken met Nederland duurt de revalidatiefase veel korter: vier weken tegen drie maanden in Nederland voor poliklinische revalidatie. In feite hebben de sportgroepen in Duitsland ook een revalidatiefunctie: ze starten vier weken na ontslag uit het opnameziekenhuis. In Duitsland wordt vrijwel alleen fysieke training aangeboden, terwijl in Nederland een breder dienstenpakket mogelijk is.

Uit de cijfers van het PSBG betreffende het aantal sportgroepen in Limburg blijkt dat eenderde hiervan niet aangesloten is bij een hartpatiëntenvereniging of het HIB, en dus "wilde" groepen genoemd kunnen worden. Ook het HIB (1989b) raamt dat er naast de ongeveer 100 bij hen aangesloten clubs nog ruim 40 niet-aangesloten clubs zijn. Uitgaande van onze schatting van 10.000 deelnemers bij de ons bekende clubs, betekent dit dat er naar alle waarschijnlijkheid in totaal tenminste 14.000 deelnemers waren in 1989 in geheel Nederland. Schäperclaus ea (1991) komen uit op een schatting van 12.000.

In voormalig West-Duitsland waren in 1982 ongeveer 500 sportclubs voor hartpatiënten en ongeveer 9.000 deelnemers (Gleichmann ea, 1983). In 1991 was dit uitgegroeid tot ongeveer 2.500 sportclubs en ongeveer 55.000 deelnemers (Schäperclaus ea, 1991). Gerelateerd aan het aantal inwoners (Nederland: 14 miljoen, West-Duitsland 60 miljoen) en uitgaande van een gelijke incidentie van hartziekten mag aangenomen worden dat in beide landen eenzelfde percentage hartpatiënten aan sportgroepen deelneemt.

5.6 CONCLUSIES

Er bestaat een redelijk beeld van de nazorgfaciliteiten en de organisatie ervan in Nederland. In het buitenland is alleen in het voormalige West-Duitsland onderzoek gedaan naar de nazorg. De nazorgactiviteiten bevinden zich nog in een opbouwfase. De ongelijke landelijke verdeling, de sterk wisselende organisatiegraad en het sterk variërende type hulp dat geboden wordt zijn hier tekenen van. Sportactiviteiten zijn breed beschikbaar. Psychosociale zorg en secundaire preventie zijn uiterst beperkt beschikbaar, waardoor in de praktijk (nog) niet voldaan kan worden aan de doelstellingen van zelfhulpactiviteiten, namelijk het continueren van fysiek en psychosociaal herstel en verandering van risicogedrag.

Hoofdstuk 6

Algemene Discussie

6.1 INLEIDING

In dit laatste hoofdstuk worden allereerst de gebruikte onderzoeksmethoden geëvalueerd en volgen er aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Op de tweede plaats worden de in hoofdstuk 3, 4 en 5 beschreven onderzoeksresultaten geëvalueerd in het licht van de vigerende definities van hartrevalidatie en het door de jaren heen gevoerde beleid; tevens wordt in het kort ingegaan op de stand van zaken van het effectonderzoek, waarna er aanbevelingen voor de praktijk volgen. Tot slot wordt aangegeven hoe deze aanbevelingen gerealiseerd zouden kunnen worden.

Alvorens op bovenstaande in te gaan zijn hier nog enkele opmerkingen over hartrevalidatie in het buitenland op zijn plaats. Gesteld kan worden dat de hartrevalidatie in Nederland, in vergelijking met het buitenland, ver ontwikkeld is. (zie hoofdstuk 2). Alleen in het voormalige West-Duitsland kan ook een redelijk compleet en wijdverbreid netwerk van voorzieningen aangetroffen worden. In Nederland is de hartrevalidatie zeer ver ontwikkeld als we kijken naar het aantal cq percentage patiënten dat gerevalideerd wordt. Ook is er een uitgebreid en gedifferentieerd pakket aan behandelvormen aanwezig, dat over het gehele land beschikbaar is.

6.2 EVALUATIE VAN DE GEBRUIKTE METHODEN VAN ONDERZOEK

De enquêtes zijn een bruikbaar instrument gebleken om een landelijk overzicht te verkrijgen van omvang en inhoud van de revalidatie. Nadeel is dat de gegevens verstrekt zijn door hoofdzakelijk een discipline, namelijk de fysiotherapeuten. Deze beroepsgroep heeft, evenals andere disciplines, geen compleet overzicht over alle revalidatie-activiteiten. Waarschijnlijk zal dit de door ons verkregen data vertekend hebben. Mogelijk dat dit probleem bij een volgende enquêtering ondervangen kan worden door het hele team bij de dataverzameling te betrekken. Een andere nadeel, namelijk het feit dat de data door het team zelf verstrekt zijn, blijft hiermee bestaan. Het team zal een relatief rooskleurig beeld geven van door hen gegeven behandelonderdelen.

Ook de individuele patiëntenregistratielijsten zijn door fysiotherapeuten ingevuld. Evenals bij de enquêtes geldt hier hetzelfde nadeel. Ook hier zou dit opgevangen kunnen worden door het hele team bij de dataverzameling te betrekken. Het grote voordeel van de registratielijsten is dat hiermee prospectief en dus nauwkeuriger data verzameld zijn. Enerzijds ter validering van de enquêtegegevens, anderzijds een uitbreiding van data. Het leverde een validering op van toegepaste behandelonderdelen, anderzijds gaf het uitvoeriger inzicht in wat daadwerkelijk per patiënt gedaan wordt in het kader van revalidatie. Hieruit bleek dat relatief weinig patiënten andere onderdelen behalve fysiotherapie kregen. Het bleek een relativering, immers uit de enquêtegegevens kwam het beeld te voorschijn van een zeer uitgebreid revalidatiepakket tijdens opname en ontslag, waarvan relatief weinig gebruik werd gemaakt.

Verder is met behulp van de individuele patiëntenlijst fase 1 en 2 in onderlinge samenhang geregistreerd, waarbij duidelijk werd hoeveel en welke patiënten vanuit de opname doorverwezen werden naar een afdeling voor revalidatie na ontslag. Een toekomstig onderzoek zou in een steekproef van representatieve gezondheidsregio's dienen te registreren zowel de overgang van fase 1 naar 2, als ook die van 2 naar 3. In deze dissertatie ligt de nadruk op fase 2, omdat hier de prioriteit wat betreft beleid en bijsturing ligt.

Beide bovengenoemde onderzoeksmethoden hebben het nadeel dat de informatie door professionals verstrekt is en daardoor waarschijnlijk in gunstige zin vertekend is. Een mogelijkheid om dit te ondervangen is de data te valideren met behulp van door patiënten zelf verstrekte gegevens. Op basis van een representatieve steekproef uit de beschikbare instellingen zouden patiënten geënquêteerd kunnen worden over wat ze allemaal aan revalidatie gehad hebben en met welke disciplines ze in contact zijn geweest.

De volgende aanbevelingen kunnen gedaan worden ten aanzien van toekomstig inventariserend onderzoek: allereerst lijkt het zinvol om periodiek, eenmaal per bijvoorbeeld 3 jaar, alle instellingen en patiëntenorganisaties te enquêteren met het doel een globaal landelijk overzicht te krijgen. Hierbij dient dan wel zo veel mogelijk het hele team betrokken te zijn. Op de tweede plaats is het zinvol om over enkele jaren een registratie met behulp van individuele patiëntenlijsten te herhalen in een representatieve gezondheidsregio, waarbij het gehele traject dat een hartpatiënt kan doorlopen onder de loupe genomen wordt. Dit kan dan gevalideerd worden met behulp van gegevens verstrekt door patiënten zelf.

6.3 EVALUATIE VAN DE REVALIDATIE IN NEDERLAND

6.3.1 Opnamefase

De belangrijkste doelstelling van de opname voor de hartpatiënt is uiteraard de medische zorg; op de tweede plaats volgt herstel van fysiek en psychosociaal functioneren en tenslotte kan er een start gemaakt worden met secundaire preventie.

De gemiddelde opnameduur is de afgelopen jaren beduidend korter geworden: was deze in 1966 nog gemiddeld vijf a zes weken, in 1988 was deze afgenomen tot slechts 13 dagen (LMR/SIG, 1989). Dit geldt voor zowel patiënten na infarct als na coronaire bypassoperatie. Deze fase is korter geworden door verbeterde kennis en medisch technische mogelijkheden en door de bevinding dat de meeste patiënten snel na een infarct of operatie gemobiliseerd konden worden zonder toename van de ziekenhuissterfte (Bär & Vonken, 1990).

Uiteraard is er in alle ziekenhuizen medisch specialistische en verpleegkundige zorg aanwezig. Standaard is verder dat de meeste patiënten door een fysiotherapeut gemobiliseerd worden. Een kwart van de patiënten krijgt tijdens opname of direct na ontslag een inspanningstest. Consultatie door diëtist, maatschappelijk werker en klinisch psycholoog is lang niet in alle ziekenhuizen mogelijk. Waar wel mogelijkheden bestaan wordt hier geen of slechts beperkt en weinig systematisch gebruik van gemaakt. Systematische aandacht gericht op secundaire preventie is tijdens opname vrijwel afwezig. De aanpak van psychosociale zorg en secundaire preventie is dus afhankelijk van lokale factoren.

Standaard fysiotherapie bij de meeste patiënten na infarct of bypassoperatie tijdens opname lijkt wenselijk. Voor fysieke training tijdens opname is er een financiering in de vorm van fysiotherapieverrichtingen. Eveneens lijkt een inspanningstest tijdens of direct na opname zinvol (Fioretti ea, 1987 en 1988). Het is van groot belang dat tijdens de opname naast problemen op medisch en fysiek vlak ook psychosociale problemen gesignaleerd worden door specialist, verpleging en fysiotherapeut. Deze kunnen dan poliklinisch daadwerkelijk aangepakt worden, door het team. Hier zou systematische screening bijvoorbeeld door middel van bestaande of nog te ontwerpen vragenlijsten kunnen helpen. Eventueel kan deze screening na ontslag gedaan worden, voor de start van de revalidatie. Ook zou de klinische patiëntenbespreking hierop gericht kunnen worden.

Overigens is doorverwijzing in dit stadium enerzijds mogelijk nog te vroeg, anderzijds zijn er op psychosociaal gebied aperte probleemgevallen, die tijdens opname in het ziekenhuis nog niet herkend worden of pas nadien evident worden. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten met ernstige angst- en/of depressiviteitsklachten.

De mogelijkheid voor individuele consulten van maatschappelijk werk, klinisch psycholoog en diëtiste dient tijdens de opname in principe aanwezig te zijn. Het gaat hier vermoedelijk om kleine aantallen patiënten die dit nodig zullen hebben. Wel is nodig dat indicatiecriteria duidelijker geformuleerd worden, omdat deze in de praktijk heel divers geïnterpreteerd worden. Op het gebied van secundaire preventie is het aan te bevelen om al tijdens de opname te starten met enkele voorlichtingsbijeenkomsten door cardioloog, verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtiste en klinisch psycholoog.

Er dient een financiële regeling te komen voor psychosociale zorg en secundaire preventie tijdens opname.

6.3.2 Revalidatie na ontslag

De belangrijkste doelstelling in deze fase is het herstel van fysiek en psychosociaal functioneren. Daarnaast verdient secundaire preventie onder andere door verandering van risicogedrag de aandacht. Op de derde plaats moet de medische zorg gecontinueerd worden.

Fysiotherapie in groepen is een standaard onderdeel van het revalidatiepakket. In de praktijk duurt dit onderdeel gemiddeld 3 maanden. Individuele fysiotherapie is weinig beschikbaar, behalve in centra voor klinische revalidatie. De start van het fysieke programma vindt steeds sneller na ontslag plaats. Het percentage patiënten per ziekenhuis dat revalidatie krijgt varieert sterk.

Individuele consulten door maatschappelijk werk, klinisch psycholoog of diëtist zijn, ondanks het ontbreken van een financieringsregeling, in eenderde van de niet-erkende afdelingen gebruikelijk. Bestaat de mogelijkheid wel dan is er een grote variatie in het aantal patiënten dat voor een consult verwezen wordt. In veel ziekenhuizen wordt weliswaar aandacht besteed aan secundaire preventie, maar vaak ongestructureerd. Slechts in ongeveer een kwart van de instellingen wordt een groepsprogramma, gericht op secundaire preventie, gegeven.

Deze grote bandbreedte in aantallen en type zorg zet aan tot nadenken: als in de ene instelling dezelfde patiënt geen revalidatie en in de andere zeer uitgebreide zorg krijgt, wekt dit de indruk dat het nut van revalidatie in deze fase onvoldoende onderbouwd is. Niet alle patiënten moeten alles hebben en daarom is het noodzakelijk om duidelijke richtlijnen te maken omtrent selectiecriteria.

Overigens is het van belang te weten in hoeverre de onderzoeksgegevens, die stammen uit 1988 en verzameld zijn in 1989, nog actueel zijn. Uit een onderzoek dat uitgevoerd werd in 1993 (Senten, submitted for publication) blijkt dat de gegevens uit deze dissertatie in grote lijnen overeenkomen met die uit het genoemde onderzoek. Een verschil valt op: anno 1993 blijkt 50% een of andere vorm van groepsvoorlichting te hebben, terwijl dat 5 jaar eerder nog maar 25% was.

De opvattingen van Bangma (1987) weerspiegelen het in de praktijk toegepaste beleid. Bangma stelde dat behandeling in de zin van bewegingstherapie bij alle patiënten steeds is geïndiceerd! Hiervoor werd de regeling "reconditionerende fysiotherapie" ontwikkeld (Ziekenfondsraad, 1985). Revalidatie was volgens Bangma geïndiceerd als er door functiestoornissen ten gevolge van het hartinfarct zodanige beperkingen op het gebied van fysieke onafhankelijkheid, maatschappelijk en psychisch functioneren ontstaan dat de kwaliteit van het bestaan van de patiënt ook op langere termijn wordt bedreigd. Hiertoe is het "advies inzake het besluit revalidatiedagbehandeling ziekenfondsverzekering" door de Ziekenfondsraad (1981) geformuleerd. Zeer waarschijnlijk heeft deze vrij algemene formulering ertoe bijgedragen dat deze regeling toegepast is voor zeer uiteenlo-

pende indicatiegebieden. In feite heeft de overheid haar beleid hierop gebaseerd. Het blijkt dat de overheid de initiatieven uit het veld gevolgd heeft.

Vaak is revalidatie in de praktijk een synoniem voor fysieke training. De nadruk op fysiotherapie wordt in feite versterkt door de bestaande financiële regeling (Dixhoorn van, 1990).

Daar komt nog bij dat door de jaren heen door de Nederlandse Hartstichting geen eenduidig beleid is gevoerd ten aanzien van de aanpak van hartrevalidatie: een deel van de leden van de Revalidatie Commissie wilde in het verleden alle patiënten doorverwijzen naar regionale gespecialiseerde afdelingen, terwijl een ander deel stelde dat de patiënten in het eigen ziekenhuis gerevalideerd moesten worden (NHS, 1966 en 1977)! In 1990 is een rapport van de Hartstichting (NHS, 1990) verschenen, waarin een visie ontwikkeld is op hartrevalidatie. Hierin zijn bovengenoemde tegenstellingen geïntegreerd.

Een ander belangrijk probleem is dat het effect van hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis zeer ter discussie staat, omdat verschillende doelen voor de hele groep patiënten worden nagestreefd (NHS, 1990). Dit is ook een belangrijke reden voor de diversiteit in de hartrevalidatie, zoals deze momenteel bestaat.

Gunstig is dat het dagelijks functioneren van hartpatiënten die fysieke reconditionering krijgen de eerste drie maanden toeneemt, terwijl dit effect het eerste jaar blijft bestaan. Vooral oudere patiënten, vaak vrouwen, maar ook alleenstaanden blijken hiervan te profiteren. Conditieverbetering is eveneens een reëel effect hiervan. Als de lichamelijke activiteiten na het beëindigen van de revalidatie niet gecontinueerd worden, neemt de conditie geleidelijk aan af (Bär ea, 1992). Met uitzondering van meta-analyses (Oldridge ea, 1988; O'Connor ea, 1989; Collins ea, 1984) laten de meeste onderzoeken geen afname van morbiditeit en mortaliteit zien na een reconditioneringsprogramma. Revalidatie verhoogt de kans op werkhervatting niet (Diederiks, 1982; Vermeulen, 1983; Bär & Vonken, 1990). Fysieke training leidt op korte termijn tot angstreductie, echter na beëindigen therapie neemt de angst weer toe (Uden van ea, 1986).

De effecten van psychologische interventies zijn erg wisselend en vaak slechts tijdelijk (Uden van ea, 1986; Uniken Venema-van Uden, 1990). Een uitzondering vormt individuele relaxatietraining in combinatie met fysieke inspanningstraining (Dixhoorn van ea, 1990). De effecten van secundaire preventieprogramma's zijn positief, mits gestructureerd en deskundig opgezet (Maes & Elderen van, 1988).

Zoals uit onderhavig onderzoek blijkt is er in Nederland een breed pakket aan behandel mogelijkheden beschikbaar. Echter dit pakket is onevenredig verdeeld over het land. Ook varieert in hoge mate per ziekenhuis in hoeverre van de beschikbare faciliteiten gebruik gemaakt wordt. Vandaar dat het nodig is om per behandelonderdeel indicatie (en contra-indicatie) criteria te bepalen. Verder is het van belang dat per individuele patiënt revalidatiedoelen opgesteld worden, zodat deze adequaat doorverwezen kan worden naar een of meer revalidatiemodulen. Deze doelen dienen op fysiek en psychosociaal vlak vastgesteld te worden en moeten zo snel mogelijk na opname bepaald te worden. Ook is het zaak een risicoprofiel per patiënt vast te stellen, zodat deze naar een secundair preventieprogramma doorgestuurd kan worden.

Hiertoe dienen meetinstrumenten ontwikkeld te worden. Idealiter wordt de behandeling op gezette tijden geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Verder is dan wel een flexibel financieel systeem noodzakelijk, waarin niet de instelling maar hetgeen de patiënt nodig heeft centraal staat.

Het is zaak dat per patiënt individuele revalidatiedoelen geformuleerd worden, waardoor het wél mogelijk is doelen als conditieverhoging, morbiditeit, angstreductie en vermindering van risicogedrag te realiseren. Revalidatie werkt niet als de hele groep patiënten standaard een vaste therapievorm gegeven wordt om een standaard doel te bereiken.

De fasering van het zorgtraject rondom de hartpatiënt is primair gebaseerd op fysiek herstel. Bij de opzet, zoals deze gegroeid is door de jaren heen, is geen rekening gehouden met de gemiddelde duur van het psychisch verwerkingsproces van zes tot twaalf maanden (Rooymans, 1979) en met de verandering van risicogedrag dat nog veel langer duurt.

Was in 1984 nog het adagium dat iedereen alles nodig had en dat de hartrevalidatiefaciliteiten daarom in deze geest uitgebreid zouden moeten worden, anno 1995 is het parool te differentiëren welk onderdeel voor welke patiënt aangewezen is. Cruciaal hiervoor is adequate selectie. Deze nieuwe aanpak hoeft niet per se duurder te zijn dan de huidige kosten die gemaakt worden voor de zorg van hartpatiënten (NHS, 1990).

De beslissing wie voor welke vorm van revalidatie na ontslag in aanmerking komt, valt idealiter aan het eind van de ziekenhuisfase. Het is verstandig om tijdens de revalidatiefase te bekijken wat er bereikt is en of het nodig en nuttig is met dit of een ander programma door te gaan. Een multidisciplinaire aanpak is aangewezen. Coördinatie hiervan is, indien aanwezig, de verantwoordelijkheid van de revalidatiearts, anders van de cardioloog. Het verdient de voorkeur de beoordeling van psychosociale gegevens onder verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog te laten vallen (NHS, 1990). Het instrumentarium voor psychosociale screening is op dit moment nog onvoldoende ontwikkeld.

In een nieuwe aanpak (NHS, 1990), waarin de patient centraal staat zouden de volgende mogelijkheden beschikbaar kunnen zijn:

(a) De gangbare begeleiding door de cardioloog met inschakeling van de huisarts. Overigens is een betere afstemming tussen deze twee disciplines gewenst (Vlek ea, 1994).

Voor patiënten bij wie geen discrepantie bestaat tussen het gewenste en het feitelijke functioneren terwijl behandelbare risicofactoren ontbreken is dit aangewezen. Of voor patiënten bij wie, gezien bijvoorbeeld de hoge leeftijd, behandeling niet bijster zinvol is. Ook dient hiermee te worden volstaan indien patiënten weigeren aan revalidatie activiteiten mee te doen.

(b) Een optie die verdient verder uitgezocht te worden is begeleiding door een, nog niet bestaande, revalidatieverpleegkundige die adviezen geeft op het gebied van dagelijkse activiteiten en controleert of de adviezen worden opgevolgd. Dit is zeker zinvol in kleinere

centra die niet een volledig team kunnen laten draaien. Dit is een benadering die overigens ook in combinatie met revalidatieprogramma's opgezet kan worden. Deze verpleegkundige kan het lange termijn werk op zich nemen. Het is zaak dat er een goede afstemming plaatsvindt met andere disciplines.

Indien geen revalidatie plaatsvindt kan een revalidatieverpleegkundige adviezen geven aan patiënten met een ongecompliceerd myocardinfarct, dat geen beperkingen oplevert, waarbij geen angina pectoris, ritme-, geleidings- en pompfunctiestoornissen of andere beperkende lichamelijke problemen aanwezig zijn. Verder geldt deze behandeling voor ouderen, psychisch stabiele patiënten die, naar verwachting, verstandig omgaan met adviezen en een goed ziekte-inzicht hebben, en patiënten die alleen durven oefenen.

(c) Lichamelijke conditietraining door middel van een (standaard) oefenprogramma in groepsverband onder leiding van een fysiotherapeut. Het programma voorziet zowel in conditietraining als in ontspanningsoefeningen en kan, indien nodig, tot op zekere hoogte per individu worden verlengd of verkort.

Dit type revalidatie is bedoeld voor "standaard" patiënten van wie het dagelijks functioneren onvoldoende is, mits geen "grande" pathologie op medisch, fysiek of psychosociaal gebied of van wie de conditie te wensen over laat. In dat laatste geval is meer nodig.

(d) Psychosociale groepstraining als aanvulling op lichamelijke conditietraining, teneinde risicofactoren zoals ongezonde leefgewoonten, verwerkingsproblemen, omgaan met stress of overmatige angsten gunstig te beïnvloeden.

(e) Individuele begeleiding door klinisch psycholoog, maatschappelijk werker of diëtist, al naar gelang de noodzaak hiertoe. Ook kan hieronder vallen individuele ontspanningstraining (Dixhoorn van, 1991), ongeacht door welke disciplines gegeven.

De gesignaleerde problemen moeten wel verband houden met de hartziekte en de begeleiding moet beperkt blijven in duur en omvang. Indien de verwachting is dat deze vorm van begeleiding langdurig nodig is, of door meerdere disciplines moet worden gegeven, verdient het de voorkeur te kiezen voor revalidatiedagbehandeling of klinische revalidatie.

Patiënten die geen fysiek of psychosociaal programma krijgen kunnen eventueel vrij snel doorverwezen worden voor nazorgactiviteiten. Coördinatie van bovengenoemde programma-onderdelen kan plaats vinden door de cardioloog of revalidatiearts, al dan niet ondersteund door een daartoe opgeleide verpleegkundige. Als een klein ziekenhuis bovengenoemde onderdelen niet in huis heeft, verdient het aanbeveling de patiënten naar een ander centrum door te sturen, waar deze mogelijkheden wel bestaan.

(f) Revalidatiedagbehandeling voor mensen die niet geschikt zijn voor bovengenoemde vormen, maar voor wie opname niet nodig is. Het gaat om veelomvattende, intensieve en geïndividualiseerde revalidatie, uitgevoerd door een multidisciplinair team waarbij naast conditietraining en groepsprogramma's ook op allerlei individuele problemen kan worden ingegaan.

(g) Klinische revalidatie voor patiënten met ernstige, complexe of multiple problemen na infarct of operatie. Het gaat hierbij om mensen met ernstige medische complicaties ten gevolge van het infarct of operatie, maar ook om mensen met grote psychologische

problemen. Door deze klinische opvangmogelijkheid is de opnameduur in het ziekenhuis vaak belangrijk te bekorten en kan opname in een verpleeghuis worden voorkomen. Ook mensen met ernstige sociale problemen kunnen voor opname in aanmerking komen: een slecht huwelijk, een belastend gezin, moeilijkheden met werk, een volstrekt inadequate thuisopvang zoals met name bij de oude operatiepatiënten nogal eens het geval is. Deze vorm van revalidatie wordt gegeven door een team dat geheel gespecialiseerd is in hartrevalidatie. Gezien de aantallen patiënten die voor deze revalidatievorm in aanmerking komen zijn meer klinische revalidatie-afdelingen nodig dan momenteel aanwezig. Deze afdelingen moeten geografisch goed gespreid zijn.

Tot slot past bij een aanpak waarbij de patiënt centraal staat ook een financieringssysteem dat hierop aansluit.

6.3.3 Nazorg

Belangrijkste doelstelling van deze fase is het voortzetten van de ingezette verandering van leefwijze. Op de tweede plaats spelen fysiek en vooral psychosociaal herstel een grote rol en ten slotte blijft de patient doorgaans laagfrequent onder controle bij de specialist.

Activiteiten van patiëntenverenigingen en sportclubs voor hartpatiënten waren aanvankelijk bedoeld om de lacunes in de revalidatie op te vangen (Weeda, 1981). Naarmate het revalidatiepakket completer werd, richtten deze groeperingen zich vooral op nazorgactiviteiten.

Bij nazorg gaat het primair om sportactiviteiten voor ex-patiënten en hun partners. Andere onderdelen van zorg, zoals secundaire preventie en psychosociale zorg, ontbreken meestal (als uitgesproken doel, wel zijn dergelijke doelen vaak impliciet de bedoeling zonder dat men deze heeft geformuleerd). Bij deze activiteiten ligt veel nadruk op eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de (ex-)patiënt zelf.

Welke activiteiten in de nazorgfase effectief cq zinvol zijn, is nog onbekend. Tot op heden is er nog maar een beperkte hoeveelheid onderzoek in deze richting gedaan (Bruggemans ea, 1986; Mortel van de, 1989; Schäperclaus ea, 1991; Frasure-Smith & Prince, 1985; Friedman ea, 1986). Het is overigens waarschijnlijk dat nazorgactiviteiten bijdragen aan het bestendigen van het korte-termijneffect van revalidatieprogramma's. De gegevens tot dusverre duiden er namelijk op dat de interventies langdurig van aard dienen te zijn (Friedman ea, 1986).

De indicatiestelling voor deze activiteiten ontbreekt. Een systematische advisering door cardioloog en andere teamleden zou zinvol kunnen zijn. Indicatiecriteria zouden dan wel nader gepreciseerd moeten worden. Zo zou iedere patient aan het einde van de opname of van de revalidatie een advies dienen te krijgen. De overgang vanuit de institutionele gezondheidszorg naar nazorgactiviteiten moet zorgvuldig bewaakt worden. Hier kan de

huisarts ook een waardevolle rol spelen. Deze dient dan wel op de hoogte te zijn van het voorzieningenpakket in zijn regio.

Het verdient de voorkeur dat er op organisatorisch vlak een landelijke en/of regionale afstemming van activiteiten plaatsvindt, onder meer omdat er in sommige regio's een overlapping aan activiteiten is. Per regio zal er wel een compleet pakket beschikbaar moeten zijn. Mogelijk dat de Hartstichting in samenwerking met de Kruisverenigingen een coördinerende en adviserende rol zouden kunnen spelen.

De financiering is in principe geen probleem, omdat de activiteiten relatief goedkoop zijn en door de deelnemers zelf betaald worden. In een aantal gevallen is subsidiering mogelijk.

6.4 HOE VERDER?

Gesteld kan worden dat dit onderzoek een redelijk compleet beeld opgeleverd heeft van de hartrevalidatie in Nederland. Eveneens is een vergelijking mogelijk gebleken met de stand van zaken in het buitenland. Tot slot zijn de bevindingen afgezet tegen het gevoerde beleid, op grond waarvan aanbevelingen ter verbetering van de revalidatie voor hartpatiënten zijn geformuleerd.

Het is zaak dat de genoemde aanbevelingen omgezet worden in de praktijk. De Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en andere beroepsverenigingen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Allereerst zal de revalidatie tijdens opname, de revalidatie na ontslag en met name de overgang tussen deze twee aangepakt dienen te worden. In een later stadium kunnen de nazorgactiviteiten in samenhang met de revalidatie na ontslag ter hand genomen worden.

Een van de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek is dat er een grote variatie bestaat in indicatiestelling. Het is dan ook zaak dat iedere discipline deze visie uitwerkt op zijn/haar gebied: wat zijn de doelen voor revalidatie, welke programmaonderdelen zijn van belang en hoe dienen ze gedefiniëerd te worden, welke selectiecriteria worden gehanteerd en welke screeningsinstrumenten dienen ontwikkeld te worden? Dit dient zowel monodisciplinair als multidisciplinair te gebeuren. De medisch specialisten dienen de medische criteria te formuleren, de klinisch psychologen dienen bouwstenen aan te dragen voor psychosociale indicatiestelling. De klinisch psychologen hebben reeds pogingen hiertoe gedaan (NIP, 1990 en 1992; CBO, 1992; Soons, 1993b). Het is van belang dat bovengenoemd en in de toekomst uitgewerkt model geïmplementeerd gaat worden middels enkele proefprojecten in de praktijk. Indicatie- en selectiecriteria dienen gepreciseerd en zonodig bijgestuurd te worden. Per patiënt dienen individueel toegesneden doelstellingen geformuleerd en geëffectueerd te worden. Evaluatie-onderzoek dient plaats te vinden om na te gaan bij welke patiënten welk behandelonderdeel effectief is. Op den duur kunnen succesvolle criteria dan door heel Nederland toegepast worden.

Een tweede belangrijke bevinding is dat de betaling van met name revalidatie-activiteiten na ontslag een probleem is. Dit heeft een ernstig remmende werking in de verdere ontwikkeling. Er is geen tarief voor de cardioloog. Ook is er geen betaling voor het psychosociaal groepsprogramma (inclusief secundaire preventie) en individuele consulten cq medebehandelingen door diëtiste, maatschappelijk werker en klinisch psycholoog. De klinisch psychologen hebben reeds pogingen gedaan hiervoor bouwstenen aan te dragen (Soons, 1992; Soons ea, 1995; Soons, in press) betreffende hun inbreng bij hartpatiënten. Voor deze aspecten dient een tarief gemaakt te worden. Het totaal zou toch budgetneutraal kunnen geschieden (NHS, 1990). Het is zaak de zorgverzekeraars bij deze aanpak te betrekken.

Samenvatting

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven waarin de hartrevalidatie in Nederland is geïnventariseerd. De gegevens, die gerapporteerd worden, zijn verzameld in het kader van "het Registratieproject" van de Revalidatie Commissie van de Nederlandse Hartstichting. De dataverzameling heeft plaatsgevonden van 1987 tot en met 1991.

In *hoofdstuk 1* (Inleiding en probleemstelling) worden allereerst de internationale ontwikkelingen op het gebied van de hartrevalidatie beschreven. Begonnen wordt bij de ontwikkelingen van voor 1950, toen langdurige bedrust voor hartinfarctpatiënten noodzakelijk geacht werd. Door twee ontwikkelingen is dit beleid veranderd. Op de eerste plaats door de toepassing van de "chair treatment" tijdens de herstelfase na een infarct. Op de tweede plaats is de toepassing van de inspanningstolerantie ten behoeve van de inschatting van de arbeidsgeschiktheid na een infarct van belang. Bovenstaande resulteerde in een eenzijdige nadruk op conditietraining in de zestiger en zeventiger jaren. In de jaren hierop volgend is binnen de hartrevalidatie het belang benadrukt van psychosociale factoren. Dankzij het herkennen van risicofactoren voor het krijgen van coronairlijden werd langzamerhand de waarde van secundaire preventie herkend.

Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkelingen in Nederland: deze beginnen bij de oprichting van de Revalidatie Commissie van de Nederlandse Hartstichting in 1965. Een jaar later verschijnt een rapport met aanbevelingen over hoe hartrevalidatie in Nederland aan te pakken. In 1970 wordt officieel gestart met hartrevalidatie in 5 centra. Na gunstige ervaringen komt er een financieringsregeling en een erkenningenbeleid voor regionale revalidatie centra, met multidisciplinaire en uitgebreide behandelmogelijkheden. Enige jaren later volgt een financieringsregeling voor afdelingen met alleen fysieke reconditionering. Aangekomen in de tachtiger en negentiger jaren zien we dat nagenoeg het hele land voorzien is met revalidatie faciliteiten, echter er is geen eenduidigheid van organisatie van de revalidatie. Verder is wel min of meer duidelijk welke onderdelen revalidatie dient te bevatten, maar de indicatiecriteria zijn onvoldoende duidelijk geformuleerd.

Vervolgens wordt ingegaan op de doelstellingen van revalidatie. In hoofdlijnen zijn deze: (a) herstel van functioneren in fysiek, sociaal en psychologisch opzicht en (b) beïnvloeding van cardiovasculaire risicofactoren. Daarna wordt beschreven dat het gehele revalidatietraject opgedeeld kan worden in drie fasen, namelijk de opnamefase, de fase aansluitend aan het ontslag uit het ziekenhuis en de nazorgfase elk met hun eigen prioriteiten en doelstellingen. Vervolgens worden de revalidatiegeneeskundige begrippen stoornis, beperking en handicap belicht en in relatie gebracht met coronaire hartpatiënten. Tot slot worden de probleemstellingen geformuleerd die in deze dissertatie zullen worden besproken. Hartrevalidatie blijkt zich in de praktijk divers ontwikkeld te hebben door allerlei lokale initiatieven. De belangrijkste doelstelling van het onderzoek

is dan ook geweest om deze verschillen (en overeenkomsten) zo precies mogelijk in kaart te brengen. Welke ontwikkelingen zijn er geweest vanaf de start van de revalidatie. Hierbij is ook aandacht besteed aan de ontstane financieringsregelingen. Verder is nagegaan welke soorten instellingen en organisaties zich richten op hartrevalidatie, welke behandelonderdelen er worden gegeven, welke disciplines bij de revalidatie betrokken zijn, welke patiënten met welke kenmerken al dan niet gerevalideerd worden. De cijfers zouden gebruikt kunnen worden om het gevoerde beleid en de concrete gang van zaken te toetsen aan de doelstellingen van revalidatie, revalidatiegeneeskundige opvattingen, beleid van de overheid, en het beleid van de Nederlandse Hartstichting. Tenslotte was van belang te weten hoe de ontwikkelingen in Nederland zich verhouden tot de rest van de wereld.

In *hoofdstuk 2* (Literatuuronderzoek) wordt een literatuursurvey uitgevoerd naar inventarisatieprojecten betreffende hartrevalidatie in binnen- en buitenland. Op de eerste plaats wordt nagegaan hoe de stand van zaken van de hartrevalidatie in Nederland en in het buitenland is. Op de tweede plaats wordt geïnventariseerd welke methoden er in de diverse onderzoeken zijn gebruikt.

In Nederland blijkt het meeste onderzoek (7 projecten) te zijn verricht van relatief goede kwaliteit. Uit het buitenland zijn in totaal 9 studies bekend die de revalidatie in een land of streek hebben geïnventariseerd: 3 uit (voormalig) West-Duitsland, 1 uit Engeland, 1 uit Italië, 2 uit de Verenigde Staten, 1 uit Canada en 1 uit Australië. In Nederland wordt de hartrevalidatie in vrijwel alle ziekenhuizen al tijdens opname gestart. In het buitenland is dat lang niet altijd het geval. In de praktijk blijkt hartrevalidatie nagenoeg synoniem te zijn met fysiotherapie.

Hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis is veruit de meest onderzochte fase, zowel in binnen- en als buitenland. Ook hier blijkt fysieke training het centrale element te zijn. In een deel van de instellingen wordt daarnaast al dan niet systematische professionele psychosociale zorg aangeboden. Slechts in weinig instellingen worden systematische therapieën aangeboden gericht op secundaire preventie. Nederland is in verhouding met het buitenland actiever op de laatstgenoemde twee onderdelen van revalidatie.

Er zijn in Nederland drie typen afdelingen beschikbaar: afdelingen voor klinische revalidatie, revalidatiedagbehandelingsafdelingen en afdelingen voor fysieke reconditionering. In het buitenland is er over het algemeen veel minder variatie. Tevens is in Nederland een redelijke geografische spreiding van deze faciliteiten, terwijl in het buitenland, behalve West-Duitsland, de faciliteiten geconcentreerd zijn in en rondom de grote steden. Wat betreft de nazorgfase is er onderzoek bekend uit Nederland en West-Duitsland. Ook in deze fase staan de fysieke cq sportactiviteiten centraal. Beide landen zijn ruimschoots voorzien van sportclubs.

Tenslotte wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de onderzoeksmethoden. De enquête is de meest gebruikte onderzoeksmethode om data te verzamelen. Deze onderzoeksmethode is een geschikt middel om een globaal inzicht te verkrijgen. Niettemin heeft de enquête ook zijn nadelen: er worden in het algemeen retrospectieve gegevens verzameld en de data kunnen subjectief gekleurd zijn, aangezien ze verstrekt worden door de afdelingen zelf. Vandaar dat in het onderzoek van deze dissertatie ook gebruik gemaakt wordt van

prospectieve gegevensverzameling, namelijk door middel van de individuele patiënten-registratielijst.

In *hoofdstuk 3* (Mobilisatie tijdens opname in het ziekenhuis) worden de resultaten beschreven van het onderzoek dat gedaan is naar de revalidatie tijdens de opnamefase. Hiertoe is eenmalig een enquête naar 151 ziekenhuizen gestuurd. De respons was slecht (37%).

Op de tweede plaats werd met behulp van de individuele registratielijsten per patiënt data verzameld in 15 ziekenhuizen, hetgeen gegevens opleverde van 4375 patiënten. In totaliteit blijkt dit een waarschijnlijk betrouwbaar beeld op te leveren van de revalidatie tijdens opname. Fysiotherapie werd gegeven in bijna alle ziekenhuizen, aan het merendeel van alle patiënten! De meest betrokken disciplines waren de cardioloog, verpleegkundige en fysiotherapeut en in mindere mate maatschappelijk werker. De fysiotherapie startte meestal na enkele dagen na de opname. Gemiddeld kregen de patiënten 9 sessies fysiotherapie, één behandeling per dag. 10% van de patiënten haakte voortijdig af met het mobilisatie programma. Iets meer dan de helft van alle ziekenhuizen gaf aan een inspanningstest te doen tijdens opname of direct na ontslag. Slechts een kwart van alle patiënten kreeg zo'n test daadwerkelijk. Systematische voorlichting aan patiënten en partners ontbrak nagenoeg geheel. In de meerderheid van de ziekenhuizen bestond de mogelijkheid een maatschappelijk werker of een klinisch psycholoog te consulteren; ook was vaak een diëtiste beschikbaar. Echter in de praktijk werden deze disciplines slechts incidenteel en bovendien meestal op ad hoc basis ingezet.

In vergelijking met Australië, het enige andere land waarvan cijfers over de revalidatie tijdens opname bekend zijn, is in Nederland de revalidatie tijdens opname veel meer verspreid over het land.

In *hoofdstuk 4* (Revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis) worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis. In de periode 1986-1989 zijn er jaarlijks enquêteformulieren opgestuurd naar alle toentertijd bekende instellingen die een of andere vorm van hartrevalidatie na ontslag gaven. Vrijwel alle instellingen zijn met behulp van de enquête tenminste eenmaal bereikt. Tevens heeft in 1987/88 een mondeling interview plaatsgevonden. Op de derde plaats hebben 15 afdelingen met behulp van de individuele patiëntenregistratielijst ook gegevens verzameld over deze periode, hetgeen in het totaal 2.043 patiënten opleverde.

Bovengenoemd onderzoek levert een uitgebreid en betrouwbaar beeld op van de instellingen in Nederland die hartrevalidatie geven na ontslag uit het ziekenhuis. Hoewel in het buitenland deze revalidatiefase ook onderzocht is door diverse landen, zijn de daar verkregen gegevens beperkt van omvang en slechts beschikbaar van een paar landen; bovendien waren deze onderzoeken gemiddeld veel minder diepgaand.

Nederland kent een diversiteit aan instellingen die hartrevalidatie na ontslag geven: afdelingen voor klinische revalidatie (3 stuks), afdelingen voor revalidatiedagbehandeling (25stuks) en afdelingen voor fysieke reconditionering, met of zonder een beperkt psychosociaal programma (87 stuks). Deze afdelingen bieden, naast medische zorg, een scala aan behandelmogelijkheden. In alle afdelingen wordt een groepsfysiotherapie programma gegeven, dat gemiddeld 3 maanden duurt en gemiddeld 26 sessies omvat;

in een klein deel van de instellingen bestaat de mogelijkheid voor een individueel aangepast fysiek programma. In de meeste instellingen kan een inspanningstest gedaan worden, waarvan overigens relatief weinig gebruik gemaakt wordt. Psychologische vragenlijsten worden weinig toegepast. In tweevijfde van de instellingen wordt een groepsprogramma gegeven, dat gericht is op voorlichting en verandering van risicogedrag; deze programma's zijn echter zeer divers wat betreft aantal sessies, inhoud en deelnemende disciplines. Individuele consulten van maatschappelijk werker en klinisch psycholoog zijn in de meeste instellingen mogelijk, echter de mate waarin deze disciplines geraadpleegd worden, variëren in hoge mate per instelling. Hetzelfde geldt voor individuele consultatie van de diëtist.

In vergelijking met het buitenland, zijn er in Nederland relatief veel revalidatiefaciliteiten. In principe zijn in Nederland alle typen instellingen en behandelonderdelen aanwezig voor een adequate aanpak van hartrevalidatie na ontslag. De geografische verdeling en beschikbaarheid van de verschillende revalidatievormen is echter niet geheel optimaal. Daar komt bij dat een gerichte indicatiestelling en dus verwijzing ontbreekt. Herordening en systematische indicatiestelling is noodzakelijk, omdat verwijzing naar de verschillende typen revalidatie nu teveel op basis van locale interpretatie plaatsvindt. Tevens varieert het percentage patiënten dat gerevalideerd wordt sterk van centrum tot centrum. Krijgen patiënten revalidatie dan houdt dat meestal een standaard therapievorm in. Het percentage deelnemers aan de andere behandelvormen varieert in hoge mate. Debet hieraan is dat het doel van revalidatie onvoldoende duidelijk geformuleerd is en de huidige financiële structuur niet adequaat is.

In *hoofdstuk 5* (Nazorg) worden de resultaten beschreven van de enquête die in 1990 is gehouden om de nazorgactiviteiten in kaart te brengen. Formulieren werden gestuurd naar alle instanties en patiëntenverenigingen waarvan bekend was dat ze nazorgactiviteiten gaven aan hartpatiënten (203 stuks). Dit leverde een hoge respons op van 91%, hetgeen impliceert dat het onderzoek een betrouwbaar beeld oplevert van de patiëntennitiatieven in Nederland.

Er is een diversiteit aan instanties die nazorgactiviteiten aanbiedt: allereerst zijn er de trimclubs en patiëntenverenigingen, die al dan niet onder een regionale of landelijke koepel vallen. Op de tweede plaats bieden de Landelijke Vereniging Thuiszorg en de Hartenark groepsvoorlichtingsprogramma's aan voor (ex)hartpatiënten en hun partners. De trimclubs bieden allerlei soorten recreatiesport aan. De patiëntenverenigingen bieden naast sport ook andere mogelijkheden aan: voorlichtingsgroepen, emotionele ondersteuning door lotgenoten, ontspannings- en vrijetijds activiteiten en tenslotte individuele- en collectieve belangenbehartiging.

De financiering bestaat voornamelijk uit contributie en bijdragen van leden en deelnemers, in een aantal gevallen aangevuld met subsidies van bijvoorbeeld de overheid. De nazorgactiviteiten blijken nog onvoldoende wasdom te hebben bereikt, hetgeen tot uitdrukking komt in: de ongelijke landelijke verdeling, de sterk wisselende organisatiegraad en het sterk variërende type hulp dat geboden wordt. Sportactiviteiten zijn breed beschikbaar. Zorg gericht op psychosociale problematiek en secundaire preventie zijn zeer beperkt beschikbaar. Sturing en afstemming op organisatorisch niveau is dan ook,

regionaal en landelijk, zinvol. Ook dient de doorverwijzing naar nazorginitiatieven verbeterd te worden.

West-Duitsland is het enige andere land dat zijn nazorgactiviteiten geïnventariseerd heeft. Ook dit land is ruim voorzien van trim- en sportgroepen. Van andere nazorgactiviteiten is weinig bekend.

In *hoofdstuk 6* (Algemene discussie) worden op de eerste plaats de gebruikte onderzoeksmethoden geëvalueerd. Kanttekeningen worden geplaatst bij de methoden van gegevensvergaring, hetgeen waarschijnlijk een wat rooskleurig beeld heeft opgeleverd. In toekomstig onderzoek zou dit ondermeer ondervangen kunnen worden door ook patiënten te betrekken bij de dataverzameling en alle gegevens prospectief te verzamelen. Doordat de gegevens voornamelijk verzameld zijn door een discipline, namelijk de fysiotherapeut, is te verwachten dat er hiaten zijn opgetreden. In de toekomst zou dit ondervangen kunnen worden door het hele team bij de dataverzameling te betrekken.

Op de tweede plaats worden de in dit onderzoek gevonden data kritisch geëvalueerd en besproken. De nadruk ligt op de opnamefase en vooral de revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis. Fysiotherapie is het meest voorkomende onderdeel van revalidatie. De overige onderdelen, psychosociale zorg en secundaire preventie, worden relatief weinig en weinig systematisch toegepast. Hierbij speelt een belangrijke rol dat er onder professionals onvoldoende overeenstemming is over hoe deze zorg aan te pakken; verder is de financiële structuur niet adequaat.

Er wordt gepleit voor een selectievere indicatiestelling voor hartrevalidatie: idealiter zou iedere patient tijdens opname of vlak na ontslag gescreend moeten worden, zodat een individueel toegesneden revalidatiepakket kan worden samengesteld. De ziekenhuizen dienen een basispakket in huis te hebben: fysieke groepstraining, groeps voorlichtingsprogramma, individuele consultering van diëtiste, maatschappelijk werker en klinisch psycholoog. Voor meer complexe revalidatie kan worden doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum, alwaar de patiënt in de vorm van revalidatiedagbehandeling of klinische revalidatie behandeld kan worden. Professionals dienen dan tot overeenstemming te komen over de indicatiestelling en type zorg. Tevens dient de financiële structuur aangepast en dus flexibeler te worden. Er worden aanbevelingen gegeven hoe dit in de praktijk budget neutraal gerealiseerd zou kunnen worden.

Summary

This thesis describes research into cardiac rehabilitation in the Netherlands. The reported data were gathered between 1987 and 1991 within the framework of "The Registration Project" from the Rehabilitation Committee of the Dutch Heart Association.

Chapter 1 (Introduction and problem definition) begins by describing international developments in cardiac rehabilitation. It starts with developments prior to 1950, a period when long bedrest was considered to be necessary for myocardial infarction patients. This policy was changed by two events: the application of the "chair treatment" during the recovery phase and the use of exercise tolerance testing to assess employment suitability after infarction. These developments resulted in a one-sided emphasis on physical condition training in the sixties and seventies. In later years, the importance of psychosocial factors was emphasized during cardiac rehabilitation. Thanks to the recognition of risk factors that can lead to coronary heart diseases, the value of secondary prevention began to be recognized.

Next, cardiac rehabilitation developments in the Netherlands are described. This began with the foundation of the Rehabilitation Committee of the Dutch Heart Association in 1965. One year later, a report was published with recommendations about how to deal with cardiac rehabilitation in the Netherlands. Cardiac rehabilitation officially started in 1970 in 5 centres. After positive experiences, financial guidelines and license policies were established for regional rehabilitation centres with multi-disciplinary and comprehensive treatment facilities. Some years later, financial guidelines were established for departments who only offered physical reconditioning. During the eighties and nineties, rehabilitation centres were established in nearly all parts of the country. This expansion however, took place without a clear policy on how to organize rehabilitation. Although the components needed for rehabilitation were relatively well known, the indication criteria were not well formulated.

The aims of cardiac rehabilitation are discussed next. The main aims are: (a) the restoration of physical, social and psychological functioning, and (b) influencing cardiovascular risk factors. There after, the whole revalidation period will be discussed. This period can be divided into three phases: the admission phase, the phase immediately after hospital discharge and finally the maintenance phase, each with their own priorities and aims. Next, the rehabilitation medical terms impairment, disability and handicap are brought into relation with coronary patients. Finally, the problem situation will be formulated which will be discussed in this thesis. In practice, cardiac rehabilitation developed into many directions due to the diversity of local initiatives. The most important aim of this research is therefore to investigate these diversities (and possible similarities) as accurately as possible. What are the developments in rehabilitation and how did financial

guidelines evolve? An investigation will be made in the type of institutions and organisations involved with rehabilitation, the kind of treatment given, which disciplines are involved with rehabilitation and which patients with which characteristics are being rehabilitated.

This data could be used to test the chosen policy and procedures to see if it meets the aims and medical concepts of rehabilitation and the policies of both the government and the Dutch Heart Association. Finally, it is important to know how the developments in the Netherlands compare to the developments in the rest of the world.

In *Chapter 2* (Literature survey) a literature survey is done that lists cardiac rehabilitation projects in the Netherlands and abroad. The state of cardiac rehabilitation in the Netherlands and abroad is investigated first and then the research methods used in the research projects will be listed. The Netherlands appears to have done the most research projects (7) of relatively good quality. Nine studies from abroad are known to have investigated cardiac rehabilitation in a country or district: 3 from (former) West Germany, 1 from England, 1 from Italy, 2 from the United States, 1 from Canada and 1 from Australia.

Cardiac rehabilitation already starts at hospital admission in most hospitals in the Netherlands. This is not always the case abroad. In practice cardiac rehabilitation is almost synonymous with physiotherapy. Cardiac rehabilitation after hospital discharge is the most researched phase in both the Netherlands and abroad. Also here physiotherapy appears to be the central element. Some institutions offer systematic professional psychosocial care and only a few institutions offer systematic therapy based on secondary prevention. Compared to other countries, the Netherlands is most active on the last two mentioned components of rehabilitation.

There are three types of rehabilitation departments in the Netherlands: clinical rehabilitation, polyclinical rehabilitation and physical reconditioning departments. Outside the Netherlands there is in general much less variation. In the Netherlands, the facilities are relatively well spread geographically whereas abroad, except in (former) West Germany, the facilities are concentrated around the big cities. Research is known in the Netherlands and Germany regarding the maintenance phase. Also in this phase the physical/sports activities are central. Both countries are well provided with sports facilities.

Finally, in this chapter research methods are discussed. The use of questionnaires is the most used research method to gather data and is a suitable method to gather a general view. Nevertheless, questionnaires have their disadvantages. They are based on data that are collected retrospectively and which could be used subjectively since data are collected by the departments themselves. For this reason, prospective data gathering is also used for this thesis using individual patient registration lists.

In *Chapter 3* (Mobilization during hospital admission) the results from research carried out on rehabilitation during the admission phase will be discussed. For this purpose, a one-time questionnaire was sent to 151 hospitals. The response from hospitals was limited (37%). In addition, data from patient registration lists were collected from 15 hospitals which resulted in data from 4375 patients.

Generally this seems to give reliable information about rehabilitation during the admission stage. Physiotherapy was given in nearly all hospitals and to the majority of patients. The closest concerned disciplines were cardiologists, nurses and physiotherapists and to a lesser extent, social workers. Physiotherapy usually started a few days after admission. On average patients received 9 physiotherapy sessions, one per day. About 10% of patients stopped early with the mobilisation program. Slightly more than half of the hospitals indicated that they gave patients exercise tests during admission or immediately after their discharge. Only a quarter of the patients actually did these exercise tests. Patients and their partners hardly received any secondary prevention. Social workers, clinical psychologists and often a dietician could be consulted in most hospitals, but in most practical cases these disciplines were incidental and usually consulted on an ad hoc basis. Compared to Australia, the only other country with known data about rehabilitation during the admission stage, rehabilitation during admission is far more wide spread in the Netherlands.

In *Chapter 4* (Rehabilitation after discharge from hospital), research about rehabilitation after discharge from hospital will be discussed. Questionnaires were sent annually to all institutions known to have cardiac rehabilitation after hospital discharge in the period 1986 to 1989. Nearly all the institutions were contacted at least once with the questionnaire. Verbal interviews took place in 1987/88. Also in this period, 15 departments collected data from individual patient forms which provided data from 2043 patients.

The above mentioned research produced a reliable picture about cardiac rehabilitation after hospital discharge in Dutch institutions. Although this rehabilitation phase was also investigated abroad, data was usually limited and only available in a few countries. In addition, research was more restricted. The Netherlands know many types of institutions that give cardiac rehabilitation after discharge from hospital: departments for clinical rehabilitation (3), departments for policlinical rehabilitation (25) and departments for physical reconditioning with or without a limited psychosocial programme (87).

These departments offer, besides medical care, many treatment possibilities. In all departments, a group physiotherapy programme lasting three months on average with an average of 26 sessions is given. In some institutions there is a possibility for an individual adapted physiotherapy programme. In most institutions an exercise tolerance test can be done, of which relative little use is made. Psychological questionnaires are used seldomly. In two fifth of the institutions a group programme aimed at providing information and changing riskbehavior is given. These programmes nevertheless are very diverse in the number of sessions, content and participating disciplines. In most hospitals, individual consultations by social workers and clinical psychologists are possible. However, the degree to which these disciplines are consulted varies much per institution. The same applies for individual consultation by dieticians.

In contrast to other countries, there are relatively many rehabilitation facilities in the Netherlands. In principle the Netherlands has all types of departments and programme components available for an adequate approach to cardiac rehabilitation after discharge. Nevertheless, the geographical distribution and availability of the diverse types of rehabilitation is not wholly optimal. Additionally, an appropriate indication and therefore referral is absent. Reshuffling and systematic indication is necessary because referral

to the diverse types of rehabilitation is now based to much on local interpretation. Also there is a large variation in the percentage of patients who are rehabilitated from centre to centre. Standard therapy is normally used when patients are rehabilitated. The percentage of participants to other treatment components varies to a high degree. This is partly due to the fact that the aim of rehabilitation is not clearly formulated and that the present financial structure is not adequate.

In *Chapter 5* (After-care) the results of the questionnaire which was held to investigate activities in the maintenance phase will be described. Questionnaires were sent to all those resorts and patient organizations known to have after-care activities to ex-patients (203). This resulted in a high response of 91%, which implies that this research produced a reasonably reliable view of patient initiatives in the Netherlands.

There are many kinds of resorts which give after-care activities: firstly there are the sports clubs and patient organizations, which sometimes fall under a regional or national organization. Secondly there are the semi-health care organizations and the Heart Foundation that give secondary prevention programmes for ex-patients and their partners. The sportsclubs offer several kinds of recreational sports. The patient organizations offer besides sports also other facilities such as: secondary prevention programs, emotional support by fellow-sufferers, relaxation and free-time activities, and finally individual and collective promotion of interests. The financing consist mainly of subscription fee and contribution by members and participants. In some cases they are supplemented by grants from authorities.

The after-care services appear to have reached insufficient growth. This is expressed in the uneven national distribution, the strong varying degree of organization and the strong varying type of help that is offered. Sports activities are widely available. Services for psychosocial problems and secondary prevention are very limited. Regional as well as national guiding and fine-tuning on an organizational level is therefore meaningful. Also referrals to after-care services needs to be improved. (Former) West-Germany is the only other country that has investigated its after-care activities and has many sportsclubs. Little is known about other facilities in this phase.

In *Chapter 6* (General discussion) the research methods that were used, are evaluated. Critical notes are made on the data gathering methods, which probably have produced a somewhat optimistic view. In future research this can be anticipated by also involving patients in data gathering as well as gathering all data prospectively. Since data are mainly gathered by one discipline, namely the physiotherapist, it can be expected that omissions appear. In future, this could be anticipated by involving the whole team in the data gathering process.

Secondly, the data found in this research are critically evaluated and discussed. The emphasis will be on the admission phase and especially on the rehabilitation after hospital discharge. Physiotherapy is the most frequently occurring component of rehabilitation. The other components, psychosocial services and secondary prevention, are applied relatively seldom and not systematically. The fact that there is insufficient consensus among professionals about how this care is set about plays an important role. Also, the financial structure is not adequate.

A more selective indication for cardiac rehabilitation will be pleaded for: in the ideal situation each patient should be screened during his stay in hospital or immediately after discharge, so that an personally adjusted rehabilitation packages can be composed. The hospitals should provide a basic package: a physical group training, a secondary prevention group program as well as individual consultation by a dietician, social worker and clinical psychologist. For more complex rehabilitation the patient can be referred to a specialized rehabilitation centre, where he can be treated either policlinically or clinically. Professionals should reach consensus on the indication and the type of care. Also the financial structure should be adjusted for more flexibility. There will be given recommendations about how to realize this in practice without additional budget.

Literatuurlijst

- Appels A (ed). Psychologische risicofactoren voor het hartinfarct. Alphen aan den Rijn: Stafleu, 1983.
- Aquarius C & Smit M. Verslag van een inventarisatie van de mogelijkheden van hartrevalidatie in Nederland door middel van een postale enquête. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, 1980.
- Bangma BD. Revalidatie Geneeskunde: methodologie en praktische uitvoering. PAOG. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1986.
- Bangma BD. Revalidatie van patiënten met een hartinfarct. Medisch Contact 1987;42:81-84.
- Bangma BD & Kap A. Inleiding revalidatie geneeskunde: patiëntgericht hulpverleners. Assen: Van Gorcum, 1988.
- Bär FW, Vonken H & Cluytmans J. Cardiac rehabilitation at the rehabilitation centre "Hoensbroeck". Netherlands Journal of Cardiology 1988;1:27-28.
- Bär FWHM & Vonken HJM. Wat is het nut van hartrevalidatie? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1990;134:107-112.
- Bär FW, Höppener P, Diederiks J, Vonken H, Bekkers J, Hoofd vd W, Appels A & Wellens HJJ. Cardiac rehabilitation contributes to the restoration of leisure and social activities after myocardial infarction. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 1992;12:117-125.
- Begeleidingscommissie Hartchirurgie. Zorg om het hart. Hartchirurgie in de tachtiger jaren. Raming van de behoefte voor 1990 en 1991. Een rapport van de Begeleidingscommissie Hartchirurgie Nederland aan de Minister en Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Utrecht: Hart-long Instituut, Academisch Ziekenhuis Utrecht, 1989.
- Bonjer FH. Revalidatie van patiënten met hartaandoeningen. Mens en Onderneming 1968;21:342-344.
- Blomqvist CG. Use of exercise testing for diagnostic and functional evaluation of patients with arteriosclerotic heart disease. Circulation 1971;64:1120-1136.
- Bruggemans E, Elderen T van & Maes S. Psychosociale effecten van een lange-termijn sportprogramma voor coronaire hartpatiënten. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, 1986.
- Cantwell JD. Coronary prevention and rehabilitation in selected countries. In: Pollock ML, Schmidt DH. Heart disease and rehabilitation. Boston: Houghton Mifflin Professional Publishers, 1979.
- Centraal Begeleidings Orgaan voor de intercollegiale toetsing. De inbreng van de klinisch psycholoog bij de behandeling van coronaire hartpatiënten. Utrecht: 1992.
- Collins R, Yusuf S & Peto R. Exercise after myocardial infarction reduces mortality: evidence from randomized controlled trials. Journal of the American College of Cardiologists 1984;3:622-627.
- Coronary Prevention Group. Guidelines for setting up and running a cardiac rehabilitation programme. London, 1989.

- Dam R van & Boer A. Ervaringen met een hartrevalidatieprogramma in een samenwerking tussen het St Radboudziekenhuis en het Revalidatiecentrum St Maartenskliniek te Nijmegen. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* 1985;129:1856.
- Davidson DM & DeBusk RF. Prognostic value of a single exercise test 3 weeks after uncomplicated myocardial infarction. *Circulation* 1980;61:236-242.
- Davidson C, Green V & Stansfield B (eds). Cardiac Rehabilitation in the United Kingdom 1985/86. A questionnaire survey. In: *Recovering from a heart attack or heart surgery (conference proceedings)*. Report of a conference organised by the Coronary Prevention Group (12th and 13th october 1988), London, 1988.
- Denolin H. Rehabilitation as part of comprehensive care. In: Kallio V & Cay E (eds). *Rehabilitation after myocardial infarction. The european experience*. Copenhagen: World Health Organization, 1985.
- Diederiks JPM. *Herstel en revalidatie na hartinfarct (proefschrift)*. Maastricht, 1982.
- Dixhoorn J van, Bär FWHM, Erdman RAM & Keulen AMA van. Cijfers en beschouwingen over poliklinische hartrevalidatie: een inventarisatie. *Hartbulletin* 1988;19:11-22.
- Dixhoorn J van. Hartrevalidatie: een terugblik. *Hartbulletin* 1990;21:35-39.
- Dixhoorn J van. Relaxation in cardiac rehabilitation. A randomized controlled clinical trial of breathing awareness as a relaxation method in the rehabilitation after myocardial infarction. Rotterdam: Universiteits Drukkerij, 1991.
- Editorial. Myocardial infarction then and now. *Lancet* 1974;1:395-396.
- Elderen T van & Maes S. The effects of a psycho-educational group intervention during cardiac rehabilitation. *International Journal of Rehabilitation Research* 1988;11:302-303.
- Elderen TMT van. *Health Education in Cardiac Rehabilitation*. Leiden: DSWO Press, 1991.
- Erdman RAM. MPVH: Medisch Psychologische Vragenlijst voor Hartpatiënten (handleiding). Lisse: Swets & Zeitlinger, 1982.
- Erdman RAM & Dixhoorn J van. Verslag van het derde wereldcongres over hartrevalidatie, Caracas, october 1985. *Hartbulletin* 1987;18:18-20.
- Erdman RAM & Weeda HWH. Vierde wereldcongres hartrevalidatie, Broadbeach, Australië, october 1988. *Hartbulletin* 1989; 20:78-81.
- Fioretti P, Simoons ML, Zwiers G, Baardman T, Brower RW, Kazemir M & Hugenholtz PG. Value of predischarge data for the prediction of exercise capacity after cardiac rehabilitation in patients with recent myocardial infarction. *European Heart Journal*, 1987; 8 supplement G:33-38.
- Fioretti P, Baardman T, Brower RW & Hugenholtz PG. Hemodynamic measurements during the acute phase of myocardial infarction: implications for prognosis and cardiac rehabilitation. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation* 1988;8 265-269.
- Federatie van Nederlandse Verenigingen voor Voor- en Nazorg bij Hartziekten. *Adressengids*. Zoetermeer 1990.
- Frasure-Smith N & Prince R. The ischemic heart disease lifestress monitoring program: impact on mortality. *Psychosomatic Medicine* 1985;47:431-444.
- Friedman M, Thoresen CE, Gill JJ, Ulmer D, Powell LH, Price VA, Brown B, Thompson L, Rabin DD, Breall WS, Bourg E, Levy R & Dixon T. Alteration of type A behavior and its effect on cardiac recurrences in post myocardial infarction patients: summary results of the recurrent coronary prevention project. *American Heart Journal* 1986;112:653-665.

- Froelicher VF, Battler A & McKinnan MD. The use of exercise testing to evaluate patients in cardiac rehabilitation. In: Pollock ML & Schmidt DH. Heart disease and rehabilitation, Boston: Houghton Mifflin Professional Publishers, 1979.
- Gentry WD & Williams RB (eds). Psychological aspects of myocardial infarction and coronary care. Saint Louis: The C.V. Mosby Company, 1975.
- Giordano A. Lo stato della riabilitazione del cardiopatico in Italia. *Giornale Italiano di Cardiologia* 1989.
- Gleichmann U, Mannebach H & Halhuber C. Die aktuelle Situation in den ambulanten Koronargruppen der Bundesrepublik Deutschland: Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage. *Zeitschrift für Kardiologie* 1983;72:418-425.
- Gosselink KJM. Hartrevalidatie, een kostenstudie. Doctoraal-scriptie Faculteit der Gezondheidswetenschappen. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1989.
- Green V, Stansfield BJ & Davidson C. Cardiac Rehabilitation in the United Kingdom 1985/86. A questionnaire survey. *Physiotherapy* 1988 (august).
- Groden BM, Semple T & Shaw GB. Cardiac Rehabilitation in Britain 1970. *British Heart Journal* 1971;33:756-758.
- Gutker de Geus S. Klinische fysiotherapie bij hartpatiënten. *Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie* 1988;98:264-267.
- Harrison TR. Abuse of rest as a therapeutic measure for patients with cardiovascular disease. *JAMA* 1944;125:1075-1077.
- Hellerstein HK. Cardiac rehabilitation: a retrospective view. In: Pollock ML & Schmidt DH (eds). *Heartdisease and rehabilitation*. New York: J. Wiley, 1986.
- Hart In Beweging. De oprichting van een recreatie-sportgroep voor (ex)hartpatiënten: wie, wat, waar, hoe. Bilthoven, 1989(a).
- Hart In Beweging. Beleidsplan 1989. Bilthoven, 1989(b).
- Hillebrand A & Vermeulen A. Ervaringen met begeleiden van bejaarde hartpatiënten na de acute fase. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* 1981;125:1869-1873.
- Jetté M, Landry F & Blumchen G. Cardiac Rehabilitation in the Federal Republic of Germany: Klinik Roderbirken. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation* 1988;9:341-349.
- Kazemier M. Capri Rotterdam: cardiologische revalidatie in groepsverband. *Hartbulletin* 1979;10:6.
- Klein Nulens GJ, Nauta ILD, Saxena PR & Weel C van. *Het Cardiovasculair Formularium 1991: Een praktische leidraad*. Rotterdam: Pharmad Publishing, 1991.
- König K & Denolin H (eds). Psychological problems in cardiac rehabilitation. Zurich: Council on Rehabilitation of the International Society of Cardiology, 1976.
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Brief dd 20 juni 1990.
- Kromme de-van der Klis IL. Psychosociale factoren rondom hartinfarct. *Cordiaal* 1982;3:59-62.
- Leeuwen M van, Gercama J & Sorber H. Gespreksbijeenkomsten voor hartpatiënten. Verslag Landelijk Project Hartgroepen. Bunnik: Nationale Kruisverenigingen, 1986.

- Levine SA & Lown B. The "chair" treatment of acute coronary thrombosis. *Trans Association of American Physicians* 1951;64:316-327.
- Lindvall K, Erhardt LR, Lundman T, Rehnqvist N & Sjögren A. Early mobilization and discharge of patients with acute myocardial infarction: a prospective study using risk indicators and early exercise tests. *Acta Medica Scandinavica* 1979;206:169-175.
- Landelijk Medische Registratie/Stichting Informatie Gezondheidszorg. Jaarboek ziekenhuizen 1988. Utrecht, 1989.
- Lorsheyd JGG. Enkele kengetallen van algemene en academische ziekenhuizen 1989 (nr. 90.475). Utrecht: Nationaal Ziekenhuis Instituut, 1990.
- Maeland JG & Havik OE. The effects of an in-hospital educational programme for myocardial infarction patients. *Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine* 1987;19: 57-65.
- Maes S, Foreest M van, Smulders M, Elderen T van & Bruggemans E. Voorlichting aan coronaire hartpatiënten. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, 1986.
- Maes S, Elderen T van & Bruggemans E. Effecten van voorlichting aan coronaire hartpatiënten. *Gezondheid en Samenleving* 1987;8:60-76.
- Maes S & Elderen T van. Effects of psycho-educational programmes in cardiac rehabilitation. *Netherlands Journal of Cardiology* 1988; 1:30-35.
- Mallory GK, White PD & Salcedo-Salger J. The speed of healing of myocardial infarction: a study of the pathological anatomy in seventy-two cases. *American Heart Journal* 1939;18:647-671.
- Meegdes JG. De revalidatiefunctie in revalidatiecentra en ziekenhuizen: vraag- en aanbod, patiëntenstromen, regionalisatie. Utrecht: Nationaal Ziekenhuis Instituut, 1988.
- Messin R & Demaret B. Accelerated versus classical early mobilization after myocardial infarction. *Advances in Cardiology* 1982;31:152-155.
- Meyer GC. Cardiovascular rehabilitation: a discipline in need of a new direction? (Editorial). *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation* 1985;5:507-509.
- Meijburg-Schutte JM & Meijler FL. Tweedelijns cardiale zorg. Na onderzoek van revalidatieperiode in buitenkliniek. *Hartbulletin* 1975;6:2-8.
- Meijler FL. Revalidatie na hartinfarct. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* 1973;117:1234-1236.
- Miller DH & Borer JS. Exercise testing early after myocardial infarction: risks and benefits. *The American Journal of Medicine* 1982;72:427-438.
- Miller HS, Ribisl PM, Adams GE & Boone W Th. Community programs of cardiac rehabilitation. In: ML Pollock & DH Schmidt. *Heart disease and rehabilitation*. Boston: Houghton Mifflin Professional Publishers, 1979.
- Mortel PMM van de. Vooronderzoek naar de effecten van Meer Bewegen voor Hart-Vaatpatiënten (doctoraalscriptie). Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, 1989.
- Nederlandse Hartstichting. Revalidatie van hartpatiënten. Den Haag, 1966.
- Nederlandse Hartstichting. Revalidatie van hartpatiënten in Zweden en Finland: verslag van een studiereis voor de Nederlandse Hartstichting. Arts & Verzekering 1969.
- Nederlandse Hartstichting. Revalidatie van hartpatiënten. Den Haag, 1977.
- Nederlandse Hartstichting. Hartrevalidatie...méér dan nodig. Den Haag, 1984.

- Nederlandse Hartstichting. Hartrevalidatie op maat: nieuwe visies. Den Haag, 1990.
- Nederlands Instituut van Psychologen. De inbreng van de klinisch psycholoog in de hartrevalidatie. Verslag van de Commissie Hartrevalidatie, ingesteld door de sectie Psychologen Algemene Ziekenhuizen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Amsterdam, 1990.
- Nederlands Instituut van Psychologen. De inbreng van de klinisch psycholoog bij de behandeling van coronaire hartpatiënten. Voorbereidings werkgroep ingesteld door de sectie Psychologen Algemene Ziekenhuizen. Amsterdam, 1992.
- Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Hartpatiënten. Klinische fysiotherapie bij hartpatiënten. Utrecht, 1988.
- Nationaal Ziekenhuis Instituut. Productiestatistiek Algemene Ziekenhuizen 1988 (nr 89.661). Utrecht, 1989.
- Nationaal Ziekenhuis Instituut. De intramurale gezondheidszorg in cijfers per 1 januari 1989 (nr 90.671). Utrecht, 1990.
- O'Connor GT, Buring JE, Yusuf S, Goldhaber SZ, Olmstead EM, Paffenbarger RS & Hennekens CH. An overview of randomized trials of rehabilitation with exercise after myocardial infarction. *Circulation* 1989;80:234-244.
- Oldridge NB, Guyatt GH, Fischer ME. Cardiac rehabilitation after myocardial infarction. Combined experience of randomized clinical trials. *JAMA* 1988; 260, 945-50.
- Pryor DB, Hindman MC, Wagner GS, Califf RM, Rhoads MK & Rosati RA. Early discharge after acute myocardial infarction. *Annals of Internal Medicine*. 1983;99:528-538.
- Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg. Meer bewegen voor hart- en vaatpatiënten. Sittard, 1988.
- Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Gezondheidszorg. Presentatie PSBG. Sittard, 1991.
- Rooy C de & Cornet F. Provinciale ontmoeting hart- en vaatziekten. Sittard: Steunpunt Zelfzorg Initiatieven, 1988.
- Rooymans HGM. Herkenning en behandeling van stoornissen bij verwerking van een hartinfarct. *Hartbulletin* 1979;10:3-5.
- Royal College of Physicians/British Cardiac Society. Cardiac Rehabilitation 1975. Report of a Joint Working Party of the Royal College of Physicians of London and the British Cardiac Society. *Journal of the Royal College of Physicians of London*, 1975;9:281-346.
- Schäperclaus GA, Greef de MHG & Rispens P. Secundaire preventie. Over de organisatie van sportgroepen voor (ex)hartpatiënten (SVH) en de invloed op risicofactoren voor coronaire hartziekten in Nederland en Duitsland. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Werkgroep Bewegingswetenschappen, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, 1991.
- Segev U & Schlesinger Z. Rehabilitation of patients after acute myocardial infarction; an interdisciplinary, family-oriented program. *Heart Lung* 1981;10:841-847.
- Senten MCM. Cardiologische nazorg in Nederland: een overzicht in cijfers (submitted for publication).
- Soons PHGM. De gedragstherapeutische behandeling van een hartrevalidant. N=1 studie ter verkrijging van het lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie. Nijmegen: St. Maartenskliniek, 1989.

- Soons PHGM, Bär FWHM & Mulleneers R. Registreren: waarom en hoe? Fysiovisie, 1989;9-11.
- Soons PHGM & Bär FWHM. Revalidatie van hartpatiënten tijdens opname en na ontslag uit het ziekenhuis: cijfer en trends. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1990;134:103-106(a).
- Soons PHGM & Bär FWHM. The present state of cardiac rehabilitation in the Netherlands. In: Proceedings of the 5th European Regional Conference of Rehabilitation International, Dublin/Ireland, may 20/25, 1990(b).
- Soons PHGM & Erdman RAM. Coronaire hartpatiënten. In JMH de Moor, HGG van Balen, KA Beers & LAJ de Vos. Revalidatie-psychologie. Assen: Van Gorcum, 1990.
- Soons PHGM. Organisatie en financiering. In NIP, De inbreng van de klinisch psycholoog bij de behandeling van coronaire hartpatiënten. De voorbereidingswerkgroep ingesteld door de sectie psychologen algemene ziekenhuizen van het NIP. Amsterdam: NIP, 1992.
- Soons PHGM. Hartrevalidatie. In TS Bierma (Red.) Verslag Studiedag Hartrevalidatie 16 oktober 1992 in Kasteel Vaalsbroek. Hoensbroek: Lucas-Stichting voor Revalidatie, 1993(a).
- Soons PHGM. Consensus: hulp of keurslijf? In J. Hendriksen, H. Jurjens & K Beers (Red.) Kwaliteit van zorg. Najaars-conferentie 1992, sectie Revalidatiepsychologen. Amsterdam: NIP, 1993(b).
- Soons PHGM, Groen M, Jeuken J. & Swaak-Beuken YJM. Het systeem van klinisch psychologische verrichtingen: een plannings-instrument. Eindverslag Commissie Verrichtingen ingesteld door de PAZ. Amsterdam: NIP, 1995.
- Soons PHGM. De psycholoog in de hart-thuis-zorg (in press).
- Southard DR & Broyden R. Psychosocial services in cardiac rehabilitation: a status report. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 1990;10:255-263.
- Spaan JM & Speld GDJ van der. Ziekenhuizen in cijfers (nr. 90.670). Utrecht: Nationaal Ziekenhuis Instituut, 1990.
- Stocksmeier U (ed). Psychological approach to the rehabilitation of coronary patients. International Society of Cardiology, Scientific Council on Rehabilitation of cardiac patients. Berlin: Springer Verlag, 1976.
- Stocksmeier U. Erfahrungsbericht bei der Grundung von Coronar-Clubs an Krankenhäusern. Therapiewoche 1978;28: 5382-5384.
- Straten J van. Revalidatie van de hartpatiënt. Samenvatting van het rapport uitgebracht door de Nederlandse Hartstichting. Mens en Onderneming 1968;21:345-354.
- Superko HR, Wood PD & Haskell WL. Coronary heart disease and risk factor modification. The American Journal of Medicine 1985;78:826-838.
- Thérout JP, Waters DD, Halphen C, Debaiseux JC & Mizgala HF. Prognostic value of exercise testing soon after myocardial infarction. New England Journal of Medicine 1979;301: 341-345.
- TNO. Internationale Classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps. WHO - Voorburg: Raad voor Gezondheidsresearch TNO, 1981.
- Uden MMAT van, Erdman RAM, Zoetewij MW, Verhage F, Vermeulen A & Weeda HWH. Heeft hartrevalidatie effect? Een literatuurstudie. Gedrag & Gezondheid 1986;14:153-158.
- Uniken Venema-Uden van MMAT. Hartrevalidatie: over het bepalen en voorspellen van herstel (proefschrift). Utrecht, 1990.

- Verkley H & Voorham A. Hartrevalidatie in ontwikkeling. *Gezondheid en Samenleving* 1982;2:24-34.
- Vermeulen A. Rehabilitation after myocardial infarction (proefschrift). Universiteit van Amsterdam, 1983.
- Verstappen HMCh, Pol JMJ van der & Nivelde HMF de. Enkele ervaringen bij revalidatie van patiënten met een myocardinfarct. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* 1974;118:716-721.
- Vlek JFM, Buntink F, Crebolder HFJM & Ree van JW. De rol van de huisarts bij de begeleiding van patiënten na een myocardinfarct. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* 1994;138:2049-2053.
- Vos R. De verstrekking revalidatie-dagbehandeling. Den Haag: Geneeskundige hoofdinspectie afdeling verkeersongevallen, ambulancevervoer en revalidatie, 1978.
- Vries J de. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Revalidatie en Fysische Geneeskunde. Vergadering gehouden op 26-27 oktober 1984 te Heerlen. *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* 1985;129:1852-1856.
- Waters DD, Bosch X, Bouchard A, Moise A, Roy D, Pelletier G & Thérout P. Comparison of clinical variables and variables derived from a limited predischARGE exercise test as predictors of early and late mortality after myocardial infarction. *Journal of the American College of Cardiologists* 1985;5:1-8.
- Waters DD. Exercise testing after myocardial infarction: a perspective. *Journal of the American College of Cardiologists* 1986;8:1007-1017(a).
- Waters DD. Exercise testing after myocardial infarction: a perspective. *Journal of the American College of Cardiologists* 1986;8:1018-1019(b).
- Weeda HWH & Visser JF. Revalidatie van hartpatiënten anno 1981. *Hartbulletin*, 1981;12:3-7.
- Weeda HWH. Revalidatie en secundaire preventie; een gelukkige combinatie? *Hartbulletin* 1981;12:15-16.
- Weeda HWH. Revalidatie van hartpatiënten. In: Dunning AJ, Meijler FL & Verheugt APM (eds). *Nederlands Leerboek der Cardiologie*. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1983.
- Weiner DA, Ryan TJ, McCabe CH & Chaitman BR. The role of exercise testing in identifying patients with improved survival after coronary artery bypass surgery. *Journal of the American College of Cardiologists* 1986; 8:741-748(a).
- Weiner DA. Role of exercise testing after myocardial infarction. *Journal of the American College of Cardiologists* 1986;8:1020-1021(b).
- Wenger NK. Panel II: the pros and cons of early mobilization and of the convalescent phase in rehabilitation. *Bibliotheca Cardiologica* 1977;36:45-49.
- Wenger NK. Rehabilitation of the patient with acute myocardial infarction: early ambulation and patient education. In: Pollock ML & Schmidt DH (eds). *Heart disease and rehabilitation*, Boston: Houghton Mifflin Professional Publishers, 1979.
- Wenger NK, Hellerstein HK, Blackburn H & Castranova SJ. Physician practice in the management of patients with uncomplicated myocardial infarction: changes in the past decade. *Circulation* 1982;65:421-427.
- Wenger NK. Early ambulation: the physiological basis revisited. *Advances in Cardiology* 1982;31:138-141.
- Wenger NK. Early ambulation after myocardial infarction: rational, program components and results. In: Wenger NK, Hellerstein HK, eds. *Rehabilitation of the coronary patient*. 2nd ed. New York: John Wiley, 1984.
- Wenger NK. Future directions in cardiovascular rehabilitation (Editorial). *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation* 1987;7:168-174.

- West RR & Henderson AH. Randomised multicentre trial of early mobilization after uncomplicated myocardial infarction. *British Heart Journal* 1979;42:381-385.
- World Health Organization. Rehabilitation of patients with cardiovascular diseases. Report of the WHO expert committee. Geneva, 1964.
- World Health Organization. The rehabilitation of patients with cardiovascular diseases. Report on a seminar: Noordwijk aan Zee 2-7 oktober. Copenhagen, 1967.
- World Health Organization. A programme for the physical rehabilitation of patients with acute myocardial infarction. Prepared by a working group. Freiburg-im-Breisgau, 1968.
- World Health Organization. WHO-report on Rehabilitation. Geneve, 1969.
- World Health Organization. Psychological aspects of the rehabilitation of cardiovascular patients. Report on a working group: Warsaw 28-30 may 1969. Copenhagen, 1970.
- World Health Organization. WHO Research Group. Exercise tests in the assessment of cardiovascular function. *Hartbulletin* 1972;3:45-51.
- Wiklund I, Sanne H, Vedin A & Wilhelmsson CI. Determinants of return to work one year after a first myocardial infarction. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation* 1985;5:62-72.
- Wilson PK, Edgett JW & Porter GH. Rehabilitation of the cardiac patient: program organization. In: Pollock ML, Schmidt DH. *Heart disease and rehabilitation*, Boston: Houghton Mifflin Professional Publishers, 1979.
- Wolfe LA, Herbert WG, Miller J & Miller DS. Status of cardiovascular rehabilitation in Virginia. *Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation* 1987;7:42-50.
- Wolfe LA, Dafoe WA, Hendren-Roberge EA & Goodman LS. Cardiovascular Rehabilitation in Ontario (Canada). *Journal of Cardiovascular Rehabilitation* 1990;10:130-140.
- Worcester M. Cardiac rehabilitation programmes in Australian hospitals. National Heart Foundation of Australia, 1986.
- Ziekenfondsraad. Advies inzake het besluit inzake revalidatiedagbehandeling ziekenfondsverzekering. Amstelveen, 1981.
- Ziekenfondsraad. Reconditionerende fysiotherapie (ontwerp). Amstelveen, 1985.
- Ziekenfondsraad. Rapport van de werkgroep revalidatie aan de commissie verstrekkingen van de Ziekenfondsraad inzake herstructurering van de verstrekking van revalidatie dagbehandeling. Amstelveen, 1989.

BIJLAGE I

Enquête hartrevalidatie tijdens opname

nederlandse hartstichting

vrienden van de hartstichting

sophialaan 10,
2514 JR 's-gravenhage.
telefoon 070-92 42 92.
postgiro 300.

(indien bovenstaande gegevens onjuist gaarne correctie)

HARTREVALIDATIE TIJDENS OPNAME 1988

(de enquête over revalidatie tijdens opname is nieuw dit jaar, die over revalidatie na ontslag is bijgevoegd en is nagenoeg hetzelfde als in 1987)

Doet Uw instelling aan hartrevalidatie tijdens opname?

0 ja
0 nee

DEEL I: AANTALLEN PATIENTEN

(indien geen exacte cijfers bekend gaarne schatting)

Patienten aantallen tijdens opname

Hanteert U een expliciete leeftijdsgrens:

	(aantal)
Patienten in 1988	: "
mannen	: "
vrouwen	: "
jonger dan 50 jaar	: "
tussen 50 en 70 jaar	: "
70 jaar en ouder	: "

Indicatie hartrevalidatie: (aantal)

hartinfarct		PTCA	
coronaire bypass		klepoperatie	
AP/dreigend infarct....		overige, nl	

Hoeveel patiënten voortijdig gestopt:

Om welke redenen? (aantal)

angina pectoris		PTCA	
dyspnoe		overleden	
ritmestoornissen		weigerend/desinteresse	
andere lich. klachten		overige, nl....	
hartoperatie			

Psychosociale begeleiding

(alleen zorg door maatschappelijk werk, psycholoog, andragoog en psychiater is bedoeld)

Aantal patiënten dat psychosociale begeleiding had:

Begelidingsvorm: (percentage/eventueel aantallen)

	mw	psycholoog	overige, nl....
eenmalig individueel	:		
meermalen individueel	:		
eenmalig groepsgewijs	:		
meermalen groepsgewijs	:		

Indikatie individuele begeleiding (percentage/aantallen):

standaard/routine	:
werk	:
werkattitude	:
uitkeringen/sociale regelingen	:
huisvesting	:
gezin/relatie	:
hyperventilatie	:
depressie	:
onzekerheid	:
assertiviteitsproblemen	:
stresshantering	:
verwerking/acceptatie	:
overige, nl....	:

Revalidatie na ontslag

Hoeveel patiënten komen na ontslag terug in Uw instelling voor revalidatie: (aantal)

De patiënten die niet terugkomen:

	(aantal)
0 worden doorgestuurd naar	" naar
0 geen doorverwijzing	"

DEEL II: ALGEMENE GEGEVENS

Idem aan Algemene Gegevens na ontslag: ☐ ja
☐ nee (doorgaan met invullen)

Algemene gegevens

Hartrevalidatie tijdens opname sedert :.....
 Jaarverslag ☐ ja
☐ nee

Betrokken disciplines

Revalidatieteam, aantal disciplines:
 cardioloog ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 internist ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 arts/revalidatiearts ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 fysiotherapeut(en) ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 maatschappelijk werk ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 psycholoog ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 dietiste ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 verpleegkundige ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 administratief medewerker ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 overige, nl.... ☐ op afroep
 ☐ aanwezig

Het team overlegde keer ☐ per week ☐ per maand
 ☐ geen expliciet teamoverleg
 Besproken werd: ☐ patientenvoortgang
 ☐ beleidsaspecten
 ☐ overige, nl....

Wordt er een administratie bijgehouden van patienten: ☐ ja
 ☐ nee
 Zo ja, ☐ in een boek of klapper
 ☐ in de status
 ☐ via individuele patientenlijst hartstichting
 ☐ overige, nl....

Welk teamlid houdt administratie bij

Welke testprocedures werden toegepast:

	aanvang	afsluiting	op ind.
cardiaal onderzoek	☐	☐	☐
psychosociaal interview	☐	☐	☐
psychologische vragenlijsten	☐	☐	☐
overige, nl....	☐	☐	☐
ergometrie: submaximaal	☐	☐	☐
maximaal	☐	☐	☐
vorm van ergometrie ☐ fiets ☐ loopband ☐ overige, nl....			

Fysieke programma tijdens opname

Start fysieke training:

(aantal dagen na opname)

infarctpatienten	"
operatiepatienten	"
PTCA	"
Overige, nl...	"

Het programma bestond uit:

☐ fiets	☐ loopband
☐ circuit	☐ oefenzaal
☐ ontspanningsoefeningen	☐ zwemmen
☐ sport en spel	☐ overige, nl....

Voorlichting

Voorlichtingsactiviteiten zijn: ☐ onderdeel fysiek programma
☐ apart georganiseerd

Vorm voorlichting: ☐ individueel
☐ groepsgewijs

Voorlichting over:

☐ informatie over operatie	☐ somatische aspecten
☐ informatie over infarct	☐ psychosociale aspecten
☐ risikofactoren	☐ revalidatie na ontslag
☐ voeding	☐ overige, nl....

Welke disciplines gaven voorlichting:

☐ cardioloog	☐ psycholoog
☐ revalidatie arts	☐ dietiste
☐ fysiotherapeut	☐ verpleegkundige
☐ maatschappelijk werker	☐ overige

Psychosociale begeleiding tijdens opname

Gebruikte methoden door:	mw	psycholoog	overige, nl...
Crisisinterventie	☐	☐	☐
Ondersteunend contact	☐	☐	☐
Ontspanningstherapie	☐	☐	☐
Vorm van psychotherapie	☐	☐	☐
te weten			
Groepswerk	☐	☐	☐
Overige, nl....	☐	☐	☐

OPMERKINGEN:

BIJLAGE II

Individuele patiëntenregistratielijst hartrevalidatie tijdens opname en hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

 

COMPLI C A T I E S

CARDIAAL (1=j a, 2=nee, 0=onbekend)

HARTINFARCT : [] ANGINA PECTORIS : []

GELEIDINGSSTOORNISSEN : [] RITMESTOORNISSEN : []

POMPFUNKTiestoornissen : [] REANIMATIE : []

OVERIGE : []

NIET-CARDIAAL

LONGPROBLEMEN : []

(1 = nee, 2 = CARA, 3 = atelectase, 4 = pneumonie,

5 = overige, 0 = onbekend)

NEUROLOGISCHE PROBLEMEN : []

(1 = nee, 2 = CVA, 3 = TIA, 4 = overige, 0 = onbekend)

BEWEGINGSPEBERKINGEN : [] (1 = ja, 2 = nee, 0 = onbekend)

CLAUDICATIO : []

OVERIGE COMPLICATIES : []

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

P S Y C H O S O C I A L E S I T U A T I E

ARBEIDSSITUATIE : [] (1= werk, 2= WAO, 3= AOW, 4= WW,
5= huisvrouw, 0= onbekend)

5= huisvrouw, 0= onbekend)

(EX) BEROEP : []

SOCIALE PROBLEMEN : [] (1 = ja, 2 = nee, 0 = onbekend)

PSYCHISCHE PROBLEMEN : []

BIJZONDERHEDEN : []

 

POLIKLINISCHE GEGEVENEN

```

ONTSLAGDATUM UIT ZIEKENHUIS : [ ]
REEDS REVALIDATIE TIJDENS OPNAME : [ ] (1=ja,2=nee,0=onbekend)
STARTDATUM POLIKLINISCHE FYSIEKE PROGRAMMA : [ ]
OP VERWIJZING VAN : [ ]
    (1 = eigen ziekenhuis, 2 = ander ziekenhuis, 3 = huisarts,
     4 = rest, 0 = onbekend)
CONDITIE VOOR POLIKLINISCHE REVALIDATIE : [ ]
    (1 = goed, 2 = matig, 3 = slecht, 0 = onbekend)
GEVOLGDE POLIKLINISCH FYSIEKE PROGRAMMA : [ ]
    (1 = normaal, 2 = individueel, 3 = overige, 4 = geen)
OVERIGE PROGRAMMA : [ ]
GEVOLGDE PSYCHOSOCIALE PROGRAMMA : [ ]
    (1 = normaal, 2 = individueel, 3 = geen)
DOOR : [ ]
    (1= psycholoog, 2= maatsch. werker, 3= overige, 0= onbekend)
VOORNAAMSTE REDEN : [ ]
    (1 = werk, 2 = angst, 3 = relaties, 4 = routine, 5 = overige)
CONTACT DIETISTE : [ ]
    (1 = nee, 2 = routine, 3 = specifieke indicatie, 4 = overige,
     0 = onbekend)

```

```
DEELNAME PARTNER AAN PROGRAMMA : [ ]      (1=ja, 2=nee, 0=onbekend)
-   DEELNAME PARTNER FYSIEK PROGRAMMA      : [ ]
-   DEELNAME PARTNER GROEPSGESPREKKEN      : [ ]
-   DEELNAME PARTNER VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN : [ ]
```

BIJZONDERHEDEN TIJDENS POLIKLINISCHE REVALIDATIE :

P O L I K L I N I S C H E R E V A L I D A T I E

EINDRESULTAAT FYSIEKE PROGRAMMA : []

(1 = volledig programma, 2 = beperkt programma, 3 = voor
tijdig gestopt)

REDEN STOPPEN : []

(1 = hartinfarct, 2 = operatie, 3 = PTCA, 4 = andere
cardiale klachten, 5 = andere fysieke klachten, 6 =
overleden, 7 = weigering, 8 = overige)

EINDDATUM BEWEGINGSTHERAPIE: [] AANTAL THERAPIEDAGEN: []

INDRUK VAN HERSTEL : []

(1 = normaal, 2 = vertraagd, 3 = moet afgeremd worden,
4 = moet gestimuleerd worden)

TOESTAND NA FYSIEKE PROGRAMMA : [] (1=goed, 2=matig, 3=slecht)

PSYCHISCHE PROBLEMEN : [] (1=ja, 2=nee, 0=onbekend)

SOCIALE PROBLEMEN : []

EVENTUELE PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN :

WERKHERVATTING : [] (1=ja, 2=partieel, 3=nee)

REKEN PARTIEEL OF STOPPEN WERKEN: []

(1 = ziektewet, 2 = afkeuring, 3 = overige, 0 = onbekend)

HUISHOUDELIJK WERK HERVAT : []

NORMALE ACTIVITEITEN HERVAT : []

ADVIEZEN NA ONTSLAG : [] [] [] []

(1 = sportgroep, 2 = fietsen, 3 = ontspanningstherapie,
4 = zwemmen, 5 = Hartenark, 6 = overige)

VERWEZEN VOOR VERDERE BEGELEIDING NAAR : [] []

(1 = huisarts, 2 = psycholoog, 3 = dietiste, 4 = psychiater, 5 = RIAGG, 6 = maatsch. werk, 7 = overige)

CONTROLE NA ONTSLAG DOOR : []

(1 = cardioloog, 2 = internist, 3 = huisarts, 4 = overige)

BIJLAGE III

Enquête hartrevalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

sophialaan 10,
2514 JR 's-gravenhage.
telefoon 070-92 42 92.
postgiro 300.

nederlandse hartstichting

vrienden van de hartstichting

(indien bovenstaande gegevens onjuist gaarne correctie)

HARTREVALIDATIE NA ONTSLAG 1988

DEEL I: AANTALLEN PATIENTEN

(indien geen exacte cijfers bekend, gaarne schattingen)

Algemene gegevens

Aantal patiënten in 1988:

Hanteert U een expliciete leeftijdsgrens:

mannen	(aantal)
vrouwen	 "
jonger dan 50 jaar	 "
tussen 50 en 70 jaar	 "
70 jaar en ouder	 "

Verwezen door: O eigen ziekenhuis (percentage)
O andere ziekenhuizen "
O overige, nl.... "

Indicatie hartrevalidatie: (aantal)

hartinfarct		PTCA	
coronaire bypass....		klepoperatie	
AP/dreigend infarct		overige, nl	

Hoeveel patiënten voortijdig met revalidatie gestopt:

Om welke redenen? (aantal)

angina pectoris		PTCA	
dyspnoe		overleden	
ritmestoornissen		weigering/desinteresse	
andere lich. klachten....		overige, nl....	
hartoperatie			

Psychosociale begeleiding

(alleen zorg door maatschappelijk werk, psycholoog, andragoog en psychiater is bedoeld; terugkomsuur en voorlichting tellen niet mee)

psycholoog ☐ aanwezig
 ☐ op afroep
 dietiste ☐ aanwezig
 ☐ op afroep
 verpleegkundige ☐ aanwezig
 ☐ op afroep
 administratief medewerker ☐ aanwezig
 ☐ op afroep
 overige,nl ☐ op afroep
 ☐ aanwezig
 Het team overlegde keer ☐ per week ☐ per maand
 ☐ geen expliciet teamoverleg
 besproken werd: ☐ patiënten voortgang
 ☐ beleidsaspecten
 ☐ overige, nl....

Wordt er een administratie bijgehouden van patiënten: ☐ ja
 ☐ nee
 Zo ja, ☐ in een boek of klapper
 ☐ in de status
 ☐ via individuele patiëntenlijst hartstichting
 ☐ overige,nl....

Welk teamlid houdt deze administratie bij:.....

Wie onderhoudt contact met GAK/GMD/BCG:
 ☐ revalidatiearts
 ☐ cardioloog
 ☐ maatschappelijk werk
 ☐ overige,nl....

Wat doet u als een patiënt niet komt:
 ☐ niets ☐ patiënt bellen
 ☐ cardioloog inlichten ☐ huisarts inlichten
 ☐ overige, nl....

Aktieve deelname partners aan programma: ☐ ja ☐ nee
 zo ja: ☐ gehele fysieke programma
 ☐ deel fysieke programma,nl....
 ☐ voorlichtingsbijeenkomsten (informatie
 gegeven door derden)
 ☐ groepsgesprekken (diskussie patiënten
 onderling)
 ☐ groep, combinatie voorlichting en groeps
 gesprekken
 ☐ terugkomsuur
 ☐ overige,nl....

Welke testprocedures werden toegepast:
 aanvang afsluiting op indicatie
 cardiaal onderzoek ☐ ☐ ☐
 psychosociaal interview ☐ ☐ ☐
 psychologische vragenlijsten ☐ ☐ ☐
 overige,nl.... ☐ ☐ ☐
 ergometrie: submaximaal ☐ ☐ ☐
 maximaal ☐ ☐ ☐
 vorm van ergometrie: ☐ fiets ☐ loopband ☐ overige,nl....

Fysieke programma

Start voor: (aantal weken na ontslag)

infarctpatienten	
operatiepatienten	
PTCA patienten	
overige patienten, nl....	

Programma tussen ontslag en eerste training in ziekenhuis:

0 cardiologische poli	0 oefenprogramma thuis
0 maatschappelijk werk	0 terugkomuur
0 psycholoog	0 telefoonnummer
0 overige, nl....	

Duur van de training (weken, gemiddeld):

Aantal bijeenkomsten (gemiddeld) :

Tijd per keer (aantal uren, gemiddeld) :

Het programma bestond uit:

0 fiets	0 loopband
0 circuit	0 oefenzaal
0 ontspanningsoefeningen	0 zwemmen
0 sport en spel	0 overige, nl....

Het advies na de training bestond uit:

0 sportgroep hartpatienten	0 fietsen en wandelen
0 ontspanningstherapie	0 hartenark
0 zwemmen	0 sportclub
0 adviezen voor thuis	0 overige, nl....

Voorlichting

Voorlichtingsactiviteiten: 0 onderdeel fysieke programma
 0 onderdeel terugkomuur
 0 apart georganiseerd

Vorm voorlichting: 0 individueel
 0 groepsgewijs

Voorlichting over:

0 risicofactoren	0 somatische aspecten
0 werkhervatting	0 psychosociale aspecten
0 voeding	0 overige, nl....

Welke disciplines gaven voorlichting:

0 cardioloog	0 psycholoog
0 arts/internist	0 dietiste
0 fysiotherapeut	0 overige, nl....
0 maatschappelijk werk	

Psychosociale zorg

Gebruikte methode door: psycholoog MW overige, nl....

crisisinterventie	0	0	0
ondersteunend contact	0	0	0
ontspanningsoefeningen	0	0	0
vorm van psychotherapie	0	0	0
te weten			
groepswork	0	0	0
overige, nl....	0	0	0

OPMERKINGEN:

BIJLAGE IV

Enquête nazorg hartpatiënten

nederlandse hartstichting

sophialaan 10,
2514 JR 's-gravenhage.
telefoon 070-92 42 92.
postgiro 300.

vrienden van de hartstichting

ENQUETE NAZORG HARTPATIENTEN IN NEDERLAND

(zonodig bovenstaande gegevens aanpassen)

I Organisatie

(hieronder verstaan wij stichtingen, verenigingen, instellingen
etc die activiteiten voor (ex-)hartpatiënten organiseren)

Wanneer is Uw organisatie gestart met zijn activiteiten?
(jaartal invullen)

Voor welk gebied?

- ☐ landelijk
- ☐ provinciaal, nl:.....
- ☐ regionaal, nl:.....
- ☐ plaatselijk, nl:.....

Is Uw organisatie aangesloten bij een overkoepelend orgaan?

- ☐ ja, landelijk, te weten:.....
- ☐ provinciaal, te weten:.....
- ☐ anders, nl:.....
- ☐ nee

Welke zijn de financiële bronnen van Uw organisatie?

- ☐ collectes/inzamelacties
- ☐ donaties/lidmaatschapsgelden
- ☐ inkomsten uit activiteiten
- ☐ industrie sponsoring
- ☐ subsidie van overheid
- ☐ subsidies van stichtingen
- ☐ anders, nl:.....

sophialaan 10,
2514 JR 's-gravenhage.
telefoon 070-92 42 92.
postgiro 300.

nederlandse hartstichting

vrienden van de hartstichting

Zijn deze bronnen voldoende voor het organiseren van Uw activiteiten?

- ☐ ja
☐ nee, (toelichting).....

II Patiënten/leden

Wie kunnen er lid worden van Uw organisatie?

- ☐ alle hartpatiënten
Indien niet alle:
☐ patiënten na een hartinfarct
☐ patiënten na een bypassoperatie
☐ patiënten na een klepoperatie
☐ patiënten na een harttransplantatie
☐ vaatpatiënten
☐ andere, te weten.....
☐ partners van patiënten
☐ professionals (cardiologen, fysiotherapeuten etc.)
☐ andere, te weten....
☐ niet van toepassing (onze organisatie heeft geen leden)

Hoeveel leden/donateurs heeft Uw organisatie?.....
(indien geen exacte cijfers bekend, gaarne schattingen geven)

- ☐ totaal :..... (aantal)
☐ man :..... (aantal)
☐ vrouw :..... (aantal)
☐ niet van toepassing (onze organisatie heeft geen leden)

Op welk tijdstip na ontslag uit het ziekenhuis worden patiënten toegelaten tot Uw activiteiten?

- ☐ na operatie :..... (aantal weken na ontslag)
☐ na infarct :..... (.. ..)
☐ andere groepen, te weten..... (.. ..)

sophialaan 10,
2514 JR 's-gravenhage.
telefoon 070-92 42 92.
postgiro 300.

nederlandse hartstichting

vrienden van de hartstichting

Op welke doelgroepen zijn Uw activiteiten gericht?

- ☐ alle hartpatiënten
 Indien niet alle:
 ☐ patiënten na een hartinfarct
 ☐ patiënten na een bypassoperatie
 ☐ patiënten na een klepoperatie
 ☐ patiënten na een harttransplantatie
☐ partners van patiënten
☐ professionals (cardiologen, fysiotherapeuten etc.)
☐ andere, te weten....

III Activiteiten en aantal deelnemers

(indien geen exacte cijfers bekend, gaarne schattingen geven)

Welke activiteiten werden door U georganiseerd en hoeveel mensen hebben daaraan deelgenomen in 1989?

SOORT ACTIVITEIT	AANTAL DEELNEMERS
☐ individuele voorlichting aan ex-patiënten	
☐ voorlichtingsgroepen voor patiënten	
☐ voorlichting aan gezondheidszorg instellingen	
☐ gespreksgroepen cq huiskamergronden	
☐ sport/trimmen/fitness/zwemmen	
☐ sportdagen	
☐ ontspanning/vrije tijd	
☐ individuele psychosociale begeleiding	
☐ individuele belangenbehartiging	
☐ collectieve belangenbehartiging	
☐ klachten behandeling	
☐ het uitgeven van een verenigingsblad	
☐ andere, te weten....	
☐ andere, te weten....	

Wie verzorgen de activiteiten?
 (vrijwilligers/ex-patiënten/professionals/anderen)

sophialaan 10,
2514 JR 's-gravenhage.
telefoon 070-92 42 92.
postgiro 300.

nederlandse hartstichting

vrienden van de hartstichting

Opmerkingen:

(hier kunnen onderwerpen aan bod komen die in het voorafgaande niet zijn genoemd en die naar Uw inzicht wel van belang zijn)

Slotvraag:

Wilt U zo mogelijk folders, jaarverslagen, tijdschriften, mededelingenbladen (laatste nummer) etc over Uw vereniging en activiteiten meesturen?

Dankwoord

Aan de tot standkoming van deze dissertatie hebben velen bijgedragen.

Het registratieproject op basis waarvan deze dissertatie tot stand is gekomen, is een project dat gesubsidieerd is door de Nederlandse Hartstichting. Jan van Dixhoorn heeft veel voorwerk gedaan, hij was projectaanvrager en wij hebben ruimschoots gebruikgemaakt van zijn know-how en adviezen. Marion Verhulsdonk dient genoemd te worden omdat zij mij getipt heeft voor de vacature van dit project.

Frits Bär was projectleider en heeft deze rol op een voortvarende, stimulerende en creatieve manier vormgegeven. Zijn aanpak van praktijkgericht onderzoek en zijn inzet om de resultaten hiervan aan te wenden ter verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg, hebben mij altijd erg aangesproken. Door onze samenwerking heeft het project zowel in binnen- als buitenland ruimschoots in de belangstelling gestaan. Hij is ook degene geweest die, met nimmer aflatend geduld, de verschillende hoofdstukken van dit proefschrift tot in hun ruwe vorm begeleid heeft.

Dank ook aan Mitzi Bär niet alleen vanwege haar uitstekende gastvrijheid tijdens de besprekingen in de avonduren, maar ook voor de invoer van data in de computer.

Vervolgens is Jos Diederiks erbij betrokken. Door zijn kritische en altijd constructieve houding werd de ruwe diamant fijngeslepen en goed genoeg geacht om aan de promotor voor te leggen.

Prof. Wellens heeft op zijn beurt de puntjes op de i gezet en het manuscript goedgekeurd. Ik vind het een grote eer dat hij zich bereid heeft verklaard als promotor van dit proefschrift op te willen treden.

Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de opmerkingen en adviezen van de beoordelingscommissie. Door hun bijdrage is de kwaliteit van de uiteindelijke versie van dit proefschrift verbeterd.

Voor de verhoging van de leesbaarheid van hoofdstuk 2 tot en met 5 dank aan mijn zwager Frans van Dijk. Voor de correctie van de drukproeven dank aan Mia van Dijk, Viola Janssen en Birgit van der Burg. Voor de bijdrage aan de vertaling van de samenvatting wil ik bedanken Rob en Ina Zeitlin.

Voor de hulp bij de dataverzameling ben ik dank verschuldigd aan de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Hartpatiënten, de ziekenhuizen, de teams en aan de vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen en hun koepelorganisaties. Speciale dank aan Emile Thijssen voor zijn gegevens van sportgroepen. Zonder hun inzet zou dit onderzoek niet hebben kunnen plaatsvinden. Dank ook aan de instellingen die de

individuele patiëntenregistratielijsten gebruikt hebben. De Nederlandse Hartstichting dient hier genoemd te worden vanwege het beschikbaar stellen van computers ten behoeve van de dataverzameling.

Rob Mulleneers, Berto Bleijlevens en Jan Heymeriks van de Afdeling Cardiologie ben ik dank verschuldigd voor hun programmeerwerk en adviezen op automatiseringsgebied. Voor administratieve en overige ondersteuning dank aan de verschillende secretaresses van de Afdeling Cardiologie, waarbij Margriet Muytjens speciaal genoemd dient te worden. Tevens dank aan het St. Annaziekenhuis voor de ondersteuning; genoemd dienen te worden oa de directie en de afdeling automatisering.

Tenslotte wil ik dit proefschrift opdragen aan mijn familie: op de eerste plaats ter nagedachtenis aan mijn moeder die vorig jaar helaas te vroeg overleden is en die zich erg verheugd had op deze dag en aan mijn vader. Verder aan Mia, mijn echtgenote en aan onze kinderen Rutger, Jeroen en Astrid, die samen met mij blij zijn dat deze onderneming afgerond is.

Curriculum Vitae

Paul Soons werd op 18 juli 1956 geboren te Merkelbeek (L.). In 1975 deed hij eindexamen Gymnasium A aan het Bisschoppelijk College te Sittard. Vervolgens ging hij aan de Katholieke Universiteit Nijmegen psychologie en filosofie studeren, alwaar hij in 1980 in beide studies het kandidaatsexamen heeft afgerond. In 1984 studeerde hij af in de psychologie met als hoofdrichting klinische psychologie, als nevenrichting arbeids- en organisatiepsychologie en als bijvak economie voor psychologen.

Daarna volgden part-time aanstellingen voor wetenschappelijk onderzoek aan de Vakgroep Klinische Psychologie van het Psychologisch Laboratorium van de KUN (1984-1986) en aan de Vakgroep Cardiologie van de Medische Faculteit van de RL te Maastricht (1987-1991). In Maastricht heeft hij gewerkt aan het Registratieproject van de Revalidatie Commissie van de Nederlandse Hartstichting, op basis waarvan dit proefschrift tot stand is gekomen. Hij was tevens secretaris van de taskforce die het rapport "Hartrevalidatie op maat: nieuwe visies" voortbracht.

Naast het wetenschappelijk onderzoek is hij steeds part-time werkzaam geweest in de patiëntenzorg achtereenvolgens aan het Ambulatorium van het Psychologisch Laboratorium (KUN) (1984-1987), de St. Maartenskliniek te Nijmegen (1986-1992) en het St. Maartensgasthuis te Venlo (1991-1992).

Vanaf 1992 is hij full-time werkzaam op de Afdeling Klinische Psychologie van het St. Annaziekenhuis te Geldrop. Hij is lid van de PAZ (sectie Psychologen Algemene Ziekenhuizen van het NIP). In opdracht van het bestuur van de PAZ was hij achtereenvolgens lid van de commissie hartrevalidatie, secretaris van de voorbereidingswerkgroep consensus hartrevalidatie (ism het CBO) en voorzitter van de commissie verrichtingen.

Hij behaalde in 1987 de registratie tot klinisch psycholoog (NIP), in 1989 volgde het lidmaatschap en in 1993 het supervisorschap van de Vereniging voor Gedragstherapie. In 1994 werd inschrijving verkregen in het register van psychotherapeuten (ministerie van VWS).

Hij is ten behoeve van postacademisch onderwijs actief voor het Instituut voor Rationele Therapie te Nijmegen (cognitieve- en gedragstherapie), de post-doctorale opleiding tot klinisch psycholoog (KUN) en de Centrale RINO-groep (in het kader van de psychotherapie opleiding).