

# Operatieve behandeling van verschillende vormen van kyfose van de wervelkolom

## Citation for published version (APA):

van Ooij, A. (1985). *Operatieve behandeling van verschillende vormen van kyfose van de wervelkolom*. Rijksuniversiteit Limburg.

## Document status and date:

Published: 01/01/1985

## Document Version:

Publisher's PDF, also known as Version of record

## Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

## General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

[www.umlib.nl/taverne-license](http://www.umlib.nl/taverne-license)

## Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

[repository@maastrichtuniversity.nl](mailto:repository@maastrichtuniversity.nl)

providing details and we will investigate your claim.

Stellingen behorende bij het proefschrift van A. van Ooij: Operatieve behandeling van verschillende vormen van kyfose van de wervelkolom.

- 1 Een versterkte kyfose van de wervelkolom kan rugklachten geven, vooral na het 30e levensjaar en meestal ten gevolge van de compensatoire hyperlordosen.
- 2 De ziekte van Scheuermann heeft bij tijdige ontdekking en adequate conservatieve behandeling een goede prognose.
- 3 Het werk van Hodgson te Honkong op het gebied van tuberculeuze kyfosen is van onschatbare waarde geweest bij de verdere ontwikkeling van de voorste wervelkolomchirurgie.
- 4 Een uitgebreide laminectomie op de kinderleeftijd dient zoveel mogelijk de facetgewrichten te sparen. Is het toch noodzakelijk deze te verwijderen, dan is het beter gelijktijdig een spondylodese toe te voegen om progressieve verkrumming van de wervelkolom te voorkomen.
- 5 Een neurofibromatose kyfose met of zonder scoliose, waarbij dysplastische kenmerken aanwezig zijn, dient in een vroeg stadium operatief gestabiliseerd te worden.
- 6 De samenwerking tussen eerste en tweede echelon zal veel gemakkelijker verlopen, als men elkaar onderling beter kent. Vriendschap is de beste manier om ook in het werk de contacten te versoepelen.
- 7 Het niet goed omschreven zijn van welke ziektebeelden tot welk specialisme behoren, geeft vele interdisciplinaire wrijvingen. Hier lijkt een taak voor de overheid te liggen, aangezien de medische professie zelf niet bij machte schijnt te zijn hiervoor een bevredigende oplossing te vinden.
- 8 Als toekomstige research aantoont, dat formaldehyde intoxicierend werkt, verklaart dat waarom patholoog-anatomen als groep zulke aardige en vriendelijke mensen zijn. Human Pathology Vol 15 no 2, febr 1984, blz 101.
- 9 De diagnose Bankart laesie van het labrum glenoïdale kan door middel van arthroscopie van de schouder met grotere zekerheid gesteld worden in vergelijking met andere onderzoeksmethoden.
- 10 Het motto "wat krom is moet recht" dient in de orthopaedie niet als absoluut gegeven gehanteerd te worden.
- 11 Het verdwijnen van grote arealen oerwoud en andere vegetatievormen in de wereld bedreigt een groot aantal levensvormen met uitroeiing. Het verdient de hoogste prioriteit deze afbraak van natuurlijk erfgoed tegen te gaan en te voorkomen. De overleving van vele soorten planten, waaronder orchideeën, zou zeer gebaat zijn bij het opzetten van zaadbanken, het vermeerderen en het opnieuw uitzetten in de overgebleven natuur van zeldzame soorten.
- 12 De zure regen zal ons nog zuur opbreken.

- 13 In orkesten bestaat vaak een scheiding tussen strijkers en blazers op grond van vermeend verschil in mentaliteit en gedrag. In de praktijk blijkt een combinatie van twee van deze instrumentalisten goed uit te kunnen pakken, als niet ieder van de twee de eerste viool wil spelen of te hoog van de toren probeert te blazen.
- 14 Laatste stellingen in proefschriften zijn vaak humoristisch bedoeld. Dit lukt slechts zelden; de proefschriften zelf zijn echter steeds vaker om te lachen.